

សម្រាប់គ្រប់គ្រង
 ថ្នាក់ទី ១២
 ភាគ ១

គណៈកម្មការវិនិច្ឆ័យ

ច្រើន បើមស្រី
 រត្ន សាគរ
 សាន សិត
 អៀម សុំផាត

គណៈកម្មការពិនិត្យ

ចាន ពន
 អ៊ិន គឹមស្រីន
 ចេង យា
 សៅ ស្នាវើត

អ្នករៀបរៀង

កើ ណែលាង

ហក្រង ខេងតិ

ទេព សុត្តន្ធ

លាង ជួនលី

បានទទួលការអនុញ្ញាតអោយបោះពុម្ពផ្សាយពីក្រសួងអប់រំ យុវជន និង កីឡា
 ប្រកាសលេខ ៣៩១ អយក ចុះថ្ងៃទី ២៧ តុលា ឆ្នាំ ១៩៩៧ ដើម្បីប្រើប្រាស់
 នៅតាមសាលាចំនេះទូទៅ ។

ពាក្យបណ្តឹង

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា យើង កំពុងអភិវឌ្ឍន៍ធនធានមនុស្សដោយផ្ដើមចេញពីវិស័យ
អប់រំ ។ សព្វថ្ងៃ ក្រ និង សិស្សកំពុងខ្វះខាតឯកសារសំរាប់សិក្សាទៀងស្មើគ្នា ។ យើងខ្ញុំ
ទាំងអស់គ្នាបានយកអស់កំលាំងកាយចិត្ត ជ្រើសរើសលំហាត់ពីសៀវភៅផ្សេងៗ និង
វិញ្ញាសាប្រលងតាមឆ្នាំនានាមកស្រាយជាគំរូ និងរៀបចំគាត់តែងសៀវភៅលំហាត់គណិត
វិទ្យានេះឡើង ដើម្បីជួយអ្នកបង្រៀន និងអ្នកសិក្សាដោយចេះធ្វើលំហាត់អនុគមន៍
ត្រឹមត្រូវ ។

យើងខ្ញុំ សូមឧទ្ទិសស្នាដៃនេះចំពោះ បុព្វការីន ដែលបានធ្វើពីលើកម្មដើម្បី
ជាតិ ។ ពិសេសទៅទៀត ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងយកចិត្ត
ទុកដាក់លើវិស័យអប់រំ យើងខ្ញុំក៏សូមឧទ្ទិសស្នាដៃនេះ ចំពោះ **សម្តេចនាយករដ្ឋមន្ត្រី
ទី២ ហ៊ុន សែន និង លោកជំនាញ ម៉ុង ភីនី ហ៊ុន សែន** សំរាប់ទុកធ្វើជា
អំណោយដល់សិស្សានុសិស្សនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ក្នុងការសិក្សាពង្រីកចំនេះ
ដឹងតទៅទៀត ។

យើងខ្ញុំរង់ចាំទទួលការចិញ្ចឹមស្ថាបនារបស់ប្អូនៗសិស្សានុសិស្ស និងលោកគ្រូ អ្នក
គ្រូទាំងអស់ ។

ក្រុមអ្នកនិពន្ធ

មាតិកា


យើងខ្ញុំជាអ្នកនិពន្ធ មានវត្ថុចំនងតែមួយគត់ គឺជួយអ្នកសិក្សាដែលខ្សោយ មធ្យម និង
ពូកែដោយចេះវិធីរកលំហាត់អនុគមន៍ ដោយយើងបានរៀបរៀងតាមលំដាប់នៃមេរៀន ៖

- ដែនកំនត់ : ដោយរៀបរៀងតាមលំដាប់ពីងាយទៅលំបាក
- លីមីត
- របៀបប្រើដេរីវេ : ប្រើដេរីវេប្រែប្រួលទៅតាមប្រភេទសំនួរក្នុងលំហាត់មាន
វិសមភាព និងចំនោទបរមា
- សំនុំចំនុច : វិធីរកសំនុំចំនុចក្នុងពិជគណិត ដំបូងត្រូវរកអាប់ស៊ីស និងអរដោនេ
រួចមើលប្រភេទទី១ ទី២ ទី៣
- កូអរដោនេ ចំនុចប្រសព្វរវាង :
 - ខ្សែកោង និង ខ្សែកោង
 - ខ្សែកោង និង បន្ទាត់
- គូសខ្សែកោងពីងាយទៅលំបាក : (ភាពខុសគ្នានៃខ្សែកោង តាងអនុគមន៍
តំលៃដាច់ខាត)
- មីកាបំលែងចាំងនៃខ្សែកោង

សូមជូនពរដល់អ្នកសិក្សាទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ប្រការ ។


អ្នកនិពន្ធ

1) $y = \lg(x^2 - x - 6)$
 ចំពោះ $\lg(x^2 - x - 6)$ មានន័យលុះត្រាតែ $x^2 - x - 6 > 0$
 $x^2 - x - 6$ ជាត្រីការ៉េក្រេទីត២ នៃ x ដែលមានឫស $x_1 = -2, x_2 = 3$



យើងបាន $\mathcal{D} =]-\infty; -2[\cup]3; +\infty[$


2) $y = \sqrt{x^2 - 2x - 8}$
 ចំពោះ $\sqrt{x^2 - 2x - 8}$ មានន័យលុះត្រាតែ $x^2 - 2x - 8 \geq 0$
 $x^2 - 2x - 8$ ជាត្រីការ៉េក្រេទីត២ នៃ x ដែលមានឫស $x_1 = -2$ និង $x_2 = 4$



យើងបាន $\mathcal{D} =]-\infty; -2] \cup [4; +\infty[$

3) $y = \lg(x^2 - 2x - 8) \pm \lg(25 - x^2)$


ចំពោះ អនុគមន៍មានន័យលុះត្រាតែ $\begin{cases} x^2 - 2x - 8 > 0 \\ 25 - x^2 > 0 \end{cases}$



យើងបាន


$\mathcal{D} =]-5; -2[\cup]4; 5[$

4) $y = \lg(x^2 - 2x - 3) \pm \sqrt{25 - x^2}$
 អនុគមន៍មានន័យលុះត្រាតែ $\begin{cases} x^2 - 2x - 3 > 0 \\ 25 - x^2 \geq 0 \end{cases}$



5) $y = \sqrt{x^2 - 2x - 8} \pm \frac{1}{\sqrt{25 - x^2}}$

ចំពោះ អនុគមន៍មានន័យលុះត្រាតែ $\begin{cases} x^2 - 2x - 8 \geq 0 \\ 25 - x^2 > 0 \end{cases}$



យើងបាន $\mathcal{D} =]-5; -2] \cup [4; 5[$

6) $y = \lg\left(\frac{x^2 - x - 2}{16 - x^2}\right)$

ចំពោះ អនុគមន៍នេះមានន័យលុះត្រាតែ $\frac{N(x)}{D(x)} = \frac{x^2 - x - 2}{16 - x^2} > 0$

x	$-\infty$	-4	-1	2	4	$+\infty$
$N(x)$	+	+	0	-	0	+
$D(x)$	-	0	+	+	0	-
$\frac{N(x)}{D(x)} > 0$	+	+	0	-	0	+

យើងបាន $\mathcal{D} =]-4; -1[\cup]2; 4[$

$$7) y = \sqrt{\frac{x^2 - 2x - 8}{25 - x^2}}$$

ចំណាំ : អនុគមន៍នេះមានន័យលុះត្រាតែ $\frac{x^2 - 2x - 8}{25 - x^2} \geq 0$

x	$-\infty$	-5	-2	4	5	$+\infty$
$x^2 - 2x - 8$		+	+	0	-	+
$25 - x^2$		-	0	+	+	0
$\frac{x^2 - 2x - 8}{25 - x^2} \geq 0$		///	+	///	+	///

យើងបាន

$$\mathcal{D} =]-5; -2] \cup [4; 5[$$

$$8) y = \lg\left(\frac{x^2 - x - 12}{x^2 + x + 1}\right)$$

ចំណាំ : អនុគមន៍នេះមានន័យលុះត្រាតែ $\frac{N(x)}{D(x)} = \frac{x^2 - x - 12}{x^2 + x + 1} > 0$

$$D(x) = x^2 + x + 1 \text{ មាន } \begin{cases} a = 10 \\ \Delta = 1 - 4 = -3 < 0 \Rightarrow D(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R} \end{cases}$$

ដូចនេះ $\frac{N(x)}{D(x)}$ យកសញ្ញាតាម $N(x)$, $\frac{N(x)}{D(x)} > 0 \Rightarrow N(x) > 0$

x	$-\infty$	-3	4	$+\infty$
$N(x) > 0$		+	///	+

យើងបាន

$$\mathcal{D} =]-\infty; -3[\cup]4; +\infty[$$

$$9) y = \lg(x^3 - 4x^2 + 3)$$

ចំណាំ : អនុគមន៍នេះមានន័យលុះត្រាតែ : $x^3 - 4x^2 + 3 > 0$

$$\text{តាង } P(x) = x^3 - 4x^2 + 3 \text{ ដោយ } P(1) = 1 - 4 + 3 = 0 \Rightarrow x = 1$$

ជាបូកនៃ $P(x)$ ហើយ $P(x)$ ចែកដាច់នឹង $x - 1$

$$\begin{array}{r|l} x^3 - 4x^2 + 3 & x - 1 \\ \hline -x^3 + x^2 & x^2 - 3x - 3 \\ \hline -3x^2 + 3 & \\ \hline 3x^2 - 3x + 3 & \\ \hline -3x + 3 & \\ \hline +3x - 3 & \\ \hline 0 & 0 \end{array}$$

$x^2 - 3x - 3$ ជាត្រីការ៉េក្រេទី២នៃ x មាន $\Delta = 9 + 12 = 21$ ដូច្នេះ

$$\text{វាមានបូក } x_1 = \frac{3 - \sqrt{21}}{2}, \quad x_2 = \frac{3 + \sqrt{21}}{2}$$

x	$-\infty$	$\frac{3 - \sqrt{21}}{2}$	1	$\frac{3 + \sqrt{21}}{2}$	$+\infty$
$x - 1$		-	0	+	+
$x^2 - 3x - 3$		+	0	-	0
$P(x) > 0$		///	+	///	+

យើងបានដែនកំណត់

$$\mathcal{D} =]\frac{3 - \sqrt{21}}{2}; 1[\cup]\frac{3 + \sqrt{21}}{2}; +\infty[$$

$$10) y = \lg(9x^2 - 6x + 1)$$


អនុគមន៍នេះមានន័យលុះត្រាតែ $9x^2 - 6x + 1 > 0$

$$9x^2 - 6x + 1 = (3x - 1)^2 \text{ មានបូក } x_1 = x_2 = \frac{1}{3}$$

$$\begin{array}{r|l} x & -\infty & \frac{1}{3} & +\infty \\ \hline 9x^2 - 6x + 1 & + & 0 & + \end{array} \quad \mathcal{D} = \mathbb{R} - \left\{\frac{1}{3}\right\}$$

$$11) y = \lg(\sqrt{x-1} + \sqrt{7-x})$$

ចំណាំ : អនុគមន៍នេះមានន័យលុះត្រាតែ $\begin{cases} x-1 \geq 0 \\ 7-x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 1 \\ x \leq 7 \end{cases}$



យើងបាន $D = [1; 7]$

12) $y = \lg(\sqrt{x-1} - \sqrt{7-x})$

ចំណើយ អនុគមន៍មានន័យលុះត្រាតែ : $\sqrt{x-1} - \sqrt{7-x} > 0$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x-1 \geq 0 \\ 7-x \geq 0 \\ \sqrt{x-1} > \sqrt{7-x} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 1 \\ x \leq 7 \\ x-1 > 7-x \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 7 \\ x > 4 \end{cases}$$

យើងបាន $D = [4; 7]$

13) $y = \sqrt{1-2x\sqrt{1-x^2}} \pm \sqrt{1+2x\sqrt{1-x^2}}$

ចំណើយ : $1-2x\sqrt{1-x^2} = x^2 - 2x\sqrt{1-x^2} + 1-x^2 = (x-\sqrt{1-x^2})^2$


$1+2x\sqrt{1-x^2} = x^2 + 2x\sqrt{1-x^2} + 1-x^2 = (x+\sqrt{1-x^2})^2$

$\Rightarrow \sqrt{1-2x\sqrt{1-x^2}} = \sqrt{(x-\sqrt{1-x^2})^2} = |x-\sqrt{1-x^2}|$

$\sqrt{1+2x\sqrt{1-x^2}} = \sqrt{(x+\sqrt{1-x^2})^2} = |x+\sqrt{1-x^2}|$

ដូច្នេះ : $y = |x-\sqrt{1-x^2}| \pm |x+\sqrt{1-x^2}|$

អនុគមន៍នេះមានន័យកាលណា $1-x^2 \geq 0$



យើងបាន $D = [-1; 1]$

14) $y = \lg(\lg x)$

អនុគមន៍មានន័យលុះត្រាតែ $\lg x > 0 = \lg 1 \Rightarrow x > 1$

ដូច្នេះយើងបាន

$D =]1; +\infty[$

15) $y = \lg(\log_{0.5} x)$

អនុគមន៍មានន័យលុះត្រាតែ $\log_{0.5} x > 0 = \log_{0.5} 1 \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ x < 1 \end{cases}$

$D =]0; 1[$ $\Leftrightarrow |\log_2 x| \leq 3$

16) $y = \sqrt{3-|\log_2 x|}$ អនុគមន៍មានន័យលុះត្រាតែ $3-|\log_2 x| \geq 0$

$\Leftrightarrow |\log_2 x| \leq 3 \Leftrightarrow \begin{cases} \log_2 x \geq -3 = \log_2 2^{-3} = \log_2 \frac{1}{8} \\ \log_2 x \leq 3 = \log_2 2^3 = \log_2 8 \end{cases} \Leftrightarrow$

$\begin{cases} x \geq \frac{1}{8} \\ x \leq 8 \end{cases} \Rightarrow D = [\frac{1}{8}; 8]$

17) $y = \sqrt{\log_{\sin \alpha} ((\log_2 x) - 3)}$ បើ $\alpha \in]0; \frac{\pi}{2}[$

លើក ក) $0 < a < 1$ $\log_a f(x) \geq 0$ លុះត្រាតែ $0 < f(x) \leq 1$

ខ) $a > 1$ $\log_a f(x) \geq 0$ លុះត្រាតែ $f(x) \geq 1$

$|A(x)| \geq K \Leftrightarrow \begin{cases} A(x) \leq -K \\ A(x) \geq K \end{cases} ; |A(x)| \leq K \Leftrightarrow \begin{cases} A(x) \geq -K \\ A(x) \leq K \end{cases}$

ដោយ $\alpha \in]0; \frac{\pi}{2}[\Rightarrow 0 < a = \sin \alpha < 1$

អនុគមន៍មានន័យលុះត្រាតែ $\log_{\sin \alpha} (|\log_2 x| - 3) \geq 0$

ដោយគោល $0 < \sin \alpha < 1 \Rightarrow \begin{cases} |\log_2 x| - 3 > 0 \\ |\log_2 x| - 3 \leq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} |\log_2 x| > 3 \\ |\log_2 x| \leq 4 \end{cases} \quad (1)$

$(1) \Rightarrow |\log_2 x| > 3 \Leftrightarrow \begin{cases} \log_2 x < -3 = \log_2 2^{-3} = \log_2 \frac{1}{8} \\ \log_2 x > 3 = \log_2 2^3 = \log_2 8 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x < \frac{1}{8} \\ x > 8 \end{cases}$



$(2) \Rightarrow |\log_2 x| \leq 4 \Leftrightarrow \begin{cases} \log_2 x \geq -4 = \log_2 2^{-4} = \log_2 \frac{1}{16} \\ \log_2 x \leq 4 = \log_2 2^4 = \log_2 16 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x \geq \frac{1}{16} \\ x \leq 16 \end{cases}$



បើ $\mathcal{D}$ ជាផែនកំនត់នោះ $= (1) \cap (2)$





$$\mathcal{D} = \left[\frac{1}{16} ; \frac{1}{8} \right] \cup]8 ; 16]$$

18) $y = \lg(\sqrt{x-1} - \sqrt{7-x}) + \sqrt{x^2-25}$

អនុគមន៍មានន័យលុះត្រាតែ :

$$\begin{cases} x-1 \geq 0 \\ 7-x \geq 0 \\ x-1 > 7-x \\ x^2-25 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 1 \\ x \leq 7 \\ x > 4 \\ x^2-25 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 4 \\ x \leq 7 \\ x^2-25 \geq 0 \end{cases}$$




$$\mathcal{D} = [5; 7]$$

19) $y = \frac{1}{|x|-x} \pm \sqrt{x^2-x-6}$

បើ $x \geq 0 \Rightarrow |x| = x \Rightarrow |x| - x = x - x = 0$ យើងយក $x < 0$

x^2-x-6 ជាត្រីការ៉េក្រេទីពីរនៃ x មានឫស $x_1 = -2, x_2 = 3$



យើងបាន


$$\mathcal{D} =]-\infty, -2]$$

20) $y = \frac{2}{x+|x|} + \lg(x^2-x-12)$

បើ $x \leq 0 \Rightarrow |x| = -x \Rightarrow x + |x| = x - x = 0$

យើងត្រូវយក $x > 0$

x^2-x-12 ជាត្រីការ៉េក្រេទីពីរនៃ x មានឫស $x_1 = -3, x_2 = 4$




យើងបាន

$$\mathcal{D} =]4 ; +\infty[$$

21) $y = \sqrt{\frac{\lg x - 1}{2 - \lg x}}$

អនុគមន៍មានន័យលុះត្រាតែ $\frac{\lg x - 1}{2 - \lg x} \geq 0$



$$\begin{cases} \lg x \geq 1 = \lg 10 \\ \lg x < 2 = \lg 100 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 10 \\ x < 100 \end{cases} \Rightarrow \mathcal{D} = [10 ; 100[$$

22) $y = \sqrt{9^x - 6^x - 4^x}$

អនុគមន៍មានន័យលុះត្រាតែ $9^x - 6^x - 4^x \geq 0$

$$9^x - 6^x - 4^x = 3^{2x} - 3^x \cdot 2^x - 2^{2x} \geq 0 \Leftrightarrow \left(\frac{3}{2}\right)^{2x} - \left(\frac{3}{2}\right)^x - 1 \geq 0$$

តាង $\left(\frac{3}{2}\right)^x = X, X > 0$ យើងបាន $X^2 - X - 1 \geq 0$ តែ

$X^2 - X - 1$ មាន $\Delta = 1 + 4 = 5$ មានឫស $x_1 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} < 0$ និង

$$x_2 = \frac{1+\sqrt{5}}{2} > 0$$

$$\frac{x}{x^2 - x - 1} \geq 0$$

$$x = \left(\frac{3}{2}\right)^x \geq \frac{1+\sqrt{5}}{2} \Rightarrow x \geq \log_{\frac{3}{2}} \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

យើងបាន $\mathcal{D} = \left[\log_{\frac{3}{2}} \frac{1+\sqrt{5}}{2} ; +\infty[\right]$

23) $y = \lg(9^x - 6^x - 4^x)$

អនុគមន៍មានន័យលុះត្រាតែ : $9^x - 6^x - 4^x > 0$

ធ្វើសំរាយដូចខាងលើ ដោយយក $x = \left(\frac{3}{2}\right)^x > \frac{1+\sqrt{5}}{2} \Rightarrow$

$$x > \log_{\frac{3}{2}} \frac{1+\sqrt{5}}{2} \Rightarrow \mathcal{D} =] \log_{\frac{3}{2}} \frac{1+\sqrt{5}}{2} ; +\infty[$$

24) $y = \sqrt{\frac{3^x - 1}{27 - 3^x}}$

អនុគមន៍មានន័យលុះត្រាតែ $\frac{3^x - 1}{27 - 3^x} \geq 0$ តាង $3^x = X, X > 0$

ឆ្លោះ : $x = \log_3 X$ យើងបាន $\frac{X-1}{27-X} \geq 0$

$$\frac{X-1}{27-X} \geq 0$$

$$1 \leq X = 3^x < 27 = 3^3 \Leftrightarrow \log_3 1 = 0 \leq x < \log_3 3^3 = 3$$

$\mathcal{D} = [0 ; 3[$

25) $y = \sqrt{4^x - 3^{x-\frac{1}{2}} - 3^{x+\frac{1}{2}} + 2^{2x-1}}$

អនុគមន៍មានន័យលុះត្រាតែ : $4^x - 3^{x-\frac{1}{2}} - 3^{x+\frac{1}{2}} + 2^{2x-1} \geq 0$

$$4^x = 4^{x-\frac{1}{2}+\frac{1}{2}} = 4^{\frac{1}{2}} \cdot 4^{x-\frac{1}{2}} = 2 \cdot 4^{x-\frac{1}{2}}$$

$$3^{x+\frac{1}{2}} = 3^{x-\frac{1}{2}+1} = 3 \cdot 3^{x-\frac{1}{2}} ; 2^{2x-1} = (2^2)^{x-\frac{1}{2}} = 4^{x-\frac{1}{2}}$$

ដូចនេះយើងបាន $2 \cdot 4^{x-\frac{1}{2}} - 3^{x-\frac{1}{2}} - 3 \cdot 3^{x-\frac{1}{2}} + 4^{x-\frac{1}{2}} \geq 0$

$$\Leftrightarrow 3 \cdot 4^{x-\frac{1}{2}} \geq 4 \cdot 3^{x-\frac{1}{2}} \Leftrightarrow \left(\frac{4}{3}\right)^{x-\frac{1}{2}} \geq \frac{4}{3} \Leftrightarrow x - \frac{1}{2} \geq 1 \Leftrightarrow x \geq \frac{3}{2}$$

ដូចនេះយើងបាន $\mathcal{D} = \left[\frac{3}{2} ; +\infty[\right]$

26) $y = \lg\left(4^x - 3^{x-\frac{1}{2}} - 3^{x+\frac{1}{2}} + 2^{2x-1}\right)$

អនុគមន៍នេះមានន័យលុះត្រាតែ $4^x - 3^{x-\frac{1}{2}} - 3^{x+\frac{1}{2}} + 2^{2x-1} > 0$

$$\left(\frac{4}{3}\right)^{x-\frac{1}{2}} > \frac{4}{3} \Rightarrow x - \frac{1}{2} > 1$$

$$\Leftrightarrow x > 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \text{ ដូច្នេះយើងបាន } \mathcal{D} =] \frac{3}{2} ; +\infty[$$


27) កំនត់ m ដើម្បីដោយអនុគមន៍ $y = \lg[(2m-1)x^2 - (m+2)x + m-1]$

មានដែនកំនត់ $\mathcal{D} = \mathcal{R}$

$(2m-1)x^2 - (m+2)x + m-1 > 0, \forall x \in \mathcal{R}$ លុះត្រាតែ

$$\begin{cases} 2m-1 > 0 \\ \Delta = -7m^2 + 16m = m(-7m+16) < 0 \end{cases}$$

$$\frac{m}{a = 2m-1 > 0}$$




28) $y = \lg \cos x$

ចំណេញ យើងត្រូវយក $\cos x > 0$


ដូច្នេះ: $-\frac{\pi}{2} + K2\pi < x < \frac{\pi}{2} + K2\pi; k \in \mathbb{Z}$

យើងបាន $\mathcal{D} =]-\frac{\pi}{2} + K2\pi; \frac{\pi}{2} + K2\pi[$




29) $y = \lg(1-x^2) \pm \lg \cos x$

ចំណេញ យើងត្រូវយក $\begin{cases} 1-x^2 > 0 \\ \cos x > 0 \end{cases}$





យើងត្រូវយក: $\mathcal{D} =]-1; 1[$



30) $y = \lg(\sqrt{x-1} + \sqrt{7-x}) \pm \lg \cos x$

យើងត្រូវយក $\begin{cases} x-1 \geq 0 \\ 7-x \geq 0 \\ \cos x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 1 \\ x \leq 7 \\ \cos x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 \leq x \leq 7 \\ \cos x > 0 \end{cases}$

x គិតជា rd នៅលើអ័ក្ស x'




យើងបាន


$\mathcal{D} = [1; \frac{\pi}{2}] \cup [\frac{3\pi}{2}; 7]$

31) $y = \lg(-x^2 + 7x - 6) \pm \sqrt{\cos x}$

យើងត្រូវយក $\begin{cases} -x^2 + 7x - 6 > 0 \\ \cos x \geq 0 \end{cases}$




x គិតជា rd នៅលើអ័ក្ស x'



យើងបាន

$\mathcal{D} = [1; \frac{\pi}{2}] \cup [\frac{3\pi}{2}; 6]$




32) $y = \lg \sin x$

យើងត្រូវយក $\sin x > 0$

$K2\pi < x < \pi + K2\pi$

ដូច្នេះ: $\mathcal{D} =]K2\pi; \pi + K2\pi[; K \in \mathbb{Z}$



33) $y = \sqrt{16-x^2} \pm \sqrt{\sin x}$

យើងត្រូវយក $\begin{cases} 16-x^2 \geq 0 \\ \sin x \geq 0 \end{cases}$




នៅលើអ័ក្ស x'x : x គិតជា rd



យើងបាន

$\mathcal{D} = [-4; -\pi] \cup [0; \pi]$



34) $y = \lg(16-x^2) \pm \sqrt{\sin x}$
 យើងត្រូវយក $\begin{cases} 16-x^2 > 0 \\ \sin x \geq 0 \end{cases} \Rightarrow \mathcal{D} =]-4; \pi] \cup [0; \pi]$


35) $y = \lg \lg x$

យើងត្រូវយក $\lg x > 0$

$\lg x > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} K2\pi < x < \frac{\pi}{2} + K2\pi \\ \pi + K2\pi < x < \frac{3\pi}{2} + K2\pi, K \in \mathbb{Z} \end{cases}$

យើងបាន :

$\mathcal{D} =]K2\pi; \frac{\pi}{2} + K2\pi[\cup]\pi + K2\pi; \frac{3\pi}{2} + K2\pi[$




36) $y = \lg(\sqrt{3} \lg^2 x - 4 \lg x + \sqrt{3})$

យើងត្រូវយក $\sqrt{3} \lg^2 x - 4 \lg x + \sqrt{3} > 0$

តាង $\lg x = t$; $-\infty < t < +\infty$ យើងបាន

$\sqrt{3}t^2 - 4t + \sqrt{3}$ មាន $\Delta' = 4 - 3 = 1$ ទោះយើងបាន

$t_1 = \frac{\sqrt{3}}{3}$; $t_2 = \sqrt{3}$ បើ $t_1 = \frac{\sqrt{3}}{3} = \lg \frac{\pi}{6}$; $t_2 = \sqrt{3} = \lg \frac{\pi}{3}$




យើងត្រូវយក

$\begin{cases} t < \frac{\sqrt{3}}{3} \\ t > \sqrt{3} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \lg x < \frac{\sqrt{3}}{3} \\ \lg x > \sqrt{3} \end{cases}$

យើងត្រូវយក $\frac{\pi}{3} + K2\pi < x < \frac{7\pi}{6} + K2\pi$

និង $x \neq \frac{\pi}{2} + K2\pi$





$-\frac{2\pi}{3} + K2\pi < x < \frac{\pi}{6} + K2\pi$ និង $x \neq -\frac{\pi}{2} + K2\pi$

ដូច្នេះ យើងបាន

$\mathcal{D} =]\frac{\pi}{3} + K2\pi; \frac{7\pi}{6} + K2\pi[\cup]-\frac{2\pi}{3} + K2\pi; \frac{\pi}{6} + K2\pi[\setminus \left\{ -\frac{\pi}{2} + K2\pi; \frac{\pi}{2} + K2\pi \right\}$

37) $y = \lg(16-x^2) + \lg\left(\frac{1}{\sin x} - 2\right)$


យើងត្រូវយក $\begin{cases} 16-x^2 > 0 \\ \frac{1}{\sin x} - 2 = \frac{1-2\sin x}{\sin x} > 0 \end{cases}$



យើងត្រូវយក

$\begin{cases} -4 < x < 4 \\ 0 < \sin x < \frac{1}{2} \end{cases}$

x គិតជា rd : នៅលើអ័ក្ស x'x




យើងបាន

$\mathcal{D} =]-\frac{7\pi}{6}; -\pi[\cup]0; \frac{\pi}{6}[\cup]\frac{5\pi}{6}; \pi[$

38) $y = \lg(\cos 2x - \cos x)$


យើងត្រូវយក $\cos 2x - \cos x = 2 \cos^2 x - \cos x - 1 > 0$



យើងត្រូវយក : $\cos x < -\frac{1}{2}$

$\frac{2\pi}{3} + K2\pi < x < \frac{4\pi}{3} + K2\pi$

$\mathcal{D}_1 =]\frac{2\pi}{3} + K2\pi ; \frac{4\pi}{3} + K2\pi[$



លំហាត់ផ្នែកលីមីត

សុខ ពិសិដ្ឋ

www.pisethsok.wordpress.com

1. លីមីតមិនកំណត់ : $\frac{0}{0}$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x^2 - 4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x^2 + 2x + 4)}{(x-2)(x+2)} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + 2x + 4}{x+2}$$

$$= \frac{4 + 8 + 4}{2 + 2} = 3 \quad \text{ដូច្នេះ:} \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x^2 - 4} = 3$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^5 - 32}{x^3 - 8} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x^4 + 2x^3 + 4x^2 + 8x + 16)}{(x-2)(x^2 + 2x + 4)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^4 + 2x^3 + 4x^2 + 8x + 16}{x^2 + 2x + 4} = \frac{16 + 16 + 16 + 16 + 16}{4 + 4 + 4} = \frac{80}{12} = \frac{20}{3}$$

$$3. \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 9} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{(x-3)(x-2)}{(x-3)(x+3)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x-2}{x+3} = \frac{1}{6}$$

$$4. \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sqrt{x+1} - 1)(\sqrt{x+1} + 1)}{x(\sqrt{x+1} + 1)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x + 1 - 1}{x(\sqrt{x+1} + 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x(\sqrt{x+1} + 1)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+1} + 1}$$

$$= \frac{1}{2} \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+1} - 1}{x} = \frac{1}{2}$$

$$5 - \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x}-1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt[3]{x}-1)}{(\sqrt[3]{x}-1)(\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{x}+1)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{x}+1} = \frac{1}{3}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x}-1}{x-1} = \frac{1}{3}$$

$$6 - \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{4x+1}-\sqrt{x+7}}{x^2-4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(\sqrt{4x+1}-\sqrt{x+7})(\sqrt{4x+1}+\sqrt{x+7})}{(x-2)(x+2)(\sqrt{4x+1}+\sqrt{x+7})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{4x+1-x-7}{(x-2)(x+2)(\sqrt{4x+1}+\sqrt{x+7})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{3(x-2)}{(x-2)(x+2)(\sqrt{4x+1}+\sqrt{x+7})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{3}{(x+2)(\sqrt{4x+1}+\sqrt{x+7})} = \frac{3}{4(3+3)} = \frac{1}{8}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{4x+1}-\sqrt{x+7}}{x^2-4} = \frac{1}{8}$$

$$7 - \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2}{\sqrt[3]{x^2}-2\sqrt[3]{x}+1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(\sqrt[3]{x}-1)^2(\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{x}+1)^2}{(\sqrt[3]{x}-1)^2}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} (\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{x}+1)^2 = 3^2 = 9$$

$$8 - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3x \frac{\sin 3x}{3x}}{2x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{3}{2} \frac{\sin 3x}{3x} = \frac{3}{2}$$

$$9 - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{\sin 3x} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{5x \frac{\sin 5x}{5x}}{3x \frac{\sin 3x}{3x}} = \frac{5}{3} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 5x}{\sin 3x} = \boxed{\frac{5}{3}}$$

$$10 - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos x}{x \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1-\cos x)(1+\cos x)}{x \sin x(1+\cos x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1-\cos^2 x}{x \sin x(1+\cos x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin^2 x}{x \sin x(1+\cos x)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{1+\cos x} = \boxed{\frac{1}{2}}$$

$$11 - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{\sin x}{\cos x} - \sin x}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x(1-\cos x)}{x^3 \cos x} =$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{2 \sin^2 \frac{x}{2}}{4 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \cos x} = \boxed{\frac{1}{2}}$$

$$12 - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a - \sqrt{a^2 - x^2}}{x^2} \quad \text{if } a > 0$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a - \sqrt{a^2 - x^2}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(a - \sqrt{a^2 - x^2})(a + \sqrt{a^2 - x^2})}{x^2(a + \sqrt{a^2 - x^2})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{a^2 - a^2 + x^2}{x^2(a + \sqrt{a^2 - x^2})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2(a + \sqrt{a^2 - x^2})}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{a + \sqrt{a^2 - x^2}} = \frac{1}{a+a} = \boxed{\frac{1}{2a}}$$

$$13 - \lim_{x \rightarrow K} \frac{\tan \pi x}{x-K}$$

លើក $\tan(\pi x + K\pi) = \tan \pi x$

តាង $x-K = X \Rightarrow x = X+K$
 $x \rightarrow K \Rightarrow X \rightarrow 0$

$$\lg \pi x = \lg \pi(X+K) = \lg(\pi X + K\pi) = \lg \pi X$$

$$\lim_{x \rightarrow K} \frac{\lg \pi x}{x-K} = \lim_{X \rightarrow 0} \frac{\lg \pi X}{X} = \lim_{X \rightarrow 0} \pi \frac{\lg \pi X}{\pi X} = \pi$$

ដូច្នេះ:

$$\lim_{x \rightarrow K} \frac{\lg \pi x}{x-K} = \pi$$

$$14 - \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin \pi x}{x-1}$$

$$\text{រំលឹក } \sin(\pi x + k\pi) = \begin{cases} \sin \pi x & \text{បើ } K \text{ គូ} \\ -\sin \pi x & \text{បើ } K \text{ សេស} \end{cases}$$

$$\text{តាង } \begin{cases} x-1 = X \\ x \rightarrow 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = X+1 \\ X \rightarrow 0 \end{cases}$$

$$\sin \pi x = \sin \pi(X+1) = \sin(\pi X + \pi) = -\sin \pi X$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin \pi x}{x-1} = \lim_{X \rightarrow 0} \frac{-\sin \pi X}{X} = \lim_{X \rightarrow 0} -\pi \frac{\sin \pi X}{\pi X} = \boxed{-\pi}$$

$$15 - \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sin \pi x}{x-2}$$

$$\text{តាង } \begin{cases} x-2 = X \\ x \rightarrow 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = X+2 \\ X \rightarrow 0 \end{cases}$$

$$\sin \pi x = \sin \pi(X+2) = \sin(\pi X + 2\pi) = \sin \pi X$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sin \pi x}{x-2} = \lim_{X \rightarrow 0} \frac{\sin \pi X}{X} = \lim_{X \rightarrow 0} \pi \frac{\sin \pi X}{\pi X} = \boxed{\pi}$$

$$16 - \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin \pi x}{x^2-1}$$

$$\text{តាង } \begin{cases} x-1 = X \\ x \rightarrow 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = X+1 \\ X \rightarrow 0 \end{cases}$$

$$x^2-1 = (X+1)^2-1 = X(X+2)$$

$$\sin \pi x = \sin \pi(X+1) = \sin(\pi X + \pi) = -\sin \pi X$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin \pi x}{x^2-1} = \lim_{X \rightarrow 0} \frac{-\sin \pi X}{X(X+2)} = \lim_{X \rightarrow 0} -\pi \frac{\sin \pi X}{\pi X} \times \frac{1}{(X+2)}$$

$$= -\frac{\pi}{2} \Rightarrow \boxed{\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin \pi x}{x^2-1} = -\frac{\pi}{2}}$$

$$17 - \lim_{x \rightarrow 2} \frac{4-x^2}{\sin \pi x}$$

$$\begin{cases} X = x-2 \\ x \rightarrow 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = X+2 \\ X \rightarrow 0 \end{cases}$$

$$4-x^2 = 4-(X+2)^2 = -X(X+4)$$

$$\sin \pi x = \sin \pi(X+2) = \sin(\pi X + 2\pi) = \sin \pi X$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{4-x^2}{\sin \pi x} = \lim_{X \rightarrow 0} \frac{-X(X+4)}{\sin \pi X} = \lim_{X \rightarrow 0} \frac{-\pi X}{\pi \sin \pi X} (X+4) = \boxed{-\frac{4\pi}{\pi}}$$

$$18 - \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sin \pi x}{x^2-4}$$

$$\begin{cases} X = x-2 \\ x \rightarrow 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = X+2 \\ X \rightarrow 0 \end{cases}$$

$$x^2-4 = (X+2)^2-4 = X(X+4)$$

$$\sin \pi x = \sin \pi(X+2) = \sin(\pi X + 2\pi) = \sin \pi X$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sin \pi x}{x^2-4} = \lim_{X \rightarrow 0} \frac{\sin \pi X}{X(X+4)} = \lim_{X \rightarrow 0} \pi \frac{\sin \pi X}{\pi X} \frac{1}{X+4} = \boxed{\frac{\pi}{4}}$$

$$19 - \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x + \sin x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x}{x}}{\frac{x}{x} + \frac{\sin x}{x}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{1 + \frac{\sin x}{x}}$$

$$= \frac{1}{2} \Rightarrow \boxed{\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x + \sin x} = \frac{1}{2}}$$

$$20 - \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x}-1 + \lg \pi x}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x}-1}{x-1} + \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\lg \pi x}{x-1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x}-1}{(\sqrt[3]{x}-1)(\sqrt[3]{x} + \sqrt[3]{x} + 1)} + \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\lg \pi X}{X}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\sqrt[3]{x^2} + \sqrt[3]{x} + 1} + \lim_{x \rightarrow 0} \pi \frac{\operatorname{tg} \pi X}{\pi X} = \frac{1}{3} + \pi$$

$$\text{Đặt } X = x-1 \Rightarrow \begin{matrix} x = X+1 \\ x \rightarrow 1 \\ X \rightarrow 0 \end{matrix}$$

$$\operatorname{tg} \pi x = \operatorname{tg} \pi(X+1) = \operatorname{tg}(\pi X + \pi) = \operatorname{tg} \pi X$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\operatorname{tg} \pi x}{x-1} = \lim_{X \rightarrow 0} \frac{\operatorname{tg} \pi X}{X} = \lim_{X \rightarrow 0} \pi \frac{\operatorname{tg} \pi X}{\pi X} = \pi$$

$$\text{Đặt: } \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{x}-1 + \operatorname{tg} \pi x}{x-1} = \frac{1}{3} + \pi$$

$$21) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4 + \sin \pi x}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x-2} + \frac{\sin \pi x}{x-2}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x+2)(x-2)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} x+2 = 4$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sin \pi x}{x-2} \quad \text{Đặt } X = x-2 \Rightarrow \begin{matrix} x = X+2 \\ x \rightarrow 2 \\ X \rightarrow 0 \end{matrix}$$

$$\sin \pi x = \sin \pi(X+2) = \sin(\pi X + 2\pi) = \sin \pi X$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sin \pi x}{x-2} = \lim_{X \rightarrow 0} \frac{\sin \pi X}{X} = \lim_{X \rightarrow 0} \pi \frac{\sin \pi X}{\pi X} = \pi$$

$$\text{Đặt: } \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4 + \sin \pi x}{x-2} = 4 + \pi$$

$$22) \lim_{x \rightarrow a} \frac{\sin x - \sin a}{\cos x - \cos a} = \lim_{x \rightarrow a} \frac{2 \sin \frac{x-a}{2} \cos \frac{x+a}{2}}{-2 \sin \frac{x+a}{2} \sin \frac{x-a}{2}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow a} \frac{\cos \frac{x+a}{2}}{\sin \frac{x+a}{2}} = - \frac{\cos a}{\sin a} = -\cot a$$

$$23) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{1 - \sqrt{2} \cos x}{1 - \sqrt{2} \sin x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\frac{\sqrt{2}}{2} - \cos x}{\frac{\sqrt{2}}{2} - \sin x} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\cos \frac{\pi}{4} - \cos x}{\sin \frac{\pi}{4} - \sin x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{2 \sin \frac{x - \frac{\pi}{4}}{2} \sin \frac{x + \frac{\pi}{4}}{2}}{2 \sin \frac{\pi - x}{2} \cos \frac{\pi + x}{2}} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sin \frac{x - \frac{\pi}{4}}{2} \sin \frac{x + \frac{\pi}{4}}{2}}{-\sin \frac{x - \frac{\pi}{4}}{2} \cos \frac{\pi + x}{2}}$$

$$= -\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{4}} \frac{\sin \frac{x + \frac{\pi}{4}}{2}}{\cos \frac{\pi + x}{2}} = -\frac{\sin \frac{\pi}{4}}{\cos \frac{\pi}{4}} = -\operatorname{tg} \frac{\pi}{4} = \boxed{-1}$$

$$24) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\cos x - \cos \frac{\pi}{3}}{x - \frac{\pi}{3}} = \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{-2 \sin \frac{x - \frac{\pi}{3}}{2} \sin \frac{x + \frac{\pi}{3}}{2}}{x - \frac{\pi}{3}}$$

$$= \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sin \frac{x - \frac{\pi}{3}}{2} \sin \frac{x + \frac{\pi}{3}}{2}}{\frac{x - \frac{\pi}{3}}{2}}$$

$$\text{Đặt } X = x - \frac{\pi}{3} \Rightarrow \begin{matrix} x = X + \frac{\pi}{3} \\ x \rightarrow \frac{\pi}{3} \\ X \rightarrow 0 \end{matrix} \Rightarrow x = X + \frac{\pi}{3}$$

$$\Rightarrow \frac{x + \frac{\pi}{3}}{2} = \frac{X + \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{3}}{2} = \frac{X}{2} + \frac{\pi}{3}$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sin \frac{x - \frac{\pi}{3}}{2} \sin \frac{x + \frac{\pi}{3}}{2}}{x - \frac{\pi}{3}} = \lim_{X \rightarrow 0} \frac{\sin \frac{X}{2} \sin \left(\frac{X}{2} + \frac{\pi}{3} \right)}{X}$$

$$= \lim_{X \rightarrow 0} -\sin \left(\frac{X}{2} + \frac{\pi}{3} \right) = -\sin \frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\cos x - \cos \frac{\pi}{3}}{x - \frac{\pi}{3}} = -\sin \frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

II - លីមីតរាងមិនកំនត់ $\infty - \infty$

គណនា $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{4x^2 + 3x + 1} - bx$ ដោយពិភាក្សាទៅតាមតំលៃនៃ b
ពិភាក្សា

ក) បើ $b \leq 0 \Rightarrow -b \geq 0$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{4x^2 + 3x + 1} - bx = +\infty$$

ខ) បើ $b > 0 \Rightarrow -b < 0$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{4x^2 + 3x + 1} - bx = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{(\sqrt{4x^2 + 3x + 1} - bx)(\sqrt{4x^2 + 3x + 1} + bx)}{\sqrt{4x^2 + 3x + 1} + bx}$$

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2(4 - b^2) + 3x + 1}{\sqrt{4x^2 + 3x + 1} + bx} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x(4 - b^2) + 3 + \frac{1}{x}}{\sqrt{4 + \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}} + b}$$

$$\begin{array}{c} b \quad 0 \quad 2 \quad +\infty \\ 4 - b^2 \quad | \quad 1 \quad + \quad 0 \quad - \end{array}$$

បើ $b \in]0 ; 2[\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{4x^2 + 3x + 1} - bx = +\infty$

$b = 2 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{4x^2 + 3x + 1} - bx = \frac{3}{4}$

$b \in]2 ; +\infty[\Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{4x^2 + 3x + 1} - bx = -\infty$

តើគេប្រើដេរីវេអឌីមួយនៅពេលណាខ្លះ

I - ទិសដៅអថេរភាពនៃអនុគមន៍

សំណួរទី 1

សិក្សាទិសដៅអថេរភាពនៃអនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{mx+4}{x+m}$ ទៅតាមតំលៃ m ។

ចំណើន

• ដែនកំនត់ $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-m\}$

• ដេរីវេទី 1 គឺ $f'(x) = \frac{m(x+m) - mx - 4}{(x+m)^2} = \frac{m^2 - 4}{(x+m)^2}$

$\forall x \in \mathcal{D} \Rightarrow x+m \neq 0 \Rightarrow (x+m)^2 > 0 \Rightarrow f'(x)$ យក

សញ្ញាតាម $m^2 - 4$

$$\begin{array}{c} m^2 - 4 \\ f'(x) \end{array} \quad \begin{array}{c} -\infty \quad -2 \quad 2 \quad +\infty \\ + \quad 0 \quad - \quad 0 \quad + \end{array}$$

$m = -2 \Rightarrow f(x) = \frac{-2x+4}{x-2} = \frac{-2(x-2)}{x-2} = -2$ ថេ $>$

$m = 2 \Rightarrow f(x) = \frac{2x+4}{x+2} = \frac{2(x+2)}{x+2} = 2$ ថេ $>$

តារាងសង្ខេបលើទិសដៅអថេរភាពនៃអនុគមន៍ $f(x)$ ទៅតាមតំលៃនៃ m

m	$f'(x)$	ទិសដៅអថេរភាពនៃអនុគមន៍
$-\infty$	+	អនុគមន៍កើន
-2	0	អនុគមន៍ថេរ $y = f(x) = -2$
	-	អនុគមន៍ចុះ
2	0	អនុគមន៍ថេរ $y = f(x) = 2$
	+	អនុគមន៍កើន
$+\infty$		

លំហាត់ទី 2

ស្រាយថាអនុគមន៍ $f(x) = \lg x$ កើនក្នុងចន្លោះ: $]0 ; \frac{\pi}{2}[$

ចំណើយ

អនុគមន៍ $f(x)$ កំនត់និងជាប់ក្នុងចន្លោះ: $]0 ; \frac{\pi}{2}[$

$$\text{មាន } f'(x) = \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x > 0$$

ដូច្នេះ: $f'(x) > 0, \forall x \in]0 ; \frac{\pi}{2}[\Rightarrow f(x)$ កើនក្នុងចន្លោះនោះ: $]0 ; \frac{\pi}{2}[$

កំនត់សំគាល់

$$\forall \alpha, \beta \in]0, \frac{\pi}{2}[\text{ បើ } \alpha < \beta \Rightarrow f(\alpha) < f(\beta) \Rightarrow \lg \alpha < \lg \beta$$

លំហាត់ទី 3

ស្រាយថា $\forall \alpha, \beta \in]0, \frac{\pi}{2}[$ បើ $\alpha < \beta$

គេបាន $\lg \lg \alpha < \lg \lg \beta$

ចំណើយ

សំរាយដូចសន្ទនាទី 2 គឺអនុគមន៍ $\lg x$ កើន

$$\text{ក្នុងចន្លោះ: }]0 ; \frac{\pi}{2}[\Rightarrow 0 < \lg \alpha < \lg \beta \Rightarrow \lg \lg \alpha < \lg \lg \beta$$

លំហាត់ទី 4

អោយអនុគមន៍ $f(x) = 29x^2 + 6x + 1996$

បើ $\alpha, \beta \in]0, \frac{\pi}{2}[$ ហើយ $\alpha < \beta$ ស្រាយថា $f(\sin \alpha) < f(\sin \beta)$

ចំណើយ

អនុគមន៍ $\sin x$ កំនត់និងជាប់ក្នុងចន្លោះ: $]0, \frac{\pi}{2}[$

$$(\sin x)' = \cos x > 0, \forall x \in]0, \frac{\pi}{2}[$$

បើ $\alpha, \beta \in]0, \frac{\pi}{2}[$ ហើយ $\alpha < \beta \Rightarrow 0 < \sin \alpha < \sin \beta$

$f(x) = 29x^2 + 6x + 1996$ មានដែនកំនត់ $\mathcal{D} = \mathbb{R}$

$$f'(x) = 58x + 6, f'(x) = 0 \Rightarrow x = -\frac{6}{58} = -\frac{3}{29}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} 29x^2 = +\infty$$

x	$-\infty$	$-\frac{3}{29}$	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	អប្បបរមា		

តាង $\mathcal{D}_2 \subset \mathcal{D}$ ដោយ $\mathcal{D}_2 =]-\frac{3}{29}; +\infty[$ យើងបាន $f'(x) > 0$

គឺ $\forall \alpha, \beta \in]0, \frac{\pi}{2}[$ បើ $\alpha < \beta$ យើងបាន $0 < \sin \alpha < \sin \beta$

$$\text{ដូច្នេះ: } \begin{cases} \sin \alpha, \sin \beta \in \mathcal{D}_2 \\ \sin \alpha < \sin \beta \end{cases} \Rightarrow f(\sin \alpha) < f(\sin \beta)$$

លំហាត់ទី 5

អោយអនុគមន៍ $g(x) = (x-m)^3 - 3x + m + 2$

កំនត់ m ដើម្បីអោយ $g(x)$

ក) កើនក្នុងចន្លោះ: $]1-\infty; -3[$

ខ) កើនក្នុងចន្លោះ: $]1; +\infty[$

ចំណើយ

អនុគមន៍ $g(x)$ ជាអនុគមន៍ពហុធាមានដែនកំនត់ $\mathcal{D} = \mathbb{R}$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x^3 = \pm\infty$$

$$g'(x) = 3(x-m)^2 - 3 = 3(x-m+1)(x-m-1)$$

$$g'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = m-1 \\ x_2 = m+1 \end{cases}$$

x	$-\infty$	$m-1$	$m+1$	$+\infty$
$g'(x)$	+	0	-	+
$g(x)$	$-\infty$	អតិបរមា	អប្បបរមា	$+\infty$

ក) $g(x)$ ក្នុងចន្លោះ $]-\infty ; -3]$ លុះត្រាតែ
 $]-\infty ; -3] \subset]-\infty ; m-1] \Rightarrow -3 \leq m-1 \Rightarrow m \geq -2$

គឺ $m \in [-2 ; +\infty[$

ខ) $g(x)$ កើនក្នុងចន្លោះ $[1 ; +\infty[$ លុះត្រាតែ
 $[1 ; +\infty[\subset [m+1 ; +\infty[\Rightarrow m+1 \leq 1 \Rightarrow m \leq 0$
 $\Rightarrow m \in]-\infty ; 0]$

II - មេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ប៉ះខ្សែកោងកាងអនុគមន៍ខ្សែកោង (C)

សមីការ $y = f(x)$ មាន $y' = f'(x)$

$A(x_A, y_A)$, $B(x_B, y_B)$ ជាចំនុចនៅលើខ្សែកោង (C)

មេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ប៉ះខ្សែកោង (C) ត្រង់ A គឺ $f'(x_A)$

បើបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ A ផ្គុំជាមួយ $(x'ox)$ បានមុំ α នោះមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ប៉ះខ្សែកោង (C) ត្រង់ A គឺ $\tan \alpha$

មេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ប៉ះខ្សែកោង (C) ត្រង់ B គឺ $f'(x_B)$

បើបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ B ផ្គុំជាមួយ $(x'ox)$ បានមុំ β នោះមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ប៉ះខ្សែកោង (C) ត្រង់ B គឺ $\tan \beta$

សមីការបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ A គឺ $f'(x_A) = \tan \alpha = \frac{y - y_A}{x - x_A}$

សមីការបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ B គឺ $f'(x_B) = \tan \beta = \frac{y - y_B}{x - x_B}$

លំហាត់ទី 1

ដោយខ្សែកោង (C) សមីការ $y = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 1$

ក) រកសមីការបន្ទាត់ប៉ះខ្សែកោង (C) ត្រង់ $A(x=2, y=\frac{17}{3})$

ខ) រកគ្រប់ចំនុចនៅលើខ្សែកោង (C) ដែលបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ចំនុចនោះស្របបន្ទាត់ $y - 2x = 0$ ។ រួចទាញរកសមីការបន្ទាត់ប៉ះ ។

ចំណើន

ក) រកសមីការបន្ទាត់ប៉ះខ្សែកោង (C) ត្រង់ A

$$y = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + 1 \Rightarrow y' = x^2 + x$$

មេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ប៉ះ (C) ត្រង់ A គឺ $y'(2) = 4 + 2 = 6$

$$\begin{aligned} \text{សមីការបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ A} \quad 6 &= \frac{y - \frac{17}{3}}{x - 2} \Rightarrow y - \frac{17}{3} = 6x - 12 \\ \Rightarrow y &= 6x - 12 + \frac{17}{3} = 6x - \frac{19}{3} \Rightarrow y = 6x - \frac{19}{3} \end{aligned}$$

ខ) រកគ្រប់ចំនុចនៅលើខ្សែកោង (C) ដែលបន្ទាត់ប៉ះស្របបន្ទាត់ $y - 2x = 0$

តាង $M(x, y) \in (C)$ ចំនួនត្រូវរក $\Rightarrow$ មេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ប៉ះ

(C) ត្រង់ M គឺ $f'(x) = x^2 + x$

បន្ទាត់ $y - 2x = 0 \Leftrightarrow y = 2x$ មានមេគុណប្រាប់ទិស 2

ដើម្បីដោយបន្ទាត់ទាំងពីរស្របគ្នាលុះត្រាតែមេគុណប្រាប់ទិសរបស់វាស្មើគ្នា

$$\text{គឺ } x^2 + x = 2 \Rightarrow x^2 + x - 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 & \Rightarrow y = \frac{1}{3} + \frac{1}{2} + 1 = \frac{11}{6} \\ x = -2 & \Rightarrow y = \frac{1}{3} \end{cases}$$

យើងបានចំនុចមានពីរ $M_1(x=1, y=\frac{11}{6})$

ទាញរកសមីការបន្ទាត់ប៉ះ $M_2(x=-2, y=\frac{1}{3})$

សមីការបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ M_1 $2 = \frac{y-\frac{11}{6}}{x-1} \Rightarrow y-\frac{11}{6} = 2x-2$
 $\Rightarrow y = 2x-2+\frac{11}{6} = 2x-\frac{1}{6} \Rightarrow y = 2x-\frac{1}{6}$

សមីការបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ M_2 $2 = \frac{y-\frac{1}{3}}{x+2} \Rightarrow y-\frac{1}{3} = 2x+4$
 $\Rightarrow y = 2x+4+\frac{1}{3} = 2x+\frac{13}{3} \Rightarrow y = 2x+\frac{13}{3}$

លំហាត់ទី 2

អោយខ្សែកោង (C) សមីការ $y = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + x + 1$

រកគ្រប់សមីការបន្ទាត់ប៉ះខ្សែកោង (C) ដែលផ្គុំជាមួយ $(x'0x)$ បានមុំ $\frac{\pi}{4}$

ចំណេះដឹង

តាង $M(x,y)$ ចំនុចនៅលើ (C) ដែលបន្ទាត់ប៉ះផ្គុំជាមួយ $(x'0x)$ បាន $\frac{\pi}{4}$

$$y = \frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{2} + x + 1 \Rightarrow y' = x^2 + x + 1$$

មេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ M គឺ $y' = x^2 + x + 1$

ដោយបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ M ផ្គុំជាមួយ $(x'0x)$ បានមុំ $\frac{\pi}{4}$ នោះមេគុណប្រាប់ទិសរបស់

វាគឺ $\tan \frac{\pi}{4} = 1$

យើងអាចទាញបាន $y' = 1 \Leftrightarrow x^2 + x + 1 = 1 \Leftrightarrow$

$$x^2 + x = 0 \Leftrightarrow x(x+1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = -1 \end{cases}$$

បើ $x = 0 \Rightarrow y = 1$ M_1

$x = -1 \Rightarrow y = \frac{1}{6}$ M_2

រកសមីការបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ $M_1(0;1)$ គឺ : $1 = \frac{y-1}{x} \Rightarrow y = x+1$

រកសមីការបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ $M_2(-1, \frac{1}{6})$ គឺ : $1 = \frac{y-\frac{1}{6}}{x+1} \Rightarrow y = x+1+\frac{1}{6}$
 $\Rightarrow y = x+\frac{7}{6}$

យើងបានសមីការបន្ទាត់ប៉ះខ្សែកោង (C) ដែលផ្គុំជាមួយ $(x'0x)$ បានមុំ $\frac{\pi}{4}$

មានពីរ គឺ $y = x+1$ និង $y = x+\frac{7}{6}$

លំហាត់ទី 3

ស្រាយបញ្ជាក់ថាខ្សែកោង (C_m) ទាំងអស់សមីការ $y = (m-2)x^2 - 2mx + m+2$

កាត់តាមចំនុចនឹង A មួយដែលត្រូវរក ។ រួចស្រាយបញ្ជាក់ថាខ្សែកោង (C_m)

ទាំងអស់មានបន្ទាត់ប៉ះរួមគ្នាត្រង់ A ដែលត្រូវបញ្ជាក់សមីការ ។

ចំណេះដឹង

ស្រាយបញ្ជាក់ថាខ្សែកោង (C_m) កាត់តាមចំនុចនឹង A ត្រូវរកសមីការខ្សែកោង

(C_m) អាចសរសេរ $y = mx^2 - 2x^2 - 2mx + m+2$

$\Leftrightarrow m(x-1)^2 = y - (-2x^2+2)$ ផ្ទៀងផ្ទាត់ $\forall m \in \mathbb{R}$ លុះត្រាតែ

$$\begin{cases} x-1=0 \\ y-(-2x^2+2)=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x=1 \\ y=0 \end{cases} \text{ ឬច្រើនខ្សែកោង } (C_m) \text{ ទាំងអស់កាត់តាម}$$

ចំនុចនឹង $A(x=1, y=0)$

ស្រាយបញ្ជាក់ថាខ្សែកោង (C_m) ទាំងអស់មានបន្ទាត់ប៉ះរួមគ្នាត្រង់ A

យើងត្រូវរកដេរីវេទី 1 ត្រង់ A អោយមានតំលៃថេរ ដែលជាមេគុណប្រាប់ទិស

នៃបន្ទាត់ប៉ះរួមគ្នា $y' = 2(m-2)x - 2m$

$$y'(A) = y'(1) = 2(m-2) - 2m = -4 \text{ ថេរ}$$

ឬច្រើនខ្សែកោង (C_m) ទាំងអស់មានបន្ទាត់ប៉ះរួមគ្នាត្រង់ A ដែលមានសមីការ

$$-4 = \frac{1}{x-1} \Rightarrow y = -4x+4$$

លំហាត់ទី 4

ស្រាយបញ្ជាក់ថាខ្សែកោង $(C_1) y = x^3 - 2x + 5$ និង $(C_2) y = 2x^2 + 2x - 3$ មានបន្ទាត់ចំរុះរួមគ្នា $A(2, 9)$ សមីការបន្ទាត់ចំរុះរួមនោះ:

ចម្លើយ

ត្រូវស្រាយថា $A(2, 9)$ ជាចំនុចរួមរវាង (C_1) និង (C_2)

ស្រាយថា A នៅលើ (C_1) : $9 = 8 - 4 + 5 = 9$ ផ្ទៀងផ្ទាត់ $\Rightarrow A \in (C_1)$

ស្រាយថា A នៅលើ (C_2) : $9 = 8 + 4 - 3 = 9$ ផ្ទៀងផ្ទាត់ $\Rightarrow A \in (C_2)$

$(C_1)y = x^3 - 2x + 5 \Rightarrow y' = 3x^2 - 2$ មេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ចំរុះ (C_1)

ត្រង់ A គឺ $y'(A) = 12 - 2 = 10$

$(C_2)y = 2x^2 + 2x - 3 \Rightarrow y' = 4x + 2$ មេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ចំរុះ (C_2)

ត្រង់ A គឺ $y' = 4 \times 2 + 2 = 10$

ដោយមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ចំរុះ (C_1) និង (C_2) ត្រង់ A ស្មើ 10 ដូចគ្នា គេថា ខ្សែកោង (C_1) និង (C_2) មានបន្ទាត់ចំរុះរួមគ្នា A មានសមីការ

$$10 = \frac{y-9}{x-2} \Rightarrow y-9 = 10x-20 \Rightarrow y = 10x-11$$

III - អតិបរមា អប្បបរមា នៃអនុគមន៍ $f(x)$

អនុគមន៍មានគំលៃ អតិបរមា រឺ អប្បបរមា β ត្រង់ $x = \alpha$

$$\begin{cases} f'(\alpha) = 0 \\ f(\alpha) = \beta \end{cases}$$

លំហាត់ទី 1

អោយអនុគមន៍ $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$

រកមេគុណ a, b, c និង d បើអនុគមន៍មានគំលៃអតិបរមាស្មើ 4 ត្រង់ $x = -1$

និងមានគំលៃអប្បបរមាស្មើ 0 ត្រង់ $x = 1$

ចម្លើយ

ដែនកំនត់ $\mathcal{D} = \mathbb{R} \quad f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$

$$\text{អតិបរមា 4 ត្រង់ } x = -1 \Rightarrow \begin{cases} f'(-1) = 0 \Leftrightarrow 3a - 2b + c = 0 & (1) \\ f(-1) = 4 \Leftrightarrow -a + b - c + d = 4 & (2) \end{cases}$$

$$\text{អប្បបរមា 0 ត្រង់ } x = 1 \Rightarrow \begin{cases} f'(1) = 0 \Leftrightarrow 3a + 2b + c = 0 & (3) \\ f(1) = 0 \Leftrightarrow a + b + c + d = 0 & (4) \end{cases}$$

$$a, b, c \text{ និង } d \text{ ជាចំលើយនៃ } \begin{cases} 3a - 2b + c = 0 & (1) \\ -a + b - c + d = 4 & (2) \\ 3a + 2b + c = 0 & (3) \\ a + b + c + d = 0 & (4) \end{cases}$$

$$\text{យើងបាន } a = 1, b = 0, c = -3, d = 2$$

លំហាត់

$$\text{អោយអនុគមន៍ } f(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 - 2x - 3}$$

- 1) កំនត់ f' ដើម្បីអោយអនុគមន៍មានអតិបរមានិងអប្បបរមា
- 2) កំនត់ f' ដើម្បីអោយអនុគមន៍មានអតិបរមា រឺ អប្បបរមាតែមួយគត់
- 3) កំនត់ f' ដើម្បីអោយអនុគមន៍មានអតិបរមាមួយ និង អប្បបរមាមួយ

ចម្លើយ

អនុគមន៍មានដែនកំនត់ $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1; 3\}$


$$f'(x) = \frac{(2x-1)(x^2-2x-3) - (x^2-1)(2x-2)}{(x^2-2x-3)^2} = \frac{(1-2)x^2 - 6x + 3}{(x^2-2x-3)^2}$$

$$\forall x \in \mathcal{D}, f'(x) \text{ យកសញ្ញាតាម } (1-2)x^2 - 6x + 3$$

- 1) កំនត់ f' ដើម្បីអោយអនុគមន៍មានអតិបរមា និង អប្បបរមា លុះត្រាតែ

$$(1-2)x^2 - 6x + 3 \text{ គ្មានឫស រឺ មានឫសខុប } \begin{cases} 1-2 \neq 0 \Leftrightarrow 1 \neq 2 \\ \Delta' \leq 0 \end{cases}$$


$$\Delta' = 9 - 3l^2 + 6l = -3l^2 + 6l + 9 = 3(-l^2 + 2l + 3) \leq 0$$



$$l \in]-\infty; -1] \cup [3; +\infty[$$

- 2) - កំណត់ l ដើម្បីអោយអនុគមន៍មានបរិមាណតែមួយគត់គឺ $f'(x)$ មានឫសតែមួយគត់ មានន័យថា $(l-2)x^2 - 6x + 3l$ មានឫសតែមួយគត់ គឺ $a = l-2 = 0 \Leftrightarrow l = 2$

- 3) - កំណត់ l ដើម្បីអោយអនុគមន៍មានតំលៃអតិបរមា និង អប្បបរមាមួយ ដើម្បីអោយ $f(x)$ មានតំលៃអតិបរមា និង អប្បបរមាមួយលុះត្រាតែ $f'(x)$ មានឫសពីរផ្សេងគ្នា គឺ $(l-2)x^2 - 6x + 3l$ មានឫសពីរផ្សេងគ្នា $\begin{cases} l-2 \neq 0 \\ \Delta' > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} l \neq 2 \\ \Delta' > 0 \end{cases}$



ដូច្នេះយើងបាន

$$l \in]-1; 3[\setminus \{2\}$$



ចំណែកបរិមាណ

លំហាត់ទី 1

ស៊ីឡាំងមួយមានអតិបរមាចារឹកក្នុងកោនាមួយ ដែលកំពស់មានរង្វាស់ h និង កាំរាងមានរង្វាស់ R ។ អនុវត្តជារលេខ បើ $h = 15 \text{ cm}$ និង $R = 6 \text{ cm}$ ។ គណនាវិមាត្រស៊ីឡាំងនោះ ។

ចំណើន

ធ្វើព័ន្ធរូបដោយបង្រួបបង្រួមកាត់តាមអ័ក្សរួម $(SO'O)$ កោនបានមុខកាត់ ជាត្រីកោណសមបាទ SAB កំពូល S

- មានកំពស់ $[SO]$, $|SO| = h$
- មានកាំ $[OA]$ និង $[OB]$ ដែល $|OA| = |OB| = R$

ស៊ីឡាំងបានមុខកាត់ ជាចតុកោណកែង $MM'N'N$

- មានកំពស់ $[OO']$
- មាន $[OM]$, $[ON]$, $[O'M']$, $[O'N']$ ជាកាំ

ថាសបាត $|OM| = |ON| = |O'M| = |O'N|$

តាង $|SO'| = x$, $0 < x < h \Rightarrow |OO'| = h - x$

យើងបានកាំ $[O'M']$ ជាកាំប្លង់នៃកាំ $[OA]$ តាមបំរែងចាំងផ្ចិត S

និងមានផលធៀប $\frac{|SO'|}{|SO|} = \frac{x}{h} \Rightarrow |O'M'| = |OA| \frac{x}{h} = \frac{Rx}{h}$

ក្រលាផ្ទៃថាសបាតស៊ីឡាំង $s = \pi |O'M'|^2 = \pi \frac{R^2 x^2}{h^2}$

តាង $v(x)$ ជាមាឌស៊ីឡាំង $v(x) = \frac{1}{3} s |OO'| = \frac{1}{3} \pi \frac{R^2 x^2}{h^2} (h - x)$

$$= \frac{\pi R^2}{h^2} (hx^2 - x^3) \Rightarrow v'(x) = \frac{\pi R^2}{h^2} (2hx - 3x^2)$$

$$v'(x) = 0 \Leftrightarrow 2hx - 3x^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \frac{2h}{3} \end{cases}$$

x	0	$\frac{2h}{3}$	h
$v'(x)$		+	-
$v(x)$		អតិបរមា	

តាមតារាង $v'(x)$ និងតាមលក្ខខណ្ឌកំនត់ យើងអាចយក $x = \frac{2h}{3}$

$$\text{រង្វាស់កំពស់ស៊ីឡាំង } |OO'| = h - x = h - \frac{2h}{3} = \frac{h}{3} = \frac{15\text{cm}}{3} = 5\text{cm}$$

$$\text{រង្វាស់កាំបាតស៊ីឡាំង } |O'M'| = R \frac{x}{h} = R \frac{2h}{3h} = \frac{2R}{3} = \frac{2 \cdot 6\text{cm}}{3} = 4\text{cm}$$

$$\text{ស៊ីឡាំងត្រូវមានរង្វាស់កំពស់ } \frac{h}{3} = 5\text{cm} \quad \text{រង្វាស់កាំបាត } \frac{2R}{3} = 4\text{cm}$$

សំណួរទី 2

គេសង់ជំរកមួយរាងកោនបរិវត្ត ដែលមានមាឌ v ។ គណនាផលធៀបរង្វាស់កំពស់ និងកាំបាត កាលណាជំរកនោះមានផ្ទៃខាងអប្បបរមា ។

ចំណេញ

$$\text{តាង } |SO| = y, \quad y > 0$$

$$|OA| = |OB| = x, \quad x > 0$$

$$V = \frac{1}{3} \pi x^2 y \Rightarrow y = \frac{3V}{\pi x^2}$$


គណនារង្វាស់ជនេត្រ $[SA], [SB]$

$$|SA| = |SB|$$

ក្នុងត្រីកោណ SOA តែងត្រង់ O យើងបាន

$$|SA|^2 = |SO|^2 + |OA|^2 = \frac{9V^2}{\pi^2 x^4} + x^2 = \frac{9V^2 + \pi^2 x^6}{\pi^2 x^4}$$

$$|SA| = \frac{\sqrt{9V^2 + \pi^2 x^6}}{\pi x^2} \quad \text{តាង } P \text{ បរិមាត្របាតកោន } P = 2\pi x$$



បើ $S(x)$ ជាត្រលាផ្ទៃខាងរបស់កោន នោះយើងបាន

$$S(x) = \frac{1}{2}P|SA| = \frac{1}{2}2\pi x \frac{\sqrt{9V^2 + \pi^2 x^6}}{\pi x^2} = \frac{\sqrt{9V^2 + \pi^2 x^6}}{x}$$

$$S'(x) = \frac{3\pi^2 x^6 - 9V^2 - \pi^2 x^6}{x^2 \sqrt{9V^2 + \pi^2 x^6}} = \frac{2\pi^2 x^6 - 9V^2}{x^2 \sqrt{9V^2 + \pi^2 x^6}}$$

$$S'(x) = 0 \Leftrightarrow 2\pi^2 x^6 - 9V^2 = 0 \Leftrightarrow x^6 = \frac{9V^2}{2\pi^2}$$

$$x = \sqrt[6]{\frac{9V^2}{2\pi^2}}$$

x	0	$\sqrt[6]{\frac{9V^2}{2\pi^2}}$	$+\infty$
$S'(x)$		-	+
$S(x)$		អប្បបរមា	

តាមតារាង $S'(x)$ និងតាមលក្ខខណ្ឌកំនត់លើ x យើងអាចយក $x = \sqrt[6]{\frac{9V^2}{2\pi^2}}$

ជាចំណេញ

$$\text{រក } \frac{y}{x} = \frac{3V}{\pi x^3} = \frac{3V}{\pi \sqrt[3]{\frac{9V^2}{2\pi^2}}}$$


$$= \frac{3V}{\pi \frac{3V}{\sqrt{2}}} = \sqrt{2} \Rightarrow \frac{y}{x} = \sqrt{2}$$

យើងបានផលធៀបរង្វាស់កំពស់និងកាំបាត ស្មើ $\sqrt{2}$
រង្វាស់កំពស់ស្មើរង្វាស់កាំបាត $x\sqrt{2}$

សំណួរទី 3

ពីរមិត្តភក្តិមួយ ក្រណាដ្ឋោងមានរង្វាស់ S ។ គណនាផលធៀបរង្វាស់
កំពស់ និងជ្រុងបាតដើម្បីអោយមានរបស់វាមានតំលៃអតិបរមា ។

ចម្លើយ



តាង $|AB| = x$, $x > 0$ រង្វាស់ជ្រុងបាត
យក I ចំនុចកណ្តាល $[AB] \Rightarrow [SI]$ ជាអ័ក្សត្រឹម
 $S = \frac{1}{2} \cdot 4x|SI| \Rightarrow |SI| = \frac{S}{2x}$
ក្នុងត្រីកោណ SOI តែងត្រង់ O យើងបាន
 $|SO|^2 = |SI|^2 - |OI|^2 = \left(\frac{S}{2x}\right)^2 - \left(\frac{x}{2}\right)^2$
 $= \frac{S^2 - x^4}{4x^2}$ តែ $S^2 - x^2 > 0 \Rightarrow x^4 < S^2 \Rightarrow$
 $x^2 < S \Rightarrow x < \sqrt{S} \Rightarrow 0 < x < \sqrt{S}$

នោះ $|SO| = \frac{\sqrt{S^2 - x^4}}{2x}$ តាង $v(x)$ មានពីរមិត្ត

$$v(x) = \frac{1}{3}x^2 \frac{\sqrt{S^2 - x^4}}{2x} = \frac{x}{6} \sqrt{S^2 - x^4} \Rightarrow$$

$$v'(x) = \frac{S^2 - 3x^4}{6\sqrt{S^2 - x^4}}, \quad v'(x) = 0 \Leftrightarrow 3x^4 = S^2 \Leftrightarrow$$

$$x = \sqrt[4]{\frac{S^2}{3}}$$

x	0	$\sqrt[4]{\frac{S^2}{3}}$	$\sqrt{S}$
$v'(x)$		+	-
$v(x)$		អតិបរមា	

តាមតារាង $v'(x)$ និងតាមលក្ខខណ្ឌកំនត់លើ x នោះយើងរកបាន

$$x = \sqrt[4]{\frac{S^2}{3}} \quad \text{គណនា} \quad \frac{|SO|}{x} = \frac{\sqrt{S^2 - x^4}}{2x^2} = \frac{\sqrt{S^2 - \frac{S^2}{3}}}{2\sqrt{\frac{S^2}{3}}}$$


$$= \frac{\sqrt{\frac{2S^2}{3}}}{2\sqrt{\frac{S^2}{3}}} = \frac{\sqrt{2}\sqrt{\frac{S^2}{3}}}{2\sqrt{\frac{S^2}{3}}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

ផលធៀបរង្វាស់កំពស់និងជ្រុងបាតស្មើ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ រី
រង្វាស់កំពស់ស្មើរង្វាស់ជ្រុងបាត $x = \sqrt{\frac{S}{2}}$

សំណួរទី 4

ត្រីកោណសមបាចមួយបរិមាត្រស្មើ $2p$ វិលជុំវិញកំពស់ គូសចេញពីកំពូល កំនត់បាន
សូលីតមួយមានមាតិកបរមា ។ គណនារង្វាស់ជ្រុងនិងកំពស់ត្រីកោណសមបាចនោះ ។

ចម្លើយ



តាង ABC ត្រីកោណសមបាចក្នុងសន្ទុះដែល
 $|AB| = |AC| = x$, $x > 0$
 $[AH]$ - ជាកំពស់របស់ត្រីកោណគូសចេញពីកំពូល A ។
ពេលវិលជុំវិញ $[AH]$ ត្រីកោណនេះកំនត់បានសូលីតមួយ
គឺកោនបរិវត្ត កំពូល A មាន
 $[AB]$, $[AC]$ ជាជនត្រ, $[AH]$ ជាកំពូល
 $|HB| = |HC|$ ជារង្វាស់កាំថាសបាត

យើងមានបរិមាត្រត្រីកោណ ABC ស្មើ $2p$ តាមសមីការ
 $|AB| + |AC| + |BC| = 2x + |BC| = 2p \Rightarrow |BC| = 2(p - x)$
ដោយ $0 < x < p$ ហើយ $|HB| = |HC| = p - x$ ក្នុងត្រីកោណ AHB តែងត្រង់ H

យើងមាន $|AH|^2 = |AB|^2 - |HB|^2 = x^2 - (p-x)^2 = 2px - p^2$
 ដោយ $2px - p^2 > 0 \Leftrightarrow x > \frac{p}{2}$ ដូច្នេះ យើងត្រូវកំណត់
 $\frac{p}{2} < x < p$ យើងបាន $|AH| = \sqrt{2px - p^2}$ រង្វាស់កំពស់កោន
 ក្រលាផ្ទៃចានបាតកោន $s = \pi|HB|^2 = \pi(p-x)^2$ តាង $v(x)$ មាឌកោន
 $v(x) = \frac{1}{3} s|AH| = \frac{1}{3} \pi(p-x)^2 \sqrt{2px - p^2}$
 $v'(x) = \frac{\pi}{3} \frac{5px^2 - 8p^2x + 3p^3}{\sqrt{2px - p^2}}$, $v'(x) = 0 \Leftrightarrow 5px^2 - 8p^2x + 3p^3 = 0$
 $\Leftrightarrow 5x^2 - 8px + 3p^2 = 0$ មាន $\Delta' = 16p^2 - 15p^2 = p^2$ យើងបាន
 $x_1 = \frac{3p}{5}$ $x_2 = p$

x	$\frac{p}{2}$	$\frac{3p}{5}$	p
$v'(x)$		+	-
$v(x)$			

អតិបរមា

តាមតារាង $v'(x)$ និងតាមលក្ខខណ្ឌកំណត់ $\frac{p}{2} < x = \frac{3p}{5} < p$
 យើងអាចយក $x = \frac{3p}{5}$

$$|AB| = |AC| = \frac{3p}{5}$$



$$|BC| = 2(p-x) = \frac{4p}{5}$$

$$|AH| = \sqrt{2px - p^2} = \frac{p\sqrt{5}}{5}$$

សំណួរទី 5

ផលបូកបរិមាត្រការងារ និងរង្វង់មួយមានប្រវែង l គណនាផលធៀបរវាងរង្វាស់កំពស់
 និងប្រវែងការងារដើម្បីដោយផលបូកក្រលាផ្ទៃការងារ និងរង្វង់មានតំលៃអប្បបរមា ។

ចំណើយ $l = 2\pi r + 2Rr \Rightarrow R = \frac{l - 2\pi r}{2}$



សន្មតយក x ជារង្វាស់ជ្រុងការងារ $x > 0$
 បរិមាត្រការងារស្មើ $4x$ ដូច្នេះបរិមាត្ររង្វង់គឺ $l - 4x$
 ដោយ $l - 4x > 0 \Rightarrow 4x < l \Rightarrow 0 < x < \frac{l}{4}$
 តាង R រង្វាស់កាំរង្វង់ នោះបរិមាត្ររង្វង់គឺ
 $2\pi R = l - 4x \Rightarrow R = \frac{l - 4x}{2\pi}$
 ក្រលាផ្ទៃការងារ គឺ x^2
 ក្រលាផ្ទៃរង្វង់ គឺ $\pi R^2 = \pi \left(\frac{l - 4x}{2\pi} \right)^2 = \frac{(l - 4x)^2}{4\pi}$

តាង $S(x)$ ជាផលបូកក្រលាផ្ទៃការងារនិងរង្វង់

$$S(x) = x^2 + \frac{(l - 4x)^2}{4\pi} = \frac{4\pi x^2 + 16x^2 - 8lx + l^2}{4\pi} = \frac{4(\pi + 4)x^2 - 8lx + l^2}{4\pi}$$

$$S'(x) = \frac{8(\pi + 4)x - 8l}{4\pi} = \frac{2[(\pi + 4)x - l]}{\pi}$$

$$S'(x) = 0 \Leftrightarrow (\pi + 4)x - l = 0 \Leftrightarrow 0 < x = \frac{l}{\pi + 4} < \frac{l}{4}$$

x	0	$\frac{l}{\pi + 4}$	$\frac{l}{4}$
$S'(x)$		-	+
$S(x)$			អប្បបរមា

តាមតារាង $S'(x)$ និងតាមលក្ខខណ្ឌកំណត់លើ x ដែល

$$0 < x = \frac{l}{\pi + 4} < \frac{l}{4} \text{ យើងអាចយក } x = \frac{l}{\pi + 4} \text{ ជាចំណើយ}$$

ដូច្នេះយើងបាន $\frac{R}{x} = \frac{l - 4x}{2\pi} : x = \frac{l - 4x}{2\pi x} = \frac{l - 4 \cdot \frac{l}{\pi + 4}}{2\pi \cdot \frac{l}{\pi + 4}} = \frac{\pi l + 4l - 4l}{2\pi l} = \frac{\pi l}{2\pi l} = \frac{1}{2}$

យើងបាន $\frac{\text{រង្វាស់កាំរង្វង់}}{\text{រង្វាស់ជ្រុងកាតេ}} = \frac{1}{2}$ ដល់រង្វាស់កាំរង្វង់និងរង្វាស់ជ្រុងកាតេស៊ី $\frac{1}{2}$

លំហាត់ទី 6


នៅមុខប្រះបរមរាជវាំង មានដងទង់មួយ កំពស់មានរង្វាស់ h នៅលើដងទង់នោះ គេដាក់ដងទង់ជាតិចិត្តប្រភពជាណាចក្រកម្ពុជាដែលកំពស់មានរង្វាស់ a ពីលើដងទង់នោះ ទេសចរម្នាក់មានភ្នែកឆ្ងាយមានប្រើបករណ៍អ៊ីរេ ចង់មើលឃើញទង់នោះនៅក្រោមមុំ បានរង្វាស់ធំបំផុត ។ គេសន្មតថាភ្នែកទេសចរស្ថិតនៅលើបង្គោលដីដែលកែងនឹងដងទង់ ។ តើ ទេសចរនោះត្រូវឈរចំងាយពីដងទង់នោះ ។

ចំណើយ

តាង $|AB| = h, h > 0$ ជារង្វាស់ដងទង់
 $|BC|$ រង្វាស់ដងទង់ជាតិ $|BC| = a, a > 0$

វិភាគ

ក្នុងករណីទេសចរឈរកាន់តែជិតដងទង់ពេលនោះ ទេសចរត្រូវឆ្លើយក្បាលឡើងលើ ដើម្បីពិនិត្យទង់ ជាតិ នាំអោយគាត់មើលពុំបានច្បាស់ល្អ ក្នុង ករណីទេសចរឈរឆ្ងាយពេក គឺគាត់មើលពុំច្បាស់ ដែរ ប្រោះភ្នែកមនុស្សមិនប្រើបករណ៍ អាចមើល



ឃើញវត្ថុអ្វីមួយក្នុងត្រីវិមាត្រដងទង់ជាតិលាក់ ។ ដូច្នេះទេសចរត្រូវឈរចំងាយ $|OA| = x$ តិចជាងដងទង់ទើបអាចមើលឃើញច្បាស់ ។

ក្នុងត្រីកោណ OAC កែងត្រង់ A សន្មត $\widehat{AOC} = \alpha$ នោះយើងបាន

$\text{tg} \alpha = \frac{|AC|}{|OA|} = \frac{|AB| + |BC|}{|OA|} = \frac{h+a}{x} > 0$

ក្នុងត្រីកោណ OAB កែងត្រង់ A យើងសន្មត $\widehat{AOB} = \beta$ នោះយើងបាន

$\text{tg} \beta = \frac{|AB|}{|OA|} = \frac{h}{x} > 0$

សន្មត $\widehat{BOC} = \gamma$ រង្វាស់មុំដែលភ្នែកទេសចរមើលឃើញទង់ជាតិចិត្តសញ្ញាប្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

យើងគិតរង្វាស់មុំ $\alpha : \beta : \gamma$ ជាអ៊ីដ្យង់ (Rad)

យើងបាន $= \alpha - \beta$ តាមរូបមន្ត

$$\text{tg} \gamma = \text{tg}(\alpha - \beta) = \frac{\text{tg} \alpha - \text{tg} \beta}{1 + \text{tg} \alpha \text{tg} \beta} = \frac{\frac{h+a}{x} - \frac{h}{x}}{1 + \frac{h+a}{x} \cdot \frac{h}{x}}$$

$$= \frac{ax}{x^2 + ah + h^2} > 0 \text{ ប្រោះ } \gamma \text{ ជាមុំស្រួចដោយ } \text{tg} \gamma \text{ ជាប់ទាក់ទងនឹងអថេរ } x$$

យើងកំនត់សរសេរ $\text{tg} \gamma = f(x)$

$$\text{tg} \gamma = f(x) = \frac{ax}{x^2 + ah + h^2} \Rightarrow f'(x) = \frac{a(-x^2 + ah + h^2)}{(x^2 + ah + h^2)^2}$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow -x^2 + ah + h^2 = 0 \Leftrightarrow x^2 = ah + h^2 \Leftrightarrow$$

$$x = \sqrt{ah + h^2} = \sqrt{(a+h)h} = \sqrt{h(a+h)} > 0$$

x	0	$\sqrt{h(a+h)}$	$+\infty$
$f'(x)$		+	-
$f(x)$		↗	↘

ដោយពិនិត្យលើតារាង $\nabla'(x)$ និងលក្ខខណ្ឌកំនត់លើ x នោះ

$x = \sqrt{h(a+h)}$ អាចយកជាចំណេញបាន


ដូចនេះទេសចរត្រូវឈរចំងាយ

$x = \sqrt{h(a+h)}$ ពីដងទង់

លំហាត់ទី 7

ត្រីកោណមួយ បរិមាត្រមាន $2p$ ហើយជ្រុងមួយមានរង្វាស់ $\frac{3p}{4}$ ។ គណនារង្វាស់ជ្រុង
ពីរទៀត ដើម្បីអោយត្រីកោណនោះមានក្រលាផ្ទៃអតិបរមា ។ អនុវត្តជាលេខ $p = 40cm$

ចំណេញ



តាង ABC ជាត្រីកោណក្នុងសំនួរដែលមានបរិមាត្រ

$$2p$$

$$|BC| = \frac{3p}{4}, |AB| = x, |AC| = y, x, y > 0$$

$$\text{តែ } |AB| + |AC| + |BC| = x + y + \frac{3p}{4} = 2p \Rightarrow$$

$$y = 2p - \frac{3p}{4} - x = \frac{5p - 4x}{4} \text{ ដោយ } 5p - 4x > 0 \Rightarrow$$

$$4x < 5p \Rightarrow x < \frac{5p}{4} \Rightarrow 0 < x < \frac{5p}{4}$$

តាមរូបមន្តហេរុង យើងអាចគណនាក្រលាផ្ទៃត្រីកោណ ABC បាន

$$S(x) = \sqrt{p(p-x)\left(p-\frac{3p}{4}\right)\left(p-\frac{5p-4x}{4}\right)} = \sqrt{\frac{p^2}{16}(p-x)(4x-p)}$$

$$= \frac{p}{4} \sqrt{-4x^2 + px - p^2} \text{ ដោយ } \frac{p}{4} < x < p$$

$$S'(x) = \frac{p}{4} \frac{-8x + 5p}{\sqrt{-4x^2 + 5px - p^2}} \Rightarrow S'(x) = 0 \Leftrightarrow -8x + 5p = 0 \Leftrightarrow x = \frac{5p}{8}$$

x	$\frac{p}{4}$	$\frac{5p}{8}$	p
$S'(x)$		+	
$S(x)$		អតិបរមា	

តាមតារាង $S'(x)$ និងពិនិត្យតាមលក្ខខណ្ឌកំរិតលើ x យើងអាចយក $x = \frac{5p}{8}$ ជាចំណុច
នោះយើងបាន $|AB| = |AC| = \frac{5p}{8}, |BC| = \frac{3p}{4}$ ត្រីកោណ ABC សមបាទកំពូល A
បើ $p = 40cm$ យើងបានត្រីកោណ ABC ជាត្រីកោណសមបាទកំពូល A មាន

$$|AB| = |AC| = 25cm$$

$$|BC| = 30cm$$



ក្បួនរកសំនុំចំនុចក្នុងពិសេស

ចំនុចអថេរមានបីប្រភេទ គឺ

ក- ចំនុចអថេរដែលមាន $\begin{cases} \text{អាបស៊ីសថេរ} \\ \text{អរដោនេ អថេរ} \end{cases}$

សំនុំចំនុចអថេរប្រភេទនេះ គឺបន្ទាត់សមីការ $x =$ អាបស៊ីសថេរស្រប $(x'oy)$

លំហាត់ទី 1

រកសំនុំចំនុច ω ផ្ចិតក្នុងនៃខ្សែកោង (H) សមីការ $y = \frac{mx+2}{x-1}$ កាលណា m ផ្លាស់ប្តូរតំលៃ ។

ចំណើន

ត្រូវរកកូអរដោនេរបស់ ω បើ ω ជាផ្ចិតក្នុងរបស់ខ្សែកោង (H) នោះ

$$x = -\frac{d}{c} = 1 \text{ ថេរ } y = \frac{a}{c} = m \text{ អថេរ}$$

$$\omega \begin{cases} x = 1 \text{ ថេរ} \\ y = m \text{ អថេរ} \end{cases} \Rightarrow \omega \text{ ដើរលើបន្ទាត់ } x = 1 \text{ ស្រប } (x'oy)$$

លំហាត់ទី 2

អោយខ្សែកោង $(C) y = x^2 - 2x + m + 1$

រកសំនុំចំនុច S កំពូលរបស់ខ្សែកោង (C) កាលណា m ផ្លាស់ប្តូរតំលៃ ។

ចំណើន

ត្រូវរកកូអរដោនេរបស់ S

បើ S ជាកំពូលរបស់ខ្សែកោង (C) នោះអាបស៊ីសរបស់ S គឺជាឫសនៃ

$$y = 0 \text{ គឺ } y' = 2x - 2, y' = 0 \Leftrightarrow x = 1 \text{ ថេរ}$$

$$y = 1 - 2 + m + 1 = m \text{ អថេរ}$$

$$S \begin{cases} x = 1 \text{ ថេរ} \\ y = m \text{ អថេរ} \end{cases} \Rightarrow S \text{ ដើរលើបន្ទាត់ } x = 1 \text{ ស្រប } (x'oy)$$

លំហាត់ទី 3

មានចំនុច $M = (x = 2 ; y = m + 1)$ និង $N(x = 1 ; y = n)$

ចូររកសំនុំចំនុចកណ្តាល I នៃ $[MN]$ កាលណា m ផ្លាស់ប្តូរតំលៃ

ចំណើន

ត្រូវរកកូអរដោនេចំនុច I

បើ $I(x ; y)$ ចំនុចកណ្តាលនៃ $[MN]$ នោះយើងបាន

$$x = \frac{x_M + x_N}{2} = \frac{2 + 1}{2} = \frac{3}{2} \text{ ថេរ}$$

$$y = \frac{y_M + y_N}{2} = \frac{m + 1 + m}{2} = \frac{2m + 1}{2} = m + \frac{1}{2} \text{ អថេរ}$$

$$\text{ដូច្នេះ សំនុំចំនុច } I \text{ គឺបន្ទាត់សមីការ } x = \frac{3}{2} \text{ ស្រប } (x'oy)$$

ខ. ចំនុចអថេរដែលមាន $\begin{cases} \text{អាបស៊ីសអថេរ} \\ \text{អរដោនេថេរ} \end{cases}$

សំនុំចំនុចប្រភេទនេះគឺដើរលើបន្ទាត់សមីការ $y =$ អរដោនេថេរស្រប $(x'ox)$

លំហាត់ទី 1

រកសំនុំចំនុច $M(x = m + 1 ; y = 2)$ កាលណា m ផ្លាស់ប្តូរតំលៃ ។

ចំណើន

ចំនុច M មានកូអរដោនេ $\begin{cases} x = m + 1 \text{ អថេរ} \\ y = 2 \text{ ថេរ} \end{cases}$

ដូច្នេះសំនុំចំនុច M គឺបន្ទាត់ $y = 2$ ស្រប $(x'ox)$

លំហាត់ទី 2

រកសំនុំចំនុច ω ផ្គុំគ្នារបស់ខ្សែកោង (C)

$$y = \frac{2x + m^2 + m + 1}{x - m} \quad \text{កាលណា } m \text{ ផ្លាស់ប្តូរតំលៃ } ។$$

ចំណើន

បើ ω ជាផ្គុំគ្នារបស់ខ្សែកោង (C) នោះ

$$x = -\frac{d}{c} = m, \quad y = \frac{a}{c} = 2 \quad \text{យើងបាន}$$

$$\omega \left| \begin{array}{l} x = m \text{ អថេរ} \\ y = 2 \text{ ថេរ} \end{array} \right. \Rightarrow \omega \text{ ដើរលើបន្ទាត់ } y = 2 \text{ ស្រប } (x'ox)$$

ក. ចំនុចអថេរដែលមាន $\left\{ \begin{array}{l} \text{អថេរស្ថិតអថេរ} \\ \text{អរដោនេអថេរ} \end{array} \right.$

ក្នុងករណីយើងត្រូវរកទំនាក់ទំនងគ្នារវាង y និង x វិសមីការសំនុំចំនុច

លំហាត់ទី 1

រកសំនុំចំនុច $M(x = 2m, y = 3m + 1)$

ចំណើន

យើងត្រូវរកទំនាក់ទំនងគ្នារវាង m រវាង y និង x វិសមីការសំនុំចំនុច M ។

$$x = 2m \Rightarrow m = \frac{x}{2} \quad \text{ជំនួសក្នុង } y \text{ យើងបាន } y = \frac{3x}{2} + 1$$

ដូច្នេះសំនុំចំនុច M គឺបន្ទាត់ $y = \frac{3}{2}x + 1$

លំហាត់ទី 2

អោយខ្សែកោង (C) សមីការ $y = \frac{(m+1)x + 2m - 1}{x - m}$

រកសំនុំចំនុច ω ផ្គុំគ្នារបស់ខ្សែកោង (C) ។

ចំណើន

រកកូអរដោនេរបស់ ω

បើ ω ជាផ្គុំគ្នារបស់ខ្សែកោង (C) យើងបាន

$$x = -\frac{d}{c} = m \text{ អថេរ} \quad y = \frac{a}{c} = m + 1 \text{ អថេរ}$$

យើងត្រូវរកទំនាក់ទំនងគ្នារវាង m រវាង y និង x វិសមីការសំនុំចំនុច ω

$$x = m \Rightarrow m = y - 1 \quad \text{ជំនួសក្នុង } y \Rightarrow y = x + 1$$

ដូច្នេះ ω ដើរលើបន្ទាត់ $y = x + 1$

លំហាត់ទី 3

អោយខ្សែកោង (H) $y = \frac{3-x}{x}$ និងបន្ទាត់ $(D_1) y = -x + 3$ ។

បន្ទាត់ (D_2) សមីការ $x = m$ កាត់ (H) ត្រង់ A និង (D_1) ត្រង់ B ។

ចូររកសំនុំចំនុចកណ្តាល I នៃ [AB] កាលណា m ផ្លាស់ប្តូរតំលៃ

ចំណើន

រកកូអរដោនេចំនុចកណ្តាល I នៃ [AB]

រកកូអរដោនេរបស់ A បន្ទាត់ $x = m$ កាត់ខ្សែកោង (C)

$$y = \frac{3-x}{x} \Rightarrow x = m, \quad y = \frac{3-m}{m} \quad \text{ជាកូអរដោនេរបស់ A}$$

រកកូអរដោនេរបស់ B បន្ទាត់ $x = m$ កាត់បន្ទាត់ $(D_1) y = -x + 3$

$$\text{ត្រង់ B: } x = m, \quad y = -m + 3$$

បើ I ជាចំនុចកណ្តាលនៃ [AB] ។ $I(x, y)$

$$x = \frac{x_A + x_B}{2} = \frac{m + m}{2} = m \text{ អថេរ}$$

$$\begin{aligned} y &= \frac{y_A + y_B}{2} = \frac{\frac{3-m}{m} + (-m + 3)}{2} = \frac{3 - m - m^2 + 3m}{2m} \\ &= \frac{-m^2 + 2m + 3}{2m} \text{ អថេរ} \end{aligned}$$

ត្រូវរកទំនាក់ទំនងគ្នា m រវាង y និង x វិសមីការ

សំនុំចំនុចគណ្តាល I នៃ $[AB]$

$$x = m \Rightarrow m = x \text{ ជំនួសក្នុង } y \text{ យើងបាន}$$

$$y = \frac{-x^2 + 2x + 3}{2x}$$

ដូច្នេះ យើងបានសំនុំចំនុច I គឺខ្សែកោង (C)

$$\text{សមីការ } y = \frac{-x^2 + 2x + 3}{2x}$$

សំណាត់ទី 4

$$\text{រកសំនុំចំនុច } N(x = 2m, y = \frac{m^2 - m - 6}{m})$$

ចំណើយ

រកទំនាក់ទំនងគ្នា m រវាង y និង x វិសមីការសំនុំចំនុច N ។

$$x = 2m \Rightarrow m = \frac{x}{2} \text{ ជំនួសក្នុង } y \text{ យើងបាន}$$

$$y = \frac{\frac{x^2}{4} - \frac{x}{2} - 6}{\frac{x}{2}} = \frac{x^2 - 2x - 24}{2x}$$

ដូច្នេះសំនុំចំនុច N គឺខ្សែកោង (H) សមីការ

$$y = \frac{x^2 - 2x - 24}{2x}$$

កូអរដោនេចំនុចប្រសព្វរវាងខ្សែកោង និង បន្ទាត់

ខ្សែកោង និង ខ្សែកោង

ដើម្បីរកកូអរដោនេចំនុចប្រសព្វរវាងខ្សែកោងនិងបន្ទាត់

វិ ខ្សែកោង និងខ្សែកោង យើងត្រូវ

- សរសេរសមីការរាប់ស៊ីសដោយយកសមីការទាំងពីរដើមក្តី
- ដោះស្រាយសមីការនោះ យើងបានរាប់ស៊ីសចំនុចប្រសព្វ
- យករាប់ស៊ីសចំនុចប្រសព្វទៅជំនួសក្នុងសមីការខ្សែកោង វិ បន្ទាត់ យើងបានកូអរដោនេចំនុចប្រសព្វ

សំណាត់ទី 1

អោយខ្សែកោង (C) សមីការ $y = x^2$ និងបន្ទាត់ (D) សមីការ $y = 2x + 3$ ។

រកកូអរដោនេចំនុចប្រសព្វ A និង B រវាង (C) និង (D) ។

ចំណើយ

សមីការរាប់ស៊ីសរវាង $(C) : y = x^2$ និង $(D) : y = 2x + 3$

$$y = 2x + 3 \text{ យើងបាន } x^2 = 2x + 3 \Leftrightarrow$$

$$x^2 - 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -1 \Rightarrow y = (-1)^2 = 1 \\ x_2 = 3 \Rightarrow y = 3^2 = 9 \end{cases}$$

យើងអាចយក

$$A(x = -1, y = 1)$$

$$B(x = 3, y = 9)$$

សំណាត់ទី 2

អោយខ្សែកោង $(H) : y = \frac{3-x}{x}$ និងបន្ទាត់ $(D) : y = -x + m$

1)- តើ m ត្រូវមានតំលៃប៉ុន្មាន ទើបបន្ទាត់ (D) ប៉ះខ្សែកោង (H) ។

ដោះស្រាយសមីការបន្ទាត់ប៉ះ

2)- តើ m ត្រូវមានតំលៃប៉ុន្មានទើប (C) និង (D) មានចំនុចប្រសព្វពីរ

M_1 និង M_2 ។

តើ m ត្រូវមានតំលៃប៉ុន្មាន ទើប M_1 និង M_2 នៅតែម្ខាងនៃអស៊ីមតូតឈរ?

តើ m ត្រូវមានតំលៃប៉ុន្មាន ទើប M_1 និង M_2 នៅខាងឆ្វេងអស៊ីមតូតឈរ?

តើ m ត្រូវមានតំលៃប៉ុន្មាន ទើប M_1 និង M_2 នៅខាងស្តាំអស៊ីមតូតឈរ?

ស្រាយថា M_1 និង M_2 មិនអាចនៅសងខាងអស៊ីមតូតឈរ

ចំណើយ

សមីការអស៊ីសរាងខ្សែកោង (C) និងបន្ទាត់ (D) :

$$(C) : y = \frac{3-x}{x} \quad | \Rightarrow \text{សមីការអស៊ីសរាង (C) និង (D) គឺ}$$

$$(D) : y = -x + m$$

$$\frac{3-x}{x} = -x + m \Rightarrow 3-x = -x^2 + mx \Leftrightarrow$$

$$x^2 - mx - x + 3 = 0 \Leftrightarrow x^2 - (m+1)x + 3 = 0$$

1)- ដើម្បីអោយ (C) និង (D) ប៉ះគ្នា លុះត្រាតែសមីការអស៊ីសមានឫសឌុប គឺ

$$a \neq 0$$

$$\Delta \geq 0 \quad \text{ដោយ } a = 1 \neq 0 \Rightarrow$$

$$\Delta = (m+1)^2 - 12 = (m+1)^2 - (2\sqrt{3})^2 = (m+1+2\sqrt{3})(m+1-2\sqrt{3})$$

$$= (m+1+2\sqrt{3})(m+1-2\sqrt{3}) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m_1 = -(1+2\sqrt{3}) \\ m_2 = -1+2\sqrt{3} \end{cases}$$

ទាញរកសមីការបន្ទាត់ប៉ះ យើងត្រូវយកតំលៃ m រកឃើញទៅជំនួសក្នុងសមីការ

បន្ទាត់ (D) នោះយើងបានសមីការបន្ទាត់ប៉ះ

$$\text{បើ } m = -(1+2\sqrt{3}) \quad \text{យើងបានសមីការបន្ទាត់ប៉ះគឺ } y = -x - (1+2\sqrt{3})$$


$$\text{បើ } m = -1+2\sqrt{3} \quad \text{យើងបានសមីការបន្ទាត់ប៉ះគឺ } y = -x - 1 + 2\sqrt{3}$$

2)- តើ m ត្រូវមានតំលៃប៉ុន្មានទើប (C) និង (D) មានចំនុចប្រសព្វពីរ M_1 និង M_2

ដើម្បីអោយមានចំនុចប្រសព្វពីរ M_1 និង M_2 លុះត្រាតែសមីការអស៊ីសមានឫស

$$\text{ពីរ គឺ } \begin{cases} a \neq 0 \\ \Delta \geq 0 \end{cases} \quad \text{តែ } a = 1 \neq 0 \Rightarrow \Delta \geq 0$$

$$\Delta = (m+1+2\sqrt{3})(m+1-2\sqrt{3})$$



$$m \in]-\infty ; -(1+2\sqrt{3})[\cup]-1+2\sqrt{3} ; +\infty[$$

តើ m ត្រូវមានតំលៃប៉ុន្មានទើប M_1 និង M_2 នៅតែម្ខាងនៃអស៊ីមតូតឈរ

អស៊ីមតូតឈរ មានសមីការ $x = 0$ បើ $M_1(x_1)$ និង $M_2(x_2)$

នៅតែម្ខាងនៃអស៊ីមតូតឈរនោះយើងបានពីរករណី គឺ

$$\begin{cases} x_1 \leq x_2 < 0 \\ 0 < x_1 \leq x_2 \end{cases} \quad \text{មានន័យថា } 0 \text{ នៅក្រៅឫសគឺ}$$

$$\begin{cases} a \neq 0 \\ \Delta \geq 0 \\ af(0) > 0 \end{cases} \quad \text{ដោយ } a = 1 \neq 0$$


$$af(0) = f(0) = 3 > 0 \quad \text{ដូច្នេះ បើ } \Delta \geq 0 \text{ នោះ } af(0) > 0$$

$$\Rightarrow \text{យើងបានចំណើយ } m \in]-\infty ; -(1+2\sqrt{3})[\cup]-1+2\sqrt{3} ; +\infty[$$

រក m ដើម្បីអោយ M_1 និង M_2 នៅខាងឆ្វេងអស៊ីមតូតឈរ

$$\text{យើងបាន } \begin{cases} x_1 \leq x_2 < 0 \\ \Delta \geq 0 \\ af(0) > 0 \\ \frac{S}{2} - 0 < 0 \Leftrightarrow S < 0 \end{cases}$$

$$S = -\frac{b}{a} = m+1 < 0 \Leftrightarrow m < -1$$



$$\text{យើងបាន } m \in]-\infty ; -(1+2\sqrt{3})[$$

រក m ដើម្បីអោយ M_1 និង M_2 នៅខាងស្តាំអស៊ីមតូតឈរ

យើងបាន $0 < x_1 \leq x_2 \Leftrightarrow \begin{cases} a \neq 0 \\ \Delta \geq 0 \\ af(0) > 0 \\ \frac{S}{2} - 0 > 0 \Leftrightarrow S > 0 \end{cases}$

$S = -\frac{b}{a} = m+1 > 0 \Leftrightarrow m > -1$



យើងត្រូវយក $m \in [-1+2\sqrt{3} ; +\infty[$

ស្រាយថា M_1 និង M_2 មិនអាចនៅសងខាងអាស៊ីមតូតឈរ $x = 0$

បើ M_1 និង M_2 នៅសងខាងអាស៊ីមតូតឈរ $x = 0$

នោះ $af(0) < 0$

ដោយយើងរកឃើញ $af(0) = 3 > 0$ នោះ M_1 និង M_2 មិនអាចនៅសងខាងអាស៊ីមតូតឈរទេ ។

សំគាល់ បើ $f(x) = ax^2 + bx + c = 0$

ជាសមីការអាប៉ូស ចង់រកតំលៃពាក់មែកដោយជំនួចប្រសព្វពីរស្ថិតនៅលើមែកសងខាង រឺ ស្ថិតនៅលើសងខាងអាស៊ីមតូតឈរ គឺយើងត្រូវរក

$\begin{cases} a \neq 0 \\ af(\alpha) < 0 \end{cases}$ ដោយ $x = \alpha$ ជាសមីការអាស៊ីមតូតឈរ

លំហាត់

គេមានអនុគមន៍ $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ មានក្រាបតំនាង (C) ។

1)- រក a, b, c និង d ដោយដឹងថា

- អនុគមន៍មានតំលៃអតិបរមាស្មើ 4 ចំពោះ $x = 1$

- អនុគមន៍មានតំលៃអប្បបរមាស្មើ 0 ចំពោះ $x = 3$

2)- សិក្សាអថេរភាពនៃសមីការ និងសងខ្សែកោង (C) តាងអនុគមន៍នេះក្នុងតំរូវការរកចរមេ (oxy) ចំពោះតំលៃ a, b, c , និង d ដែលរកឃើញ ។

3)- រកក្របសមីការបន្ទាត់ប៉ះខ្សែកោង (C) ដែលស្របទៅនឹងបន្ទាត់ $y - 9x = 0$

4)- ដោះស្រាយកាត្រាភិចអង្គភាព និងសញ្ញាវិសមីការ $f(x) = 1$ ដោយពិភាក្សាទៅតាមតំលៃនៃ f ។

ចំណើយ

1)- រក a, b, c និង d

អនុគមន៍ $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ជាអនុគមន៍ត្រីកោណដែលមានដែនកំនត់ $D = R$

យើងបាន $y' = f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$

តាមសម្មតិកម្មយើងដឹងថា

អនុគមន៍មានតំលៃអតិបរមាស្មើ 4 ចំពោះ $x = 1$ នោះយើងបាន $\begin{cases} f'(x) = 0 & (1) \\ f(1) = 4 & (2) \end{cases}$

អនុគមន៍មានតំលៃអប្បបរមាស្មើ 0 ចំពោះ $x = 3$ នោះយើងបាន $\begin{cases} f'(3) = 0 & (3) \\ f(3) = 0 & (4) \end{cases}$

(1) : $f'(1) = 0 \Leftrightarrow 3a + 2b + c = 0 \Leftrightarrow C = -3a - 2b$ (ក)

(2) : $f(1) = 4 \Leftrightarrow a + b + c + d = 4$ (ខ)

(3) : $f'(3) = 0 \Leftrightarrow 27a + 6b + c = 0 \Leftrightarrow C = -27a - 6b$ (គ)

(4) : $f(3) = 0 \Leftrightarrow 27a + 9b + 3c + d = 0$ (ឃ)

ផ្ទឹម (ក) និង (ខ) យើងបាន : $-3a-2b = -27a-6b \Rightarrow 4b = -24a$
 $\Leftrightarrow b = -6a$

ក្នុង (ក) ជំនួស $b = -6a$ នោះយើងបាន $C = -3a+12a = 9a$

ក្នុង (ខ) ជំនួស $b = -6a$; $C = 9a$ យើងបាន
 $a-6a+9a+d = 4 \Rightarrow d = 4-4a$

ក្នុង (ឃ) ជំនួស b, c, d , ជាអនុគមន៍នៃ a

$27a-54a+27a+4-4a = 0 \Rightarrow 4-4a = 0 \Rightarrow a = 1$

$a = 1$; $b = -6a$; $C = 9a = 9$; $d = 4-4a = 0$

$a = 1$; $b = -6$; $C = 9$; $d = 0$

2)- បើ $a = 1$, $b = -6$, $c = 9$ និង $d = 0$ នោះអនុគមន៍ទៅជា


$y - f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$

អនុគមន៍នេះជាអនុគមន៍ពហុធានដែលមានដែនកំនត់ $\mathcal{D} = \mathbb{R}$

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} = f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x^3 - \pm\infty$

$f(x) = 3x^2 - 12x + 9 = 3(x^2 - 4x + 3)$

$f(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 1 \Rightarrow y_1 = 4 \\ x_2 = 3 \Rightarrow y_2 = 0 \end{cases}$



អនុគមន៍មានតំលៃអតិបរមាស្មើ 4 ចំពោះ $x = 1$ ហើយមានតំលៃអប្បបរមាស្មើ 0 ចំពោះ $x = 3$

រកភូមិរោងនៃចំនុចបេត់ I

$y'' = f''(x) = 6x - 12 = 6(x - 2)$

$y'' = 0 \Leftrightarrow x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 2 \Rightarrow y = f(2) = 2$

រាប់ស៊ីសចំនុចប្រសព្វរវាង (C) និង $(y'ox)$ ជាបូសនៃសមីការ $x^3 - 6x^2 + 9x = 0$

$\Leftrightarrow x(x^2 - 6x + 9) = 0 \Leftrightarrow x(x - 3)^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 3 \end{cases}$

អរោងនៃចំនុចប្រសព្វរវាង (C) និង $(y'oy)$ គឺ $y = f(0) = 0$

ស្រាយថា I ជាផ្ចិតឆ្លុះរបស់ខ្សែកោង (C)

ក្នុងកំរយ (IXY) យើងបានតាមរូបមន្តនៃការផ្លាស់ប្តូរ $x = 2 + X$
 $y = 2 + Y$

$2 + Y = (2 + X)^3 - 6(2 + X)^2 + 9(2 + X)$

$Y = 8 + 12X + 6X^2 + X^3 - 24 - 24X - 6X^2 + 18 + 9X - 2$

$Y = f(X) = X^3 - 3X$

ដោយ $f(-X) = (-X)^3 - 3(-X) = -X^3 + 3X = -(X^3 - 3X)$

$= -f(X) \Rightarrow f(X)$ ជាអនុគមន៍សេស $\Rightarrow$

$I(2; 2)$ ជាផ្ចិតឆ្លុះរបស់ខ្សែកោង (C)

3)- រកគ្រប់សមីការបន្ទាត់ប៉ះខ្សែកោង (C) ដែលស្របទៅនឹងបន្ទាត់ $y - 9x = 0$

បន្ទាត់ $y - 9x = 0 \Leftrightarrow y = 9x$ មានមេគុណប្រាប់ទិស 9

តាង $M(x_1, y) \in (C)$ ជាចំនុចដែលបន្ទាត់ប៉ះមានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើ 9

យើងបានមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ប៉ះខ្សែកោង (C) ត្រង់ M គឺ

$f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$ ដោយមេគុណប្រាប់ទិសនេះស្មើ 9 នោះ

យើងបាន $3x^2 - 12x + 9 = 9 \Leftrightarrow 3x^2 - 12x = 0 \Leftrightarrow$


$x^2 - 4x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -2, y_1 = -50 & M_1 \\ x_2 = 2, y_2 = 2 & M_2 \end{cases}$

សមីការបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ $M_1(-2; -50)$

$9 = \frac{y+50}{x+2} \Leftrightarrow y+50 = 9x+18 \Leftrightarrow y = 9x-32$

សមីការបន្ទាត់ប៉ះព្រំ $M_2(2; 2)$

$$9 = \frac{y-2}{x-2} \Leftrightarrow y-2 = 9x-18 \Leftrightarrow y = 9x-16$$



- 4)- ដោះស្រាយតាមត្រាតិចអតិភាព និងសញ្ញាបូសសមីការ $x^3 - 6x^2 + 9x = 1$ ជាសមីការរាងស៊ីសរោង (C) និងបន្ទាត់ $y = 1$ ដោយពិនិត្យតាមត្រាតិក យើងបានចំណេះ

l	អត្ថិភាព និង សញ្ញាបូសសមីការ
$-\infty$	សមីការមានបូសមួយ $x < 0$
0	សមីការមានបូសពីរ $x_1 = 0 < x_2 = 3$
	សមីការមានបូស $0 < x_1 < x_2 < x_3$
4	សមីការមានបូសពីរ $0 < x_1 = 1 < x_2$
	សមីការមានបូសមួយ $x > 0$

លំហាត់

តែដោយអនុគមន៍ $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ដែលមានត្រាបត់នាង (C) ។

- 1)- កំនត់រាត់តែមេគុណ a, b, c និង d ដោយដឹងថា :
 $f(x)$ ជាអនុគមន៍សេស ហើយ $f(x)$ មានតំលៃអប្បបរមាស្មើ -2 ចំពោះ $x = 1$ ។
- 2)- ចំពោះតំលៃ a, b, c និង d ដែលរកឃើញ ចូរស្វែងរកអថេរហេតុផលនិងសំនុំរូបរាង (C) នៃក្នុងក្រុមអនុគមន៍ (axy) ។ រកសមីការបន្ទាត់ចំព្រំផ្ចិតក្នុងបូសខ្សែកោង (C) ។
- 3)- តាមចំនុច $A \in (C)$ ដែល $x = 1$ តែគូសបន្ទាត់ (Δ_m) មានមេគុណប្រាប់ទិស m ។ កំនត់ m ដើម្បីអោយ (C) និង (Δ_m) មានចំនុចប្រសព្វពីររឿង M និង N ខុសពី A ។ រកសំនុំចំនុចកណ្តាល I នៃ $[MN]$ បើ m ផ្លាស់ប្តូរតំលៃ ។
- 4)- ពិភាក្សាតាមត្រាតិកអត្ថិភាពនិងសញ្ញាបូសសមីការ $f(x) = K$ ដោយ K ជាចំនួនថេរ ។

ចំណេះ

- 1)- កំនត់រាត់តែមេគុណ a, b, c និង d អនុគមន៍ $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ជាអនុគមន៍ត្រាបត់មាន $\mathcal{D} = \mathbb{R}$
 $y' = f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$

តាមសម្មតិកតម្លៃ យើងបាន :

$f(x)$ ជាអនុគមន៍សេសក្នុង $\mathcal{D} = \mathbb{R}$ មានន័យថា :

$$f(-x) + f(x) = 0, \forall x \in \mathcal{D} = \mathbb{R} \Leftrightarrow$$

$$-ax^3 + bx^2 - cx + d + ax^3 + bx^2 + cx + d = 0, \forall x \in \mathcal{D} = \mathbb{R} \Leftrightarrow$$

$$2bx^2 + 2d = 0, \forall x \in \mathcal{D} = \mathbb{R} \Leftrightarrow bx^2 + d = 0, \forall x \in \mathcal{D} = \mathbb{R}$$

ឲ្យត្រាតែ $\begin{cases} b = 0 \\ d = 0 \end{cases}$ ទោះអនុគមន៍ទៅជា $y = f(x) = ax^3 + cx$
 $y' = f'(x) = 3ax^2 + c$

ដោយ $x = 1$ ធ្វើអោយអនុគមន៍មានតំលៃអប្បបរមាស្មើ -2 នោះយើងបាន

$$f'(1) = 0 \Leftrightarrow 3a + C = 0 \Leftrightarrow C = -3a \quad (1)$$

$$f(1) = -2 \Leftrightarrow a + C = -2 \Leftrightarrow C = -a - 2 \quad (2)$$

ដោយផ្គុំ (2) និង (1) : $-3a = -a - 2 \Leftrightarrow a = 1$

$$a = 1, b = 0, c = -3, d = 0$$

2)- បើ $a = 1, b = 0, c = -3, d = 0$ នោះអនុគមន៍ទៅជា

$$y = f(x) = x^3 - 3x$$

សិក្សាទិសដៅអថេរភាពនិងសង់ខ្សែកោង (C) តាងអនុគមន៍នេះក្នុងតំរុយអនុគមន៍មេ (oxy) $D = \mathbb{R}$

$f(x) = x^3 - 3x$ ជាអនុគមន៍សេសតាមសម្មតិកម្ម

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x^3 = \pm\infty$$

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x+1)(x-1)$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -1 \Rightarrow y_1 = 2 \\ x_2 = 1 \Rightarrow y_2 = -2 \end{cases}$$

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$+$
$f(x)$	$-\infty$	2	-2	$+\infty$


- អនុគមន៍មានតំលៃអតិបរមាស្មើ 2 ក្រុង $x = -1$ មានតំលៃអប្បបរមាស្មើ -2 ក្រុង $x = 1$

- ដោយ $f(x)$ ជាអនុគមន៍សេសនោះគល់ $O(0,0)$ ជាផ្ចិតឆ្លុះ

អាប័ស្តីសចំនុចប្រសព្វរវាង (C) និង $(x'oy)$ ជាបួសសមីការ $x^3 - 3x = 0 \Leftrightarrow$

$$x(x^2 - 3) = 0 \Leftrightarrow x(x + \sqrt{3})(x - \sqrt{3}) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -\sqrt{3} \\ x_2 = 0 \\ x_3 = \sqrt{3} \end{cases}$$

- អរដោនេចំនុចប្រសព្វរវាង (C) និង $(x'oy)$ គឺ $y = f(0) = 0$



រកសមីការបន្ទាត់ប៉ះខ្សែកោង (C) ក្រុងផ្ចិតឆ្លុះ $O(0,0)$

មេគុណប្រាវទិសនៃបន្ទាត់ប៉ះគឺ $y'(0) = f'(0) = -3$

សមីការបន្ទាត់ប៉ះ $y = f'(0)(x - 0) + 0 = -3x$

$$y = -3x$$

3)- បើ $A \in (C)$ ដែលមានអាប័ស្តីស $x = 1$ នោះ $y = -2$ $A(1; -2)$

រកសមីការនៃបន្ទាត់ (Δ_m) : $m = \frac{y+2}{x-1} \Leftrightarrow y = m(x-1) - 2$

$$(\Delta_m) : y = m(x-1) - 2$$

កំនត់ m ដើម្បីអោយ (C) និង (Δ_m) មានចំនុចប្រសព្វ M និង N ខុសពី A សម្រាកអាប័ស្តីសរវាង (C) និង (Δ_m)

$$x^3 - 3x = m(x-1) - 2 \Leftrightarrow x^3 - 3x + 2 - m(x-1) = 0$$

គង់ $A(x) = x^3 - 3x + 2$ ដោយ $A(1) = 1 - 3 + 2 = 0$ នោះយើងបាន $= 1$ ជាបួសមួយនៃ $A(x)$ ហើយ $A(x)$ ចែកដាច់នឹង $x-1$

$$\begin{array}{r} x^3 - 3x + 2 \\ -x^3 + x^2 \\ \hline x^2 - 3x + 2 \\ -x^2 + x \\ \hline -2x + 2 \\ +2x - 2 \\ \hline 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} x - 1 \\ x^2 + x - 2 \\ \hline \end{array}$$

ដូច្នេះ $A(x) = x^3 - 3x + 2 = (x-1)(x^2 + x - 2)$

យើងបានសមីការអាប់ស៊ីសរោង (C) និង (Δ_m) គឺ

$$(x-1)(x^2 + x - 2) - m(x-1) = 0 \Leftrightarrow$$

$$(x-1)(x^2 + x - 2 - m) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x^2 + x - 2 - m = 0 \end{cases} \quad (1)$$

ដើម្បីអោយមាន M និង N លុះត្រាតែសមីការ (1) មានរួស

$$\Delta = 1 - 4(-2 - m) = 1 + 8 + 4m = 4m + 9 \geq 0 \Leftrightarrow$$

$$m \geq -\frac{9}{4}$$

ដើម្បីអោយ M និង N ខុសពី A លុះត្រាតែអាប់ស៊ីសរបស់ M និង N ខុស

ពី 1 មានន័យថា $x = 1$ មិនមែនជាឫសនៃសមីការ (1)

$$1 + 1 - 2 - m \neq 0 \Leftrightarrow m \neq 0$$

ដូច្នេះ ជាសរុប យើងត្រូវយក

$$\begin{cases} m \geq -\frac{9}{4} \\ m \neq 0 \end{cases}$$

រកសំនុំចំនុចកណ្តាល I នៃ [MN]

តាង $I(x, y)$

យើងបាន $x = \frac{x_M + x_N}{2} = -\frac{b}{2a} = -\frac{1}{2}$ ថេរ

$$y = m\left(-\frac{1}{2} - 1\right) - 2 = -\frac{3}{2}m - 2 \text{ អថេរ}$$

ដូច្នេះ I ដើរលើបន្ទាត់ $x = -\frac{1}{2}$ ស្រប $(x'Oy)$

ផែនដែន I ដើរបាន

$$m \geq -\frac{9}{4} \Rightarrow -\frac{3}{2}m \leq \left(-\frac{3}{2}\right)\left(-\frac{9}{4}\right) = \frac{27}{8} \Rightarrow -\frac{3}{2}m - 2 \leq \frac{27}{8} - 2$$

$$\Rightarrow y \leq \frac{11}{8} \quad ; \quad I_0\left(-\frac{1}{2}; \frac{11}{8}\right)$$

$$m \neq 0 \Rightarrow -\frac{3}{2}m \neq 0 \Rightarrow y = -\frac{3}{2}m - 2 \neq -2; \quad I_1\left(-\frac{1}{2}; -2\right)$$

$$\text{ដូច្នេះ } I \in \left[I_0 Z' \right] \setminus \{I_1\} : I_0\left(-\frac{1}{2}; \frac{11}{8}\right), I_1\left(-\frac{1}{2}; -2\right)$$

4)- ពិភាក្សាប្រភេទអត្ថិភាព និងសញ្ញាឫសសមីការ $f(x) = K$

$$f(x) = K \Leftrightarrow x^3 - 3x = K \text{ ជាសមីការអាប់ស៊ីសរោងខ្សែកោង (C)}$$

និង បន្ទាត់ $y = K$ ស្រប $(x'Ox)$ តាមប្រភេទ យើងបាន

K	អត្ថិភាពឫសសមីការ
$-\infty$	សមីការមានឫសមួយ $x < 0$
-2	សមីការមានឫសពីរ $x_1 < 0 < x_2 = 1$
	សមីការមានឫសបី $x_1 < 0 < x_2 < x_3$
0	សមីការមានឫសបី $x_1 = -\sqrt{3} < x_2 = 0 < x_3 = \sqrt{3}$
	សមីការមានឫសបី $x_1 < x_2 < 0 < x_3$
2	សមីការមានឫសពីរ $x_1 = -1 < 0 < x_2$
$+\infty$	សមីការមានឫសមួយ $x > 0$

លំហាត់

គេអោយអនុគមន៍ $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ដែលមានក្រាបតាង (C)

1)- រក a, b, c និង d ដោយដឹងថា :

$f(x)$ ជាអនុគមន៍សេស

$f(x)$ មានតំលៃអតិបរមាស្មើ $\frac{2}{3}$ គ្រប់ $x = -1$

2)- សិក្សាទិសដៅ និងសង់ខ្សែកោង (C) តាងអនុគមន៍នេះក្នុងតំបន់អន្តរមេ (oay)

3)- រកក្របសមីការបន្ទាត់ដែលប៉ះខ្សែកោង (C) ហើយស្របទៅនឹងបន្ទាត់ $y - 3x = 0$

4)- ពិភាក្សាតាមក្រាតិចអត្ថិភាព និងសញ្ញាបូសសមីការ $x^3 - 3x - 3m = 0$ ទៅតាមតំលៃនៃប៉ារ៉ាម៉ែត m ។

ចំណើន

អនុគមន៍ $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ជាអនុគមន៍ពហុធាមានដែនកំនត់ $\mathcal{D} = \mathbb{R}$ មានដេរីវេ $y' = f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$

1)- រក a, b, c និង d ដោយដឹងថា

$f(x)$ ជាអនុគមន៍សេសក្នុង $\mathcal{D} = \mathbb{R}$ ទោះយើងបាន

$$f(-x) + f(x) = 0, \forall x \in \mathcal{D} = \mathbb{R} \Leftrightarrow$$

$$-ax^3 + bx^2 - cx + d + ax^3 + bx^2 + cx + d = 0, \forall x \in \mathcal{D} = \mathbb{R} \Leftrightarrow$$

$$2bx^2 + 2d = 0, \forall x \in \mathcal{D} = \mathbb{R} \Leftrightarrow bx^2 + d = 0, \forall x \in \mathcal{D} = \mathbb{R}$$

$$\text{យើងអាចទាញបាន } \begin{cases} b = 0 \\ d = 0 \end{cases}$$

$$\text{ដោយ } b = d = 0 \text{ ទោះយើងបាន } f(x) = ax^3 + cx$$

$$f'(x) = 3ax^2 + c$$

ដោយ $f(x)$ មានតំលៃអតិបរមាស្មើ $\frac{2}{3}$ គ្រប់ $x = -1$ ទោះយើងបាន :

$$f'(-1) = 0 \Leftrightarrow 3a + c = 0 \Leftrightarrow c = -3a \quad (1)$$

$$f(-1) = \frac{2}{3} \Leftrightarrow -a - c = \frac{2}{3} \Leftrightarrow c = a - \frac{2}{3} \quad (2)$$

តាមផ្ទឹម (2) និង (1) យើងអាចទាញបាន $-a - \frac{2}{3} = -3a$

$$\Leftrightarrow -3a - 2 = -9a \Leftrightarrow 6a = 2 \Leftrightarrow a = \frac{1}{3}$$

$$a = \frac{1}{3} \Rightarrow c = -3a = -3\left(\frac{1}{3}\right) = -1$$

ដូច្នេះ យើងបាន $a = \frac{1}{3}; b = 0; c = -1; d = 0$

2)- អនុគមន៍ដែលត្រូវរកទៅជា $y = f(x) = \frac{x^3}{3} - x$

- អនុគមន៍នេះមានដែនកំនត់ $\mathcal{D} = \mathbb{R}$

- អនុគមន៍នេះជាអនុគមន៍សេស (សមូតិកម្ម) ; $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^3}{3} = \pm\infty$

$$y' = f'(x) = x^2 - 1 = (x+1)(x-1)$$

$$y' = 0 \Leftrightarrow (x+1)(x-1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1; y = \frac{2}{3} \\ x = 1; y = -\frac{2}{3} \end{cases}$$

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	$\frac{2}{3}$	$-\frac{2}{3}$	$+\infty$	

អនុគមន៍មានតំលៃអតិបរមា $\frac{2}{3}$ គ្រប់ $x = -1$ ហើយមានតំលៃអប្បបរមាស្មើ $-\frac{2}{3}$ គ្រប់ $x = 1$ ។


ដោយអនុគមន៍នេះជាអនុគមន៍សេសសម្រាប់ $x=0$ ជាចំនុចរបត់ និងជាផ្ចិតព្យុះ
 អាចស៊ើបចំនុចប្រសព្វរវាង (C) និង $(x'oy)$ ជាបួសនៃកម្រិត

$$\frac{x^3}{3} - x = 0 \Leftrightarrow x^3 - 3x = 0 \Leftrightarrow x(x^2 - 3) = 0$$

$$\Leftrightarrow x(x + \sqrt{3})(x - \sqrt{3}) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\sqrt{3} \\ x = 0 \\ x = \sqrt{3} \end{cases}$$

ខ្សែកោង (C) កាត់ $(x'oy)$ បានបីចំនុចអាចស៊ើបរៀង $-\sqrt{3} ; 0 ; \sqrt{3}$

ខ្សែកោង (C) កាត់ $(y'oy)$ ត្រង់ចំនុចអនេកាទ $y = f(0) = 0$



3)- រកគ្រប់សមីការបន្ទាត់ប៉ះខ្សែកោង (C) ដែលស្របបន្ទាត់ $y - 3x = 0$

បន្ទាត់ $y - 3x = 0 \Leftrightarrow y = 3x$ មានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើ 3

កាត់ $M(x, y) \in (C)$ ចំនុចដែលមានបន្ទាត់ប៉ះស្របបន្ទាត់ $y = 3x$ ដូច្នេះ
 មេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ប៉ះខ្សែកោង (C) ត្រង់ M គឺ $f'(x) = x^2 - 1 = 3 \Leftrightarrow$

$$x^2 = 4 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -2, y_1 = -\frac{2}{3} \\ x_2 = 2, y_2 = \frac{2}{3} \end{cases}$$

យើងមានចំនុច M ពីរ គឺ $M_1(-2; -\frac{2}{3})$ និង $M_2(2; \frac{2}{3})$

សមីការបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ $M_1(-2; -\frac{2}{3})$ $3 = \frac{y + \frac{2}{3}}{x + 2} \Leftrightarrow$

$$y = 3x + 6 - \frac{2}{3} = 3x + \frac{16}{3} \quad y = 3x + \frac{16}{3}$$

សមីការបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ $M_2(2; \frac{2}{3})$ $3 = \frac{y - \frac{2}{3}}{x - 2} \Leftrightarrow$

$$y = 3x - 6 + \frac{2}{3} = 3x - \frac{16}{3} \quad y = 3x - \frac{16}{3}$$

ដូច្នេះយើងបានសមីការបន្ទាត់ប៉ះមានពីរស្របបន្ទាត់ $y - 3x = 0$ គឺ

$$y = 3x + \frac{16}{3} \quad \text{និង} \quad y = 3x - \frac{16}{3}$$

4)- ពិភាក្សាតាមត្រាភិចអត្ថិភាព និងសញ្ញាបួសសមីការ $x^3 - 3x - 3m = 0$

$x^3 - 3x = 3m \Leftrightarrow \frac{x^3}{3} - x = m$ ជាសមីការអាចស៊ើបរវាងខ្សែកោង (C)

និងបន្ទាត់ $y = m$ ស្រប $(x'oy)$

m	អត្ថិភាព និងសញ្ញាបួសសមីការ
$-\infty$	សមីការមានបួសមួយ $x < 0$
$-\frac{2}{3}$	សមីការមានបួសពីរ $x_1 < 0 < x_2 = 1$
	សមីការមានបួសបី $x_1 < 0 < x_2 < x_3$
0	សមីការមានបួសបី $x_1 = -\sqrt{3} < x_2 = 0 < x_3 = \sqrt{3}$
	សមីការមានបួសបី $x_1 < x_2 < 0 < x_3$
$\frac{2}{3}$	សមីការមានបួសពីរ $x_1 = -1 < 0 < x_2$
$+\infty$	សមីការមានបួសមួយ $x > 0$

លំហាត់

អោយអនុគមន៍ $y = f(x) = x^3 - ax^2 + 2$ មានក្រាបតំរាង (C)

- 1)- គណនា a ដើម្បីអោយក្រាប (C) ប៉ះបន្ទាត់ $y = -2$ ។
ចំពោះតំលៃ a កេរេង្សសិក្សាទិសដេរីវេនិងសង់ខ្សែកោង (C) តាងអនុគមន៍នេះក្នុង
តំរេយអូតូនមេ (ox) ។ រួចស្រាយចៅខ្សែកោង (C) មានព្រឹត្តិក្ខៈមួយ ។
- 2)- A ជាចំនុចប៉ះរាងខ្សែកោង (C) និងបន្ទាត់ $y = -2$ ។ តាម A គេគូស
បន្ទាត់អមេរមានមេគុណប្រាប់ទិស m តាង (D_m) បន្ទាត់នោះកំនត់ m ដើម្បី
អោយ (C) និង (D_m) មានចំនុចប្រសព្វពីរទៀត M និង N ខុសពី A ។ រួច
រួចរកសំនុំចំនុចគណ្តាលនៃ $[MN]$ កាលណា m ផ្លាស់ប្តូរតំលៃ
- 3)- ពិភាក្សាតាមប្រភពអន្តិភាព និងសញ្ញាបូសសមីការតាមតំលៃ K
 $x^3 - 3x^2 + 2 - K = 0$

ចំណើយ

អនុគមន៍ $y = f(x) = x^3 - ax^2 + 2$ ជាអនុគមន៍ពហុធាមានដែនកំនត់ $D = R$
មាន $y' = f'(x) = 3x^2 - 2ax = x(3x - 2a)$

- 1)- គណនាមេគុណ a ដើម្បីអោយខ្សែកោង (C) ប៉ះបន្ទាត់ $y = -2$
វិភាគ : តើបន្ទាត់ $y = -2$ ជាបន្ទាត់មានទីតាំងយ៉ាងដូចម្តេច ?
- បន្ទាត់ $y = -2$ មានទីតាំងស្រប $(x'ox)$ វិទីតាំងជាបន្ទាត់ដេក
- បើខ្សែកោង (C) ប៉ះបន្ទាត់ $y = -2$ ត្រង់ចំនុច A នោះ A ជាចំនុចអ្វី?
ចំពោះខ្សែកោង (C) ?
- ចំនុច A ហៅថាភ័ក្ត្រលរបស់ខ្សែកោង (C) ។ តើអ្វីជាអាប៉ូស៊ីតភ័ក្ត្រលខ្សែកោង
(C) ។ អាប៉ូស៊ីតភ័ក្ត្រលខ្សែកោង (C) ជាបូសាដេរីវេទី 1 គឺបូសានៃ
 $f'(x) = x(3x - 2a)$
 $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x(3x - 2a) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \frac{2a}{3} \end{cases}$

អោយចំនុចប៉ះ A ស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ $y = -2$ នោះបញ្ជាក់ថាអមេគុណរបស់ A
ស្មើ -2 ។

បើ $x = 0$ នោះយើងបាន $y = f(0) = 2 \neq -2$ មិនផ្ទៀងផ្ទាត់

ដូច្នេះ $x = \frac{2a}{3} \Rightarrow f\left(\frac{2a}{3}\right) = \frac{8a^3}{27} - \frac{4a^3}{9} + 2 = -2$ ពិត

$$\frac{8a^3}{27} - \frac{4a^3}{9} = -4 \Leftrightarrow -4a^3 = -4 \times 27 \Leftrightarrow$$

$$a^3 = 27 \Leftrightarrow a = \sqrt[3]{27} = 3 \quad \text{ដូច្នេះយើងបាន}$$

$$a = 3 \quad \text{ជាចំណើយ}$$

បើ $a = 3$ ជាអនុគមន៍ទៅជា $y = f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$

ទិសដៅអមេគុណ $D = R$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x^3 = \pm\infty$$

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \Rightarrow y_1 = 2 \\ x_2 = 2 \Rightarrow y_2 = -2 \end{cases}$$

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$-\infty$	2	-2	$+\infty$	

អនុគមន៍មានតំលៃអតិបរមាស្មើ 2 ត្រង់ $x = 0$ ហើយមានតំលៃអប្បបរមាស្មើ -2
ត្រង់ $x = 2$

កេរេង្សដេរីវេនៃចំនុចរបស់ I អាប៉ូស៊ីតរបស់ I ជាបូសានៃ $f''(x) = 6x - 6$

$$6x - 6 = 0 \Leftrightarrow x = 1 \Rightarrow y = f(1) = 0$$

រកស៊ីសចំនុចប្រសព្វរវាង (C) និង $(y'ox)$ ជាបួសនៃ $x^3 - 3x^2 + 2 = 0$

$$\Leftrightarrow (x-1)(x^2 - 2x - 2) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x^2 - 2x - 2 = 0 \end{cases}$$

$x^2 - 2x - 2 = 0$ មាន $\Delta' = 1 + 2 = 3$ ដូច្នេះសមីការនេះមាន

បួសគឺ $x = 1 - \sqrt{3}$, $x = 1 + \sqrt{3}$ ឱ្យរក (C) កាត់ $(y'ox)$

បានចំនុច មានរកស៊ីស $1 - \sqrt{3} : 1 : 1 + \sqrt{3}$

(C) កាត់ $(y'oy)$ ត្រង់ចំនុចអោរ $y = f(o) = 2$

ស្រាយថា $I(1 : 0)$ ជាផ្ចិតក្នុងរបស់ (C)

ក្នុងតំរុយ (IXY) យើងបានតាមរូបមន្តដូចតំរុយ

$$x = 1 + X$$

$$y = 0 + Y = Y$$

តាមរូបមន្ត $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$


យើងបានអនុគមន៍ទៅជា $Y = (1+X)^3 - 3(1+X)^2 + 2$

$$= 1 + 3X + 3X^2 + X^3 - 3 - 6X - 3X^2 + 2 = X^3 - 3X$$

ដូច្នេះ $Y = f(X) = X^3 - 3X$ ជាសមីការប្រែប្រួលនៃ (C) ។

ដោយ $f(-X) = (-X)^3 - 3(-X) = -X^3 + 3X = -(X^3 - 3X) = -f(X)$

នោះ $f(X)$ ជាអនុគមន៍សេស $\Rightarrow I(1 : 0)$ ជាផ្ចិតក្នុងរបស់ (C) ។



2)- សមីការបន្ទាត់ $(D_m) : m = \frac{y+2}{x-2} \Leftrightarrow y = m(x-2) - 2$

សមីការរកស៊ីសរវាង (C) $y = x^3 - 3x^2 + 2$ និង $(D_m) : y = m(x-2) - 2$

$$x^3 - 3x^2 + 4 - m(x-2) = 0$$

តាង $p(x) = x^3 - 3x^2 + 4 - m(x-2)$ យើងមាន $p(-1) = -1 - 3 + 4 = 0$

នោះ $x = -1$ ជាបួសនៃ $p(x)$ ហើយ $p(x)$ ចែកដាច់នឹង $x+1$

ដោយចែក $p(x)$ នឹង $x+1$ នោះយើងបាន

$$p(x) = (x+1)(x-2)^2$$

សមីការរកស៊ីសទៅជា : $(x+1)(x-2)^2 - m(x-2) = 0 \Leftrightarrow$

$$(x-2)[(x+1)(x-2) - m] = 0$$

$x = 2$ រកស៊ីសរបស់ A

$$(x-2)(x^2 - x - 2 - m) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x^2 - x - 2 - m = 0 \end{cases} \quad (1)$$

ដើម្បីអោយមានចំនុចប្រសព្វ M និង N លុះត្រាតែសមីការ (1) មានឫសពិត

$$\Delta = 1 - 4(-2-m) = 1 + 8 + 4m = 4m + 9 \geq 0 \Leftrightarrow m \geq -\frac{9}{4}$$

ដោយ M និង N ខុសពី A នោះ $x = 2$ មិនមែនជាឫសនៃ (1)

$$4 - 2 - 2 - m \neq 0 \Leftrightarrow m \neq 0$$

ដូច្នេះ យើងត្រូវយក $\begin{cases} m \geq -\frac{9}{4} \\ m \neq 0 \end{cases}$

រកសំនុំចំនុចណ្ហានៃ $[MN]$ តាងដោយ $J(x, y)$ កាលណា m ជ្រាបស្របតាមលក្ខខណ្ឌ

យើងបាន : $x = \frac{x_M + x_N}{2} = -\frac{b}{2a}m = \frac{1}{2}$ ថេរ

$$y = m\left(\frac{1}{2} - 2\right) = -\frac{3}{2}m \quad \text{អថេរ}$$

ដូច្នេះ J បើរលើបន្ទាត់ $x = \frac{1}{2}$ ស្រប $(y'ox)$ ដើម្បីអោយមាន J លុះត្រាតែមាន

M និង N ដើម្បីអោយមាន M និង N លុះត្រាតែ

$$m \geq -\frac{9}{4} \Rightarrow y = -\frac{3}{2}m \leq -\frac{3}{2}\left(-\frac{9}{4}\right) = \frac{27}{8}$$

យក $J_1\left(\frac{1}{2}; \frac{27}{8}\right)$

$$m \neq 0 \Rightarrow y = -\frac{3}{2}m \neq 0$$

យក $J_1\left(\frac{1}{2}; 0\right)$

ដូច្នេះ $J \in [JZ'] \setminus \{J_1\}$ សមីការ $x = \frac{1}{2}$

3)- ពិភាក្សាតាមត្រាភិចអត្ថិភាព និងសញ្ញាប្រសព្វសមីការ

សមីការនេះអាចសរសេរ $x^3 - 3x^2 + 2 = K$ ជាសមីការអាប់ស៊ីសរោងខ្សែកោង (C) និងបន្ទាត់ $y = K$ ស្រប $(x'ox)$ ។

K	អត្ថិភាពនិងសញ្ញាប្រសព្វសមីការ
$-\infty$	សមីការមានឫសតែមួយ $x < 0$
-2	សមីការមានឫសពិត $x_1 < 0 < x_2 = 2$
	សមីការមានឫសបី $x_1 < 0 < x_2 < x_3$
2	សមីការមានឫសពិត $x_1 = 0 < x_2$
$+\infty$	សមីការមានឫសបីរយ $x > 0$

សំណួរ

អោយអនុគមន៍ $y = f(x) = (x-m)^3 - 3x + 2$

1)- កំនត់ m ដើម្បីអោយអនុគមន៍នេះ

ក)- កើនក្នុងចន្លោះ $[1; +\infty[$

ខ)- កើនក្នុងចន្លោះ $] -\infty; 3]$

2)- ស្រាយបញ្ជាក់ថា $\forall m \in \mathbb{R}$ អនុគមន៍នេះមានតំលៃអតិបរមាមួយ និងអប្បបរមាមួយ ជានិច្ច ។

3)- សិក្សាទិសដៅអថេរភាពនៃអនុគមន៍នេះ បើ $m = 0$ រួចសង្ខេបខ្សែកោងតំណាង (C) ក្នុងតំបន់អរតូមេ (oxy)

4)- ដោះស្រាយតាមត្រាភិចអត្ថិភាព និងសញ្ញាប្រសព្វសមីការ $x^3 - 3x + 2 - n = 0$


ចំណើយ

1)- កំនត់ m ដើម្បីអោយអនុគមន៍នេះកើន

អនុគមន៍ $y = f(x) = (x-m)^3 - 3x + 2$ ជាអនុគមន៍តែហុដានដែនកំនត់ $\mathcal{D} = \mathbb{R}$

$$y' = f'(x) = 3(x-m)^2 - 3 = 3[(x-m)^2 - 1] = 3(x-m+1)(x-m-1)$$

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = m-1 \\ x_2 = m+1 \end{cases} \text{ ដោយ } m-1 < m+1, \forall m \in \mathbb{R}$$



ក)- ក្នុងចន្លោះ $]1; +\infty[$

លុះត្រាតែ $]1; +\infty[\subset]m+1; +\infty[$ មានន័យថា

$$m+1 \leq 1 \Leftrightarrow m \leq 0 \Leftrightarrow m \in]-\infty; 0]$$

ខ)- ក្នុងចន្លោះ $]1; -\infty[$

លុះត្រាតែ $]1; -\infty[\subset]-\infty; m-1[$ មានន័យថា

$$3 \leq m-1 \Leftrightarrow m \geq 4 \Leftrightarrow m \in [4; +\infty[$$

2) ស្រាយបញ្ជាក់ថា $\forall m \in \mathbb{R}$ អនុគមន៍មានតំលៃអតិបរមា និងអប្បបរមាជានិច្ច
យើងស្រាយថា $\forall m \in \mathbb{R} : f(x)$ មានលីសតិរលូនក្នុងក្លាដាទិច

$$f(x) = 3(x-m+1)(x-m-1)$$

តាមសំណើយោងលើ $\forall m \in \mathbb{R} : f(x)$ មានលីសតិរលូនក្នុងក្លាដាទិច

$$x = m-1 \text{ និង } x = m+1$$

ដូច្នេះ អនុគមន៍នេះមានតំលៃអតិបរមា និងអប្បបរមាជានិច្ច
ចំពោះ $\forall m \in \mathbb{R}$


3) បើ $m = 0$ អនុគមន៍ទៅជា $y = x^3 - 3x + 2$

អនុគមន៍នោះមានដែនកំនត់ $\mathcal{D} = \mathbb{R}$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x^3 = \pm\infty$$

$$y' = f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x-1)(x+1)$$

$$y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -1 \Rightarrow y_2 = 4 \\ x_2 = 1 \Rightarrow y_2 = 0 \end{cases}$$



អនុគមន៍មានតំលៃអតិបរមាស្មើ 4 ចំពោះ $x = -1$ ហើយមានតំលៃអប្បបរមាស្មើ 0
ចំពោះ $x = 1$

ពេកអរដោយនៃចំនុចបេតុង 1

យើងដឹងថា រាល់ស៊ីស្តែមនៃចំនុចបេតុងជាប្រភេទនៃ $y'' = f''(x) = 6x$

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow 6x = 0 \Leftrightarrow x = 0 \Rightarrow y = 2$$

ដូច្នេះ $I(0; 2)$

រាល់ស៊ីស្តែមនៃចំនុចប្រសព្វរវាង (C) និង $(x'ox)$ ជាប្រភេទនៃ $x^3 - 3x + 2 = 0 \Leftrightarrow$

$$(x-1)^2(x+2) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -2 \end{cases}$$

អរដោយនៃចំនុចប្រសព្វរវាង (C) និង $(y'oy)$ គឺ $y = f(0) = 2$


ស្រាយថា $I(0; 2)$ ជាផ្ចិតក្នុងរបស់ខ្សែកោង (C)

ក្នុងកំរុយអក្ខរកម្ម (IXY) យើងបានតាមរូបមន្តដូចខាងលើ $x = 0 + X = X$
 $y = 2 + Y$

ដោយអនុគមន៍ទៅជា $2 + Y = X^3 - 3X + 2 \Leftrightarrow Y = X^3 - 3X$

$$f(-X) = (-X)^3 - 3(-X) = -X^3 + 3X = -(X^3 - 3X) = -f(X)$$

$\Rightarrow f(X) = X^3 - 3X$ ជាអនុគមន៍សេស $\Rightarrow I(0; 2)$ ជាផ្ចិតក្នុងរបស់
ខ្សែកោង (C) ។



- 4)- ដោះស្រាយតាមត្រាតិចអត្ថិភាព និងសញ្ញាបួសសមីការ $x^3 - 3x + 2 - n = 0$
 សមីការនេះអាចសរសេរ $x^3 - 3x + 2 = n$ ជាសមីការអាប់ស៊ីសរវាងខ្សែកោង (C)
 និងបន្ទាត់ $y = n$ ស្រប ($x'ox$) តាមត្រាតិចយើងបានចំណែកក្នុងតារាងខាងក្រោម
 នេះ:

n	អត្ថិភាពនិងសញ្ញាវិសសមីការ
$-\infty$	សមីការមានបួសមួយ $x < 0$
0	សមីការមានបួសពីរ $x_1 = -2 < 0 < x_2 = 1$
	សមីការមានបួសបី $x_1 < 0 < x_2 < x_3$
2	សមីការមានបួសបី $x_1 < x_2 = 0 < x_3$
	សមីការមានបួសបី $x_1 < x_2 < 0 < x_3$
4	សមីការមានបួសពីរ $x_1 = -1 < 0 < x_2$
$+\infty$	សមីការមានបួសមួយ $x > 0$

លំហាត់

អោយអនុគមន៍ $y = f(x) = x^3 - 1 - m(x-1)$ ដែលមានខ្សែកោងតំនាង (C_m) ។

- 1)- កំនត់ m ដើម្បីអោយខ្សែកោង (C_m) ប៉ះអ័ក្ស ($x'ox$) ។
- 2)- ចំពោះ $m = 3$ ចូរសិក្សាទិសដោយចេតនា និងសង់ខ្សែកោង (C)

តាងអនុគមន៍នេះក្នុងតំរុយអូតូនរមេ (oxy) ដោយរកសមីការបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ផ្គិតដូច្នេះ I ។

- 3)- ដោយប្រើខ្សែកោង ដោះស្រាយវិសសមីការ $x^3 - 3x + 2 \geq x + 2$
- 4)- ដោះស្រាយអត្ថិភាព និងសញ្ញាវិសសមីការ $x^3 - 3x + 2 - K = 0$

ដោយពិភាក្សាទៅតាមតំលៃនៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រ K ។

ចំណើន

- 1)- កំនត់ m ដើម្បីអោយខ្សែកោង (C_m) ប៉ះអ័ក្ស ($x'ox$)

ដើម្បីអោយខ្សែកោង (C_m) : $y = f(x) = x^3 - 1 - m(x-1) =$
 $-(x-1)^2(x^2 + x + 1) - m(x-1)$

ប៉ះ ($x'ox$) : លុះត្រាតែសមីការ $y = f(x) = 0$ មានបួសឌុប

$(x-1)(x^2 + x + 1 - m) = 0$ មានបួសឌុប

$(x-1)(x^2 + x + 1 - m) = 0$ (1) $\Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x^2 + x + 1 - m = 0 \end{cases}$ (2)

បើសមីការ (2) មានបួស $x = 1$ ដែរ មានន័យ $x = 1$ ផ្ទៀងផ្ទាត់ (2)
 គឺ $1 + 1 + 1 - m = 0 \Leftrightarrow 3 - m = 0 \Leftrightarrow m = 3$ នោះ $x = 1$ ជាបួស
 ឌុបនៃ (1) មានន័យថាខ្សែកោង (C_m) ប៉ះ ($x'ox$) ត្រង់ $x = 1$

បើសមីការ (2) មានបួសឌុបគឺ $\Delta = 1 - 4(1 - m) = 1 - 4 + 4m =$
 $4m - 3 = 0 \Leftrightarrow m = \frac{3}{4} \Leftrightarrow x_1 = x_2 = -\frac{1}{2}$ នោះ (C_m)

ប៉ះ ($x'ox$) ត្រង់ $x = -\frac{1}{2}$

ដូច្នេះ យើងបាន

បើ $m = 3 \cdot (C_m)$ ប៉ះ ($x'ox$) ត្រង់ $x = 1$
 $m = \frac{3}{4} \cdot (C_m)$ ប៉ះ ($x'ox$) ត្រង់ $x = -\frac{1}{2}$

2)- បើ $m = 3$ អនុគមន៍អោយទៅជា $y = f(x) = x^3 - 1 - 3(x-1) = x^3 - 3x + 2$

$$y = f(x) = x^3 - 3x + 2$$

ទិសដៅអថេរភាពនៃអនុគមន៍ $y = f(x)$ អនុគមន៍មានដែនកំនត់ $\mathcal{D} = \mathbb{R}$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x^3 = \pm\infty$$

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x+1)(x-1)$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -1 \Rightarrow y = f(-1) = 4 \\ x_2 = 1 \Rightarrow y = f(1) = 0 \end{cases}$$

x	$-\infty$	-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		+		-		+
$f(x)$	$-\infty$		4		0	$+\infty$

អនុគមន៍មានតំលៃអតិបរមាស្មើ 4 ត្រង់ $x = -1$ ហើយមានតំលៃអប្បបរមាស្មើ 0 ត្រង់ $x = 1$

ចំនុចរបត់ អាម៉ូស៊ីសចំនុចរបត់ជាបួសនៃ $y'' = f''(x)$

$$y'' = f''(x) = 6x, \quad y'' = 0 \Leftrightarrow 6x = 0 \Leftrightarrow x = 0 \Rightarrow y = f(0) = 2$$

យើងបាន $I(0; 2)$ ជាចំនុចរបត់

អាម៉ូស៊ីសចំនុចប្រសព្វរវាង (C) និង $(x'ox)$ ជាបួសនៃសមីការ

$$x^3 - 3x + 2 = 0 \Leftrightarrow (x-1)^2(x+2) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = x_2 = 1 \\ x_3 = -2 \end{cases}$$

យើងបាន (C) ប៉ះ $(x'ox)$ ត្រង់ $x = 1$ ហើយកាត់ត្រង់ $x = -2$

អរដោនេចំនុចប្រសព្វរវាង (C) និង $(y'oy)$ គឺ $y = f(0) = 2$

ស្រាយថា $I(0; 2)$ ជាផ្ចិតឆ្លុះរបស់ខ្សែកោង (C)


ក្នុងតំរុយ (IXY) យើងបានតាមរូបមន្តនៃការផ្ទេរតំរុយ $x = 0 + X = X$
 $y = 2 + Y$

នោះសមីការរបស់ខ្សែកោង (C) ទៅជា $2 + Y = X^3 - 3X + 2 \Leftrightarrow$

$$Y = f(X) = X^3 - 3X$$

ដោយ $f(-X) = (-X)^3 - 3(-X) = -X^3 + 3X = -(X^3 - 3X) = -f(X)$

នោះ $f(x)$ ជាអនុគមន៍សេសដែលតំរុយអោយ $I(0,2)$ ជាផ្ចិតឆ្លុះរបស់ខ្សែកោង (C) ។



3)- ដោយប្រើខ្សែកោង (C) ដោះស្រាយវិសមីការ $x^3 - 3x + 2 \geq x + 2$

$y = x^3 - 3x + 2$ ជាសមីការរបស់ខ្សែកោង (C)

$y = x + 2$ ជាសមីការបន្ទាត់ (D) កាត់តាម $\begin{array}{c|cc} x & -2 & 0 & 2 \\ \hline y & 0 & 2 & 4 \end{array}$

ដោះស្រាយវិសមីការ $x^3 - 3x + 2 \geq x + 2$ គឺជ្រើសរើសរតតំលៃ X

ដែលធ្វើអោយ (C) នៅលើ (D) ។ ដោយពិនិត្យតាមត្រាតច យើងត្រូវយក

$$x \in [-2; 0] \cup [2; +\infty[$$

4). ដោះស្រាយអត្ថិភាព និងសញ្ញាបូសសមីការ $x^3 - 3x + 2 - K = 0$

សមីការនេះអាចសរសេរ $x^3 - 3x + 2 = K$ ជាសមីការអាប់ស៊ីសរវាងខ្សែកោង

(C) និងបន្ទាត់ $y = K$ ស្រប $(x'ox)$ ។

ដោយពិនិត្យតាមក្រាហ្វិកនោះយើងបានចំណេញក្នុងតារាងខាងក្រោមនេះ៖

m	អត្ថិភាព និងសញ្ញាបូសសមីការ
$-\infty$	សមីការមានបូសមួយ $x < 0$
0	សមីការមានបូសពីរ $x_1 = -2 < 0 < x_2 = 1$
	សមីការមានបូសបី $x_1 < 0 < x_2 < x_3$
2	សមីការមានបូសបី $x_1 < x_2 = 0 < x_3$
	សមីការមានបូសបី $x_1 < x_2 < 0 < x_3$
4	សមីការមានបូសពីរ $x_1 = -1 < 0 < x_2$
$+\infty$	សមីការមានបូសមួយ $x > 0$

លំហាត់

ដោយខ្សែកោង (C_λ) សមីការ $y = f(x) = x^3 - 3x^2 \sin 2\lambda + 2$

ដែល $\lambda \in [0, 2\pi]$ រឺ $(0 \leq \lambda \leq 2\pi)$ ។

តំណាង λ ដើម្បីរកដោយខ្សែកោង (C_λ) ប៉ះទៅនឹងបន្ទាត់ $y = -2$

ចំណើយ

យើងមិនអាចប្រើសមីការអាប់ស៊ីសរវាង (C_λ) និងបន្ទាត់ $y = -2$ បានទេព្រោះសមីការអាប់ស៊ីសជាសមីការដឺក្រេទី 3 មានជាប់ប៉ារ៉ាម៉ែត $\sin 2\lambda$ ដូច្នេះយើងត្រូវប្រើគំនិតវិភាគ ។ តើត្រូវវិភាគលើអ្វីខ្លះ ? គឺវិភាគដូចតទៅនេះ ៖

ក). តើបន្ទាត់ $y = -2$ មានទីតាំងយ៉ាងដូចម្តេច ?

ចំណើយ : បន្ទាត់ $y = -2$ ជាបន្ទាត់ស្រប $(x'ox)$ រឺជាបន្ទាត់ដេក

- បើខ្សែកោង (C_λ) ប៉ះបន្ទាត់ $y = -2$ ដែលជាបន្ទាត់ស្រប $(x'ox)$ នោះចំនុចប៉ះតាងដោយ S តាងអ្វីចំពោះខ្សែកោង (C_λ) ?

ចំណើយ : ចំនុចប៉ះ S ជាកំពូលរបស់ខ្សែកោង (C_λ)

- តើអាប់ស៊ីសនៃកំពូល S គឺជាអ្វី រឺ អ្វីទៅដែលជាអាប់ស៊ីសនៃកំពូលរបស់ខ្សែកោង (C_λ) ?

ចំណើយ : អាប់ស៊ីសនៃកំពូល S ជាបូសនៃដេរីវេទី 1 ។ តាងដោយ $f'(x)$

យើងរក $f'(x) = 3x^2 - 6x \sin 2\lambda = 3x(x - 2 \sin 2\lambda)$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 2 \sin 2\lambda \end{cases}$$

អរដោនេរបស់ S បានដោយយកគីលេបូសនៃ $f'(x)$ ទៅជំនួសក្នុង $f(x)$ ហើយ

អនុគមន៍ $f(x)$ ត្រូវមានតំលៃស្មើ -2 (C_λ) ប៉ះបន្ទាត់ $y = -2$

តាមគត្តវិទ្យា យើងដឹងថាបរិសំនើ (PVQ) ពិត និង P ជាសំនើមិនពិត នោះតំរូវអោយសំនើ Q ជាសំនើពិតដាច់ខាត ។

$f(0) = 2 \neq -2$ មិនផ្ទៀងផ្ទាត់ (ជាសំនើ P មិនពិត) ដូច្នេះ

• $f(2 \sin 2\lambda) = -2$ (ជាសំនើ Q ពិតដាច់ខាត) ហេតុនេះ យើងបាន

$$8 \sin^3 2\lambda - 12 \sin^3 2\lambda + 2 = -2 \Leftrightarrow -4 \sin^3 2\lambda = -4 \Leftrightarrow$$

$$\sin^3 2\lambda = 1 \Leftrightarrow \sin 2\lambda = 1 \Leftrightarrow$$

$$2\lambda = \frac{\pi}{2} + K2\pi \text{ ដោយ } K \in \mathbb{Z}$$

$$\lambda = \frac{\pi}{4} + K\pi, K \in \mathbb{Z}$$

គេកំនត់ល្បិចខ្លួន : $\lambda \in [0; 2\pi]$

នោះយើងត្រូវរកតំលៃ K ដូចតទៅ ព្រោះយើងយកតំលៃ λ ចំណេញពីល្បិចខ្លួន

$$K = 0 \Rightarrow \lambda = \frac{\pi}{4} \in [0; 2\pi]$$

$$K = 1 \Rightarrow \lambda = \frac{\pi}{4} + \pi = \frac{5\pi}{4} \in [0; 2\pi]$$

$$K = 2 \Rightarrow \lambda = \frac{\pi}{4} + 2\pi = \frac{9\pi}{4} \notin [0; 2\pi]$$

ដូច្នេះយើងបានតំលៃ λ មានតែពីរគត់ជាចំណេញ គឺ

$$\lambda = \frac{\pi}{4} \text{ ឬ } \lambda = \frac{5\pi}{4}$$

និស្សាគ

គេមានអនុគមន៍ $y = f(x) = x^4 - 6x^2 + 9$ ដែលមានក្រាបតំណាង (C)

- 1) សិក្សាអថេរភាពទិសដៅ និងសង់ខ្សែកោង (C) តាងអនុគមន៍នេះក្នុងតំបន់អន្តរកាល (ox)
- 2) រកក្របខ័ណ្ឌចុះនៅលើខ្សែកោង (C) ដែលបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ចំនុចនោះផ្គុំជាមួយ $(x'ox)$ បានមុំ α ដោយ $\tan \alpha = -8$ ។ សរសេរសមីការបន្ទាត់ប៉ះទាំងនោះ ។
- 3) ដោះស្រាយតាមក្រាបតំណាង និងសញ្ញាបូសសមីការ $x^4 - 6x^2 + 9 - m = 0$ ដោយរកតាមក្រាបតំណាងនៃ m ។

ចំណើយ

- 1) ក- អនុគមន៍ $y = f(x) = x^4 - 6x^2 + 9$ ជាអនុគមន៍ពហុធា បីការ

មានដែនកំនត់ : $\mathcal{D} = \mathbb{R}$

មានលីមីត : $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x^4 = +\infty$

មានដេរីវេ : $y' = f'(x) = 4x^3 - 12x = 4x(x^2 - 3) = 4x(x + \sqrt{3})(x - \sqrt{3})$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -\sqrt{3} \Rightarrow y_1 = f(-\sqrt{3}) = 0 \\ x_2 = 0 \Rightarrow y_2 = f(0) = 9 \\ x_3 = \sqrt{3} \Rightarrow y_3 = f(\sqrt{3}) = 0 \end{cases}$$

ដោយ $f'(x) = 4x^3 - 12x = 4x(x^2 - 3)$ យើងត្រូវសិក្សាសញ្ញា $f'(x)$ ជាមុនសិន

x	$-\infty$	$-\sqrt{3}$	0	$\sqrt{3}$	$+\infty$
$4x$	-	-	0	+	+
$x^2 - 3$	+	0	-	0	+
$f'(x)$	-	0	+	0	+

តារាងទិសដៅអថេរភាព

x	$-\infty$	$-\sqrt{3}$	0	$\sqrt{3}$	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+	0	+
$f(x)$	$+\infty$	0	9	0	$+\infty$

អនុគមន៍មានតំលៃអប្បបរមាស្មើ 0 ចំពោះ $x = -\sqrt{3}$ និង $x = \sqrt{3}$ ហើយមានតំលៃអតិបរមាស្មើ 9 ចំពោះ $x = 0$ ។


- 2- សំនង់ខ្សែកោង $f(-x) = (-x)^4 - 6(-x^2) + 9 = x^4 - 6x^2 + 9 = f(x), \forall x \in \mathcal{D}$ ដូច្នេះអនុគមន៍ $f(x) = x^4 - 6x^2 + 9$ ជាអនុគមន៍ដែលតំរូវអោយខ្សែកោង (C) មានអ័ក្សអដោនេ $(y'ox)$ ជាអ័ក្សធ្លុះ ។

អាចស្ថិតចំនុចប្រសព្វរវាង (C) និង $(x'ox)$ ជាបូសរបស់សមីការ $x^4 - 6x^2 + 9 = 0$
 $x^4 - 6x^2 + 9 = (x^2 - 3)^2 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\sqrt{3} \\ x = \sqrt{3} \end{cases}$

អរោនេចំនុចប្រសព្វរវាង (C) និង (x', ox) គឺ $y = f(0) = 9$
 រកអរោនេចំនុចប្រសព្វ : អាចស៊ើបចំនុចប្រសព្វជាប្រសព្វនៃអរោនេចំនុច
 $y'' = f''(x) = 12x^2 - 12 = 12(x^2 - 1) = 12(x+1)(x-1)$
 $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -1 \\ x_2 = 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_1 = f(-1) = 4 \\ y_2 = f(1) = 4 \end{cases}$

យើងមានចំនុចប្រសព្វ ក៏ $I_1(-1;4)$ និង $I_2(1;4)$

4- រកត្រង់ចំនុចនៅលើខ្សែកោង (C) ដែលបង្កាត់បី៖ត្រង់ចំនុចនោះផ្គុំជាមួយ (C_{01})
 បានមុំ α កំនត់ដោយ $\lg \alpha = -8$



តាង $M(x,y) \in (C)$ ចំនុចត្រូវរក

តាមសមីការក្រប : បង្កាត់បី៖ត្រង់ M មានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើ -8

តាមដេរីវេ : បង្កាត់បី៖ត្រង់ M មានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើ $f'(x) = 4x^3 - 12x$

យើងអាចទាញបាន: $4x^3 - 12x = -8 \Leftrightarrow x^3 - 3x + 2 = 0 \Leftrightarrow (x-1)^2(x+2) = 0$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = 4 \\ y = 1 \end{cases} \text{ គឺ } \begin{cases} I_2(1;4) \\ M(-2;1) \end{cases}$$

យើងបានពីចំនុច $I_2(1;4)$ និង $M(-2;1)$

សរសេរសមីការបង្កាត់បី៖ទាំងពីរនោះ:

$$\text{សមីការបង្កាត់បី៖ត្រង់ } I_2(1;4) \quad -8 = \frac{y-4}{x-1} \Leftrightarrow y = -8x + 12$$

$$\text{សមីការបង្កាត់បី៖ត្រង់ } M(-2;1) \quad -8 = \frac{y-1}{x+2} \Leftrightarrow y = -8x - 15$$

3- ដោះស្រាយតាមត្រកូតិចអតិភាពនិងសញ្ញាវិសសមីការ

$$x^4 - 6x^2 + 9 - m = 0 \Leftrightarrow x^4 - 6x^2 + 9 = m \text{ ជាសមីការអាចស៊ើបសរសេរខ្សែកោង}$$

(C) និងបង្កាត់ $y = m$ ស្រប (x', ox) ។ យើងបានចំណេញលើត្រកូតិច

និមាត់

$$\text{តេមានអនុគមន៍ } y = f(x) = \frac{1}{8}(x^4 - 6x^2 + 9)$$

1- សិក្សាអថេរភាពទិសដៅ និងសង់ខ្សែកោង (C) តាងអនុគមន៍នេះក្នុងតំបន់អក្ខរកូសប្រកាស (oxy) ។ ស្រាយបង្កាត់បី៖ខ្សែកោង (C) ត្រង់ចំនុចប្រសព្វតែងត្នា ។

2- បង្កាត់ (Δ) សមីការ $y = 1$ កាត់ខ្សែកោង (C) បានបួនចំនុច M, N, P, Q រៀបតាមលំដាប់អាចស៊ើបស្ថិតនៅក្នុងត្រីកោណ ។ ស្រាយបង្កាត់នៃក (MPNQ) ជាបីនៃក អាមូនិក ។ តើតេអាចថាយ៉ាងម្តេចម្តេចពោះបាច់បង្កាត់ $O(MPNQ)$?

3- ពិភាក្សាដោយប្រើត្រកូតិចអតិភាព, និងសញ្ញាវិសសមីការទៅតាមតំលៃនៃ

$$K : x^4 - 6x^2 + 9 - 8K = 0$$

1)- សិក្សាអថេរភាពទិសដៅ និងសង់ខ្សែកោង (C) តាងអនុគមន៍

$$y = f(x) = \frac{1}{8}(x^4 - 6x^2 + 9)$$

អនុគមន៍ $f(x)$ អោយជាអនុគមន៍ចំការ មានដែនកំនត់ : $\mathcal{D} = \mathbb{R}$

អនុគមន៍នេះមានដេរីវេ $f'(x) = \frac{1}{8}(4x^3 - 12x) = \frac{x}{2}(x + \sqrt{3})(x - \sqrt{3})$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -\sqrt{3} & \Rightarrow y_1 = f(-\sqrt{3}) = 0 \\ x_2 = 0 & \Rightarrow y_2 = f(0) = \frac{9}{8} \\ x_3 = \sqrt{3} & \Rightarrow y_3 = f(\sqrt{3}) = 0 \end{cases}$$

សញ្ញា $f'(x)$

x	$-\infty$	$-\sqrt{3}$	0	$\sqrt{3}$	$+\infty$
$\frac{x}{2}$	-	0	0	0	+
$x^2 - 3$	+	0	-	0	+
$f'(x)$	-	0	+	0	+

តារាងអថេរភាពទិសដៅ

x	$-\infty$	$-\sqrt{3}$	0	$\sqrt{3}$	$+$
$f'(x)$	-	0	+	0	+
$f(x)$	$+\infty$	0	$\frac{9}{8}$	0	$+\infty$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{8}x^4 = +\infty$$

អនុគមន៍ $f(x)$ មានតំលៃអប្បបរមានៅ 0 ចំពោះ $x = -\sqrt{3}$ និង $x = \sqrt{3}$

ហើយមានតំលៃអតិបរមានៅ $\frac{9}{8}$ ចំពោះ $x = 0$

ភាពពិសេសនៃអនុគមន៍

$$f(-x) = \frac{1}{8}[(-x)^4 - 6(-x)^2 + 9] = \frac{1}{8}(x^4 - 6x^2 + 9) = f(x), \forall x \in \mathcal{D}$$

ដូច្នេះ $f(x)$ ជាអនុគមន៍គូក្នុង $\mathcal{D} = \mathbb{R}$

អាប៊ីស៊ីសចំនុចប្រសព្វរវាង (C) និង $(x'ox)$ ជាបូស្តនៃសមីការ $\frac{1}{8}(x^4 - 6x^2 + 9) = 0$

$$\Leftrightarrow x^4 - 6x^2 + 9 = 0 \Leftrightarrow (x^2 - 3)^2 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow$$

$$x^2 = 3 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -\sqrt{3} \\ x_2 = \sqrt{3} \end{cases}$$

អនុគមន៍នៃចំនុចប្រសព្វរវាង (C) និង $(x'oy)$ គឺ $y = f(0) = \frac{9}{8}$


រកតួអនុគមន៍នៃចំនុចប្រសព្វរវាង អាប៊ីស៊ីសនៃចំនុចប្រសព្វជាបូស្តនៃដេរីវេទី២ តាងដោយ

$f''(x)$

$$f''(x) = \frac{12}{8}(x^2 - 1) = \frac{3}{2}(x + 1)(x - 1)$$

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -1 & \Rightarrow y_1 = f(-1) = \frac{1}{2} \\ x_2 = 1 & \Rightarrow y_2 = f(1) = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$I_1(-1; \frac{1}{2}), I_2(1; \frac{1}{2})$$



ស្រាយបន្ទាត់ប៉ះខ្សែកោង (C) ត្រង់ចំនុចរេបត់កែងគ្នា

មេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ប៉ះខ្សែកោង (C) ត្រង់ចំនុចរេបត់ I_1 គឺ $f'(-1) = 1$

មេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ប៉ះខ្សែកោង (C) ត្រង់ចំនុចរេបត់ I_2 គឺ $f'(1) = -1$

ដោយផលគុណមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ប៉ះទាំងពីរ $f'(-1) f'(1) = -1$ នោះយើងបានបន្ទាត់ប៉ះទាំងពីរកែងគ្នា ។

2) ស្រាយបាច់នៃក (MPNQ) ជាប់នៃកអមូលីក

សមីការអាប់ស៊ីសរវាង (C) និងបន្ទាត់ $y = 1 \Leftrightarrow \frac{1}{8}(x^4 - 6x^2 + 9) = 1$
 $\Leftrightarrow x^4 - 6x^2 + 9 - 8 = 0 \Leftrightarrow x^4 - 6x^2 + 1 = 0$ ជាសមីការបីការ
 តាង $X = x^2 \Rightarrow x = \pm\sqrt{x} \quad (X \geq 0)$

យើងបានសមីការស្វ័យ : $X^2 - 6X + 1 = 0$ មាន $\Delta' = 9 - 1 = 8 = (2\sqrt{2})^2$

នោះយើងបាន $X_1 = 3 - 2\sqrt{2} \Rightarrow x = \pm\sqrt{3 - 2\sqrt{2}}$

$X_2 = 3 + 2\sqrt{2} \Rightarrow x = \pm\sqrt{3 + 2\sqrt{2}}$

ដោយសម្មតិកម្មខ្នាងលើ គេប្រាប់ថាគេរៀបចំនុចប្រសព្វតាមលំដាប់អាប់ស៊ីសពីតូចទៅធំ នោះយើងអាចយក

$M(-\sqrt{3+2\sqrt{2}}; 1), N(-\sqrt{3-2\sqrt{2}}; 1)$

$P = (\sqrt{3-2\sqrt{2}}; 1), Q(\sqrt{3+2\sqrt{2}}; 1)$

ដោយចំនុចទាំងនោះរត់ត្រង់គ្នានៅលើបន្ទាត់ $y = 1$ នោះយើងត្រូវតែស្រាយទំនាក់ទំនងអាប់ស៊ីស $(x_M + x_P)(x_N + x_Q) = 2(x_M x_P + x_N x_Q)$ ផ្ទៀងផ្ទាត់

ជំពូងយើងគណនា
 $(x_M + x_P)(x_N + x_Q) = (-\sqrt{3+2\sqrt{2}} + \sqrt{3-2\sqrt{2}})(-\sqrt{3-2\sqrt{2}} + \sqrt{3+2\sqrt{2}})$
 $= 1 - 3 - 2\sqrt{2} - 3 + 2\sqrt{2} + 1 = -4$

រួចយើងគណនា

$2(x_M x_P + x_N x_Q) = 2[-\sqrt{3+2\sqrt{2}}\sqrt{3-2\sqrt{2}} - \sqrt{3-2\sqrt{2}}\sqrt{3+2\sqrt{2}}]$
 $= 2(-1 - 1) = -4$ ដូច្នេះ យើងបានទំនាក់ទំនងនេះផ្ទៀងផ្ទាត់ គឺ

$(x_M + x_P)(x_N + x_Q) = 2(x_M x_Q + x_N x_P) = -4$ ដែលគំរូរវាងប៉ះនៃក (MPNQ)

ជាប់នៃកអមូលីក

តើគេអាចថាយ៉ាងណាចំពោះបាច់បន្ទាត់ $O(MPNQ)$

យើងមានចំនុច O មិននៅលើបន្ទាត់ (MPNQ) និងប៉ះនៃក (MPNQ) ជាប់នៃកអមូលីកនោះគឺរវាង $O(MPNQ)$ ជាបាច់បន្ទាត់អមូលីក

3) ដោះស្រាយសមីការ $x^4 - 6x^2 + 9 - 8K = 0$ ដោយប្រើប្រាស់វិធីសមីការសម្រួល
 ឬសមីការនេះអាចសរសេរ : $x^4 - 6x^2 + 9 = 8K \Leftrightarrow$

$\frac{1}{8}(x^4 - 6x^2 + 9) = K$ ជាសមីការអាប់ស៊ីសរវាងខ្សែកោង

(C) $y = \frac{1}{8}(x^4 - 6x^2 + 9)$ និងបន្ទាត់ $y = K$ ស្រប $(x'ox)$

ដោយពិនិត្យតាមក្រាហ្វិច យើងបានលទ្ធផលក្នុងតារាងសង្ខេបខាងក្រោម

K	អត្ថិភាព និង សញ្ញាបូសសមីការ
$-\infty$	សមីការគ្មានបូស
0	សមីការមានបូសពីរ $x_1 = -\sqrt{3} < 0 < x_2 = \sqrt{3}$
	សមីការមានបូសបួន $x_1 < x_2 < 0 < x_3 < x_4$
$\frac{9}{8}$	សមីការមានបូសបី $x_1 < x_2 = 0 < x_3$
	សមីការមានបូសពីរ $x_1 < 0 < x_2$
$+\infty$	

សំណួរ

គេអោយខ្សែកោង (C_a) តាងអនុគមន៍ $y = f(x) = x^4 - 4x^2 \sin a - 3 \cos 2a$

ដោយ : $(0 \leq a \leq 2\pi)$ ។

គណនាតំលៃ a ដើម្បីអោយខ្សែកោង (C_a) កាត់ $(x'ox)$ បានបួនចំនុច

ចម្លើយ

យើងដឹងថាអាប់ស៊ីសចំនុចប្រសព្វខ្សែកោង (C_a) និង $(x'ox)$ ជាបូស្ថានសមីការ

$$x^4 - 4x^2 \sin a - 3 \cos 2a = 0 \quad (\text{ជាសមីការបីការ}) \quad (1)$$

ដើម្បីអោយមានចំនុចប្រសព្វបួន លុះត្រាតែសមីការ (1) មានបូស្ថានផ្សេងគ្នា

ពីរដង យើងត្រូវតាង $X = x^2$, $X > 0 \Rightarrow x = \pm \sqrt{X}$

យើងបានសមីការរង្វង់ : $X^2 - 4X \sin a - 3 \cos 2a = 0 \quad (2)$

ជាសមីការដឺក្រេទី 2 នៃ X ។

សមីការ (1) មានបូស្ថានបួន លុះត្រាតែសមីការ (2) មានបូស្ថានពីរផ្សេងគ្នា

វិជ្ជមាន គឺ : $0 < X_1 < X_2$

ដើម្បីអោយ (2) មានបូស្ថានពីរ : $0 < X_1 < X_2$ លុះត្រាតែ

$$\begin{cases} \Delta' > 0 \\ P > 0 \\ S > 0 \end{cases} \quad (\text{ព្រោះមេគុណរបស់ } x^2 \text{ ស្មើ } 1 \neq 0)$$

$$\text{រក } \Delta' = 4 \sin^2 a + 3 \cos 2a = 4 \sin^2 a + 3(\cos^2 a - \sin^2 a) =$$

$$4 \sin^2 a + 3 \cos^2 a - 3 \sin^2 a = 3 \cos^2 a + \sin^2 a = 2 \cos^2 a + \cos^2 a + \sin^2 a$$

តាមរូបមន្តត្រីកោណមាត្រ : $\cos^2 a + \sin^2 a = 1, \forall a \in [0, 2\pi]$

យើងបាន : $\Delta' = 2 \cos^2 a + 1 = 1 + 2 \cos^2 a > 0, \forall a \in [0, 2\pi]$

$$\text{រក } P = -3 \cos 2a > 0 \Leftrightarrow \cos 2a < 0$$

$$\cos 2a < 0 \Leftrightarrow \frac{\pi}{2} + K2\pi < 2a < \frac{3\pi}{2} + K2\pi$$

$$\frac{\pi}{4} + K\pi < a < \frac{3\pi}{4} + K\pi$$

យើងត្រូវអោយតំលៃ K ព្រោះ : $a \in [0, 2\pi]$

$$K = 0 \Rightarrow \frac{\pi}{4} < a < \frac{3\pi}{4}$$

$$K = 1 \Rightarrow \frac{5\pi}{4} < a < \frac{7\pi}{4}$$

យើងមិនអាចអោយតំលៃ $K = 2, 3$ គេទៅទៀតបានទេ ព្រោះ : $a \in [0, 2\pi]$

$$\text{រក } S = 4 \sin a > 0 \Leftrightarrow \sin a > 0$$


$$\sin a > 0 \Leftrightarrow K2\pi < a < \pi + K2\pi$$

យើងត្រូវអោយតំលៃ K ព្រោះ : $a \in [0, 2\pi]$

$$K = 0 \Rightarrow 0 < a < \pi$$

យើងមិនអាចអោយតំលៃ $K = 1, 2$ គេទៅទៀតបានទេ ព្រោះ : $a \in [0, 2\pi]$

សរុបលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ $\begin{cases} \Delta' > 0 \\ P > 0 \\ S > 0 \end{cases}$ និង $0 \leq a \leq 2\pi$ យើងបាន



ចម្លើយ

$$\frac{\pi}{4} < a < \frac{3\pi}{4}$$

$$a \in]\frac{\pi}{4}; \frac{3\pi}{4}[$$

លំហាត់

គេអោយក្រសារ $y = f_m(x) = \frac{mx+4}{x+m}$ ដែលមានខ្សែកោងតំនាង (C_m)

- 1)- សិក្សាទិសដៅអថេរភាពនៃអនុគមន៍ $f_m(x)$ ដោយពិភាក្សាទៅតាមតំលៃនៃ m
- 2)- រកសំនុំចំនុច ω ផ្គិតឆ្លុះរបស់ខ្សែកោង (C_m) កាលណា m ផ្លាស់ប្តូរតំលៃ
- 3)- ស្រាយថាខ្សែកោង (C_m) កាត់តាមចំនុចនឹងពីរ A និង B ដែលត្រូវរក កើតមានតំលៃ m ដែលធ្វើអោយបន្ទាត់ចំនុចខ្សែកោង (C_m) ក្រង់ A និង B ស្របគ្នាដែររឺទេ ?
- 4)- សិក្សាទិសដៅអថេរភាពនៃអនុគមន៍ $f_m(x)$ ចំពោះ $m = 1$ រួចសង់ខ្សែកោង (C) តាងអនុគមន៍នេះក្នុងតំបន់អក្ខរកូសមេ (oxy) ។ ក៏សំនង់ខ្សែកោង (C) ទាញសំនង់ខ្សែកោង (C) តាងអនុគមន៍ $y = g(x) = \frac{x+4}{x+1}$ រួចដោះស្រាយតាមក្រាហ្វិកអត្ថិភាពនិងសញ្ញាឫសសមីការ $\frac{x+4}{x+1} = K$ ដោយពិភាក្សាទៅតាមតំលៃ K

ចំណេះដឹង

- 1)- សិក្សាទិសដៅអថេរភាពនៃអនុគមន៍ $y = f_m(x) = \frac{mx+4}{x+m}$
អនុគមន៍នេះមានដែនកំនត់ : $D = \mathbb{R} \setminus \{m\}$

សិក្សាទិសដៅអថេរភាព គឺសិក្សាសញ្ញា $f'(x)$

$$f'_m(x) = \frac{\mu'v - v'\mu}{v^2} \quad \begin{cases} \mu = mx+4 \Rightarrow \mu' = m \\ v = x+m \Rightarrow v' = 1 \end{cases}$$

$$f'_m(x) = \frac{mx + m^2 - mx - 4}{(x+m)^2} = \frac{m^2 - 4}{(x+m)^2} = \frac{(m+2)(m-2)}{(x+m)^2}$$


$$f'(x) \text{ យកសញ្ញាតាមភាគយក } m^2 - 4 = (m+2)(m-2)$$

$$f'_m(x) = 0 \Leftrightarrow (m+2)(m-2) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = -2 \\ m = 2 \end{cases}$$

$$\text{បើ } m = -2 \Rightarrow y = f_{-2}(x) = \frac{-2x+4}{x-2} = \frac{-2(x-2)}{x-2} = -2 \text{ អនុគមន៍ថេរ}$$

$$\text{បើ } m = 2 \Rightarrow y = f_2(x) = \frac{2x+4}{x+2} = \frac{2(x+2)}{x+2} = 2 \text{ អនុគមន៍ថេរ}$$

តារាងសញ្ញាទិសដៅអថេរភាពនៃអនុគមន៍



m	$f'_m(x)$	ទិសដៅអថេរភាពនៃ $f_m(x)$
$-\infty$	+	អនុគមន៍ $f_m(x)$ កើន
-2	0	អនុគមន៍ $f_{-2}(x) = -2$ ជាអនុគមន៍ថេរ
	-	អនុគមន៍ $f_m(x)$ ចុះ
2	0	អនុគមន៍ $f_2(x) = 2$ ជាអនុគមន៍ថេរ
	+	អនុគមន៍ $f_m(x)$ កើន
$+\infty$		

- 2)- រកសំនុំចំនុចផ្គិតឆ្លុះរបស់ (C_m)

$$\omega \begin{cases} x = -\frac{d}{c} = -m \text{ អថេរ} \\ y = \frac{a}{c} = m \text{ អថេរ} \end{cases} \begin{matrix} \text{យើងត្រូវរកទំនាក់ទំនងគ្នា } m \text{ រវាង } y \text{ និង } x \\ \text{សមីការសំនុំចំនុច} \end{matrix}$$

$$x = -m \Rightarrow m = -x \Rightarrow y = -x$$

ដូច្នេះសំនុំ ω គឺបន្ទាត់សមីការ

$$y = -x$$

3)- ស្រាយបញ្ជាក់ថាខ្សែកោង (C_m) កាត់តាមចំនុចនឹង A និង B ដែលត្រូវរកសមីការ (C_m) អាចសរសេរ $y = \frac{mx+4}{x+m} \Leftrightarrow mx+4 = xy+my \Leftrightarrow mx-my = xy-4 \Leftrightarrow m(x-y) = xy-4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} y_2 = x \\ x^2-4 = 0 \end{cases}$
 $\Leftrightarrow \begin{cases} m = -2; y = -2 \\ x = 2; y = 2 \end{cases}$ យើងអាចយក $A(-2;-2); B(2;2)$

តើមានតំលៃ m ដែលធ្វើអោយបន្ទាត់ប៉ះខ្សែកោង (C_m) ត្រង់ A និង B ស្របគ្នាដែររឺទេ?

មេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ប៉ះ (C_m) ត្រង់ $A(-2;-2)$ គឺ $f'_m(-2) = \frac{(m+2)(m-2)}{(-2+m)^2} = \frac{(m+2)(m-2)}{(m-2)^2} = \frac{m+2}{m-2}$

មេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ប៉ះ (C_m) ត្រង់ $B(2;2)$ គឺ $f'_m(2) = \frac{(m+2)(m-2)}{(2+m)^2} = \frac{m-2}{m+2}$

ដើម្បីអោយបន្ទាត់ប៉ះ (C_m) ត្រង់ A និង B ស្របគ្នា ពុះត្រាតែមេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ប៉ះទាំងពីរស្មើគ្នា

គឺ $f'_m(-2) = f'_m(2) \Leftrightarrow \frac{m+2}{m-2} = \frac{m-2}{m+2} \Leftrightarrow (m+2)^2 = (m-2)^2 \Leftrightarrow m^2+4m+4 = m^2-4m+4 \Leftrightarrow 8m = 0 \Leftrightarrow m = 0$

យើងបានចំណេញមួយ គឺ $m = 0$


4)- បើ $m = 1$ នោះយើងបានអនុគមន៍ទៅជា $y = f_1(x) = \frac{x+4}{x+1}$

អនុគមន៍នេះមានដែនកំនត់ $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f_1(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} 1 + \frac{3}{x+1} = 1$

$\lim_{x \rightarrow -1} f_1(x) = \lim_{x \rightarrow -1} 1 + \frac{3}{x+1} = \lim_{x \rightarrow -1} \frac{3}{x+1} = \infty$

$f'_1(x) = -\frac{3}{(x+1)^2} < 0, \forall x \in D$



អនុគមន៍ $f_1(x)$ ចុះក្នុង $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f_1(x) = 1 \Rightarrow$ បន្ទាត់ $y = 1$ ជាអាស៊ីមតូតដេក


$\lim_{x \rightarrow -1} f_1(x) = \infty \Rightarrow$ បន្ទាត់ $x = -1$ ជាអាស៊ីមតូតដេក

x	-4	-3	-2	-1	0	1	2
y	0	1/2	-2		4	5/2	2

អាស៊ីមតូតប្រសព្វរវាង (C) និង $(x'oy)$ ជាបាសនៃសមីការ

$\frac{x+4}{x+1} = 0 \Leftrightarrow x+4 = 0 \Leftrightarrow x = -4$

អរដោនេចំនុចប្រសព្វរវាង (C) និង $(y'oy)$ គឺ $y = f(0) = 4$



4). ពិសោធន៍ខ្សែកោង (C) ទាញសំនង់ខ្សែកោង (C') តាមអនុគមន៍

$$y = g(x) = \left| \frac{x+4}{x+1} \right| = |f_1(x)|$$

អនុគមន៍ $g(x)$ មានដែនកំនត់ $\mathcal{D} = \mathcal{D} - \mathcal{R} \setminus \{-1\}$

$\forall x \in \mathcal{D}, f_1(x) \geq 0 \Rightarrow g(x) = |f_1(x)| = f(x)$ នោះយើងបាន (C') = (C)

$\forall x \in \mathcal{D}, f_1(x) < 0 \Rightarrow g(x) = |f_1(x)| = -f(x)$ នោះយើងបាន (C')

ជារូបឆ្មុះនៃ (C) ធៀប $(x'ox)$ ។

ដោះស្រាយតាមក្រាភិចអត្ថិភាពនិងសញ្ញាបូសសមីការ $\left| \frac{x+4}{x+1} \right| = K$ ជាសមីការអាប់ស៊ីន រវាងខ្សែកោង (C') និងបន្ទាត់ $y = K$ ស្រប $(x'ox)$ តាមក្រាភិច យើងបាន ចំណេញ

K	អត្ថិភាព និង សញ្ញាបូសសមីការ
$-\infty$	សមីការគ្មានបូស
0	សមីការមានបូសមួយ $x = -4 < 0$
	សមីការមានបូសពីរ $x_1 < x_2 < 0$
1	សមីការមានបូសមួយ $x < 0$
	សមីការមានបូសពីរ $x_1 < 0 < x_2$
4	សមីការមានបូសពីរ $x_1 < x_2 = 0$
$+\infty$	សមីការមានបូសពីរ $x_1 < x_2 < 0$

លំហាត់

1)- សិក្សាទិសដៅអថេរភាពនៃអនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{3-x}{x+2}$ រួចសង់ខ្សែកោង (H) តាមអនុគមន៍នេះក្នុងតំរុយអរតូនមេ $(x'ox)$ ។

2)- រកចំនុចនៅលើខ្សែកោង (H) ដែលបន្ទាត់ច្រង់ចំនុចនោះស្របទៅនឹងបន្ទាត់ $y = -5x$

3)- មានត្រួសារបន្ទាត់ (D_m) សមីការ $y = 2x + m$ ដែលមាន m ជាពាក់មែក ។ កំនត់តំលៃ m ដើម្បីអោយ (H) និង (D_m) មានចំនុចប្រសព្វ P_1 និង P_2 ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថា $\vec{OP}_1 \cdot \vec{OP}_2$ មានតំលៃថេរ ទោះបី m ផ្លាស់ប្តូរតំលៃ ។

4)- គេដាច់ចំនុច P_3 ដោយអោយ $|\vec{OP}_3| = |\vec{OP}_2|$ និង $(\vec{OP}_2, \vec{OP}_3) = \frac{\pi}{2}$ ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថា រង្វាស់ផ្ទៃក្រឡា OP_1P_3 មានតំលៃថេរ ដែលត្រូវគណនា កាលណា m ផ្លាស់ប្តូរតំលៃ ។

ចំណើន

1)- សិក្សាទិសដៅអថេរភាព

អនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{3-x}{x+2} = \frac{-x+3}{x+2} = -1 + \frac{5}{x+2}$ (រាងកាណូនិច)

$x+2 = 0 \Leftrightarrow x = -2$ ដូច្នេះ អនុគមន៍នេះមានដែនកំនត់ $\mathcal{D} = \mathcal{R} \setminus \{-2\}$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} -1 + \frac{5}{x+2} = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2} -1 + \frac{5}{x+2} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{5}{x+2} = \infty$$

$$f'(x) = \frac{\mu'v - v'\mu}{v^2} \quad \mu = -x+3 \Rightarrow \mu' = -1$$

$$v = x+2 \Rightarrow v' = 1$$

$$f'(x) = \frac{-x-2+x-3}{(x+2)^2} = \frac{-5}{(x+2)^2} < 0, \forall x \in \mathcal{D}$$

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$f'(x)$	$-$		$-$
$f(x)$	-1	$+\infty$	-1

$f(x)$ ជាអនុគមន៍ចុះក្នុងដែនកំនត់ D

x	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3
$f(x)$	$-\frac{9}{4}$	$-\frac{8}{3}$	$-\frac{7}{2}$	-6	$\parallel$	4	$\frac{3}{2}$	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{4}$	0

អាស៊ីមតូត

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = -1 \Rightarrow \text{បន្ទាត់ } y = -1 \text{ ជាអាស៊ីមតូតដេក}$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = \infty \Rightarrow \text{បន្ទាត់ } x = -2 \text{ ជាអាស៊ីមតូតឈរ}$$

អាស៊ីមតូតប្រសព្វរវាង (H) និង $(x'ox)$ ជាបូសន៍សមីការ $\frac{-x+3}{x+2} = 0$
 $-x+3=0 \Leftrightarrow x=3$

អរដោនេតូប្រសព្វរវាង (H) និង $(x'oy)$ គឺ $y = f(0) = \frac{3}{2}$
 ផ្ចិតភ្ជួរបស់ខ្សែកោង (H)


អាស៊ីមតូតឈរ $x = -2$ និងអាស៊ីមតូតដេក $y = -1$ កាត់គ្នាត្រង់ $\omega(x=-2, y=-1)$
 ក្នុងតំរុយ (ωXY) យើងបានតាមរូបមន្តនៃកាសប្តូរតំរុយ $x = -2 + X$, $y = -1 + Y$ នោះយើងបាន

$$-1 + Y = \frac{-(-2+X)+3}{-2+X+2} = \frac{-X+5}{X} \Leftrightarrow Y = \frac{-X+5}{X} + 1 = \frac{5}{X}$$

$Y = f(X) = \frac{5}{X}$ ហៅថា សមីការប្រែមរបស់ខ្សែកោង (H)

$$f(-X) = \frac{5}{-X} = -\frac{5}{X} = -f(X) \Leftrightarrow f(X) \text{ ជាអនុគមន៍សេស} \Rightarrow \omega$$

ជាផ្ចិតភ្ជួរបស់ខ្សែកោង (H) ។



2) រកចំនុចនៅលើខ្សែកោង (H) ដែលបន្ទាត់ប៉ះក្រុងចំនុចនោះស្របទៅនឹងបន្ទាត់

$$y = -5x$$

តាង $M(x,y) \in (H)$ ជាចំនុចត្រូវរក

មេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ប៉ះ (H) ត្រង់ $M(x,y)$ គឺ $f'(x) = \frac{-5}{(x+2)^2}$

មេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ $y = -5x$ គឺ -5

បន្ទាត់ទាំងពីរស្របគ្នា លុះត្រាតែ មេគុណប្រាប់ទិសរបស់វាស្មើគ្នា

$$-\frac{5}{(x+2)^2} = -5 \Leftrightarrow \frac{1}{(x+2)^2} = 1 \Leftrightarrow (x+2)^2 = 1 \Leftrightarrow$$

$$(x+2+1)(x+2-1) = (x+3)(x+1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -3, y_1 = -6 \\ x_2 = -1, y_2 = 4 \end{cases}$$

យើងបានចំនុចត្រូវរកមានពីរ គឺ

$$M_1(x = -3; y = -6)$$

$$M_2(x = -1; y = 4)$$

3)- បន្ទាត់ $(D_m) \quad y = 2x + m$

បន្ទាត់ (D_m) មានមេគុណប្រាប់ទិសស្មើ 2 ថេរ ដូច្នេះបន្ទាត់ (D_m) ប្រែប្រួលខ្លួន

ឯង ហើយស្របបន្ទាត់ $y = 2x$ ដែលកាត់តាម $\begin{array}{c|cc} x & 0 & 1 \\ \hline y & 0 & 2 \end{array}$

កំនត់ m ដើម្បីអោយ (C) និង (D_m) មានចំនុចប្រសព្វ P_1 និង P_2 សមីការអាប់ស៊ីសរវាង (C) និង (D_m)

$$\frac{-x+3}{x+2} = 2x+m \Leftrightarrow 2x^2 + (m+5)x + 2m-3 = 0$$

ដើម្បីអោយមាន P_1 និង P_2 លុះត្រាតែសមីការអាប់ស៊ីសមានឫសពីរ គឺ $\Delta \geq 0$

$\Delta = m^2 - 6m + 49$ ជាត្រីការ៉េក្រេទី 2 នៃ m ដែលមាន

$$\Delta' = 9 - 49 = -40 < 0 \Rightarrow \Delta > 0, \forall m \in \mathbb{R}$$

ដូច្នេះ (C) កាត់ (D_m) បានពីរចំនុចផ្សេងគ្នាជានិច្ច P_1 និង P_2 ; $\forall m \in \mathbb{R}$

ស្រាយបញ្ជាក់ថា $\vec{OP}_1 \cdot \vec{OP}_2$ មានតំលៃថេរ $\forall m \in \mathbb{R}$

$$\vec{OP}_1 \begin{vmatrix} x_1 \\ y_1 \end{vmatrix} \quad \vec{OP}_2 \begin{vmatrix} x_2 \\ y_2 \end{vmatrix} \quad \vec{OP}_1 \cdot \vec{OP}_2 = x_1 x_2 + y_1 y_2$$

$$x_1 x_2 = \frac{2m-3}{2}; \quad y_1 = \frac{3-x_1}{x_1+2}; \quad y_2 = \frac{3-x_2}{x_2+2}$$

$$y_1 y_2 = \frac{3-x_1}{x_1+2} \cdot \frac{3-x_2}{x_2+2} = \frac{9-3(x_1+x_2)+x_1 x_2}{x_1 x_2 + 2(x_1+x_2) + 4} = -m-6$$

$$\text{ដូច្នេះ: } \vec{OP}_1 \cdot \vec{OP}_2 = x_1 x_2 + y_1 y_2 = \frac{2m-3}{2} - m - 6 = \frac{2m-3-2m-12}{2} = -\frac{15}{2}$$

$$\vec{OP}_1 \cdot \vec{OP}_2 = -\frac{15}{2}, \quad \forall m \in \mathbb{R}$$

ស្រាយបញ្ជាក់ថាផ្ទៃសំនុំនៃត្រីកោណ $OP_1 P_2$ មានតំលៃថេរ

តាង S ក្រលាផ្ទៃត្រីកោណ $OP_1 P_2$

$$S = \frac{1}{2} \|\vec{OP}_1\| \|\vec{OP}_2\| \sin(\widehat{\vec{OP}_1, \vec{OP}_2})$$

$$(\widehat{\vec{OP}_1, \vec{OP}_3}) = (\widehat{\vec{OP}_1, \vec{OP}_2}) + (\widehat{\vec{OP}_2, \vec{OP}_3}) = \alpha + \frac{\pi}{2} \quad \text{ព្រោះយើងសន្មត} \\ (\widehat{\vec{OP}_1, \vec{OP}_2}) = \alpha$$

$$\sin(\widehat{\vec{OP}_1, \vec{OP}_3}) = \sin\left(\alpha + \frac{\pi}{2}\right) = \cos \alpha = \cos(\widehat{\vec{OP}_1, \vec{OP}_2})$$

$$\text{ដូច្នេះ: } S = \frac{1}{2} \|\vec{OP}_1\| \|\vec{OP}_2\| \cos(\widehat{\vec{OP}_1, \vec{OP}_2}) = \frac{1}{2} \|\vec{OP}_1\| \|\vec{OP}_2\| = \frac{1}{2} \cdot \frac{15}{2} = \frac{15}{4}$$

$$S = \frac{15}{4} \text{ ឯកតាផ្ទៃ } \forall m \in \mathbb{R}$$

សំណត់

1)- សំគាល់ទិសដោយចេតោភាព អនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{x^2}{x-1}$

2)- គូសខ្សែកោង (C) តាងអនុគមន៍នេះក្នុងតំបន់អន្តរកាល (oxy)

3)- ដោះស្រាយអក្ខរភាព និង សញ្ញាបូសសមីការ $x^2 - mx + m = 0$ ដោយពិភាក្សាតាមតំលៃ m

ចំណើន

1)- សំគាល់ទិសដោយចេតោភាព អនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{x^2}{x-1}$

សរសេរ $f(x)$ ជារាងកាណូនិច

$$\frac{x^2}{-x^2+x} \quad \frac{x-1}{x+1}$$

$$\frac{-x+1}{1}$$

យើងបាន $y = f(x) = \frac{x^2}{x-1} = x+1 + \frac{1}{x-1}$

ដែនកំនត់ $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x+1 + \frac{1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x = \pm\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} x+1 + \frac{1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} = \pm\infty$$

$$y' = f'(x) = \frac{u'v - v'u}{v^2} \text{ ដោយ } \begin{cases} u = x^2 \Rightarrow u' = 2x \\ v = x-1 \Rightarrow v' = 1 \end{cases}$$

ដូច្នេះយើងបាន $y' = f'(x) = \frac{2x^2 - 2x - x^2}{(x-1)^2} = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x(x-2) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \Rightarrow y = 0 \\ x = 2 \Rightarrow y = 4 \end{cases}$$

តារាងទិសដៅអថេរភាព

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$	
$f'(x)$		0	-	-	0	+
$f(x)$	$-\infty$	0	$+\infty$	4	$+\infty$	

អនុគមន៍មានតំលៃអតិបរមាស្មើ 0 ត្រង់ $x = 0$ ហើយមានតំលៃអប្បបរមាស្មើ 4 ត្រង់ $x = 2$ ។

2- គូសខ្សែកោង (C) តាងអនុគមន៍នេះក្នុងតំរុយអក្សរគូនមេ (oxy)

អាស៊ីមតូតចំនុចប្រសព្វកោងខ្សែកោង (C) និង $(x'ox)$ ជាបូសនៃសមីការ

$$f(x) = \frac{x^2}{x-1} = 0 \Leftrightarrow x^2 = 0 \Leftrightarrow x_1 = x_2 = 0$$

អរដោនេចំនុចប្រសព្វកោងខ្សែកោង (C) និង $(y'oy)$ គឺ $y = f(0) = 0$

អាស៊ីមតូតឈរ ដោយ $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty$ ទោះយើងបានបន្ទាត់សមីការ $x = 1$ ជា

អាស៊ីមតូតឈរ

អាស៊ីមតូតទ្រូត រឺ អាស៊ីមតូតមិនស្របនឹងអ័ក្សអូអរដោនេ

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (x+1)] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x-1} = 0 \text{ ទោះយើងបានបន្ទាត់ } y = x-1 \text{ ជាអាស៊ីមតូតទ្រូត}$$

អាស៊ីមតូតទាំងពីរកាត់គ្នាត្រង់ចំនុច $\omega(x=1; y=1+1=2)$

ស្រាយថា $\omega(x=1; y=2)$ ជាផ្ចិតឆ្លុះរបស់ខ្សែកោង (C)

ក្នុងតំរុយ (ωXY) យើងបានតាមរូបមន្តដូរតំរុយ

$$\begin{aligned} x &= 1+X \\ y &= 2+Y \end{aligned} \Rightarrow \text{យើងបានសមីការខ្សែកោង (C)}$$

ធៀបតំរុយថ្មី រឺ សមីការបង្រួម គឺ

$$2+Y = \frac{(X+1)^2}{X+1-1} = \frac{X^2+2X+1}{X} \Rightarrow$$

$$Y = f(X) = \frac{X^2+2X+1}{X} - 2 = \frac{X^2+2X+1-2X}{X}$$

$$Y = f(X) = \frac{X^2+1}{X}$$

$$\text{យើងបាន } f(-X) = \frac{(-X)^2+1}{-X} = \frac{X^2+1}{-X} = -\frac{X^2+1}{X} = -f(X)$$

$$\text{ដោយ } f(-X) = -f(X) \Rightarrow Y = f(X) = \frac{X^2+1}{X}$$

ជាអនុគមន៍សេស $\Rightarrow \omega(x=1, y=2)$ គឺចំនុចតំរុយ (ωXY)

ជាផ្ចិតឆ្លុះរបស់ខ្សែកោង (C) ។ ដូច្នេះ ខ្សែកោង (C) មាន $\omega(x=1; y=2)$

ជាផ្ចិតឆ្លុះ ។


3)- ដោះស្រាយអត្ថិភាព និងសញ្ញាបូសសមីការ

$$x^2 - mx + m = 0 \text{ ដោយពិភាក្សាតាមតំលៃ } m$$

$$\text{សមីការនេះអាចសរសេរ } x^2 = mx - m = m(x-1) \Leftrightarrow \frac{x^2}{x-1} = m$$

ពាសមីការអាចស៊ីសរវាងខ្សែកោង (C) និងបន្ទាត់អថេរ $y = m$ ប្រែប្រួលស្រប $(x'ox)$ ។

ដោយប្រើក្រាតិច (C) យើងបានចំណេញក្នុងតារាងខាងក្រោម



អត្ថិភាព និងសញ្ញាបូសសមីការ $x^2 - mx + m = 0$	
m	
$-\infty$	សមីការមានឫសពីរ $x_1 < 0 < x_2$
0	សមីការមានឫសឌុប $x_1 = x_2 = 0$
	សមីការគ្មានឫស
4	សមីការមានឫសឌុប $0 < x_1 = x_2 = 2$
	សមីការមានឫសពីរ $0 < x_1 < x_2$
$+\infty$	

លំហាត់

ក - សិក្សាទិសដោយចេញពីភាពនៃអនុគមន៍

$$y = f(x) = \frac{x^2 - x - 2}{x + 2}$$

ខ - គូសខ្សែកោង (C) តាងអនុគមន៍នេះក្នុងតំបន់អក្ខរកូស (oxy) ។

គ - ដោះស្រាយអត្ថិភាព និងសញ្ញាបូសសមីការ

$$x^2 - (m+1)x - 2m - 2 = 0 \text{ ដោយពិភាក្សាទៅតាមតំលៃនៃ } m$$

ចំណើយ

ក - សិក្សាទិសដោយចេញពីភាពនៃអនុគមន៍

- សរសេរអនុគមន៍ $f(x)$ ជាពាក្យពណ៌នា

$$\begin{array}{r|l} x^2 - x - 2 & x + 2 \\ -x^2 - 2x & x - 3 \\ \hline -3x - 2 & \\ +3x + 6 & \\ \hline 4 & \end{array}$$

យើងអាចសរសេរ : $y = f(x) = \frac{x^2 - x - 2}{x + 2} = x - 3 + \frac{4}{x + 2}$

ដែនកំនត់ $D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x - 3 + \frac{4}{x + 2} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x = \pm\infty$

$\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2} x - 3 + \frac{4}{x + 2} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{4}{x + 2} = \infty$

$f(x) = \frac{\mu'v - v'\mu}{v^2}$ ដោយ $\begin{cases} \mu = x^2 - x - 2 \Rightarrow \mu' = 2x - 1 \\ v = x + 2 \Rightarrow v' = 1 \end{cases}$

$f'(x) = \frac{2x^2 + 4x - x - 2 - x^2 + x + 2}{(x + 2)^2} = \frac{x^2 + 4x}{(x + 2)^2} = \frac{x(x + 4)}{(x + 2)^2}$

$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x(x + 4) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -4 \Rightarrow y = -9 \\ x_2 = 0 \Rightarrow y = -1 \end{cases}$

តារាងទិន្នន័យដោយដេកោត

x	$-\infty$	-4	-2	0	$+\infty$
$f(x)$		+	0	-	0
$f(x)$			-9		-1

អនុគមន៍មានតំលៃអតិបរមាស្មើ -9 ត្រង់ $x = -4$ និងមានតំលៃអប្បបរមាស្មើ -1 ត្រង់ $x = 0$

ខ - ខ្សែកោង (C) តាងអនុគមន៍

រាប់ស៊ីសចំនុចប្រសព្វរវាងខ្សែកោង (C) និងអ័ក្ស ($x'ox$) ជាបួននៃសមីការ

$\frac{x^2 - x - 2}{x + 2} = 0 \Leftrightarrow x^2 - x - 2 = 0 \Leftrightarrow$

$\begin{cases} x_1 = -1 \\ x_2 = 2 \end{cases}$ ដូច្នេះ (C) កាត់ ($x'ox$) ត្រង់ចំនុច $x = -1$ និង $x = 2$

អរដោនេចំនុចប្រសព្វរវាង (C) និង ($y'oy$) គឺ $y = f(0) = -1$

អាស៊ីមតូត

អាស៊ីមតូតឈរ : $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = \infty$ យើងបានបន្ទាត់សមីការ $x = -2$

ជាអាស៊ីមតូតឈរ ។

អាស៊ីមតូតទ្រូត រឺ អាស៊ីមតូតមិនស្របអ័ក្សទាំងពីរ

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (x - 3)] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{4}{x + 2} = 0$ យើងបានបន្ទាត់សមីការ

$y = x - 3$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រូត ។

ផ្ចិតឆ្លុះរបស់ខ្សែកោង (C) អាស៊ីមតូតទាំងពីរ $x = -2$ និង $y = x - 3$ កាត់គ្នា

ត្រង់ចំនុច $\omega(x = -2; y = -5)$

ក្នុងតំរុយ (ωXY) យើងបានតាមរូបមន្តជួរតំរុយ :

$x = -2 + X; y = -5 + Y$ ហើយសមីការ (C) ទៅជា :

$-5 + Y = \frac{(-2 + X)^2 - (-2 + X) - 2}{-2 + X + 2} = \frac{X^2 - 5X + 4}{X}$

$\Rightarrow y = f(X) = \frac{X^2 - 5X + 4}{X} + 5 = \frac{X^2 + 4}{X}$

ដោយ $-f(-X) = \frac{(-X)^2 + 4}{-X} = -\frac{X^2 + 4}{X} = -f(X)$

$\Rightarrow f(X)$ ជាអនុគមន៍សេស $\Rightarrow \omega(x = -2; y = -5)$ ជាផ្ចិតឆ្លុះរបស់

ខ្សែកោង (C)

គ. ដោះស្រាយអត្ថិភាពនិងសញ្ញាបូសសមីការ


$x^2 - (m+1)x - 2m - 2 = 0$ ដោយពិភាក្សាតាមតំលៃ m ។
ដោយពន្លាតសមីការនេះទៅជា

$$x^2 - mx - x - 2m - 2 = 0 \Leftrightarrow x^2 - x - 2 = mx + 2m \Leftrightarrow x^2 - x - 2 = m(x+2)$$

$$\Leftrightarrow \frac{x^2 - x - 2}{x+2} = m \text{ ជាសមីការអាប៉ូស៊ីសរវាងខ្សែកោង (C) សមីការ}$$

$$y = f(x) = \frac{x^2 - x - 2}{x+2} \text{ និងបន្ទាត់អថេរ } y = m \text{ ប្រែប្រួលស្រប (x'ox)}$$

ដោយពិនិត្យតាមត្រាតិច យើងបានចំណេះអត្ថិភាពនិងសញ្ញាបូសសមីការក្នុងតារាងខាងក្រោម :



m	អត្ថិភាព និង សញ្ញាបូសសមីការ ដោយពិនិត្យតាមត្រាតិច
$-\infty$	សមីការមានបូសពីរ $x_1 < x_2 < 0$
-9	សមីការមានបូសដុប $x_1 = x_2 = -4 < 0$
	សមីការគ្មានបូស
-1	សមីការមានបូសដុប $x_1 = x_2 = 0$
$+\infty$	សមីការមានបូសពីរ $x_1 < 0 < x_2$

លំហាត់

- 1)- ក- សិក្សាទិសដោយចេរភាពនៃអនុគមន៍ $y = g(x) = \frac{x^2 - 2x + 4}{2x - 4}$
- ខ- គូសខ្សែកោង (C) តាងអនុគមន៍នេះក្នុងតំបន់អក្ខរកូអរដោនេ (oxy) ។
- 2)- ដោះស្រាយតាមត្រាតិចអត្ថិភាព និងសញ្ញាបូសសមីការ

$$x^2 - 2(m+1)x + 4(m+1) = 0 \text{ ដោយពិភាក្សាទៅតាមតំលៃ } m$$

ចំណើយ

- 1)- ក- សិក្សាទិសដោយចេរភាពនៃអនុគមន៍ $y = g(x) = \frac{x^2 - 2x + 4}{2x - 4}$

សរសេរ $g(x)$ ជាភាគកាណូនិច

$$\frac{x^2 - 2x + 4}{-x^2 + 2x} \quad \left| \begin{array}{l} 2x - 4 \\ x \\ 2 \end{array} \right.$$

យើងបាន $y = g(x) = \frac{x^2 - 2x + 4}{2x - 4} = \frac{x}{2} + \frac{4}{2x - 4}$

អនុគមន៍ $g(x)$ មានដែនកំនត់ $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x}{2} + \frac{4}{2x - 4} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x}{2} = \pm\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x}{2} + \frac{4}{2x - 4} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{4}{2x - 4} = \infty$$

$$g'(x) = \frac{\mu'v - v'\mu}{v^2} \text{ ដោយ } \begin{cases} \mu = x^2 - 2x + 4 \Rightarrow \mu' = 2x - 2 \\ v = 2x - 4 \Rightarrow v' = 2 \end{cases}$$

$$g'(x) = \frac{4x^2 - 8x - 4x + 8 - 2x^2 + 4 - 8}{(2x - 4)^2} = \frac{2x(x - 4)}{(2x - 4)^2}$$

$$g'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x(x - 4) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \Rightarrow y = -1 \\ x_2 = 4 \Rightarrow y = 3 \end{cases}$$

តារាងមីលដោយអថេរតារាង

x	$-\infty$	0	2	4	$+\infty$
$g'(x)$	+	0	-	-	+
$g(x)$	$-\infty$	-1		3	$+\infty$

អនុគមន៍មានតំលៃអតិបរមាស្នើ -1 ត្រង់ $x = 0$ ហើយមានតំលៃអប្បបរមាស្នើ 3 ត្រង់ $x = 4$ ។

១- តួសខ្សែកោង (C) តាងអនុគមន៍ $y = g(x)$

អាបស៊ីសចំនុចប្រសព្វរវាងខ្សែកោង (C) និងអ័ក្ស $(x'ox)$ ជាបូសនៃសមីការ $\frac{x^2 - 2x + 4}{2x - 4} = 0 \Rightarrow x^2 - 2x + 4 = 0$ ជាសមីការដឺក្រេទីពីរនៃ x

ដែលមាន $\Delta' = 1 - 4 = -3 < 0$ ដូច្នេះសមីការនេះគ្មានបូស បានសេចក្តីថា ខ្សែកោង (C) មិនកាត់ $(x'ox)$ ទេ

អដោនេចំនុចប្រសព្វរវាងខ្សែកោង (C) និងអ័ក្ស $(y'oy)$ គឺ $y = g(0) = -1$

អាស៊ីមតូតឈរ

$$\lim_{x \rightarrow 2} g(x) = \infty \Rightarrow \text{បន្ទាត់ } x = 2 \text{ ជាអាស៊ីមតូតឈរ}$$

អាស៊ីមតូតទ្រូត

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left[g(x) - \frac{x}{2} \right] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{4}{2x - 4} = 0 \Rightarrow \text{បន្ទាត់ } y = \frac{x}{2}$$

ជាអាស៊ីមតូតទ្រូត

អាស៊ីមតូតទាំងពីរកាត់គ្នាត្រង់ចំនុច $\omega(x = 2, y = 2 \cdot \frac{1}{2} = 1)$

ក្នុងតំរុយ (ωXY) យើងបានតាមរូបមន្តនៃការផ្លាស់ប្តូរ

$$x = 2 + X, \quad y = 1 + Y \text{ សមីការ (C) អាសរសេរ}$$

$$1 + Y = \frac{(2 + X)^2 - 2(2 + X) + 4}{2(2 + X) - 4} = \frac{4 + 4X + X^2 - 4 - 2X + 4}{2X}$$

$$\Rightarrow Y = f(X) = \frac{X^2 + 2X + 4}{2X} - 1 = \frac{X^2 + 4}{2X}$$

$$f(-X) = \frac{(-X)^2 + 4}{2(-X)} = \frac{X^2 + 4}{-2X} = -\frac{X^2 + 4}{2X} = -f(X)$$

$\Rightarrow f(X)$ ជាអនុគមន៍សេស $\Rightarrow \omega(x = 2, y = 1)$ ជាផ្ចិតឆ្លុះរបស់ខ្សែកោង (C)

ខ្សែកោង (C) មិនកាត់ $(x'ox)$ ទេ តែកាត់អ័ក្ស $(y'oy)$ ត្រង់ចំនុចអដោនេ $y = -1$


និងមាន $\omega(x = 2, y = 1)$ ជាផ្ចិតឆ្លុះ ។

2) ដោះស្រាយតាមប្រាក្រិតអត្តសញ្ញាណ និងសញ្ញាបូសសមីការ

$$x^2 - 2(m + 1)x + 4(m + 1) = 0 \text{ ដោយពិភាក្សាតាមតំលៃ } m$$

$$\text{សមីការនេះអាចសរសេរ } x^2 - 2mx - 2x + 4m + 4 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x + 4 = m(2x - 4) \Leftrightarrow \frac{x^2 - 2x + 4}{2x - 4} = m \text{ ជាសមីការអាបស៊ីសរវាងខ្សែកោង (C) }$$

$$y = \frac{x^2 - 2x + 4}{2x - 4} \text{ និងបន្ទាត់ } y = m \text{ ស្រប } (x'oy)$$



- 1) សិក្សាទិសដៅអថេរភាព និងកូសខ្សែកោង (C) តាងអនុគមន៍

$$y = f(x) = \frac{(x-4)^2}{x-3} \text{ ក្នុងតំបន់អនុគមន៍ ។}$$

- 2) ស្រាយថានៅលើខ្សែកោង (C) មានពីរចំនុច A និង B ដែលបន្ទាត់ប៉ះខ្សែកោង (C) ត្រង់ចំនុចនោះស្របបន្ទាត់ $y+3x=0$ ។ តើចំនុចទាំងពីរនោះមានទីតាំងយ៉ាងណាចំពោះផ្ចិតភ្ជុះរបស់ខ្សែកោង (C) ?

- 3) ដោះស្រាយតាមប្រភេទអត្ថិភាព និងសញ្ញាបូសសមីការ

$$x^2 - (m+8)x + 3m + 16 = 0 \text{ ដោយពិភាក្សាទៅតាមតំលៃ } m \text{ ។}$$

ចំណើន

- 1) ក- សិក្សាទិសដៅអថេរភាពអនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{x^2 - 8x + 16}{x-3}$

សរសេរអនុគមន៍ $f(x)$ ជារាងកាណូនិច

$$\begin{array}{r|l} x^2 & -8x & +16 \\ -x^2 & +3x & \\ \hline & -5x & +16 \\ & +5x & -15 \\ \hline & & 1 \end{array} \quad \begin{array}{l} x-3 \\ x-5 \end{array}$$

អនុគមន៍ $f(x)$ អាចសរសេរ

$$f(x) = \frac{(x-4)^2}{x-3} = \frac{x^2 - 8x + 16}{x-3} = x-5 + \frac{1}{x-3}$$

ដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{3\}$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x-5 + \frac{1}{x-3} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x = \pm\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3} x-5 + \frac{1}{x-3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{x-3} = \infty$$

m	អត្ថិភាព និង សញ្ញាបូសសមីការ
$-\infty$	សមីការមានបួសពីរ $x_1 < 0 < x_2$
-1	សមីការមានបួសដូចគ្នា $x_1 = x_2 = 0$
	សមីការគ្មានបួស
3	សមីការមានបួសដូចគ្នា $x_1 = x_2 = 4 > 0$
$+\infty$	សមីការមានបួសពីរ $0 < x_1 < x_2$

$$f'(x) = \frac{\mu'v - v'\mu}{v^2} \quad \text{ដោយ} \quad \begin{cases} \mu = x^2 - 8x + 16 \Rightarrow \mu' = 2x - 8 \\ v = x - 3 \Rightarrow v' = 1 \end{cases}$$

$$\text{ដូច្នេះ: } f'(x) = \frac{x^2 - 6x + 8}{(x-3)^2} = \frac{(x-2)(x-4)}{(x-3)^2}$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow (x-2)(x-4) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 2 \Rightarrow y = -4 \\ x_2 = 4 \Rightarrow y = 0 \end{cases}$$

តារាងទិសដៅអថេរភាព

x	$-\infty$	2	3	4	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	-	-	0	+
$f(x)$	$-\infty$	-4		0	$+\infty$	

អនុគមន៍មានតំលៃអតិបរមាស្មើ -4 ត្រង់ $x = 2$ ហើយមានតំលៃអប្បបរមាស្មើ 0 ត្រង់ $x = 4$ ។

- អាប៊ីស៊ីសចំនុចប្រសព្វរវាង (C) និង $(x'ox)$ ជាបួសនៃសមីការ

$$\frac{(x-4)^2}{x-3} = 0 \Leftrightarrow (x-4)^2 = 0 \Leftrightarrow x_1 = x_2 = 4$$

ខ្សែកោង (C) ប៉ះ $(x'ox)$ ត្រង់ចំនុចអាប៊ីស៊ីស $x = 4$

- អរដោនេចំនុចប្រសព្វរវាង (C) និង $(y'oy)$ គឺ $y = f(o) = -\frac{16}{3}$

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \infty \Rightarrow \text{បន្ទាត់ } x = 3 \text{ ជាអាស៊ីមតូតឈរ}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (x-5)] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x-3} = 0 \Rightarrow \text{បន្ទាត់សមីការ}$$

$y = x - 3$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រូក

អាស៊ីមតូតទាំងពីរកាត់គ្នាត្រង់ $\omega(x=3, y=-2)$

ក្នុងតំរុយ (ωXY) តាមរូបមន្តនៃការផ្ទេរតំរុយ យើងបាន :

$$x = 3 + X \quad y = -2 + Y \quad \text{សមីការខ្សែកោង (C) អាចសរសេរ}$$

$$-2 + Y = \frac{(3+X-4)^2}{3+X-3} \Rightarrow Y = \frac{X^2 - 2X + 1}{X} + 2 = \frac{X^2 - 2X + 1 + 2X}{X} = \frac{X^2 + 1}{X}$$

$$Y = f(X) \quad \text{ដោយ } f(-X) = \frac{(-X)^2 + 1}{-X} = -\frac{X^2 + 1}{X} = -f(X)$$

នោះ $f(X)$ ជាអនុគមន៍សេស $\Rightarrow$ ខ្សែកោង (C) មាន $\omega(3; -2)$ ជាផ្ចិតឆ្លុះ ។

2)- ស្រាយថា នៅលើខ្សែកោង (C) មានព័រចំនុច A និង B ដែលបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ចំនុច

នោះស្របបន្ទាត់ $y + 3x = 0$

តាង $M(x,y) \in (C)$ ចំនុចដែលបន្ទាត់ប៉ះស្របនឹងបន្ទាត់ $y + 3x = 0 \Leftrightarrow y = -3x$

មេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ប៉ះខ្សែកោង (C) ត្រង់ $M(x,y)$ គឺ $f'(x) = \frac{x^2 - 6x + 8}{(x-3)^2}$

ដើម្បីអោយបន្ទាត់ប៉ះនេះស្របបន្ទាត់ $y + 3x = 0 \Leftrightarrow y = -3x$ លុះត្រាតែមេគុណ

$$\text{ប្រាប់ទិសដៅរបស់វាស្មើគ្នា} \quad \frac{x^2 - 6x + 8}{(x-3)^2} = -3 \Leftrightarrow$$

$$4x^2 - 24x + 35 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{5}{2}, y = -\frac{9}{2} \\ x_2 = \frac{7}{2}, y = \frac{1}{2} \end{cases}$$

យើងអាចយក $A(\frac{5}{2}; -\frac{9}{2})$; $B(\frac{7}{2}; \frac{1}{2})$

តើ A និង B មានលក្ខណៈយ៉ាងណាចំពោះផ្ចិតឆ្លុះរបស់ (C) ?

$$\frac{x_A + x_B}{2} = \frac{\frac{5}{2} + \frac{7}{2}}{2} = \frac{12}{4} = 3 = \text{អាប៊ីស៊ីសរបស់ } \omega$$


$$\frac{y_A + y_B}{2} = \frac{-\frac{9}{2} + \frac{1}{2}}{2} = \frac{-8}{4} = -2 = \text{អរដោនេរបស់ } \omega$$

ω ជាចំនុចកណ្តាលនៃ $[AB]$ រឺ A ឆ្លុះ B ចំពោះ ω

3)- ដោះស្រាយអត្ថិភាព និងសញ្ញាបួសសមីការ $x^2 - (m+8)x + 3m + 16 = 0$

សមីការនេះអាចសរសេរ $x^2 - 8x + 16 = (x-4)^2 = m(x-3)$

$\Leftrightarrow \frac{(x-4)^2}{x-3} = m$ ជាសមីការអាប់ស៊ីសរវាងខ្សែកោង (C) និងបន្ទាត់
 $y = m$ ស្រប $(x'0x)$ ។ យើងបានចំណេញក្នុងតារាងខាងក្រោម ។



m	អត្ថិភាព និង សញ្ញាបូសសមីការ
$-\infty$	សមីការមានបូសពីរ $x_1 < 0 < x_2$
$-\frac{16}{3}$	សមីការមានបូសពីរ $x_1 = 0 < x_2$
-4	សមីការមានបូសពីរ $0 < x_1 < x_2$
	សមីការមានបូសឌុប $x_1 = x_2 = 2 > 0$
	សមីការគ្មានបូស
0	សមីការមានបូសឌុប $x_1 = x_2 = 4 > 0$
$+\infty$	សមីការមានបូសពីរ $0 < x_1 < x_2$

សំណួរ

- សិក្សាអថេរភាពទិសដៅ និងគូសខ្សែកោង (C_1) តាងអនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{x^2}{x-1}$ ក្នុងតំបន់អនុគមន៍ (oxy) ។
- គូសខ្សែកោង (C_2) តាងអនុគមន៍ $y = g(x) = \left| \frac{x^2}{x-1} \right|$
- ដោះស្រាយអត្ថិភាព និង សញ្ញាបូសសមីការ $\left| \frac{x^2}{x-1} \right| = m$ ដោយពិភាក្សាទៅតាមតំលៃ m ។

ចំណើយ

- ក. សិក្សាទិសដៅអថេរភាពអនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{x^2}{x-1}$ សរសេរអនុគមន៍នេះជាពាក្យពាក្យនិច ដោយចែកភាគយកនិងភាគបែង យើងបាន :

$$y = f(x) = \frac{x^2}{x-1} = x + 1 + \frac{1}{x-1}$$

$$\text{ដែនកំណត់ } D = R \setminus \{1\}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x + 1 + \frac{1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x = \pm\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} x + 1 + \frac{1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} = \infty$$

$$f'(x) = \frac{\mu'v - v'\mu}{v^2} = \frac{2x^2 - 2x - x^2}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2}$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x = 0 \Leftrightarrow x(x-2) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \Rightarrow y = f(0) = 0 \\ x_2 = 2 \Rightarrow y = f(2) = 4 \end{cases}$$

តារាងទិសដៅអថេរភាព

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$-\infty$	0	$+\infty$	4	$+\infty$

អនុគមន៍មានតំលៃអតិបរមាស្ថិតនៅ $x = 0$ ហើយមានតំលៃអប្បបរមាស្ថិតនៅ $x = 2$ ។

១- គូសខ្សែកោង (C_1) តាងអនុគមន៍ $y = f(x)$

រកស្វ័យចំនុចប្រសព្វរវាងខ្សែកោង (C_1) និង $(x'ox)$ ជាបួនរបស់សមីការ

$$\frac{x^2}{x-1} = 0 \Leftrightarrow x^2 = 0 \Leftrightarrow x_1 = x_2 = 0$$

ខ្សែកោង (C_1) ប៉ះ $(x'ox)$ ត្រង់គល់ ០ នៃតំរុយ (oxy) អរដោនេចំនុចប្រសព្វរវាង (C_1) និង $(y'oy)$ គឺ $y = f(0) = 0$

អាស្រ័យគូតឈរ $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty \Rightarrow$ បន្ទាត់ $x = 1$ ជាអាស្រ័យគូតឈរ

$$\text{អាស្រ័យគូតទ្រូត } \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (x+1)] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x-1} = 0$$

$\Rightarrow$ បន្ទាត់ $y = x+1$ ជាអាស្រ័យគូតទ្រូត

អាស្រ័យគូតទាំងពីរកាត់គ្នាត្រង់ចំនុច $\omega(x=1; y=2)$

ស្រាយថា $\omega(x=1, y=2)$ ជាផ្ចិតភ្ជួររបស់ (C_1)


គូសតំរុយអនុគមន៍ $(\omega x y)$ យើងបានតាមរូបមន្តអូតូម៉ូរ្វ $x = 1+X, y = 2+Y$

ដូច្នេះ សមីការខ្សែកោង (C_1) អាចសរសេរ $2+Y = \frac{(1+X)^2}{1+X-1} = \frac{1+2X+X^2}{X}$

$$Y = f(X) = \frac{X^2+2X+1}{X} - 2 = \frac{X^2+1}{X}$$

$$\text{ដោយ } f(-X) = \frac{(-X)^2+1}{-X} = -\frac{X^2+1}{X} = -f(X)$$

$\Rightarrow f(X)$ ជាអនុគមន៍សេស $\Rightarrow \omega(x=1, y=2)$ ជាផ្ចិតភ្ជួររបស់ខ្សែកោង (C_1) ។



2- គូសខ្សែកោង (C_2) តាងអនុគមន៍ $y = g(x) = \left| \frac{x^2}{x-1} \right|$


$$\text{យើងអាចសរសេរ } g(x) = \left| \frac{x^2}{x-1} \right| = |f(x)|$$

មានដែនកំណត់ $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$

$$\forall x \in \mathcal{D}, f(x) \geq 0 \Rightarrow g(x) = |f(x)| = f(x) \Rightarrow (C_2) = (C_1)$$

$$\forall x \in \mathcal{D}, f(x) < 0 \Rightarrow g(x) = |f(x)| = -f(x) \Rightarrow (C_2)$$

ជារូបភាពនៃ (C_1) ធៀប $(x'ox)$ ។



3)- ដោះស្រាយអត្ថិភាព និង សញ្ញាបូសសមីការ $\left| \frac{x^2}{x-1} \right| = m$ ជាសមីការអន់ស៊ុស រោងខ្សែរោង (C_2) និងបន្ទាត់ $y = m$ ស្រប $(x'ox)$ ។

m	អត្ថិភាពនិងសញ្ញាបូសសមីការ តាមត្រាតិច
$-\infty$	សមីការគ្មានបូស
0	សមីការមានបូសខ្ទប់ $x_1 = x_2 = 0$
	សមីការមានបូសពីរ $x_1 < 0 < x_2$
4	សមីការមានបូសបី $x_1 < 0 < x_2 < x_3 = 2$
$+\infty$	សមីការមានបូសបួន $x_1 < 0 < x_2 < x_3 < x_4$

លំហាត់

- សិក្សាទិសដៅអថេរភាព និង គូសខ្សែរោង (C_1) តាងអនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{x^2 - x - 2}{x + 2}$ ក្នុងតំរុយអនុគមន៍ ។
- គូសខ្សែរោង (C_2) តាងអនុគមន៍ $y = g(x) = \left| \frac{x^2 - x - 2}{x + 2} \right|$ ក្នុងតំរុយអនុគមន៍ (oxy) ។
- ដោះស្រាយអត្ថិភាព និង សញ្ញាបូសសមីការ $\left| \frac{x^2 - x - 2}{x + 2} \right| = m$ ពិភាក្សាតាមតំលៃ m ។

ចំណើយ

- ក- សិក្សាទិសដៅអថេរភាពអនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{x^2 - x - 2}{x + 2}$
 សរសេរ $f(x)$ ជារាងកាណូនិច ដោយចែកភាគយកនិងភាគបែង យើងបាន
 $y = f(x) = \frac{x^2 - x - 2}{x + 2} = x - 3 + \frac{4}{x + 2}$
 $D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$
 $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x - 3 + \frac{4}{x + 2} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x = \pm\infty$
 $\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2} x - 3 + \frac{4}{x + 2} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{4}{x + 2} = \infty$
 $f'(x) = \frac{\mu'v - v'\mu}{v^2} = \frac{2x^2 + 4x - x - 2 - x^2 + x + 2}{(x + 2)^2} \Rightarrow$
 $f'(x) = \frac{x^2 + 4x}{(x + 2)^2} = \frac{x(x + 4)}{(x + 2)^2}$
 $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x(x + 4) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \Rightarrow y = -1 \\ x = -4 \Rightarrow y = -9 \end{cases}$
 បើ $x = 0 \Rightarrow y = f(0) = -1$
 $x = -4 \Rightarrow y = f(-4) = -9$

តារាងទិន្នន័យដេរីវេ

x	$-\infty$	-4	-2	0	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	-9	$+\infty$	-1	$+\infty$

អនុគមន៍មានតំលៃអតិបរមាស្មើ -9 ចំពោះ $x = -4$ ហើយមានតំលៃអប្បបរមាស្មើ -1 ចំពោះ $x = 0$

ខ. គូសខ្សែកោង (C_1) តាងអនុគមន៍ $y = f(x)$

អាស្រ័យចំនុចប្រសព្វរវាង (C_1) និង $(x'ox)$ ជាបួនរបស់សមីការ

$$\frac{x^2 - x - 2}{x + 2} = 0 \Leftrightarrow x^2 - x - 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -1 \\ x_2 = 2 \end{cases}$$

ខ្សែកោង (C_1) កាត់ $(x'ox)$ បានពីរចំនុចមានអាស្រ័យរៀងគ្នា $x_1 = -1, x_2 = 2$

អរដេរីវេចំនុចប្រសព្វរវាង (C_1) និង $(y'oy)$ គឺ $y' = f'(0) = -1$

$$\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = \infty \Rightarrow \text{បន្ទាត់ } x = -2 \text{ ជាអាស្រ័យតូចឈរ}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (x - 3)] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{4}{x + 2} = 0 \text{ បន្ទាត់ } y = x - 3$$

ជាអាស្រ័យតូចទៀត

អាស្រ័យតូចទាំងពីរកាត់គ្នាត្រង់ចំនុច $\omega(x = -2; y = -5)$

ក្នុងតំបន់ (ωxy) យើងបានតាមរូបមន្តនៃការប្តូរតំបន់

$$x = -2 + X, y = -5 + Y \text{ នោះសមីការខ្សែកោង } (C_1)$$

$$\text{អាចសរសេរ } -5 + Y = \frac{(-2 + X)^2 - (-2 + X) - 2}{-2 + X + 2} \Rightarrow$$


$$Y = \frac{X^2 - 5X + 4}{X} + 5 = \frac{X^2 - 5X + 4 + 5X}{X} = \frac{X^2 + 4}{X}$$

$$Y = f(X) = \frac{X^2 + 4}{X}$$

$$f(-X) = \frac{(-X)^2 + 4}{-X} = \frac{X^2 + 4}{-X} = -\frac{X^2 + 4}{X} = -f(X)$$

ដោយ $f(-X) = -f(X) \Rightarrow f(X)$ ជាអនុគមន៍សេស $\Rightarrow \omega(x = -2; y = -5)$

ជាផ្ចិតឆ្លុះរបស់ខ្សែកោង (C_1)




2) គូសខ្សែកោង (C_2) តាងអនុគមន៍ $y = g(x) = \left| \frac{x^2 - x - 2}{x + 2} \right| = |f(x)|$

អនុគមន៍មានដែនកំនត់ $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$

$$\forall x \in \mathcal{D}, f(x) \geq 0 \Rightarrow g(x) = |f(x)| = f(x) \Rightarrow (C_2) = (C_1)$$

$$\forall x \in \mathcal{D}, f(x) < 0 \Rightarrow g(x) = |f(x)| = -f(x) \Rightarrow (C_2) \text{ ជាបញ្ចុះរន្ធ}$$

(C_1) ធៀបនឹង $(x'ox)$ ។ យើងអាចទាញសំនង់ (C_2)



m	អត្ថិភាពនិងសញ្ញាបូសសមីការ $\left \frac{x^2 - x - 2}{x + 2} \right = m$
$-\infty$	សមីការគ្មានបូស
0	សមីការមានបូសពីរ $x_1 = -1 < 0 < x_2 = 2$
	សមីការមានបូសបួន $x_1 < x_2 < 0 < x_3 < x_4$
1	សមីការមានបូសបី $x_1 < x_2 = 0 < x_3$
	សមីការមានបូសពីរ $x_1 < 0 < x_2$
9	សមីការមានបូសបី $x_1 = -4 < x_2 < 0 < x_3$
$+\infty$	សមីការមានបូសបួន $x_1 < x_2 < x_3 < 0 < x_4$

សំណាត់

1)- ក. សិក្សាទិសដៅអថេរភាព អនុគមន៍ : $y = f(x) = \frac{x^2 - 2x + 4}{2x - 4}$

ខ. គូសខ្សែកោង (C_1) តាងអនុគមន៍នេះក្នុងតំបន់អន្តរកាល (ox)

2)- គូសខ្សែកោង (C_2) តាងអនុគមន៍ $y = g(x) = \left| \frac{x^2 - 2x + 4}{2x - 4} \right|$

3)- ដោះស្រាយអត្ថិភាព និង សញ្ញាបូសសមីការ

$$\left| \frac{x^2 - 2x + 4}{2x - 4} \right| - K = 0 \text{ ដោយពិភាក្សាទៅតាមតំលៃ } K$$

1)- ក. សិក្សាទិសដៅអថេរភាពអនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{x^2 - 2x + 4}{2x - 4}$

សរសេរ $f(x)$ ជាបាតានុវិច ដោយចែកភាគយកនិងភាគបែង

$$\text{យើងបាន } y = f(x) = \frac{x^2 - 2x + 4}{2x - 4} = \frac{x}{2} + \frac{2}{x-2}$$

អនុគមន៍មានដែនកំណត់ $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x}{2} + \frac{2}{x-2} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x}{2} = \pm\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x}{2} + \frac{2}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2}{x-2} = \infty$$

$$f'(x) = \frac{\mu'v - v'\mu}{v^2} = \frac{x^2 - 4x}{(2x-4)^2} = \frac{x(x-4)}{(2x-4)^2}$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 4 \end{cases} \Rightarrow \begin{aligned} y &= f(0) = -1 \\ y &= f(4) = 3 \end{aligned}$$

x	$-\infty$	0	2	4	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$-\infty$	-1	$+\infty$	3	$+\infty$

អនុគមន៍មានតំលៃអតិបរមា -1 ត្រង់ $x = 0$ និងមានអប្បបរមា 3 ត្រង់ $x = 4$

ខ. គូសខ្សែរោង (C_1) តាងអនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{x^2 - 2x + 4}{2x - 4}$

រាប់ស៊ីសចំនុចប្រសព្វរវាងខ្សែរោង (C_1) និងអ័ក្ស $(x'ox)$ ជាបួសរបស់សមីការ

$$\frac{x^2 - 2x + 4}{2x - 4} = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x + 4 = 0 \text{ សមីការដឺក្រេទី២នៃ } x$$

$$\text{ដែលមាន } \Delta' = 1 - 4 = -3 < 0 \Rightarrow \text{សមីការគ្មានបួស}$$

ដូច្នេះ (C_1) មិនកាត់ $(x'ox)$ ទេ ។

អរោងចំនុចប្រសព្វរវាងខ្សែរោង (C_1) និងអ័ក្ស $(y'oy)$

$$\text{គឺ } y = f(0) = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \infty \Rightarrow \text{បន្ទាត់ } x = 2 \text{ ជាអាស៊ីមតូតឈរ}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left[f(x) - \frac{x}{2} \right] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2}{x-2} = 0 \text{ បន្ទាត់ } y = \frac{x}{2} \text{ ជាអាស៊ីមតូតទ្រូត}$$

រាប់ស៊ីមតូតទាំងពីរកាត់គ្នាត្រង់ចំនុច $\omega(x=2; y=2 \cdot \frac{1}{2} = 1)$

ក្នុងតំរុយ (ωXY) យើងបានតាមរូបមន្តនៃការផ្លាស់ប្តូរ

$$x = 2 + X; y = 1 + Y \text{ នោះយើងអាចសរសេរសមីការ } (C_1)$$

$$1 + Y = \frac{(1+X)^2 - 2(2+X) + 4}{2(2+X) - 4} = \frac{X^2 + 2X + 4}{2X} \Rightarrow$$


$$Y = \frac{X^2 + 2X + 4}{2X} - 1 = \frac{X^2 + 2X + 4 - 2X}{2X} = \frac{X^2 + 4}{2X} = f(X)$$

$$\text{ដោយ } f(-X) = \frac{(-X)^2 + 4}{2(-X)} = \frac{X^2 + 4}{-2X} = -\frac{X^2 + 4}{2X} = -f(X)$$

$\Rightarrow f(X)$ ជាអនុគមន៍សេស $\Rightarrow \omega(x=2, y=1)$ ជាផ្ចិតឆ្លុះរបស់ខ្សែរោង (C_1) ។

ខ្សែរោង (C_1) មិនកាត់ $(x'ox)$ ទេ កាត់ $(y'oy)$ ត្រង់ចំនុចមានអរោង $y = -1$ ។

ខ្សែរោង (C_1) មានចំនុច $\omega(x=2; y=1)$ ជាផ្ចិតឆ្លុះ



2) គូសខ្សែកោង (C_2) តាងអនុគមន៍ $y = g(x) = \left| \frac{x^2 - 2x + 4}{2x - 4} \right|$


ដែនកំនត់នៃអនុគមន៍ $g(x)$ $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{2\}$

$$\forall x \in \mathcal{D} \text{ យើងបាន } g(x) = \left| \frac{x^2 - 2x + 4}{2x - 4} \right| = |f(x)| \geq 0$$

- បើ $x \in \mathcal{D}$, $f(x) \geq 0 \Rightarrow g(x) = f(x)$ ដូច្នេះ យើងបាន $(C_2) = (C_1)$

- បើ $x \in \mathcal{D}$, $f(x) < 0 \Rightarrow g(x) = -f(x)$ ដូច្នេះ យើងបាន (C_2) ជារូបភាពនៃ (C_1) ធៀបនឹង $(x'ox)$

យើងអាចទាញសន្និដ្ឋាន (C_2) ពី (C_1) បាន



3) ដោះស្រាយអត្ថិភាព និងសញ្ញាបូសសមីការ $\left| \frac{x^2 - 2x + 4}{2x - 4} \right| - K = 0$

សមីការនេះអាចសរសេរ $\left| \frac{x^2 - 2x + 4}{2x - 4} \right| = K$ ជាសមីការអាប់ស៊ីសរវាងខ្សែកោង

(C_2) និងបន្ទាត់ $y = K$ ស្រប $(x'ox)$ យើងបានចំណេញតាមត្រាតិចក្នុងតារាងខាងក្រោម

K	អត្ថិភាព និង សញ្ញាបូសសមីការតាមត្រាតិច
$-\infty$	សមីការគ្មានឫស
1	សមីការមានឫសឌុប $x_1 = x_2 = 0$ សមីការមានឫសពីរ $x_1 < 0 < x_2$
3	សមីការមានឫសបី $x_1 < 0 < x_2 < x_3 = 4$
$+\infty$	សមីការមានឫសបួន $x_1 < 0 < x_2 < x_3 < x_4$

លំហាត់

- សិក្សាអថេរភាពទិសដៅ និងតួសន្យាកោង (C_1) តាងអនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{x^2}{x-1}$ ។
- តួសន្យាកោង (C_2) តាងអនុគមន៍ $y = g(x) = \frac{x^2}{|x|-1}$ ។
- ដោះស្រាយអន្តរភាព និងសញ្ញាបូសសមីការ $x^2 - m|x| + m = 0$ ដោយពិភាក្សាទៅតាមតំលៃនៃ m ។

ចំណើយ

- ក- សិក្សាទិសដៅអថេរភាពនៃអនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{x^2}{x-1}$ សរសេរ $f(x)$

ជាការកាណូនិច ដោយចែកភាគយកនិងភាគបែង

$$\text{យើងបាន } f(x) = \frac{x^2}{x-1} = x+1 + \frac{1}{x-1}$$

$$\text{ដែនកំណត់ } \mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x+1 + \frac{1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x = \pm\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} x+1 + \frac{1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} = \infty$$

$$f'(x) = \frac{u'v - v'u}{v^2} = \frac{2x(x-1) - x^2}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2}$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x = 0 \Leftrightarrow x(x-2) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \Rightarrow y_1 = f(0) = 0 \\ x_2 = 2 \Rightarrow y_2 = f(2) = 4 \end{cases}$$

តារាងទិសដៅអថេរភាព

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$-\infty$	0	$-\infty$	4	$+\infty$

អនុគមន៍មានតំលៃអតិបរមាស្មើ 0 ចំពោះ $x = 0$ ហើយមានតំលៃអប្បបរមាស្មើ 4

ចំពោះ $x = 2$ ។

- តួសន្យាកោង (C_1) តាងអនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{x^2}{x-1}$ អាចស៊ើបចំទុចប្រសព្វរវាង

$$(C_1) \text{ និង } (x'ox) \text{ ជាបូសនៃសមីការ } \frac{x^2}{x-1} = 0 \Leftrightarrow x^2 = 0 \Leftrightarrow x_1 = x_2 = 0$$

ដូច្នេះ ខ្សែកោង (C_1) ប៉ះ $(x'ox)$ ត្រង់គល់ 0 ។

អរដោនេចំនុចប្រសព្វរវាង (C_1) និង $(y'oy)$ គឺ $y = f(0) = 0$

$$\text{អាស៊ីមតូតឈរ } \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} x+1 + \frac{1}{x-1} = \infty$$

នោះយើងបានបន្ទាត់ $x = 1$ ជាអាស៊ីមតូតឈរ

$$\text{អាស៊ីមតូតទ្រេត } \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (x+1)] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x-1} = 0$$

$\Rightarrow$ បន្ទាត់ $y = x+1$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេត

អាស៊ីមតូតទាំងពីរកាត់គ្នាត្រង់ចំនុច $\omega(x=1, y=2)$ ក្នុងតំបន់ (ωXY)

យើងបានតាមរូបមន្ត ដូចតំបន់ $x = 1+X, y = 2+Y$


សមីការខ្សែកោង (C_1) អាចសរសេរ $2+Y = \frac{(1+X)^2}{1+X-1} = \frac{X^2+2X+1}{X}$

$$Y = f(X) = \frac{X^2+2X+1}{X} - 2 = \frac{X^2+2X+1-2X}{X}$$

$$= \frac{X^2+1}{X} \Rightarrow Y = f(X) = \frac{X^2+1}{X}$$

ដោយ $f(-X) = \frac{(-X)^2+1}{-X} = -\frac{X^2+1}{X} = -f(X)$

$\Rightarrow f(X)$ ជាអនុគមន៍សេស $\Rightarrow \omega(x=1, y=2)$ ជាផ្ចិតឆ្លុះរបស់ខ្សែកោង (C_1)។



2/ គូសខ្សែកោង (C_2) តាងអនុគមន៍ $y = g(x) = \frac{x^2}{|x|-1}$


ដែនកំណត់ $D = \mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$

$$\forall x \in D, g(-x) = \frac{(-x)^2}{|-x|-1} = \frac{x^2}{|x|-1} = g(x) \Rightarrow g(x) \text{ ជាអនុគមន៍គូ}$$

បើ $x \geq 0$ និង $x \neq 1 \Rightarrow g(x) = f(x) = \frac{x^2}{x-1} \Rightarrow (C_2) = (C_1)$

បើ $x < 0$ និង $x \neq -1$ យើងបាន (C_2) ជាបញ្ចុះនៃ (C_1) ធៀប

($y'oy$) ព្រោះ $g(x)$ ជាអនុគមន៍គូ ។ យើងអាចគូស (C_2)



3/ ដោះស្រាយអត្ថិភាព និងសញ្ញាបូសសមីការ $x^2 - m|x| + m = 0$

សមីការនេះអាចសរសេរ $x^2 = m(|x| - 1) \Leftrightarrow \frac{x^2}{|x| - 1} = m$

ជាសមីការអាប៉ូស៊ីរោងខ្សែកោង (C_2) និងបន្ទាត់ $y = m$ ស្របនឹង ($x'ox$)

m	អត្ថិភាព និងសញ្ញាបូសសមីការ $x^2 - m x + m = 0$ តាមត្រាតិច
$-\infty$	សមីការមានបូសពីរ $x_1 < 0 < x_2$
0	សមីការមានបូសខុប $x_1 = x_2 = 0$
4	សមីការមានបូសខុបពីរ $x_1 = x_2 = -2 < 0 < x_3 = x_4 = 2$
$+\infty$	សមីការមានបូសបួន $x_1 < x_2 < 0 < x_3 < x_4$

លំហាត់

1/ សិក្សាទិសដៅអថេរភាព និងតួសខ្សែកោង (C_1) តាងអនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{(x-4)^2}{x-3}$

ក្នុងតំរុយអត្ថន័យ (oxy) ។

2/ តួសខ្សែកោង (C_2) តាងអនុគមន៍ $y = g(x) = \frac{(|x|-4)^2}{|x|-3}$

ក្នុងតំរុយអត្ថន័យ (oxy) ។

3/ ដោះស្រាយអត្ថិភាព និងសញ្ញាបូសសមីការ

$\frac{(|x|-4)^2}{|x|-3} = m$ ពិភាក្សាតាមតំលៃ m ។

ចំណើន

1/ ក. សិក្សាទិសដៅអថេរភាពនៃអនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{(x-4)^2}{x-3}$

សរសេរអនុគមន៍ $f(x) = \frac{(x-4)^2}{x-3} = \frac{x^2 - 8x + 16}{x-3}$ ជាបាញ់ទូទៅ

ដោយចែកភាគយកនឹងភាគបែង យើងបាន :

$y = f(x) = \frac{(x-4)^2}{x-3} = \frac{x^2 - 8x + 16}{x-3} = x - 5 + \frac{1}{x-3}$

ដែនកំនត់ $D = \mathbb{R} \setminus \{3\}$

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x - 5 + \frac{1}{x-3} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x = \pm\infty$

$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3} x - 5 + \frac{1}{x-3} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-3} = \infty$

$f'(x) = \frac{u'v - v'u}{v^2} = \frac{x^2 - 6x + 8}{(x-3)^2} = \frac{(x-2)(x-4)}{(x-3)^2}$

$f'(x) = 0 \Leftrightarrow (x-2)(x-4) = 0 \Leftrightarrow$

$\begin{cases} x = 2 \Rightarrow y = f(2) = -4 \\ x = 4 \Rightarrow y = f(4) = 0 \end{cases}$

តារាងទិសដៅអថេរភាព

x	$-\infty$	2	3	4	$+\infty$
$f'(x)$	+	○	-	○	+
$f(x)$	$-\infty$	-4	$+\infty$	○	$+\infty$

អនុគមន៍មានតំលៃអតិបរមាស្មើ -4 ចំពោះ $x = 2$ និងមានតំលៃអប្បបរមាស្មើ 0

ចំពោះ $x = 4$ ។

១. គូសខ្សែកោង (C_1)

អាស៊ីមតូតប្រសព្វរវាង (C_1) និង $(x'oy)$ ជាបួសនៃសមីការ

$$\frac{(x-4)^2}{x-3} = 0 \Leftrightarrow (x-4)^2 = 0 \Leftrightarrow x-4 = 0 \Leftrightarrow$$

$$x_1 = x_2 = 4 \Rightarrow \text{ខ្សែកោង } (C_1) \text{ ប៉ះ } (y'oy) \text{ ត្រង់ } x = 4$$

អរោនេចំនុចប្រសព្វរវាង (C_1) និង $(y'oy)$ គឺ $y = f(0) = -\frac{16}{3}$

អាស៊ីមតូតឈរ $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \infty \Rightarrow$ បន្ទាត់ $x = 3$ ជាអាស៊ីមតូតឈរ

ជាអាស៊ីមតូតទ្រូត $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (x-5)] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x-3} = 0$

$\Rightarrow$ បន្ទាត់ $y = x-5$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រូត

អាស៊ីមតូតទាំងពីរកាត់គ្នាត្រង់ចំនុច $\omega(x=3, y=-2)$


ក្នុងតំបន់ (ωXY) តាមរូបមន្តអូឡែរ យើងបាន $x = 3+X, y = -2+Y$

សមីការខ្សែកោង (C_1) អាចសរសេរ $-2+Y = \frac{(3+X-4)^2}{3+X-3} = \frac{X^2-2X+1}{X}$

$$Y = F(X) = \frac{X^2-2X+1}{X} + 2 = \frac{X^2+1}{X}$$

$$F(-X) = \frac{(-X)^2+1}{-X} = \frac{X^2+1}{-X} = -\frac{X^2+1}{X} = -F(X)$$

$\Rightarrow F(X)$ ជាអនុគមន៍សេស $\Rightarrow \omega(x=3, y=-2)$ ជាផ្ចិតឆ្លុះរបស់ខ្សែកោង (C_1)



2. គូសខ្សែកោង (C_2) តាងអនុគមន៍ $y = g(x) = \frac{(|x|-4)^2}{|x|-3}$


$$\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-3; 3\}$$

$$\forall x \in \mathcal{D}, \quad g(-x) = \frac{(|-x|-4)^2}{|-x|-3} = \frac{(|x|-4)^2}{(|x|-3)} = g(x)$$

$g(x)$ ជាអនុគមន៍គូ $\Rightarrow (C_2)$ មាន $(y'oy)$ ជាអ័ក្សឆ្លុះ

បើ $x \geq 0$ និង $x \neq 3 \Rightarrow g(x) = \frac{(x-4)^2}{(x-3)} \Rightarrow (C_2) = (C_1)$

បើ $x < 0$ និង $x \neq -3$ នោះ (C_2) ជារូបឆ្លុះនៃ (C_1) ធៀបនឹង $(y'oy)$



- 3/. ដោះស្រាយអត្ថិភាព និងសញ្ញាបូសសមីការ $\frac{(|x|-4)^2}{|x|-3} = m$ ជាសមីការ
អាប័ស្មីសរវាងខ្សែកោង (C_2) និងបន្ទាត់ $y = m$

m	អត្ថិភាព និងសញ្ញាបូសសមីការ តាមក្រាហ្វិច
$-\infty$	សមីការមានបូសពីរ $x_1 < 0 < x_2$
$-\frac{16}{3}$	សមីការមានបូសបី $x_1 < x_2 = 0 < x_3$
	សមីការមានបូសបួន $x_1 < x_2 < 0 < x_3 < x_4$
-4	សមីការមានបូសឌុបពីរ $x_1 = -2 < 0 < x_2 = 2$
	សមីការគ្មានបូស
0	សមីការមានបូសឌុបពីរ $x_1 = -4 < 0 < x_2 = 4$
$+\infty$	សមីការមានបូសបួន $x_1 < x_2 < 0 < x_3 < x_4$

លំហាត់

- 1/. សិក្សាខ្ទឹមដេរីវេអថេរភាព និងតួសន្យាកោង (C_1) តាងអនុគមន៍

$$y = f(x) = \frac{x^2 - 2x + 4}{2x - 4} \quad \text{ក្នុងតំបន់អនុវត្តន៍ (oxy) ។}$$

- 2/. តួសន្យាកោង (C_2) តាងអនុគមន៍ $y = g(x) = \frac{x^2 - 2|x| + 4}{2|x| - 4}$

- 3/. ដោះស្រាយអត្ថិភាព និងសញ្ញាបូសសមីការ

$$\frac{x^2 - 2|x| + 4}{2|x| - 4} - m = 0 \quad \text{ដោយពិភាក្សាទៅតាមតំលៃ m ។}$$

ចំណើន

1/ ក. សិក្សាទិសដៅអថេរភាពនៃអនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{x^2 - 2x + 4}{2x - 4}$

សរសេរ $f(x)$ ជាការបំបែកនិមិត្ត ដោយចែកភាគរយ និងភាគបែង

$$\text{យើងបាន } y = f(x) = \frac{x^2 - 2x + 4}{2x - 4} = \frac{x}{2} + \frac{x}{x-2}$$

ដែនកំណត់ : $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{2\}$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x}{2} + \frac{x}{x-2} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x}{2} = \pm\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x}{2} + \frac{x}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2}{x-2} = \pm\infty$$

$$f'(x) = \frac{u'v - v'u}{v^2} = \frac{x^2 - 4x}{(2x-4)^2} = \frac{x(x-4)}{(2x-4)^2}$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x(x-4) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} x = 0 \Rightarrow y = f(0) = -1 \\ x = 4 \Rightarrow y = f(4) = 3 \end{cases}$$

តារាងទិសដៅអថេរភាព

x	$-\infty$	0	2	4	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$-\infty$	-1	$+\infty$	3	$+\infty$

អនុគមន៍មានតំលៃអតិបរមានៅ -1 ចំពោះ $x = 0$ និងមានតំលៃអប្បបរមានៅ 3

ចំពោះ $x = 4$ ។

ខ/ គូសខ្សែកោង (C_1) តាងអនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{x^2 - 2x + 4}{2x - 4}$

រាប់ស៊ីសចំនុចប្រសព្វរវាងខ្សែកោង (C_1) និងអ័ក្ស ($x'ox$) ជាបួសរបស់សមីការ

$$\frac{x^2 - 2x + 4}{2x - 4} = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x + 4 = 0$$

$$\text{ដែលមាន } \Delta' = 1 - 4 = -3 < 0 \Rightarrow \text{សមីការគ្មានបួស}$$

ដូច្នេះខ្សែកោង (C_1) មិនកាត់ ($x'ox$) ទេ ។

អរដោនេចំនុចប្រសព្វរវាង (C_1) និង ($y'Oy$) គឺ $y = f(0) = -1$

អាស៊ីមតូតឈរ $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \infty \Rightarrow$ បន្ទាត់ $x = 2$ ជាអាស៊ីមតូតឈរ

$$\text{ជាអាស៊ីមតូតទ្រូង } \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left[f(x) - \frac{x}{2} \right] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2}{x-2} = 0$$

$$\Rightarrow \text{បន្ទាត់ } y = \frac{x}{2} \text{ ជាអាស៊ីមតូតទ្រូង}$$

អាស៊ីមតូតទាំងពីរកាត់គ្នាត្រង់ចំនុច $\omega(x = 2, y = 1)$


ក្នុងតំរុយ (ωXY) តាមរូបមន្តផ្លូវតំរុយ យើងបាន $x = 2 + X, y = 1 + Y$

$$\text{ហើយសមីការ } (C_1) \text{ អាចសរសេរ } 1 + Y = \frac{(2+X)^2 - 2(2+X) + 4}{2(2+X) - 4}$$

$$Y = F(X) = \frac{X^2 + 4}{X} \quad \text{តែដោយ}$$

$$F(-X) = \frac{(-X)^2 + 4}{-X} = \frac{X^2 + 4}{-X} = -\frac{X^2 + 4}{X} = -F(X)$$


$$\Rightarrow F(X) \text{ ជាអនុគមន៍សេស } \Rightarrow \omega(2; 1) \text{ ជាផ្ចិតឆ្លុះរបស់ } (C_1)$$



2. គូសខ្សែកោង (C_2) តាងអនុគមន៍ $y = g(x) = \frac{x^2 - 2|x| + 4}{2|x| - 4}$
 ដែនកំណត់ $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-2; 2\}$

បើ $x \geq 0$ និង $x \neq 2 \Rightarrow g(x) = f(x) \Rightarrow (C_2) = (C_1)$

បើ $x < 0$ និង $x \neq -2$ នោះ (C_2) ជារូបភាពនៃ (C_1) ធៀបនឹង $(y'Oy)$ ។
 យើងអាចទាញសំណង់ (C_2) បានពី (C_1)



3. ដោះស្រាយអត្ថិភាព និងសញ្ញាបូសសមីការ $\frac{x^2 - 2|x| + 4}{2|x| - 4} = m$
 ជាសមីការអាបស៊ីសរវាងខ្សែកោង (C_2) និងបន្ទាត់ $y = m$

m	អត្ថិភាព និងសញ្ញាបូសសមីការតាមក្រាហ្វិក
$-\infty$	សមីការមានបូសពីរ $x_1 < 0 < x_2$
0	សមីការមានបូសមួយ $x_1 = x_2 = 0$
	សមីការគ្មានបូស
3	សមីការមានបូសមួយពីរ $x_1 = -2 < 0 < x_2 = 2$
$+\infty$	សមីការមានបូសបី $x_1 < x_2 < 0 < x_3 < x_4$

លំហាត់

1. គូសខ្សែកោង (C_1) តាងអនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{x^2}{x-1}$ ក្នុងតំរុយអនេក្រិម (oxv)
2. គូសខ្សែកោង (C_2) តាងអនុគមន៍ $y = g(x) = \frac{x^2}{|x|-1}$ ក្នុងតំរុយអនេក្រិម (oxv)
3. គូសខ្សែកោង (C_3) តាងអនុគមន៍ $y = h(x) = \left| \frac{x^2}{|x|-1} \right|$ ក្នុងតំរុយអនេក្រិម (oxv)
4. ដោះស្រាយអត្ថភាព និងសញ្ញាបូសសមីការ $\left| \frac{x^2}{|x|-1} \right| - m = 0$ ពិភាក្សាតាមតំលៃ m

ចំណើយ

1. គូសខ្សែកោង (C_1) តាងអនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{x^2}{x-1}$
សរសេរ $f(x)$ ជាការបំបែក ដោយចែកភាគយក និងភាគបែង

$$f(x) = \frac{x^2}{x-1} = x+1 + \frac{1}{x-1}$$

ដែនកំនត់ $\mathcal{D}_1 = \mathbb{R} \setminus \{1\}$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x+1 + \frac{1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x = \pm\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} x+1 + \frac{1}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} = \infty$$

$$f'(x) = \frac{u'v - v'u}{v^2} = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \Rightarrow y_1 = 0 \\ x_2 = 4 \Rightarrow y_2 = 4 \end{cases}$$

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	-	-	0	+
$f(x)$		0		$+\infty$	4	$+\infty$

$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty \Rightarrow$ បន្ទាត់ $x = 1$ ជាកាស៊ីមីតូតឈរ


$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (x+1)] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x}{x-1} = 0$$

$\Rightarrow$ បន្ទាត់ $y = x+1$ ជាកាស៊ីមីតូតទ្រូត

ខ្សែកោង (C_1) កាត់ $(x'ox)$ ត្រង់ចំនុច មានអាបស៊ីសជាបូសសមីការ

$$\frac{x^2}{x-1} = 0 \Leftrightarrow x^2 = 0 \Leftrightarrow x_1 = x_2 = 0$$

ខ្សែកោង (C_1) កាត់ $(y'oy)$ ត្រង់ចំនុចអរដោនេ $y = f(0) = 0$ អាស៊ីមីតូតទាំងពីរកាត់គ្នាត្រង់ $\omega(x=1; y=2)$ ជាផ្ចិតឆ្លុះរបស់ខ្សែកោង (C_1)



2/ គូសខ្សែកោង (C_2) តាងអនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{x^2}{|x|-1}$


ដែនកំណត់ $D_2 = \mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$

$$\forall x \in D_2, g(-x) = \frac{(-x)^2}{|-x|-1} = \frac{x^2}{|x|-1} = g(x) \Rightarrow g(x)$$

ជាអនុគមន៍គូ $\Rightarrow (y'oy)$ ជាអ័ក្សឆ្លុះបញ្ចាំង (C_2) ។

$$\text{បើ } x > 0 \text{ និង } x \neq 1 \Rightarrow g(x) = f(x) = \frac{x^2}{x-1} \Rightarrow \text{ខ្សែកោង } (C_2) = (C_1)$$

$$\text{បើ } x < 0 \text{ និង } x \neq -1 \Rightarrow (C_2) \text{ ជាបញ្ចូលនៃ } (C_1) \text{ ធៀប } (y'oy)$$




3/ គូសខ្សែកោង (C_3) តាងអនុគមន៍ $y = h(x) = \left| \frac{x^2}{|x|-1} \right|$

$$h(x) = |g(x)| = \left| \frac{x^2}{|x|-1} \right| \text{ មានដែនកំណត់ } D_3 = D_2 = \mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$$

$$\forall x \in D_3, \text{ ដែល } g(x) \geq 0 \Rightarrow h(x) = g(x) \Rightarrow (C_3) = (C_2)$$

$$\forall x \in D_3, \text{ ដែល } g(x) < 0 \Rightarrow h(x) = -g(x) \Rightarrow (C_3) \text{ ជាបញ្ចូលនៃ } (C_2) \text{ ធៀប } (x'ox) \text{ ។}$$

ដូច្នេះ យើងអាចទាញសំនង់ខ្សែកោង (C_3) បាន (C_2) ។



4/ ដោះស្រាយអត្ថិភាព និងសញ្ញាបូសសមីការ $\left| \frac{x^2}{|x|-1} \right| - m = 0$

សមីការនេះអាចសរសេរ $\left| \frac{x^2}{|x|-1} \right| = m$ ជាសមីការអាប់ស៊ីសរវាងខ្សែកោង (C_3)

និងបន្ទាត់ $y = m$ ស្រប $(x'ox)$ ។

m	អត្ថិភាព និងសញ្ញាបូសសមីការតាមក្រាហ្វិក
$-\infty$	សមីការគ្មានបូស
0	សមីការមានបូសមួយ $x_1 = x_2 = 0$
	សមីការមានបូសពីរ $x_1 < 0 < x_2$
4	សមីការមានបូសបួន $x_1 = -2 < x_2 < 0 < x_3 < x_4 = 2$
$+\infty$	សមីការមានបូសប្រាំមួយ $x_1 < x_2 < x_3 < 0 < x_4 < x_5 < x_6$

លំហាត់

1/ គូសខ្សែកោង (C_1) តាងអនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{x^2 - 2x + 4}{2x - 4}$
ក្នុងតំបន់អនុវត្តន៍ (oxy) ។

2/ គូសខ្សែកោង (C_2) តាងអនុគមន៍ $y = g(x) = \frac{x^2 - 2|x| + 4}{2|x| - 4}$
ក្នុងតំបន់អនុវត្តន៍ (oxy) ។

3/ គូសខ្សែកោង (C_3) តាងអនុគមន៍ $y = h(x) = \left| \frac{x^2 - 2|x| + 4}{2|x| - 4} \right|$
ក្នុងតំបន់អនុវត្តន៍ (oxy) ។

4/ ដោះស្រាយអត្ថិភាព និងសញ្ញាបូសសមីការ $\left| \frac{x^2 - 2|x| + 4}{2|x| - 4} \right| = K$
ដោយពិភាក្សាតាមតំលៃ K ។

ចំណើន

1/ គូសខ្សែកោង (C_1) តាងអនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{x^2 - 2x + 4}{2x - 4}$

សរសេរ $f(x)$ ជារាងកាណូនិច ដោយចែកភាគយក និងភាគបែង

$$\text{យើងបាន } y = f(x) = \frac{x^2 - 2x + 4}{2x - 4} = \frac{x}{2} + \frac{2}{x - 2}$$

ដែនកំនត់ $\mathcal{D}_1 = \mathbb{R} \setminus \{2\}$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x}{2} + \frac{2}{x-2} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x}{2} = \pm\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x}{2} + \frac{2}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2}{x-2} = \infty$$

$$f'(x) = \frac{u'v - v'u}{v^2} = \frac{2x(x-4)}{(2x-4)^2}$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2x(x-4) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 4 \end{cases}$$

$$x_1 = 0 \Rightarrow y = f(0) = -1$$

x	$-\infty$	0		2		4	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	-	0	+	
$f(x)$	$-\infty$	-1	$-\infty$		$+\infty$	3	$+\infty$

អាប់ស៊ីសចំនុចប្រសព្វកោង (C_1) និង $(x'ox)$ ជាបូសរបស់សមីការ

$$\frac{x^2 - 2x + 4}{2x - 4} = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x + 4 = 0 \text{ ដែលមាន}$$

$$\Delta' = 1 - 4 = -3 < 0 \Rightarrow \text{សមីការគ្មានបូស} \Rightarrow (C_1) \text{ មិនកាត់ } (x'ox) \text{ ទេ ។}$$

អដោនេចំនុចប្រសព្វរវាង (C_1) និង $(y'oy)$ គឺ $y = f(0) = -1$


ដោយ $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \infty \Rightarrow$ បន្ទាត់ $x = 2$ ជាអាស៊ីមតូតឈរ

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left[f(x) - \frac{x}{2} \right] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2}{x-2} = 0 \Rightarrow$$

បន្ទាត់ $y = \frac{x}{2}$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រូត

អាស៊ីមតូតទាំងពីរនេះ កាត់គ្នាត្រង់ចំនុច $\omega(x=2, y=1)$

$\omega(x=2, y=1)$ ជាផ្ចិតឆ្លុះរបស់ខ្សែកោង (C_1) ។



2/. គូសខ្សែកោង (C_2) តាងអនុគមន៍ $y = g(x) = \frac{x^2 - 2|x| + 4}{2|x| - 4}$


ដែនកំណត់ $\mathcal{D}_2 = \mathbb{R} \setminus \{-2, 2\}$

$$\forall x \in \mathcal{D}_2, y = g(-x) = \frac{(-x)^2 - 2|-x| + 4}{2|-x| - 4} = \frac{x^2 - 2|x| + 4}{2|x| - 4} = g(x)$$

$\Rightarrow g(x)$ ជាអនុគមន៍គូ $\Rightarrow (y'oy)$ ជាអ័ក្សឆ្លុះរបស់ (C_2)

បើ $x \geq 0$ និង $x \neq 2 \Rightarrow g(x) = f(x) = \frac{x^2 - 2x + 4}{2x - 4} \Rightarrow (C_2) = (C_1)$

បើ $x < 0$ និង $x \neq -2$ យើងបាន (C_2) ជារូបឆ្លុះនៃ (C_1) ធៀបនឹង $(y'oy)$



3. គូសខ្សែកោង (C_3) តាងអនុគមន៍ $y = h(x) = \left| \frac{x^2 - 2|x| + 4}{2|x| - 4} \right|$

ដែនកំណត់ $D_3 = D_2 = \mathbb{R} \setminus \{-2; 2\}$

យើងបាន $y = h(x) = \left| \frac{x^2 - 2|x| + 4}{2|x| - 4} \right| = |g(x)|$


$\forall x, x \in D_3 = D_2$ ដែល $g(x) \geq 0 \Rightarrow |g(x)| = g(x)$

ដូច្នេះ $h(x) = |g(x)| = g(x) \Rightarrow (C_3) = (C_2)$

$\forall x \in D_3 = D_2$ ដែល $g(x) < 0 \Rightarrow |g(x)| = -g(x)$

$\Rightarrow h(x) = |g(x)| = -g(x) \Rightarrow (C_3)$ ជាប់នឹង (C_2) ផ្សេងទៀត $(x'ox)$

ដូច្នេះ យើងអាចទាញបានសំនុំខ្សែកោង (C_3) ពី (C_2)



4. ដោះស្រាយអត្ថិភាព និងសញ្ញាបូសសមីការ $\left| \frac{x^2 - 2|x| + 4}{2|x| - 4} \right| = K$

ដោយពិភាក្សាតាមតំលៃ K

សមីការនេះ ជាសមីការអាប៉ូស៊ីសរវាងខ្សែកោង (C_3)

$y = \left| \frac{x^2 - 2|x| + 4}{2|x| - 4} \right|$ និងបន្ទាត់ $y = K$ ស្រប $(x'ox)$

ដោយពិនិត្យលើត្រាតច (C_3) យើងបានអត្ថិភាពនិងសញ្ញាបូសសមីការក្នុងតារាងខាងក្រោម ។

K	អត្ថិភាព និងសញ្ញាបូសសមីការ
$-\infty$	
1	សមីការគ្មានចូស សមីការមានចូសគុប $x_1 = x_2 = 0$ សមីការមានចូសពីរ $x_1 < 0 < x_2$
3	សមីការមានចូសបួន $x_1 = -4 < x_2 < 0 < x_3 < x_4 = 4$
$+\infty$	សមីការមានចូសប្រាំមួយ $x_1 < x_2 < x_3 < 0 < x_4 < x_5 < x_6$

លំហាត់

1. គូសខ្សែកោង (C_1) តាងអនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{(x-4)^2}{x-3}$ ក្នុងតំបន់អនុគមន៍ (oxy) ។
2. គូសខ្សែកោង (C_2) តាងអនុគមន៍ $y = g(x) = \frac{(|x|-4)^2}{|x|-3}$ ក្នុងតំបន់អនុគមន៍ (oxy) ។
3. គូសខ្សែកោង (C_3) តាងអនុគមន៍ $y = h(x) = \left| \frac{x^2 - 8|x| + 16}{|x| - 3} \right|$ ក្នុងតំបន់អនុគមន៍ (oxy) ។
4. ដោះស្រាយអត្ថិភាព និងសញ្ញាបូសសមីការ $\left| \frac{x^2 - 8|x| + 16}{|x| - 3} \right| = m$ ដោយពិភាក្សាតាមតំលៃ m ។

1. គូសខ្សែកោង (C_1) តាងអនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{(x-4)^2}{x-3}$

សរសេរ $f(x)$ ជារាងកាណូនិច ដោយចែកភាគយក និងភាគបែង

$$\text{យើងបាន } y = f(x) = \frac{(x-4)^2}{x-3} = \frac{x^2 - 8x + 16}{x-3} = x - 5 + \frac{1}{x-3}$$

ដែនកំណត់ $\mathcal{D}_1 = \mathbb{R} \setminus \{3\}$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x - 5 + \frac{1}{x-3} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x = \pm\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3} x - 5 + \frac{1}{x-3} = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{1}{x-3} = \infty$$

$$f'(x) = \frac{u'v - v'u}{v^2} = \frac{x^2 - 6x + 8}{(x-3)^2} = \frac{(x-2)(x-4)}{(x-3)^2}$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 2 \Rightarrow y_1 = f(2) = -4 \\ x_2 = 4 \Rightarrow y_2 = f(4) = 0 \end{cases}$$

$$x_1 = 2 \Rightarrow y_1 = -4$$

$$x_2 = 4 \Rightarrow y_2 = 0$$

x	$-\infty$	2	3	4	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$		-4		0	

Diagram showing the behavior of the function near the asymptotes:
 - As $x \rightarrow -\infty$, $f(x) \rightarrow -\infty$.
 - As $x \rightarrow 3^-$, $f(x) \rightarrow +\infty$.
 - As $x \rightarrow 3^+$, $f(x) \rightarrow -\infty$.
 - As $x \rightarrow 4^-$, $f(x) \rightarrow 0^-$.
 - As $x \rightarrow 4^+$, $f(x) \rightarrow 0^+$.
 - As $x \rightarrow +\infty$, $f(x) \rightarrow +\infty$.

អាស័យដ្ឋានចំនុចប្រសព្វរវាង (C_1) និង ($x'Ox$) ជាបូជនីយកម្ម

$$\frac{(x-4)^2}{x-3} = 0 \Leftrightarrow (x-4)^2 = 0 \Leftrightarrow x_1 = x_2 = 4$$

ខ្សែកោង (C_1) ប៉ះអ័ក្ស ($x'Ox$) ត្រង់ចំនុចអាស័យស្ថាន $x = 4$

អង្កេតចំនុចប្រសព្វរវាង (C_1) និង ($y'Oy$) គឺ $y = f(0) = -\frac{16}{3}$

អាស័យដ្ឋានតូចនៃ $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \infty \Rightarrow$ បន្ទាត់ $x = 3$ ជាអាស័យដ្ឋានតូច

$$\text{អាស័យដ្ឋានទ្រូតិ } \lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (x-5)] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x-3} = 0 \Rightarrow$$

$\Rightarrow$ បន្ទាត់ $y = x - 5$ ជាអាស័យដ្ឋានទ្រូតិ


អាស័យដ្ឋានទាំងពីរនេះ កាត់គ្នាត្រង់ចំនុច $\omega(x = 3, y = -2)$

ខ្សែកោង (C_1) កាត់ ($y'Oy$) ត្រង់ចំនុចអង្កេត $y = -\frac{16}{3}$ ប៉ះ ($x'Ox$)

ត្រង់ចំនុចអាស័យស្ថាន $x = 4$

ហើយមាន $\omega(x = 3, y = -2)$ ជាផ្ចិតឆ្លង៖ 1. (C_1) មានកំពូលពីរ ($x = 2, y = -4$)

និង ($x = 4, y = 0$)



2/ គូសខ្សែកោង (C_2) តាងអនុគមន៍ $y = g(x) = \frac{(|x|-4)^2}{|x|-3}$

អនុគមន៍នេះអាចសរសេរ $y = g(x) = \frac{x^2 - 8|x| + 16}{|x| - 3}$


មានដែនកំនត់ $D_2 = \mathbb{R} \setminus \{-3, 3\}$

$\forall x \in D_2, g(-x) = \frac{(-x^2) - 8(-|x|) + 16}{|-x| - 3} = \frac{x^2 - 8|x| + 16}{|x| - 3} = g(x)$

$\Rightarrow g(x)$ ជាអនុគមន៍គូ

បើ $x \geq 0$ និង $x \neq 3 \Rightarrow g(x) = f(x) = \frac{(x-4)^2}{x-3} \Rightarrow (C_2) = (C_1)$

បើ $x < 0$ និង $x \neq -3$ យើងបាន (C_2) ជារូបភាពនៃ (C_1) ធៀបទ័ព្វ $(y'oy)$



3/ គូសខ្សែកោង (C_3) តាងអនុគមន៍ $y = h(x) = \frac{x^2 - 8|x| + 16}{|x| - 3}$

អនុគមន៍ $h(x) = \frac{x^2 - 8|x| + 16}{|x| - 3} = |g(x)|$


ដែនកំនត់ $D_3 = D_2$

$\forall x \in D_3 = D_2 \Rightarrow h(x) = |g(x)| \geq 0$

បើ $x \in D_3, gx \geq 0 \Rightarrow h(x) = g(x) \Rightarrow (C_3) = (C_2)$

បើ $x \in D_3, g(x) < 0 \Rightarrow h(x) = |g(x)| = -g(x) \Rightarrow$

(C_3) ជារូបភាពនៃ (C_2) ធៀបទ័ព្វ $(x'ox)$



4/ ដោះស្រាយអត្ថិភាព និងសញ្ញាបូសសមីការ $\left| \frac{x^2 - 8|x| + 16}{|x| - 3} \right| = m$

សមីការនេះ ជាសមីការអាបស៊ីសរវាងខ្សែកោង (C_3) និងបន្ទាត់ $y = m$ ស្រប ($x'ox$)

ដោយពិនិត្យតាមត្រកិច្ចយើងបានចំណេញក្នុងតារាងខាងក្រោម ។

m	អត្ថិភាព និងសញ្ញាបូសសមីការ តាមតំលៃនៃ m
$-\infty$	សមីការគ្មានបូស
0	សមីការមានបូសពីរ $x_1 = -4 < 0 < x_2 = 4$
	សមីការមានបូសបួន $x_1 < x_2 < 0 < x_3 < x_4$
4	សមីការមានបូសបួន $x_1 < x_2 = -2 < 0 < x_3 = 2 < x_4$
	សមីការមានបូសប្រាំមួយ $x_1 < x_2 < x_3 < 0 < x_4 < x_5 < x_6$
$\frac{16}{3}$	សមីការមានបូសប្រាំ $x_1 < x_2 < x_3 = 0 < x_4 < x_5$
$+\infty$	សមីការមានបូសបួន $x_1 < x_2 < 0 < x_3 < x_4$

លំហាត់

1/ សិក្សាទិសដោយមេរោត និងតួសខ្សែកោង (C)

តាងអនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{x^2 - 4x}{x^2 - 4x + 3}$ ក្នុងតំរុយអក្ខរកូនរមេ (oxy) ។

2/ តួសខ្សែកោង (C) កាត់ ($x'ox$) ត្រង់ O និង A ។ ស្រាយថាបន្ទាត់ចំខ្សែកោង (C) ត្រង់ O និង A កាត់គ្នាលើអ័ក្សឆ្លុះរបស់ខ្សែកោង (C) ។

3/ ដោះស្រាយអត្ថិភាព និងសញ្ញាបូសសមីការ $(m-1)x^2 - 4(m-1)x + 3m = 0$ ដោយពិភាក្សាទៅតាមតំលៃ m

ចំណើយ

1/ សិក្សាទិសដោយមេរោត និងតួសខ្សែកោង (C) តាងអនុគមន៍

$y = f(x) = \frac{x^2 - 4x}{x^2 - 4x + 3}$ ក្នុងតំរុយអក្ខរកូនរមេ (oxy) ។

ដែនកំនត់ $D = \mathbb{R} \setminus \{1, 3\}$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2 \left(1 - \frac{4}{x}\right)}{x^2 \left(1 - \frac{4}{x} + \frac{3}{x^2}\right)} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1 - \frac{4}{x}}{1 - \frac{4}{x} + \frac{3}{x^2}} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 4x}{x^2 - 4x + 3} = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 4x}{x^2 - 4x + 3} = \infty$$

$$f'(x) = \frac{u'v - v'u}{v^2} = \frac{6(x-2)}{(x^2-4x+3)^2}$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x-2 = 0 \Leftrightarrow x = 2$$

$$\text{បើ } x = 2 \Rightarrow y = f(2) = 4$$

តារាងទិសដៅអថេរភាព

x	$-\infty$	1	2	3	$+\infty$
$f'(x)$	-	-	+	+	+
$f(x)$	1 $\swarrow$ $-\infty$	$+\infty$ $\swarrow$ 4	$+\infty$ $\nearrow$ 4	$+\infty$ $\nearrow$ $-\infty$	1

អនុគមន៍មានតំលៃអប្បបរមាស្ថិតនៅ $x = 2$

កូសខ្សែកោង (C) តាងអនុគមន៍ $y = f(x)$

អាចស៊ើបចំនុចប្រសព្វរវាង (C) និង ($x'Ox$) ជាបួសរបស់សមីការ

$$\frac{x^2-4x}{(x^2-4x+3)^2} = 0 \Leftrightarrow x^2-4x = 0 \Leftrightarrow x(x-4) = 0$$

$\Rightarrow x_1 = 0 : x_2 = 4$ ខ្សែកោង (C) កាត់ ($x'Ox$) ត្រង់ចំនុចអាចស៊ើប $x = 0$ និង $x = 4$

អង្កេតចំនុចប្រសព្វរវាង (C) និង ($y'Oy$) គឺ $y = f(0) = 0$

អាស៊ីមតូតដេក $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 1 \Rightarrow$ បន្ទាត់ $y = 1$ ជាអាស៊ីមតូតដេក

អាស៊ីមតូតប្រសព្វ ($x'Ox$)

អាស៊ីមតូតឈរ $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \infty$

$\Rightarrow$ បន្ទាត់ $x = 1$ និង $x = 3$ ជាអាស៊ីមតូតឈរ

អំពូលៈ តាង $S(2, 4)$ តំពូលរបស់ខ្សែកោង


ក្នុងតំរុយ (XSY) យើងបាន តាមរូបមន្តដូរតំរុយ

$$x = 2+X, y = 4+Y \Leftrightarrow \text{សមីការ (C) អាចសរសេរ } 4+Y = \frac{(2+X)^2-4(2+X)}{(2+X)^2-4(2+X)+3}$$

$$Y = f(X) = \frac{X^2-4}{X^2-1}-4$$

$$f(-X) = \frac{(-X)^2-4}{(-X)^2-1}-4 = \frac{X^2-4}{X^2-1}-4 = f(X) \Rightarrow f(x) \text{ ជាអនុគមន៍គូ}$$

$\Rightarrow$ បន្ទាត់ ($Y'SY$) សមីការ $x = 2$ ជាអ័ក្សព្រះរបស់ខ្សែកោង (C)



2/ ស្រាយបន្ទាត់បីខ្សែកោង (C) ត្រង់ O និង A កាត់គ្នានៅលើអ័ក្សឆ្វេង
របស់ខ្សែកោង (C)

មេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់បីត្រង់ O គឺ $f'(0) = -\frac{4}{3}$

សមីការបន្ទាត់បីត្រង់ O គឺ $-\frac{4}{3} = \frac{y}{x} \Rightarrow y = -\frac{4}{3}x$

មេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់បីត្រង់ A គឺ $f'(4) = \frac{4}{3}$

សមីការបន្ទាត់បីត្រង់ A គឺ $A(4, 0): \frac{4}{3} = \frac{y}{x-4} \Leftrightarrow y = \frac{4}{3}x - \frac{16}{3}$

រកព្រំដោះនៃចំនុចប្រសព្វនៃបន្ទាត់បីទាំងពីរ $-\frac{4}{3}x = \frac{4}{3}x - \frac{16}{3}$

$$\Leftrightarrow -\frac{8x}{3} = -\frac{16}{3} \Leftrightarrow x = 2 \Rightarrow y = -\frac{8}{3} \Rightarrow \text{ចំនុចប្រសព្វស្ថិតនៅលើបន្ទាត់ } x = 2$$

ជាអ័ក្សឆ្វេងរបស់ខ្សែកោង (C)

3/ ដោះស្រាយអត្ថិភាព និងសញ្ញាបូសសមីការ $(m-1)x^2 - 4(m-1)x + 3m = 0$

សមីការអាចសរសេរ $mx^2 - x^2 - 4mx + 4x + 3m = 0 \Leftrightarrow$

$$m(x^2 - 4x + 3) = x^2 - 4x \Leftrightarrow \frac{x^2 - 4x}{4x + 3x^2} = m$$

ជាសមីការអាប់ស៊ីរោងខ្សែកោង (C) និងបន្ទាត់ $y = m$

m	អត្ថិភាព និងសញ្ញាបូសសមីការ
$-\infty$	សមីការមានឫសពីរ $0 < x_1 < x_2$
0	សមីការមានឫសពីរ $x_1 = 0 < x_2 = 4$
	សមីការមានឫសពីរ $x_1 < 0 < x_2$
1	សមីការមានឫសមួយ
4	សមីការមានឫសមួយ $0 < x_1 = x_2 = 2$
$+\infty$	សមីការមានឫសពីរ $0 < x_1 < x_2$

លំហាត់

1/ សិក្សាទិសដោយអាកាសនៃអនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{x^2 - 6x + 9}{x^2 - 7x + 10}$

2/ គូសខ្សែកោង (C) តាងអនុគមន៍នេះក្នុងតំបន់អន្តរកាល (oxy) ។

3/ ដោះស្រាយអត្ថិភាព និងសញ្ញាបូសសមីការ $\frac{(x-3)^2}{x^2 - 7x + 10} = m$
ដោយពិភាក្សាទៅតាម m

ចំណើន

1/ សិក្សាទិសដោយអាកាសនៃអនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{x^2 - 6x + 9}{x^2 - 7x + 10}$

ដែនកំណត់ $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{2, 5\}$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2 \left(1 - \frac{6}{x} + \frac{9}{x^2}\right)}{x^2 \left(1 - \frac{7}{x} + \frac{10}{x^2}\right)} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1 - \frac{6}{x} + \frac{9}{x^2}}{1 - \frac{7}{x} + \frac{10}{x^2}} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 6x + 9}{x^2 - 7x + 10} = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 5} f(x) = \lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - 6x + 9}{x^2 - 7x + 10} = \infty$$

$$f'(x) = \frac{u'v - v'u}{v^2} = \frac{-x^2 + 2x + 3}{(x^2 - 7x + 10)^2}$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow -x^2 + 2x + 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -1 \\ x_2 = 3 \end{cases}$$

$$x = -1 \Rightarrow y = f(-1) = \frac{8}{9}$$

$$x = 3 \Rightarrow y = f(3) = 0$$

x	$-\infty$	-1	2	3	5	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+	+	0	-
$f(x)$	1	$\frac{8}{9}$	$+\infty$	0	$-\infty$	1

អនុគមន៍មានតំលៃអប្បបរមានៅ $\frac{8}{9}$ ត្រង់ $x = -1$ ហើយមានតំលៃអតិបរមានៅ

ចំពោះ $x = 3$

2/ គូសខ្សែកោង (C) តាងអនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{x^2 - 6x + 9}{x^2 - 7x + 10}$

រាប់ស៊ីសចំនុចប្រសព្វកោង (C) និង $(x'0x)$ ជាបួនរបស់សមីការ

$$x^2 - 6x + 9 = 0 \Leftrightarrow x_1 = x_2 = 3 \Rightarrow \text{ខ្សែកោង (C) ប៉ះ (x'0x) ត្រង់ចំនុចរាប់ស៊ីស } x = 3$$

អរដេរេន្តចំនុចប្រសព្វកោង (C) និង $(y'0y)$ គឺ $y = f(0) = \frac{9}{10}$


$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow 5} f(x) = \infty \Rightarrow \text{បន្ទាត់ } x = 2 \text{ និង } x = 5 \text{ ជាអាស៊ីមតូតឈរ}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 1 \Rightarrow \text{បន្ទាត់ } y = 1 \text{ ជាអាស៊ីមតូតដក}$$

ខ្សែកោង (C) កាត់អាស៊ីមតូតដកសមីការ $y = 1$ ត្រង់ចំនុចមានរាប់ស៊ីសជាបួន

$$\text{សមីការ } \frac{x^2 - 6x + 9}{x^2 - 7x + 10} = 1 \Leftrightarrow x^2 - 6x + 9 = x^2 - 7x + 10 \Leftrightarrow x = 1$$

ខ្សែកោង (C) កាត់អាស៊ីមតូតដកត្រង់ចំនុច $(x = 1, y = 1)$



3/ ដោះស្រាយអត្ថិភាព និងសញ្ញាបួនសមីការ $\frac{(x-3)^2}{x^2 - 7x + 10} = m$

ដោយពិភាក្សាទៅតាម m

សមីការនេះ ជាអំពូលសមីការខ្សែកោង (C) និងបន្ទាត់អថេរ $y = m$ ស្រប $(x'0x)$

ដោយពិនិត្យលើក្រាហ្វិក យើងបានចំណេញពីតារាងខាងក្រោម

m	អត្ថិភាព និងសញ្ញាបូសសមីការ
$-\infty$	សមីការមានបូសពីរ $0 < x_1 < x_2$
0	សមីការមានបូសឌុប $x_1 = x_2 = 3 > 0$ សមីការគ្មានបូស
$\frac{8}{9}$	សមីការមានបូសឌុប $x_1 = x_2 = -1 < 0$ សមីការមានបូសពីរ $x_1 < x_2 < 0$
$\frac{9}{10}$	សមីការមានបូសពីរ $x_1 < x_2 = 0$ សមីការមានបូសពីរ $x_1 < 0 < x_2$
1	សមីការមានបូសមួយ $x = 1 > 0$
$+\infty$	សមីការមានបូសពីរ $0 < x_1 < x_2$

លំហាត់

អោយអនុគមន៍ $f(x) = (x-m)^3 - 3x + m + 2$ ដែលមានខ្សែកោងតំណាង (C_m) ។

- ស្រាយបញ្ជាក់ថា $\forall m \in \mathbb{R}$ អនុគមន៍នេះមានតំលៃអតិបរមាមួយ និងអប្បបរមាមួយជានិច្ច រឺខ្សែកោង (C_m) មានកំពូលពីរ ។
- កំណត់ m ដើម្បីអោយអនុគមន៍
 - កើនក្នុងចន្លោះ $] -\infty ; -5]$
 - កើនក្នុងចន្លោះ $[1 ; +\infty [$
- រកតំលៃ m ដើម្បីអោយអនុគមន៍មានតំលៃអតិបរមាគ្រប់ $x = -1$ ។ ចំពោះតំលៃ m ដែលរកឃើញគូសខ្សែកោង (C) តាងអនុគមន៍នេះក្នុងតំបន់អក្សរមេ (oxy) ។
- រកគ្រប់សមីការបន្ទាត់ប៉ះខ្សែកោង (C) ដែលផ្គុំជាមួយ $(x'ox)$ បានមុំ $\frac{\pi}{4}$ កំណត់ដោយ $tg \frac{\pi}{4} = 9$ ។
- ដោះស្រាយអត្ថិភាព និងសញ្ញាបូសសមីការ $x^3 - 3x + 2 - K = 0$ ដោយពិភាក្សាតាមតំលៃ K

ចំណើយ

- ស្រាយបញ្ជាក់ថា $\forall m \in \mathbb{R}$ អនុគមន៍នេះមានតំលៃអតិបរមាមួយ និងអប្បបរមាមួយជានិច្ច រឺខ្សែកោង (C_m) មានកំពូលពីរ ។

អនុគមន៍នេះមានដែនកំណត់ $\mathcal{D} = \mathbb{R}$ ព្រោះជាអនុគមន៍ពហុធា

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x^3 = \pm\infty$$

$$f(x) = 3(x-m)^2 - 3 = 3(x-m+1)(x-m-1)$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow (x-m+1)(x-m-1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = m-1 \\ x = m+1 \end{cases}$$

$$-1 < 1 \Rightarrow \forall m \in \mathbb{R}, \quad m-1 < m+1$$

ដូច្នេះ $\forall m \in \mathbb{R}, f(x)$ មានឫសពីរ $x_1 = m-1$ និង $x_2 = m+1$

ផ្សេងគ្នាជានិច្ច មានន័យជាអនុគមន៍ មានតំលៃអតិបរមាមួយ និងអប្បបរមាមួយជានិច្ច វិស្វកោង (C_m) មានកំពូលពីរ ។

2. កំនត់ m ដើម្បីអោយអនុគមន៍

ក. កើនក្នុងចន្លោះ $]-\infty; -5]$

ខ. កើនក្នុងចន្លោះ $[1; +\infty[$

តារាងទិន្នន័យដោយស្របតាមអនុគមន៍

x	$-\infty$	$m-1$	$m+1$	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	0	+
$f(x)$	$-\infty$	អតិបរមា	អប្បបរមា	$+\infty$

ដោយពិនិត្យលើតារាងទិន្នន័យដោយស្របតាម យើងបាន

អនុគមន៍កើនក្នុងចន្លោះ $]-\infty; -5]$ លុះត្រាតែ

$$]-\infty; -5] \subset]-\infty; m-1] \Rightarrow -5 \leq m-1$$

$$\Rightarrow -4 \leq m \quad \text{ឬ} \quad m \geq -4 \quad \text{ឬ} \quad m \in [-4; +\infty[$$

អនុគមន៍កើនក្នុងចន្លោះ $[1; +\infty[$ លុះត្រាតែ

$$[1; +\infty[\subset [m+1; +\infty[\Rightarrow m+1 \leq 1$$

$$\Rightarrow m \leq 0 \quad ; \quad m \in]-\infty; 0]$$

3. រកតំលៃ m ដើម្បីអោយអនុគមន៍មានតំលៃអតិបរមាត្រង់ $x = -1$ ។

ដោយពិនិត្យលើតារាងទិន្នន័យដោយស្របតាម យើងបាន អនុគមន៍មានតំលៃអតិបរមាត្រង់ $x = m-1$ យើងចង់បានអនុគមន៍មានតំលៃអតិបរមាត្រង់ $x = -1$ ដូច្នេះ យើងត្រូវយក

$$m-1 = -1 \Rightarrow m = 0$$

បើ $m = 0$ អនុគមន៍អោយទៅជា $y = x^3 - 3x + 2$

គូសខ្សែកោង (C) តាមអនុគមន៍ $y = x^3 - 3x + 2$

$$D = \mathbb{R}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x^3 = \pm\infty$$

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x+1)(x-1)$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -1 \Rightarrow y_1 = 4 \\ x_2 = 1 \Rightarrow y_2 = 0 \end{cases}$$

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	0	+
$f(x)$	$-\infty$	4	0	$+\infty$

រាប់ស៊ីស្ទង់ចុចប្រសព្វរវាងខ្សែកោង (C) និង ($x'Ox$) ជាបួននៃសមីការ $x^3 - 3x + 2 = 0$

តាង $P(x) = x^3 - 3x + 2$ ដោយ $P(1) = 1 - 3 + 2 = 0 \Rightarrow x = 1$ ជាឫសនៃ $P(x)$

$\Rightarrow P(x)$ ចែកដាច់នឹង $x-1$

$$\begin{array}{r}
 x^3 \quad -3x \quad +2 \\
 -x^3 + x^2 \\
 \hline
 x^2 -3x +2 \\
 -x^2 + x \\
 \hline
 -2x +2 \\
 +2x -2 \\
 \hline
 0 \quad 0
 \end{array}$$

$$\begin{array}{r}
 x-1 \\
 x^2+x-2 \\
 \hline
 \end{array}$$

យើងបាន $P(x) = (x-1)(x^2+x-2) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x=1 \\ x^2+x-2=0 \end{cases}$

$x^2+x-2=0$ ជាសមីការដឺក្រេទី 2 នៃ x ដែលមានឫស

$x=1$ និង $x=-2$

ដូច្នេះ យើងបាន $x_1 = x_2 = 1$ និង $x_3 = -2$ មានន័យថា

ខ្សែកោង (C) ប៉ះ $(x'Ox)$ ត្រង់ $x=1$ ហើយកាត់ $(x'Ox)$ ត្រង់ $x=-2$


អរដេរីវេចំនុចប្រសព្វរវាង (C) និង $(y'Oy)$ គឺ $y=f(0)=2$

ចំនុចរបត់ $y''=f''(x)=6x$, $f''(x)=0 \Leftrightarrow$

$6x=0 \Leftrightarrow x=0 \Rightarrow y=f(0)=2$

ដូច្នេះ ចំនុចរបត់ I មានកូអរដោនេ $x=0$, $y_1=2$ ។

$I(0;2)$ ជាផ្ចិតឆ្លុះរបស់ខ្សែកោង ។



4/. រកគ្រប់សមីការបន្ទាត់ប៉ះខ្សែកោង (C) ដែលផ្គុំជាមួយ $(x'Ox)$ បានមុំ α កំនត់ដោយ $\lg \alpha = 9$ ។

តាង $M(x, y)$ ចំនុចនៅលើខ្សែកោង (C) ដែលបន្ទាត់ប៉ះត្រង់ចំនុចនោះ ផ្គុំជាមួយ $(x'Ox)$ បានមុំ α កំនត់ដោយ $\lg \alpha = 9$ ។

យើងបាន មេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ប៉ះខ្សែកោង (C) ត្រង់ M គឺ 9

តាមបំរែកស្រាយតាមធរណីមាត្រនៃដេរីវេ មេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ប៉ះខ្សែកោង (C) ត្រង់ M គឺជាដេរីវេទីមួយត្រង់ M គឺ $f'(x) = 3x^2 - 3$

យើងទាញបាន $3x^2 - 3 = 9 \Leftrightarrow x^2 - 1 = 3 \Leftrightarrow$

$x^2 = 4 \Leftrightarrow \begin{cases} x=-2 \Rightarrow y=0 & M_1 \\ x=2 \Rightarrow y=4 & M_2 \end{cases}$

រកសមីការបន្ទាត់ប៉ះខ្សែកោង (C) ត្រង់ $M_1(-2; 0)$

$9 = \frac{y}{x+2} \Leftrightarrow y = 9x + 18$

រកសមីការបន្ទាត់ប៉ះខ្សែកោង (C) ត្រង់ $M_2(2; 4)$

$9 = \frac{y-4}{x-2} \Leftrightarrow y-4 = 9x-18 \Leftrightarrow y = 9x-14$

បន្ទាត់ប៉ះខ្សែកោង (C) ដែលផ្គុំជាមួយ $(x'Ox)$ បានមុំ α

កំនត់ដោយ $\lg \alpha = 9$ មានពីរ ដែលមានសមីការ

$y = 9x + 18$ ប៉ះ (C) ត្រង់ចំនុច $(-2; 0)$

$y = 9x - 14$ ប៉ះ (C) ត្រង់ចំនុច $(2; 4)$

5/. ដោះស្រាយអក្ខិកា និងសញ្ញាបូសសមីការ $x^3 - 3x + 2 - K = 0 \Leftrightarrow x^3 - 3x + 2 = K$
ជាសមីការអាប់ស៊ីសរវាងខ្សែកោង (C) និងបន្ទាត់ $y = K$

ដោយពិនិត្យលើក្រាហ្វិក យើងបានចំណេញក្នុងតារាងខាងក្រោម

K	អក្ខិកា និងសញ្ញាបូសសមីការ
$-\infty$	សមីការមានបូសមួយ $x < 0$
0	សមីការមានបូសពីរ $x_1 = -2 < 0 < x_2 = 1$
	សមីការមានបូសបី $x_1 < 0 < x_2 < x_3$
2	សមីការមានបូសបី $x_1 < x_2 = 0 < x_3$
	សមីការមានបូសបី $x_1 < x_2 < 0 < x_3$
4	សមីការមានបូសពីរ $x_1 = -1 < 0 < x_2 = 2$
$+\infty$	សមីការមានបូសមួយ $x > 0$

លំហាត់

1/. (C_a) ជាខ្សែកោងតាងអនុគមន៍ $y = \frac{x^2 - 4x \sin a - 3 \cos 2a}{x^2 + 1}$ ដែល $a \in [0, 2\pi]$ ។

ក. ស្រាយបញ្ជាក់ថា $\forall a \in [0, 2\pi]$: ខ្សែកោង (C_a) កាត់ $(x'0x)$ បានពីរចំនុច $M_1(x_1)$, $M_2(x_2)$ ផ្សេងគ្នាជានិច្ច

ខ. សរសេរទំនាក់ទំនងគ្នានៃ a រវាង x_1 និង x_2

គ. គណនា $|M_1 M_2|$

2/. កំនត់ $a \in [0, 2\pi]$ ដើម្បីអោយ $|M_1 M_2|$

ក. មានតំលៃអតិបរមា

ខ. មានតំលៃអប្បបរមា

3/. កំនត់ a ដើម្បីអោយ

ក. M_1 និង M_2 នៅតែម្ខាងនៃគល់ 0

ខ. M_1 និង M_2 មិននៅតែម្ខាងនៃគល់ 0

គ. M_1 និង M_2 ឆ្លុះគ្នាជៀបនឹងគល់ 0

ចំណើយ

1/.

ក. ស្រាយបញ្ជាក់ថា $\forall a \in [0, 2\pi]$ ខ្សែកោង (C_a) កាត់ $(x'0x)$ បានពីរចំនុច $M_1(x_1)$ និង $M_2(x_2)$ ផ្សេងគ្នាជានិច្ច

$$\text{អនុគមន៍ } y = \frac{x^2 - 4x \sin a - 3 \cos 2a}{x^2 + 1} \text{ មានដែនកំនត់ } \mathcal{D} = \mathbb{R}$$

យើងដឹងថា អ័ស្សីសច្ចុប្បសព្វរវាងខ្សែកោង (C_a) និង $(x'Ox)$ ជាបូសនៃសមីការ

$$\frac{x^2 - 4x \sin a - 3 \cos 2a}{x^2 + 1} = 0 \Leftrightarrow x^2 - 4x \sin a - 3 \cos 2a = 0 \quad (1)$$

ដូច្នេះ ដើម្បីស្រាយថា $\forall a \in [0, 2\pi]$ ខ្សែកោង (C_a) កាត់ $(x'Ox)$ បានពីរចំណុច $M_1(x_1)$ និង $M_2(x_2)$ ផ្សេងគ្នាជានិច្ច នោះយើងត្រូវស្រាយថា សមីការ (1) មានបូសពីរ x_1 និង x_2 ផ្សេងគ្នាជានិច្ច $\forall a \in [0, 2\pi]$

សមីការ (1) មាន $\Delta' = b'^2 - ac = 4 \sin^2 a + 3 \cos 2a =$
 $= 4 \sin^2 a + 3(\cos^2 a - \sin^2 a) = 4 \sin^2 a + 3(1 - \sin^2 a - \sin^2 a)$
 $= 4 \sin^2 a + 3 - 6 \sin^2 a = 3 - 2 \sin^2 a = 1 + 2 - 2 \sin^2 a$
 $= 1 + 2(1 - \sin^2 a) = 1 + 2 \cos^2 a > 0 ; \quad \forall a \in [0, 2\pi]$

ដោយ $\Delta' = 1 + 2 \cos^2 a > 0$, $\forall a \in [0, 2\pi]$ នោះសមីការ (1) មានបូសពីរ x_1 និង x_2 ផ្សេងគ្នាជានិច្ច ដូច្នេះខ្សែកោង (C_a) កាត់ $(x'Ox)$ បានពីរចំណុច $M_1(x_1)$ និង $M_2(x_2)$ ផ្សេងគ្នាជានិច្ច ។

ខ. សរសេរទំនាក់ទំនងគ្នានៃ a រវាង x_1 និង x_2

x_1 និង x_2 ជាបូសនៃសមីការ (1) យើងបាន

$$P = x_1 x_2 = \frac{c}{a} = -3 \cos 2a = -3(\cos^2 a - \sin^2 a)$$

$$= -3(1 - \sin^2 a - \sin^2 a) = -3(1 - 2 \sin^2 a) = -3 + 6 \sin^2 a$$

$$S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = 4 \sin a \Rightarrow \sin a = \frac{S}{4} \Rightarrow$$

$$P = -3 + 6 \left(\frac{S}{4}\right)^2 = -3 + 6 \frac{S^2}{16} = -3 + \frac{S^2}{8} \Rightarrow$$

$$8P = -24 + S^2 \Rightarrow S^2 - 8P - 24 = 0 \Rightarrow$$

$$(x_1 + x_2)^2 - 8x_1 x_2 - 24 = 0$$

គ. គណនា $|M_1 M_2|$, $\overline{OM}_1 = x_1$, $\overline{OM}_2 = x_2$

$$\overline{M_1 M_2} = \overline{OM}_2 - \overline{OM}_1 = x_2 - x_1$$

$$|M_1 M_2| = |\overline{M_1 M_2}| = |\overline{OM}_2 - \overline{OM}_1| = |x_2 - x_1|$$

$$= \left| \frac{-b' + \sqrt{\Delta'}}{a} - \frac{-b' - \sqrt{\Delta'}}{a} \right| = \left| \frac{2\sqrt{\Delta'}}{a} \right| = \left| \frac{2\sqrt{\Delta'}}{1} \right|$$

$$= 2\sqrt{\Delta'} = 2\sqrt{1 + \cos^2 a}$$

$$|M_1 M_2| = 2\sqrt{1 + \cos^2 a}$$

ឃ. កំណត់ $a \in [0, 2\pi]$

ក. ដើម្បីអោយ $|M_1 M_2|$ មានតំលៃអតិបរមា

$$\forall a \in [0, 2\pi] ; \quad \text{យើងបាន} \quad 0 \leq \cos^2 a \leq 1$$

អតិបរមានៃ $|M_1 M_2|$ គឺអតិបរមានៃ $\cos^2 a$ តែ $\cos^2 a$ មានតំលៃអតិបរមា កាលណា $\cos^2 a = 1$

$$\cos^2 a = 1 \Leftrightarrow \cos a = \pm 1 \Leftrightarrow a = K\pi$$

$$K = 0 \Rightarrow a = 0$$

$$K = 1 \Rightarrow a = \pi$$

$$K = 2 \Rightarrow a = 2\pi$$

$$a \in \{0 ; \pi ; 2\pi\}$$

ខ. ដើម្បីអោយ $|M_1 M_2|$ មានតំលៃអប្បបរមា

អប្បបរមានៃ $|M_1 M_2|$ គឺអប្បបរមានៃ $\cos^2 a$; $\cos^2 a$ អប្បបរមា

កាលណា $\cos^2 a = 0 \Leftrightarrow \cos a = 0 \Leftrightarrow a = \frac{\pi}{2} + K\pi$

$$K = 0 \Rightarrow a = \frac{\pi}{2}$$

$$K = 1 \Rightarrow a = \frac{\pi}{2} + \pi = \frac{3\pi}{2}$$

$$a \in \left\{ \frac{\pi}{2} ; \frac{3\pi}{2} \right\}$$

3/ កំណត់ a ដើម្បីរក

ក. ដើម្បីរក M_1 និង M_2 នៅតែមានន័យគល់ O

$$\begin{cases} M_1, M_2 \text{ នៅតែខាងឆ្វេងគល់ } O \Rightarrow x_1 < x_2 < 0 \Rightarrow P = x_1 x_2 > 0 \\ M_1, M_2 \text{ នៅតែខាងស្តាំគល់ } O \Rightarrow 0 < x_1 < x_2 \Rightarrow P = x_1 x_2 > 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow P = \frac{c}{a} = -3\cos 2a > 0 \Rightarrow \cos 2a < 0 \Leftrightarrow$$

$$\frac{\pi}{2} + K2\pi < 2a < \frac{3\pi}{2} + K2\pi \Leftrightarrow \frac{\pi}{4} + K\pi < a < \frac{3\pi}{4} + K\pi$$

$$K = 0 \Rightarrow \frac{\pi}{4} < a < \frac{3\pi}{4}$$

$$K = 1 \Rightarrow \pi + \frac{\pi}{4} = \frac{5\pi}{4} < a < \frac{3\pi}{4} + \pi = \frac{7\pi}{4}$$

$$a \in] \frac{\pi}{4} ; \frac{3\pi}{4} [\cup] \frac{5\pi}{4} ; \frac{7\pi}{4} [$$

ខ. ដើម្បីរក M_1 និង M_2 មិននៅតែមានន័យគល់ O

បើ M_1 និង M_2 មិននៅតែមានន័យគល់ O នោះ M_1 និង M_2 នៅសងខាងគល់ $O \Rightarrow x_1 < 0 < x_2$ រឺ $x_2 < 0 < x_1 \Rightarrow P = x_1 x_2 < 0$

$$\Rightarrow -3\cos 2a < 0 \Rightarrow \cos 2a > 0 \Rightarrow$$

$$\begin{cases} K2\pi < 2a < \frac{\pi}{2} + K2\pi \\ \frac{3\pi}{2} + K2\pi < 2a < 2\pi + K2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} K\pi < a < \frac{\pi}{4} + K\pi \\ \frac{3\pi}{4} + K\pi < a < \pi + K\pi \end{cases}$$

$$K = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 0 < a < \frac{\pi}{4} \\ \frac{3\pi}{4} < a < \pi \end{cases}$$

$$K = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} \pi < a < \frac{\pi}{4} + \pi = \frac{5\pi}{4} \\ \frac{3\pi}{4} + \pi = \frac{7\pi}{4} < a < 2\pi \end{cases}$$

$$a \in]0, \frac{\pi}{4} \cup \frac{3\pi}{4} ; \pi[\cup] \frac{5\pi}{4} ; \frac{7\pi}{4} ; 2\pi[$$

គ. ដើម្បីរក M_1 ឬ M_2 ធៀបគល់ O លុះត្រាតែ O ចំនុចកណ្តាលនៃ

$$|M_1 M_2| \Rightarrow \overline{OM_1} + \overline{OM_2} = 0 \Leftrightarrow x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = 0$$

$$-4\sin a = 0 \Rightarrow \sin a = 0 \Rightarrow a = K\pi, K = 0, 1, 2$$

$$a \in \{0, \pi, 2\pi\}$$


វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យាប្រឡងសញ្ញាប័ត្រឡើយសិក្សាភីរិត ២៩៖ ទូទៅ និង

បំពេញវិជ្ជា សម័យប្រឡងឆ្នាំ ២០១២ ខែមិថុនា ឆ្នាំ ១៩៩៩

I. រកដែនកំនត់នៃអនុគមន៍ $y = \lg(\sqrt{x-1} - \sqrt{7-x}) + \sqrt{\cos x}$

$$\text{ចំណេញ} \text{ អនុគមន៍នេះមានន័យលុះត្រាតែ } \begin{cases} (\sqrt{x-1} - \sqrt{7-x}) > 0 \\ \cos x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} x-1 \geq 0 \\ 7-x \geq 0 \\ \sqrt{x-1} > \sqrt{7-x} \\ \cos x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 1 \\ x \leq 7 \\ x-1 > 7-x \\ \cos x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 4 \\ x \leq 7 \\ \cos x \geq 0 \end{cases}$$



$$\Leftrightarrow \begin{cases} x > 4 \\ x \geq 7 \\ \cos x \geq 0 \end{cases}$$

យើងត្រូវយក $\frac{3\pi}{2} \leq x \leq 7$

ដូច្នេះយើងបានដែនកំនត់

$$\mathcal{D} = \left[\frac{3\pi}{2} ; 7 \right]$$

II. គណនា $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x^2}{\sin \pi x}$ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a - \sqrt{a^2 - x^2}}{x^2}$ បើ $a > 0$

លើក $\sin(mx + k\pi) = \begin{cases} \sin mx & \text{បើ } k \text{ គូ} \\ -\sin mx & \text{បើ } k \text{ សេស} \end{cases}$

ឧទាហរណ៍ $\sin(3x \mp 3\pi) = -\sin 3x$; $k = \pm 3$ សេស
 $\sin(\pi x \mp \pi) = -\sin \pi x$; $k = \pm 1$ សេស
 $\sin(\pi x \mp 4\pi) = \sin \pi x$; $k = \pm 4$ គូ

តាង $X = x - 1 \Rightarrow x = X + 1$
 $x \rightarrow 1 \quad X \rightarrow 0$
 $1 - x^2 = 1 - (X + 1)^2 = -X(2 + X)$

$\sin \pi x = \sin \pi(X + 1) = \sin(\pi X + \pi) = \sin \pi X$ ព្រោះ $k = 1$ សេស

ដូច្នេះ $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{1-x^2}{\sin \pi x} = \lim_{X \rightarrow 0} \frac{-X(X+2)}{-\sin \pi X} = \lim_{X \rightarrow 0} \frac{X}{\sin \pi X} (X+2)$

$= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{X \cdot \frac{X}{X}}{\pi X \frac{\sin \pi X}{\pi X}} (X+2) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{\pi} \frac{1}{\frac{\sin \pi X}{\pi X}} (X+2) = \boxed{\frac{2}{\pi}}$

$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{a - \sqrt{a^2 - x^2}}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(a - \sqrt{a^2 - x^2})(a + \sqrt{a^2 - x^2})}{x^2(a + \sqrt{a^2 - x^2})}$
 $= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2(a + \sqrt{a^2 - x^2})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{(a + \sqrt{a^2 - x^2})} = \boxed{\frac{1}{2a}}$

II. រកអនុគមន៍ $f(x) = \frac{1 - \cos x}{1 + \cos x}$

ក. រកដែនកំណត់ រួចស្រាយ $f(x)$ ជាអនុគមន៍គូ

ខ. គណនា $f'(x)$ រួចរក $f'(100\pi)$; $f'\left(\frac{175\pi}{2}\right)$

គ. រក x ដើម្បីរក $f(x) = f'(x)$

ចំណេះ

ក. $1 + \cos x = 0 \Leftrightarrow \cos x = -1 \Leftrightarrow x = \pi + k2\pi$

ដូច្នេះ $D = \mathbb{R} \setminus \{\pi + k2\pi\}$

ស្រាយថា $f(x)$ ជាអនុគមន៍គូ ត្រូវរកដោយបាន $\forall x \in D, f(-x) = f(x)$

$\forall x \in D, f(-x) = \frac{1 - \cos(-x)}{1 + \cos(-x)} = \frac{1 - \cos x}{1 + \cos x} = f(x) \Rightarrow$

$f(x)$ ជាអនុគមន៍គូក្នុង D

ខ. គណនា $f'(x) = \frac{u'v - v'u}{v^2}$

$u = 1 - \cos x \Rightarrow u' = \sin x$

$v = 1 + \cos x \Rightarrow v' = -\sin x$

$f'(x) = \frac{\sin x(1 + \cos x) + \sin x(1 - \cos x)}{(1 + \cos x)^2} = \frac{2 \sin x}{(1 + \cos x)^2}$

$\sin k\pi = 0 \quad \cos k\pi = \begin{cases} 1 & \text{បើ } k \text{ គូ} \\ -1 & \text{បើ } k \text{ សេស} \end{cases}$

$\sin\left(\frac{\pi}{2} + k\pi\right) = \begin{cases} 1 & \text{បើ } k \text{ គូ} \\ -1 & \text{បើ } k \text{ សេស} \end{cases} \quad \cos\left(\frac{\pi}{2} + k\pi\right) = 0$

$f'(100\pi) = \frac{2 \sin 100\pi}{(1 + \cos 100\pi)^2} = \frac{0}{(1 + 1)^2} = \frac{0}{4} = 0$

$\frac{175\pi}{2} = \frac{\pi}{2} + \frac{174\pi}{2} = \frac{\pi}{2} + 87\pi, \quad k = 87 \text{ សេស}$

$f'\left(\frac{175\pi}{2}\right) = f'\left(\frac{\pi}{2} + 87\pi\right) = \frac{2 \sin\left(\frac{\pi}{2} + 87\pi\right)}{\left[1 + \cos\left(\frac{\pi}{2} + \frac{87\pi}{2}\right)\right]^2} = \frac{2(-1)}{(1 + 0)^2} = \boxed{-2}$

ក. រក x ដើម្បីអោយ $f(x) = f'(x)$

$$f(x) = f'(x) \Leftrightarrow \frac{1 - \cos x}{1 + \cos x} = \frac{2 \sin x}{(1 + \cos x)^2} \Leftrightarrow$$

$$(1 - \cos x)(1 + \cos x) = 2 \sin x \Leftrightarrow 1 - \cos^2 x = 2 \sin x$$

$$\Leftrightarrow \sin^2 x - 2 \sin x = 0 \Leftrightarrow \sin x (\sin x - 2) = 0$$

ដោយ $\sin x \leq 1 < 2 \Rightarrow \sin x - 2 < 0$ ដូច្នេះ

$$\sin x (\sin x - 2) = 0 \Leftrightarrow \sin x = 0 \Leftrightarrow x = \begin{cases} k2\pi \in \mathcal{D} \\ \pi + k2\pi \in \mathcal{D} \end{cases}$$

ដូច្នេះ យើងបានចំណេះ

$x = k2\pi ; k \in \mathbb{Z}$

IV. អោយអនុគមន៍ $g(x) = 29x^2 + 6x + 1995$

បើ $a > 0$ និង $b > 0$ ស្រាយបញ្ជាក់ថា

$$g\left(\frac{a+b}{1+a+b}\right) < g\left(\frac{a}{1+a} + \frac{b}{1+b}\right)$$

យើងអាចស្រាយបានពីរបៀបផ្សេងគ្នា

របៀបទី ១ តាមនិយមន័យ $M < N$ គឺ រក $M - N < 0$

ពី $0 < a \Rightarrow 1 < 1+a < 1+a+b \Rightarrow$

$$0 < \frac{1}{1+a+b} < \frac{1}{1+a} \Rightarrow 0 < \frac{a}{1+a+b} < \frac{a}{1+a} \quad (1)$$

ពី $0 < b \Rightarrow 1 < 1+b < 1+a+b \Rightarrow$

$$0 < \frac{1}{1+a+b} < \frac{1}{1+b} \Rightarrow 0 < \frac{a}{1+a+b} < \frac{a}{1+b} \quad (2)$$

$$(1) + (2) \Rightarrow 0 < \frac{a+b}{1+a+b} = A < \frac{a}{1+a} + \frac{b}{1+b} = B$$

ដើម្បីស្រាយ $g\left(\frac{a+b}{1+a+b}\right) = g(A) < g\left(\frac{a}{1+a} + \frac{b}{1+b}\right) = g(B)$

ត្រូវរកអោយបាន $g(A) - g(B) < 0$

យើង បានរកឃើញ $0 < A = \frac{a+b}{1+a+b} < B = \frac{a}{1+a} + \frac{b}{1+b}$

មានន័យថាយើងបាន $A - B < 0$

$$g\left(\frac{a+b}{1+a+b}\right) = g(A) = 29A^2 + 6A + 1995$$

$$g\left(\frac{a}{1+a} + \frac{b}{1+b}\right) = g(B) = 29B^2 + 6B + 1995$$

$$g(A) - g(B) = 29A^2 + 29B^2 + 6A + 6B = 29(A+B)(A-B) + 6(A-B)$$

$$= (A-B)[26((A+B)+6)]$$

ដោយ $A - B < 0$

$$26(A+B)+6 > 0 \quad \left| \Rightarrow g(A) - g(B) < 0 \Rightarrow \right.$$

$$g(A) < g(B) \Rightarrow g\left(\frac{a+b}{1+a+b}\right) < g\left(\frac{a}{1+a} + \frac{b}{1+b}\right)$$

ដូច្នេះ បើ $a > 0$ និង $b > 0$ យើងបាន

$g\left(\frac{a+b}{1+a+b}\right) < g\left(\frac{a}{1+a} + \frac{b}{1+b}\right)$

របៀបទី ២ ប្រើដេរីវេ

បើ $g(x)$ កើនក្នុងចន្លោះ $\mathcal{D}_2$ គឺ $\forall x \in \mathcal{D}_2 ; g'(x) > 0$

មានន័យថា $\forall \alpha, \beta \in \mathcal{D}_2$ បើ $\alpha < \beta$ នោះយើងបាន $g(\alpha) < g(\beta)$

ដំបូងយើងត្រូវស្រាយ : $a < \frac{a+b}{a+1+b} < \frac{a}{1+a} + \frac{b}{1+b}$

$$0 < a \Rightarrow 1 < 1+a < 1+a+b \Rightarrow 0 < \frac{1}{1+a+b} < \frac{1}{1+a} \Rightarrow 0 < \frac{a}{1+a+b} < \frac{a}{1+a} \quad (1)$$

$$0 < b \Rightarrow 1 < 1+b < 1+a+b \Rightarrow 0 < \frac{1}{1+a+b} < \frac{1}{1+b} \Rightarrow 0 < \frac{b}{1+a+b} < \frac{b}{1+b} \quad (2)$$

$$(1) + (2) \Rightarrow 0 < \frac{a+b}{1+a+b} < \frac{a}{1+a} + \frac{b}{1+b}$$

$g(x) = 29x^2 + 6x + 1995$ ជាអនុគមន៍ត្រីការ៉េ មានដែនកំនត់

$$D = \mathbb{R} \cdot \lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} 29x^2 = +\infty$$

$$g'(x) = 58x + 6$$

$$g'(x) = 0 \Leftrightarrow 58x + 6 = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{3}{29}$$

x	$-\infty$	$-\frac{3}{29}$	$+\infty$
$g'(x)$	-	0	+
$g(x)$	$+\infty$		$+\infty$

អប្បបរមា

គង់ $D_2 =]-\frac{3}{29}; +\infty[$, ដែល $\forall x \in D_2, g'(x) > 0$

$\Rightarrow g(x)$ កើនក្នុងចន្លោះ D_2 ដូច្នេះយើងបាន

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{a+b}{1+a+b} < \frac{a}{1+a} + \frac{b}{1+b} \\ \frac{a+b}{1+a+b} < \frac{a}{1+a} + \frac{b}{1+b} \end{array} \right\} \Rightarrow \text{តាមលក្ខណៈអនុគមន៍កើន}$$

$$g\left(\frac{a+b}{1+a+b}\right) < g\left(\frac{a}{1+a} + \frac{b}{1+b}\right)$$

V. គណនា $F(x) = \int \frac{4x^2 - 5x^3 + 2}{x^3} dx$ បើ $F(1) = -4$

$$F(x) = \int \frac{4x^2 - 5x^3 + 2}{x^3} dx = \int 4x dx - \int 5dx + \int \frac{2}{x^3} dx$$

$$= 4 \int x dx - 5 \int dx + 2 \int \frac{dx}{x^3} = 2x^2 - 5x - \frac{1}{x^2} + c$$


$$F(1) = -4 \Leftrightarrow 2 - 5 - 1 + c = -4 \Leftrightarrow c = 0$$

ដូច្នេះ: $F(x) = 2x^2 - 5x - \frac{1}{x^2}$

VI. មានប្រលេតិច៊ែតត្រង់មួយដែលជ្រុងបាតមានរង្វាស់ 3cm និង 4cm ហើយមុំដែលផ្គុំដោយជ្រុងទាំងពីរនេះមានរង្វាស់ 120° ។ រង្វាស់ទ្រនុងខាងទីមួយ។ ជាមធ្យមធរណីមាត្រនៃរង្វាស់ជ្រុងបាត ។

គណនារង្វាស់អង្កត់ទ្រូងប្រលេតិច៊ែតនោះ ។


ចំលើយ



គង់ $ABCD A'B'C'D'$ ជាប្រលេតិច៊ែតតែងក្នុងសំនួរ បាត $ABCD$ និង $A'B'C'D'$ ជាប្រលេឡូក្រាមច្រើនគ្នា
 $|AB| = 4\text{cm}$, $|AD| = 3\text{cm}$
 $\widehat{ABD} = 120^\circ$
 $\Rightarrow \widehat{ABC} = 60^\circ$

តាមសម្មតិកម្ម ទ្រនុងខាងមធ្យមធរណីមាត្រនៃជ្រុងបាត
 $|AA'|^2 = 4.3 = 12 \Rightarrow |AA'| = 2\sqrt{3}\text{cm}$

មុខកាត់ទ្រូង $AA'C'C$ និង $BB'D'D$ ជាចតុកោណកែងដែលមាន អង្កត់ទ្រូង
ប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំណុច



រក $|AC|$ និង $|BD|$ $\cos 60^\circ = \frac{1}{2}$; $\cos 120^\circ = -\cos 60^\circ = -\frac{1}{2}$

ក្នុងត្រីកោណ ABC តាមទ្រឹស្តីបទកូស៊ីនុស យើងបាន

$$|AC|^2 = |BA|^2 + |BC|^2 - 2|BA||BC|\cos \widehat{ABC} = 4^2 + 3^2 - 2 \cdot 4 \cdot 3 \cdot \frac{1}{2}$$

$$= 25 - 12 = 13 \Rightarrow |AC| = \sqrt{13}$$

តាមទ្រឹស្តីបទកូស៊ីនុសអនុវត្តក្នុងត្រីកោណ ABD

$$|BD|^2 = |AB|^2 + |AD|^2 - 2|AB||AD|\cos \widehat{BAD} = 4^2 + 3^2 - 2 \cdot 4 \cdot 3 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$= 25 + 12 = 37 \Rightarrow |BD| = \sqrt{37}$$

គណនាអង្កត់ទ្រូង $|A'C|$ និង $|B'D|$

ក្នុងត្រីកោណ $AA'C$ កែងត្រង់ A

$$|A'C|^2 = |AA'|^2 + |AC|^2 = 12 + 13 = 25$$

$$\Rightarrow |A'C| = \sqrt{25} = 5 \text{ cm}$$

ក្នុងត្រីកោណ $B'DD$ កែងត្រង់ B

$$|B'D|^2 = |BB'|^2 + |BD|^2 = 12 + 37 = 49$$


$$\Rightarrow |B'D| = \sqrt{49} = 7 \text{ cm}$$

អង្កត់ទ្រូងធំ មានរង្វាស់ 7cm អង្កត់ទ្រូងតូចមានរង្វាស់ 5cm

VII. កំនាត់កោនមួយមាន a និង b ជារង្វាស់កាំមាសបាត ។ ក្រលាផ្ទៃ
មុខកាត់ដែលកាត់តាមអ័ក្សស្មើនឹងផលដកក្រលាផ្ទៃបាតទាំងពីរ ។

គណនាមាឌកំនាត់កោននោះ ។

ចំណើយ



តាងមុខកាត់ដែលកាត់តាមអ័ក្ស ដោយ

ចតុកោណក្លាយ សមបាត $ABB'A'$ ដែលមាន

$$|AB| = 2a \quad \text{អង្កត់ជួរក្រាលបាតធំ}$$

$$|A'B'| = 2b \quad \text{អង្កត់ជួរក្រាលបាតតូច}$$

$|OO'|$ ជារង្វាស់កំពស់

តាង S ក្រលាផ្ទៃមុខកាត់

$$S = \frac{2a+2b}{2}|OO'| = (a+b)|OO'|$$

តាង s_1 និង s_2 ក្រលាផ្ទៃបាតធំ និងបាតតូច

$$s_1 = \pi a^2 \quad s_2 = \pi b^2 \quad \text{តែតាមសម្មតិកម្ម}$$

$$S = s_1 - s_2 \Leftrightarrow (a+b)|OO'| = \pi a^2 - \pi b^2 = \pi(a+b)(a-b)$$

$$\Rightarrow |OO'| = \pi(a-b)$$

បើ V ជាមាឌកំនាត់កោននោះ យើងបាន

$$V = \frac{1}{3}(s_1 + s_2 + \sqrt{s_1 s_2})|OO'|$$

$$V = \frac{1}{3}(\pi a^2 + \pi b^2 + \pi ab)\pi(a-b)$$

$$= \frac{\pi^2}{3}(a^2 + b^2 + ab)(a-b)$$

$$= \frac{\pi^2}{3}(a^3 - b^3)$$

$$V = \frac{\pi^2}{3}(a^3 - b^3)$$

VIII. (C) ជាខ្សែកោង តាងក្រាបនៃអនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{x^2 - 4x}{x^2 - 4x + 3}$

- សិក្សាអថេរភាពនៃអនុគមន៍ $y = f(x)$ និងសង់ខ្សែកោង (C)
- រកគូអរដោនេនៃចំនុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ច័ន្ទខ្សែកោង (C) ត្រង់ចំនុចមានអាប៉ូស៊ីតូ និង 4 ។
- ដោះស្រាយតាមក្រាតិចអត្ថិភាពឫសសមីការ $(1-K)x^2 - 4(1-K)x - 3K = 0$ ដោយពិភាក្សាតាមតំលៃ k ។

ចម្លើយ

1. សិក្សាអថេរភាពនៃអនុគមន៍

ដែនកំនត់ $D = \mathbb{R} \setminus \{1; 3\}$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2(1 - \frac{4}{x})}{x^2(1 - \frac{4}{x} + \frac{3}{x^2})} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1 - \frac{4}{x}}{1 - \frac{4}{x} + \frac{3}{x^2}} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 - 4x}{x^2 - 4x + 3} = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 4x}{x^2 - 4x + 3} = \infty$$

$$f(x) = \frac{6(x-2)}{(x^2 - 4x + 3)^2} \quad ; \quad f(x) = 0 \Leftrightarrow x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 2 \Rightarrow$$

$$y = f(2) = \frac{-4}{-1} = 4$$

x	$-\infty$	1	2	3	$+\infty$
$f'(x)$	-	-	0	+	+
$f(x)$	1	$+\infty$	4	$+\infty$	$+\infty$

អនុគមន៍មានតំលៃអប្បបរមាស្មើ 4 ត្រង់ $x = 2$

អាប៉ូស៊ីតូចំនុចប្រសព្វរវាងខ្សែកោង (C) និងអ័ក្ស $(x'Ox)$ ជាឫសនៃសមីការ

$$\frac{x^2 - 4x}{x^2 - 4x + 3} = 0 \Leftrightarrow x^2 - 4x = 0 \Leftrightarrow$$

$$x(x - 4) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \quad ; \quad x = 4 \quad \text{ខ្សែកោង (C) កាត់ } (x'Ox) \text{ ត្រង់ } x = 0 \text{ និង } x = 4 \quad \text{។}$$

អរដោនេចំនុចប្រសព្វរវាងខ្សែកោង (C) និង $(y'Oy)$ គឺ $y = f(0) = 0$

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 1 \Rightarrow$ បន្ទាត់ $y = 1$ ជាអាស៊ីមតូតងេក វ៉ែអាស៊ីមតូតត្របប $(x'Ox)$ ។

$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \infty \Rightarrow$ បន្ទាត់ $x = 1$

និង $x = 3$ ជាអាស៊ីមតូតឈរ វ៉ែអាស៊ីមតូតត្របប $(y'Oy)$

តាង S ជាកំពូលខ្សែកោង (C) យើងបាន $S(2;4)$

ក្នុងតំរុយអត្រូនរមេ (SXY) យើងប្រើប្រាស់បន្តបន្ទាប់តំរុយ

$$x = 2 + X$$

$$y = 4 + Y$$


$\Rightarrow$ សមីការខ្សែកោង (C) ទៅជា

$$4 + Y = \frac{(2 + X)^2 - 4(2 + X)}{(2 + X)^2 - 4(2 + X) + 3} = \frac{X^2 - 4}{X^2 - 1} \Rightarrow$$

$$Y = f(X) = \frac{X^2 - 4}{X^2 - 1} - 4 \text{ ដោយ}$$

$$f(-X) = \frac{(-X)^2 - 4}{(-X)^2 - 1} - 4 = \frac{X^2 - 4}{X^2 - 1} - 4 = f(X) \Rightarrow$$

$f(X)$ ជាអនុគមន៍គូ $\Rightarrow$ អ័ក្ស $(Y'SY)$ សមីការ $x = 2$ ជាអ័ក្សឆ្លងរបស់ខ្សែកោង (C)



2/. រកកូអរដោនេនៃចំនុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ប៉ះខ្សែកោង (C)

ត្រង់ចំនុចឆាប់ស៊ីស 0 និង 4

$$\text{បើ } x = 0 \Rightarrow y = 0 \Rightarrow \text{គល់ } O(0;0)$$

$$\text{បើ } x = 4 \Rightarrow y = 0 \Rightarrow \text{តាងដោយ } A(4;0)$$

មេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ប៉ះខ្សែកោង (C) ត្រង់ $x = 0$

$$\text{គឺ } f'(0) = -\frac{12}{9} = -\frac{4}{3} \text{ សមីការបន្ទាត់ប៉ះត្រង់គល់ } O$$

$$-\frac{4}{3} = \frac{y}{x} \Leftrightarrow y = -\frac{4}{3}x$$

មេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ប៉ះខ្សែកោង (C) ត្រង់ $x = 4$

$$\text{គឺ } f'(4) = \frac{12}{9} = \frac{4}{3} \text{ សមីការបន្ទាត់ប៉ះត្រង់គល់ } A(4;0)$$

$$\frac{4}{3} = \frac{y}{x-4} \Rightarrow y = \frac{4}{3}x - \frac{16}{3}$$

រកកូអរដោនេនៃចំនុចប្រសព្វរវាងបន្ទាត់ប៉ះ $y = -\frac{4}{3}x$

$$\text{និង } y = \frac{4}{3}x - \frac{16}{3} \text{ យើងបាន } -\frac{4}{3}x = \frac{4}{3}x - \frac{16}{3}$$

$$-8x = -16 \Leftrightarrow x = 2 \Rightarrow y = -\frac{8}{3}$$

បន្ទាត់ប៉ះទាំងពីរកាត់គ្នាត្រង់

$$x = 2 ; y = -\frac{8}{3}$$

3/. ដោះស្រាយតាមប្រភាគចេតនាចម្បងសមីការ $(1-K)x^2 - 4(1-K)x - 3K = 0$

សមីការនេះអាចសរសេរ $x^2 - Kx^2 - 4x + 4Kx - 3K = 0 \Leftrightarrow$

$$x^2 - 4x = K(x^2 - 4x + 3) \Leftrightarrow \frac{x^2 - 4x}{x^2 - 4x + 3} = K$$

ជាសមីការអាប៉ូស៊ីនរវាងវ៉ិច្យុកោង (C) និងបន្ទាត់ $y = K$ ស្រប ($x'ox$)

ដោយពិនិត្យតាមត្រាតិចរបស់វ៉ិច្យុកោង (C) យើងបានចំណែកក្នុងតារាងខាងក្រោម

K	អត្ថិភាព ឬសមីការ
$-\infty$	សមីការ មានឫសពីរផ្សេងគ្នា x_1 និង x_2
1	សមីការ គ្មានឫស
	សមីការ គ្មានឫស
4	សមីការ មានឫសខុប $x_1 = x_2 = 2$
$+\infty$	សមីការ មានឫសពីរផ្សេងគ្នា x_1 និង $x_2; x_1 < 0 < x_2$

វិញ្ញាសាគណិតវិទ្យាប្រឡងសញ្ញាប័ត្រមធ្យមសិក្សាភូមិភាគ II ចំនេះទូទៅ និង
បំពេញវិជ្ជា សម័យប្រឡងថ្ងៃ ០៨ សីហា ១៩៩៤

I. ដោះស្រាយសមីការ $\cos x + \cos 2x + \cos 3x + \cos 4x = 0$

ចំណែក

តាមលក្ខណៈត្រលប់ និងផ្គុំនៃវ៉ិច្យុកោង និងតាមរូបមន្ត

$$\cos p + \cos q = 2 \cos \frac{p+q}{2} \cos \frac{p-q}{2} \quad \text{យើងអាចសរសេរ}$$

$$(\cos 4x + \cos x) + (\cos 3x + \cos 2x) =$$

$$2 \cos \frac{5x}{2} \cos \frac{3x}{2} + 2 \cos \frac{5x}{2} \cos \frac{x}{2} = 2 \cos \frac{5x}{2} \left(\cos \frac{3x}{2} + \cos \frac{x}{2} \right)$$

$$= 4 \cos \frac{5x}{2} \cos x \cos \frac{x}{2} = 0 \Leftrightarrow \cos \frac{x}{2} \cos x \cos \frac{5x}{2} = 0 \Leftrightarrow$$

$$\cos \frac{x}{2} = 0 \Leftrightarrow \frac{x}{2} = \frac{\pi}{2} + k\pi \Leftrightarrow x = \pi + k2\pi$$

$$\cos x = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi$$

$$\cos \frac{5x}{2} = 0 \Leftrightarrow \frac{5x}{2} = \frac{\pi}{2} + k\pi \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{5} + \frac{k2\pi}{5}$$


តាង S ជាសំនុំចំណែក យើងបាន

$$S = \left\{ \pi + k2\pi ; \frac{\pi}{2} + k\pi ; \frac{\pi}{5} + \frac{k2\pi}{5} \right\} \quad ; \quad k \in \mathbb{Z}$$

II. រកដែនកំនត់នៃអនុម័ត $y = \lg \left(\frac{x^2 - 9x + 20}{x - 5} \right)$

$\lg A(x)$ មានន័យលុះត្រាតែ $A(x) > 0$

$$A(x) = \frac{N(x)}{D(x)} = \frac{x^2 - 9x + 20}{x - 5} = \frac{(x-4)(x-5)}{x-5} = x-4 > 0 \quad \text{និង } x \neq 5$$



យើងបាន

$$\mathcal{D} =]4 ; +\infty[\setminus \{5\}$$

III. គណនា $I = \int_{-1}^3 \left(\frac{x}{\sqrt{7+x^2}} + 1 \right) dx$

$$I = \int_{-1}^3 \left(\frac{x}{\sqrt{7+x^2}} + 1 \right) dx = \int_{-1}^3 \left(\frac{2x}{2\sqrt{7+x^2}} + 1 \right) dx$$

$$= [\sqrt{7+x^2} + x]_{-1}^3 = [7 - \sqrt{8} + 1] = 8 - 2\sqrt{2}$$

យើងបាន

$$I = 8 - 2\sqrt{2} = 2(4 - \sqrt{2})$$

IV. 1/. សិក្សាទិសដោយចេតនាភាពនៃអនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{2x^2 - x + 3}{1 - x}$

2/. សង់ខ្សែកោង (C_1) តាងអនុគមន៍នេះក្នុងតំបន់អក្ខរកូសមេ (oxy) ។

3/. សង់ខ្សែកោង (C_2) តាងអនុគមន៍ $y = g(x) = \left| \frac{2x^2 - x + 3}{1 - x} \right|$

ក្នុងតំបន់អក្ខរកូសមេ (oxy) ។

4/. បោះស្រាយ និងពិភាក្សាទៅតាមតំលៃ m អត្ថិភាព និងសញ្ញាបូសសមីការ

$$\left| \frac{2x^2 - x + 3}{1 - x} \right| = m \quad ?$$

ចំណើយ

1/. សិក្សាទិសដោយចេតនាភាពនៃអនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{2x^2 - x + 3}{1 - x}$

ដែនកំនត់ $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$

សរសេរ $f(x)$ ជា រាងកាលានុវិច ដោយចែកភាគយក និងភាគបែង

យើងបាន $y = f(x) = \frac{2x^2 - x + 3}{1 - x} = -2x - 1 + \frac{4}{1 - x}$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} -2x - 1 + \frac{4}{1 - x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} -2x = \pm\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} -2x - 1 + \frac{4}{1 - x} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{4}{1 - x} = \infty$$

$$f'(x) = \frac{u'v - v'u}{v^2} = \frac{2(-x^2 + 2x + 1)}{(1 - x)^2}$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow -x^2 + 2x + 1 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 1 - \sqrt{2} & \Rightarrow y_1 = 4\sqrt{2} - 3 \\ x_2 = 1 + \sqrt{2} & \Rightarrow y_2 = -(4\sqrt{2} + 3) \end{cases}$$

តាងអថេរភាព

x	$-\infty$	$1 - \sqrt{2}$	$1 + \sqrt{2}$	$+\infty$		
$f'(x)$	-	0	+	+	0	-
$f(x)$	$+\infty$	$(4\sqrt{2} - 3)$	$-(4\sqrt{2} + 3)$	$-\infty$		

អនុគមន៍មានតំលៃអប្បបរមាស្មើ $(4\sqrt{2} - 3)$ ចំពោះ $x = 1 - \sqrt{2}$ ហើយមានតំលៃ

អតិបរមាស្មើ $-(4\sqrt{2} + 3)$ ចំពោះ $x = 1 + \sqrt{2}$ ។

2/. សង់ខ្សែកោង (C_1) តាងអនុគមន៍នេះក្នុងតំបន់អក្ខរកូសមេ (oxy) ។

អាប័ស្តិសចំនុចប្រសព្វរវាងខ្សែកោង (C_1) និង $(x'Ox)$ ជាបូសនៃសមីការ

$$\frac{2x^2 - x + 3}{1 - x} = 0 \Leftrightarrow 2x^2 - x + 3 = 0 \quad \text{ដែលមាន}$$

$$\Delta = 1 - 24 = -23 < 0 \Rightarrow \text{សមីការគ្មានបូស} \Rightarrow \text{ខ្សែកោង } (C_1) \text{ មិនកាត់ } (x'Ox) \text{ ទេ ។}$$

អរោនេចំនុចប្រសព្វរវាង (C_1) និង $(y'0y)$ គឺ $y = f(0) = 3$

អាស៊ីមតូតឈរ $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty \Rightarrow$ បន្ទាត់ $x = 1$ ជាអាស៊ីមតូតឈរ

អាស៊ីមតូតទ្រូត $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (-2x-1)] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{4}{1-x} = 0 \Rightarrow$

បន្ទាត់ $y = -2x-1$ ជាអាស៊ីមតូតទ្រូត

អាស៊ីមតូតទាំងពីរកាត់គ្នាគ្រប់ $\omega(x=1, y=-3)$ តាមរូបមន្ត

ប្តូរតម្លៃអនុវត្តក្នុងតម្លៃ (ωXY) យើងបាន

$$x = 1+X$$

$$y = -3+Y$$


នោះសមីការខ្សែកោង (C_1) អាចសរសេរ

$$-3+Y = \frac{2(1+X)^2 - (1+X) + 3}{1-1-X} = \frac{-2X^2 + 3X + 4}{-X} \Rightarrow$$

$$Y = f(X) = \frac{2X^2 + 3X + 4}{-X} + 3 = \frac{-2X^2 - 4}{X} \text{ ដោយ}$$

$$f(-X) = \frac{-2(-X)^2 - 4}{-X} = \frac{-2X^2 - 4}{-X} = \frac{-2X^2 - 4}{X} = -f(X)$$

$\Rightarrow f(x)$ ជាអនុគមន៍សេស $\Rightarrow \omega(1; -3)$ ជាផ្ចិតឆ្លុះរបស់ខ្សែកោង (C_1) ។




3/. សំនុំរូបកោង (C_2) តាងអនុគមន៍ $y = g(x) = \left| \frac{2x^2 - x + 3}{1 - x} \right| = |f(x)|$

ដែនកំនត់ $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$

$\forall x \in \mathcal{D}$; បើ $f(x) \geq 0 \Rightarrow g(x) = |f(x)| = f(x) \Rightarrow (C_2) = (C_1)$

បើ $f(x) < 0 \Rightarrow g(x) = |f(x)| = -f(x) \Rightarrow (C_2)$ ជារូបភ្ជុះនៃ (C_1)

រៀប ($x'ox$) ។ យើងអាចធ្វើសំនង់ (C_2) បានពី (C_1) ។



4/. ដោះស្រាយ និងពិភាក្សាទៅតាមតំលៃ m អតិភាព និងសញ្ញាបូសសមីការ

$\left| \frac{2x^2 - x + 3}{1 - x} \right| = m$ សមីការនេះអាចជាជាសមីការអាប់ស៊ីសរោងរូបកោង (C_2)

$y = \left| \frac{2x^2 - x + 3}{1 - x} \right|$ និងបន្ទាត់ $y = m$ ស្រប ($x'ox$)

ដោយពិនិត្យតាមត្រាតិច (C_2) យើងបានចំលើយក្នុងតារាងខាងក្រោម

m	អតិភាព និង សញ្ញាបូសសមីការ $\left \frac{2x^2 - x + 3}{1 - x} \right = m$
$-\infty$	សមីការគ្មានបូស
$4\sqrt{2} - 3$	សមីការមានបូសមួយ $x_1 = x_2 = 1 - \sqrt{2} < 0$
3	សមីការមានបូសពីរ $x_1 < x_2 = 0$
3	សមីការមានបូសពីរ $x_1 < x_2 = 0$
$4\sqrt{2} + 3$	សមីការមានបូសពីរ $x_1 < 0 < x_2$
$4\sqrt{2} + 3$	សមីការមានបូសបី $x_1 < 0 < x_2 < x_3 = 1 + \sqrt{2}$
$+\infty$	សមីការមានបូសបួន $x_1 < 0 < x_2 < x_3 < x_4$

V. ABC ជាត្រីកោណកែងក្នុង A ដែល $|AB| = 6\text{cm}$; $|AC| = 8\text{cm}$ ។

5 ជាចំនុចក្នុងលំហដែល $|SA| = |SB| = |SC| = 13\text{cm}$ ។


1/ បើ I ជាចំនុចកណ្តាលនៃ BC ស្រាយថា |SI| ជាកំពស់នៃតេត្រាអែត SABC ។

2/ គណនាមាឌនៃតេត្រាអែត SABC

3/ A'B'C' ជាត្រីកោណប្លង់នៃត្រីកោណ ABC ក្នុងបំលែងចាងមាន S ជាកំពូល និងមានផលធៀប $\frac{1}{2}$ ។ គណនាមាឌនៃកំទាត់ពីរឹមិត ABCA'B'C'

4/ A''B''C'' ជាត្រីកោណចំណោលកែងនៃត្រីកោណ A'B'C' លើ (ABC) គណនាមាឌព្រិស A'B'C'A''B''C'' ។

ចំលើយ



1/ ស្រាយថា |SI| ជាកំពស់នៃតេត្រាអែត

តាមសម្មតិកម្ម

យើងមាន :

ត្រីកោណ ABC កែងក្នុង A និង I

ជាចំនុចកណ្តាលនៃ BC នោះ I

ជាជួរកណ្តាលនៃត្រីកោណ ABC

$|SA| = |SB| = |SC|$ នោះ S ត្រូវស្ថិត

នៅលើអ័ក្សរង្វង់ចារឹកក្រៅត្រីកោណ ABC

គឺបន្ទាត់កែង និងប្លង់ (ABC) ក្រុង $I \Rightarrow |SI|$ ជាកំពស់នៃតេត្រាអែត SABC ។

2/ គណនាមាឌ V_1 នៃតេត្រាអែត SABC ក្នុងត្រីកោណ ABC កែងក្នុង A

យើងបាន $|BC|^2 = |AB|^2 + |AC|^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$

$$\Rightarrow |BC| = 10\text{cm} \Rightarrow |IA| = |IB| = |IC| = \frac{|BC|}{2} = 5\text{cm}$$

ក្នុងត្រីកោណ SIA កែងក្នុង I

$$|SI|^2 = |SA|^2 - |IA|^2 = 13^2 - 5^2 = 144$$

$$|SI| = \sqrt{144} = 12\text{cm}$$

តាង S ក្រលាផ្ទៃត្រីកោណ ABC :

$$S = \frac{1}{2}|AB||AC| = \frac{1}{2} \cdot 6 \cdot 8 = 24\text{cm}^2$$

$$V_1 = \frac{1}{3}S|SI| = \frac{1}{3} \cdot 24 \cdot 12 = 96\text{cm}^3$$

3/ គណនាមាឌនៃកំទាត់ពីរឹមិត ABCA'B'C'

សម្មតិកម្ម A'B'C' ជាត្រីកោណប្លង់នៃត្រីកោណ ABC តាមបំលែងចាងផ្ចិត

S ផលធៀប $\frac{1}{2}$ នោះពីរឹមិត SA'B'C' ជាពីរឹមិតប្លង់នៃពីរឹមិត SABC តាមបំលែង

ចាងផលធៀប $\frac{1}{2}$ ដូច្នេះ $V_2 = V_1 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{V_1}{8}$

បើ V_3 ជាមាឌនៃកំទាត់ពីរឹមិត ABCA'B'C' យើងបាន

$$V_3 = V_1 - V_2 = V_1 - \frac{V_1}{8} = \frac{7V_1}{8} = \frac{7 \times 96}{8} = 84\text{cm}^3$$

4/ គណនាមាឌព្រិស A'B'C'A''B''C''

A''B''C'' ជាត្រីកោណចំណោលកែងនៃ A'B'C' លើ ABC

នោះយើងបានត្រីកោណ A''B''C'' និង A'B'C' ប៉ុនគ្នា ព្រោះ (A'B'C') // (ABC)

តាង s' ក្រលាផ្ទៃត្រីកោណ $A'B'C'$ នោះយើងបាន

$$s' = s\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{s}{4} = \frac{24}{4} = 6\text{cm}^2$$

$|ST|$ ជាអង្កត់ប្រែនៃ $|ST|$ តាមចំណែកចំនួន s

$$\text{ផលធៀប } \frac{1}{2} \Rightarrow |ST| = |ST| \frac{1}{2} = \frac{|ST|}{2} \Rightarrow |T'| = \frac{|ST|}{2} = \frac{12\text{cm}}{2} = 6\text{cm}$$

បើ V_4 ជាមាឌនៃព្រិសនោះយើងបាន

$$V_4 = s|T'| = 6\text{cm}^2 \times 6\text{cm} = 36\text{cm}^3$$

លំហាត់

f ជាអនុគមន៍កំនត់ដោយ $f(x) = ax + b - \frac{1}{x}$

ក/. ចូរកំនត់តំលៃ a និង b ដើម្បីអោយខ្សែកោង (C) នៃអនុគមន៍ $y = f(x)$

កាត់តាមពីរចំនុច $(-1; 0)$ និង $(\frac{1}{2}; 0)$ ។

ខ/. សិក្សាអថេរភាពនៃអនុគមន៍ និងកូសខ្សែកោង (C) តាងអនុគមន៍

$$y = f(x) = \frac{2x^2 + x - 1}{x} \text{ តាមគំរូយអនុគមន៍ (oxy) ។}$$

គ/. ដោយប្រើប្រាស់ចង្វាស់លី, ដោះស្រាយវិសមីការ $\frac{2x^2 + x - 1}{x} \geq 2x - 1$

ឃ/. ពិសិន្នន័យ (C) ខាងសំនុំនៃខ្សែកោង (C') $y = g(x) = \left| \frac{2x^2 + x - 1}{x} \right|$

រួចដោះស្រាយអសមភាព និងសញ្ញាប្រសិទ្ធភាព ដោយពិភាក្សាទៅតាមតំលៃនៃ K

$$\left| \frac{2x^2 + x - 1}{x} \right| = K$$

ចំណើយ

ក/. កំនត់តំលៃ a និង b ដើម្បីអោយខ្សែកោង (C) $y = f(x) = ax + b - \frac{1}{x}$

- កាត់តាម $(-1; 0)$ លុះត្រាតែ $f(-1) = 0 \Leftrightarrow -a + b + 1 = 0 \Leftrightarrow$

$$b = a - 1 \quad (1)$$

- កាត់តាម $(\frac{1}{2}; 0)$ លុះត្រាតែ $f(\frac{1}{2}) = 0 \Leftrightarrow \frac{a}{2} + b - \frac{1}{\frac{1}{2}} = 0$

$$\Leftrightarrow \frac{a}{2} + b - 2 = 0 \Leftrightarrow b = -\frac{a}{2} + 2 \quad (2)$$

ដោយផ្អែក (1) និង (2) យើងបាន $a - 1 = -\frac{a}{2} + 2 \Leftrightarrow$

$$a + \frac{a}{2} = 2 + 1 = 3 \Leftrightarrow \frac{3a}{2} = 3 \Leftrightarrow \frac{a}{2} = 1 \Leftrightarrow a = 2$$

$b = a - 1 = 2 - 1 = 1$ ដូច្នេះយើងអាចទាញបាន

$$a = 2 ; b = 1$$

ខ/. a/. សិក្សាអថេរភាពនៃអនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{2x^2 + x - 1}{x} = 2x + 1 - \frac{1}{x}$

ជាអនុគមន៍ប្រភាគសនិទាន កាត់បែង x មានឫស $x = 0$

ដូច្នេះអនុគមន៍មានដែនកំនត់ $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} 2x + 1 - \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} 2x = \pm\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} 2x + 1 - \frac{1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} -\frac{1}{x} = \infty$$

$$u = 2x^2 + x - 1 \Rightarrow u' = 4x + 1$$

$$f'(x) = \frac{u'v - v'u}{v^2} \quad v = x \Rightarrow v' = 1$$

$$f'(x) = \frac{4x^2 + x - 2x^2 - x + 1}{x^2} = \frac{2x^2 + 1}{x^2} \text{ ដោយយើងដឹងថា}$$

$$\forall x \in \mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{0\} \quad x^2 > 0 \text{ និង } 2x^2 + 1 > 0 \text{ នោះ}$$

$$f'(x) = \frac{2x^2+1}{x^2} > 0 \Rightarrow f(x) \text{ កើនឡើងដែនកំនត់ } D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	+		+
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \infty$ នោះបញ្ជាក់ថា បន្ទាត់ (y'') សមីការ $x = 0$ ជាអាស៊ីមតូតឈរ

រកសមីការអាស៊ីមតូតទៀត តាមនិយមន័យបើ $y = ax + b$ ជាអាស៊ីមតូតទៀតនៃ $y = f(x)$

នោះគេបាន $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$

ដោយ $f(x) = 2x + 1 - \frac{1}{x}$ នោះយើងបាន $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (2x + 1)] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(-\frac{1}{x}\right) = 0$

ដែលបញ្ជាក់ថា បន្ទាត់ $y = 2x + 1$ ជាអាស៊ីមតូតទៀតរបស់ខ្សែកោង (C)

អាស៊ីមតូតឈរ $x = 0$ និងអាស៊ីមតូតទៀត $y = 2x + 1$ កាត់គ្នាត្រង់ $\omega(0;1)$ ។

ខ្សែកោង (C) មិនកាត់ $(y'0)$ ទេព្រោះយើងពុំអាចរក $f(0)$ បានទេ

តែខ្សែកោង (C) កាត់ $(x'0x)$ ត្រង់ $x = -1$ និង $x = \frac{1}{2}$

រកផ្ចិតឆ្លុះរបស់ (C) ក្នុងតំបន់ (ωXY) យើងបានតាមរូបមន្តដូរតំបន់

$$x = 0 + X = X, \quad y = 1 + Y \text{ អនុគមន៍ទៅជា}$$

$$1 + Y = \frac{2X^2 + X - 1}{X} \Rightarrow Y = \frac{2X^2 + X - 1}{X} - 1 = \frac{2X^2 - 1}{X}$$


$$Y = f(X) = \frac{2X^2 - 1}{X} \text{ ជាសមីការបង្ហាញរបស់ (C)}$$

$$f(-X) = \frac{2(-X)^2 - 1}{-X} = \frac{2X^2 - 1}{-X} = -f(X)$$

$\Rightarrow f(X)$ ជាអនុគមន៍សេស $\Rightarrow \omega(0;1)$ ជាផ្ចិតឆ្លុះរបស់ខ្សែកោង (C) ។

$$f(-X) = \frac{2(-X)^2 - 1}{-X} = \frac{2X^2 - 1}{-X} = -\frac{2X^2 - 1}{X} = -f(X)$$

$\Rightarrow f(X)$ ជាអនុគមន៍សេស $\Rightarrow \omega(0;1)$ ជាផ្ចិតឆ្លុះរបស់ខ្សែកោង (C)



$$\text{គ/។ ប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រសមីការ } \frac{2x^2 + x - 1}{x} \geq 2x - 1$$

$$y = \frac{2x^2 + x - 1}{x} \text{ ជាសមីការរបស់ខ្សែកោង (C)}$$

$$y = 2x - 1 \text{ ជាសមីការរបស់បន្ទាត់ស្របអាស៊ីមតូតទៀត } y = 2x + 1$$

តាមប្រាភូតិសមីការ $\frac{2x^2 + x - 1}{x} \geq 2x - 1$ គឺគេអាចយើងវិសោធន៍តំបន់ x ដែល

(C) នៅលើបន្ទាត់ $y = 2x - 1$

ចំណែកដោយពិនិត្យតាមក្រាហ្វិក

$$S =]-\infty ; 0[\cup \left] \frac{1}{2} ; +\infty[$$

ឃ. ទាញសំនុំ (C') $y = g(x) = \left| \frac{2x^2 + x - 1}{x} \right|$

$g(x)$ មានដែនកំនត់ $\mathcal{D} = \mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$


$g(x) = |f(x)|$ ដូច្នេះយើងអាចទាញបាន

បើ $f(x) \geq 0$ នោះ $|f(x)| = f(x) = g(x) \Rightarrow (C') = (C)$

បើ $f(x) < 0$ នោះ $|f(x)| = -f(x) = g(x) = -f(x) \Rightarrow (C')$ ជាបញ្ចូលនៃ (C)

រៀប (x'ox) ។

ដើម្បីបាន (C') ចំពោះខ្សែកោង (C) នៅលើ (x'ox) យើងរក្សាទុក
ចំពោះ (C) ដែលនៅក្រោម (x'ox) យើងត្រូវបញ្ចូល (x'ox)



ដោះស្រាយតាមក្រាហ្វិកអត្ថិភាព និងសញ្ញាបូសមីការ $\left| \frac{2x^2 + x - 1}{x} \right| = K$
ជាសមីការអាស៊ីមតិ (C') និងបន្ទាត់ $y = K$ ស្រប (x'ox)

K	អត្ថិភាព និង សញ្ញាបូសមីការ
$-\infty$	សមីការគ្មានបូស
0	សមីការមានបូសពីរ $x_1 = -1 < 0 < x_2 = \frac{1}{2}$
$+\infty$	សមីការមានបូសបួន $x_1 < x_2 < 0 < x_3 < x_4$

លំហាត់

គេអោយអនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{x - 2}$ ដែលមានខ្សែកោងតំនាង (C)

1/. គណនា a, b និង c ដោយដឹងថា (C) កាត់តាមចំនុច :

A(0 ; $\frac{3}{2}$) B(-1 ; 0) C(3 ; 0)

2/. សិក្សាទិសដោយមេរោគនៃអនុគមន៍ ដោយបញ្ជាក់សមីការអាស៊ីមតិ និង
ផ្ចិតព្យាបាលនៃខ្សែកោង (C) ក្នុងតំបន់អន្តរកាល (ox)

3/. ស្រាយថាបន្ទាត់ (D_m) សមីការ $y = m(x - 1) + 3$ កាត់តាមចំនុចនឹង E
មួយដែលត្រូវបញ្ជាក់ ។ កំនត់ m ដើម្បីអោយ (C) និង (D_m) មានចំនុចប្រសព្វពីរ M និង
N ។ រកសំនុំចំនុចកណ្តាល នៃ [MN] តាមលំហូរ m ប្តូរតំលៃ ។

4/. ដោះស្រាយអត្ថិភាពបូសមីការ $f(x) = K$ រៀបចំនូវ 0 ដោយពិនិត្យទៅ
តាមតំលៃនៃ K ។

ចំណើយ

1/ គណនា a, b និង c ដោយដឹងថា (C) កាត់តាមចំនុច :

$$A(0; \frac{3}{2}) \Rightarrow f(0) = \frac{c}{-2} = \frac{3}{2} \Leftrightarrow c = -3$$

$$B(-1; 0) \Rightarrow f(-1) = \frac{a-b-3}{-1-2} = \frac{a-b-3}{-3} = 0 \Leftrightarrow a-b-3 = 0 \Leftrightarrow b = a-3 \quad (1)$$

$$C(3; 0) \Rightarrow f(3) = \frac{9a+3b-3}{3-2} = \frac{9a+3b-3}{1} = 0 \Leftrightarrow$$

$$9a+3b-3 = 0 \Leftrightarrow 3a+b-1 = 0 \Leftrightarrow b = -3a+1 \quad (2)$$

ដោយផ្អែក (1) និង (2) នោះយើងអាចទាញបាន

$$a-3 = -3a+1 \Leftrightarrow 4a = 4 \Leftrightarrow a = 1 \Rightarrow b = 1-3 = -2$$

ដូច្នេះយើងអាចទាញបាន

$$a = 1 ; \quad b = -2 \quad \text{និង} \quad c = -3$$

2/ ដោយ $a=1 ; b=-2$ និង $c=-3$ នោះអនុគមន៍ទៅជា

$$y = f(x) = \frac{x^2-2x-3}{x-2} \quad \text{ជាអនុគមន៍ប្រភេទសមីការមានដែនកំណត់} \quad \mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{2\}$$

សរសេរអនុគមន៍នេះជាភាគពណ្ឌនិម ដោយចែកភាគយក និងភាគបែង

$$\text{យើងបាន} \quad y = f(x) = \frac{x^2-2x-3}{x-2} = x - \frac{3}{x-2}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x - \frac{3}{x-2} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x = \pm\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} x - \frac{3}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} -\frac{3}{x-2} = \infty$$

$$f(x) = \frac{U'V - V'U}{V^2} \quad U = x-2x-3 \quad \Rightarrow U' = 2x-2$$

$$V = x-2 \quad \Rightarrow V' = 1$$

$$\text{យើងបាន} : \quad f'(x) = \frac{2x^2-4x-2x+4-x^2+2x+3}{(x-2)^2} = \frac{x^2-4x+7}{(x-2)^2}$$

ដោយ $(x-2)^2 > 0, \forall x \in \mathcal{D}$ នោះយើងបាន $f'(x)$ យកសញ្ញាតាមភាគយក

$$x^2-4x+7 \quad \text{ជាត្រីការ៉េក្រេទី ២ នៃ} \quad x \quad \text{ដែល} \quad \begin{cases} a = 1 > 0 \\ \Delta' = 4-7 = -3 < 0 \end{cases}$$

$$\text{នោះតំរូវអោយ} \quad x^2-4x+7 > 0 \quad \forall x \in \mathcal{D}$$

$$\text{ដូច្នេះយើងបាន} \quad f'(x) > 0 \quad \forall x \in \mathcal{D}$$

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	$+$		$+$
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$

អនុគមន៍នេះកើនក្នុង $\mathcal{D}$

បញ្ជាក់សមីការណស៊ីមតូតដែលមាន

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \infty \quad \text{នោះបញ្ជាក់ថាបន្ទាត់} \quad x = 2 \quad \text{ជាអាស៊ីមតូតឈរ}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - x] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3}{x-2} = 0 \Rightarrow \text{បន្ទាត់} \quad y = x \quad \text{ជាអាស៊ីមតូតទ្រេត}$$

បញ្ជាក់ផ្ចិតឆ្លុះ អាស៊ីមតូតឈរ $x = 2$ និងអាស៊ីមតូតទ្រេត $y = x$ កាត់គ្នាត្រង់

$$\text{ត្រង់} \quad \omega(x = 2; y = 2) \quad \text{ស្រាយថា} \quad \omega \quad \text{ជាផ្ចិតឆ្លុះរបស់ខ្សែកោង} \quad (C)$$

$$\text{ក្នុងតំរុយ} \quad (\omega XY) \quad \text{យើងបានតាមរូបមន្តនៃការបំប្លែង} \quad x = 2+X, \quad y = 2+Y$$

$$\text{នោះអនុគមន៍ទៅជា} \quad 2+Y = \frac{(2+X)^2-2(2+X)-3}{2+X-2} = \frac{4+4X+X^2-4-2X-3}{X}$$

$$Y = f(X) = \frac{X^2+2X-3}{X} - 2 = \frac{X^2-3}{X}$$

$$Y = f(X) = \frac{X^2 + 2X - 3}{X} - 2 = \frac{X^2 - 3}{X}$$


ដោយ $f(-X) = \frac{(-X)^2 - 3}{-X} = -\frac{X^2 - 3}{X} = -f(X)$

នោះយើងបាន $f(X)$ ជាអនុគមន៍សេស $\Rightarrow \omega(2; 2)$ ជាផ្ចិតកំពូលរបស់ខ្សែកោង (C) ។

(C) កាត់ $(x'oy)$ ត្រង់ចំនុចមានអាប់ស៊ីសជាមួយនៃសមីការ

$$\frac{x^2 - 2x - 3}{x - 2} = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -1 \\ x_2 = 3 \end{cases}$$

(C) កាត់ $(y'oy)$ ត្រង់ចំនុចអនេន $y = f(0) = \frac{3}{2}$



3. ស្រាយបញ្ជាក់ថាបន្ទាត់ (D_m) សមីការ $y = m(x-1) + 3$ កាត់តាមចំនុចនឹង E

សមីការនេះអាចសរសេរ $y - 3 = m(x - 1)$ វាផ្ទៀងផ្ទាត់ $\forall m \in \mathbb{R}$ លុះត្រាតែ

$$\begin{cases} y - 3 = 0 \\ x - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y = 3 \\ x = 1 \end{cases} \quad \text{ដូច្នេះបន្ទាត់ } (D_m) \text{ កាត់តាមចំនុចនឹង } E(1; 3)$$

សមីការអាប់ស៊ីសរវាង (C) និង (D_m)

$$\frac{x^2 - 2x - 3}{x - 2} = m(x - 1) + 3 \Leftrightarrow m(x - 1)(x - 2) + 3(x - 2) = x^2 - 2x - 3$$

$$\Leftrightarrow mx^2 - 3mx + 2m + 3x - 6 = x^2 - 2x - 3 \Leftrightarrow$$

$$(m - 1)x^2 - (3m - 5)x + 2m - 3 = 0 \text{ ជាសមីការអាប់ស៊ីសរវាង (C) និង } (D_m)$$

ដើម្បីអោយ (C) និង (D_m) មានចំនុចប្រសព្វពីរ M និង N លុះត្រាតែសមីការអាប់ស៊ីស


$$\text{មានឫសពីរ គឺ } \begin{cases} a = m - 1 \neq 0 \\ \Delta \geq 0 \end{cases}$$

$$a = m - 1 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq 1$$

$$\Delta = (3m - 5)^2 - 4(m - 1)(2m - 3) = 9m^2 - 30m + 25 - 8m^2 + 12m + 8m - 12$$

$$\Delta = m^2 - 10m + 13 \text{ ជាត្រីការ៉េក្រេទី 2 នៃ } m \text{ មាន } \delta' = 25 - 13 = 12$$

$$= 4 \times 3 = (2\sqrt{3})^2 \text{ ដូច្នេះ } \Delta \text{ មានឫសពីរគឺ } m_1 = 5 - 2\sqrt{3}, m_2 = 5 + 2\sqrt{3}$$



យើងត្រូវយក : $m \in]-\infty; 5 - 2\sqrt{3}] \cup [5 + 2\sqrt{3}; +\infty[\setminus \{1\}$

រកសំនុំចំនុចកណ្តាល I នៃ $[MN]$, បើ m ផ្លាស់ប្តូរតំលៃ

តាង $I(x, y)$ តាមរយៈដេរីវេនៃ I

$$x = \frac{x_M + x_N}{2} = -\frac{b}{2a} = \frac{3m-5}{2(m-1)} = \frac{3m-5}{2m-2}$$

$$y = m\left(\frac{3m-5}{2m-2} - 1\right) + 3 = m\left(\frac{3m-5-2m+2}{2m-2}\right) + 3$$

$$= m\left(\frac{m-3}{2m-2}\right) + 3 = \frac{m^2-3m+6m-6}{2m-2} = \frac{m^2+3m-6}{2m-2}$$

$$x = \frac{3m-5}{2m-2}; \quad y = \frac{m^2+3m-6}{2m-2}$$

សរសេរទំនាក់ទំនងគ្នា m រវាង x និង y វិសសមីការសំនុំចំនុច

$$2mx - 2x = 3m - 5 \Leftrightarrow 2mx - 3m = 2x - 5 \Leftrightarrow m = \frac{2x-5}{2x-3}$$

$$y = \frac{\left(\frac{2x-5}{2x-3}\right)^2 + 3\frac{2x-5}{2x-3} - 5}{2\frac{2x-5}{2x-3} - 2} = \frac{(2x-5) + (6x-15)(2x-3) - 5(2x-3)^2}{(4x-10)(2x-3) - 2(2x-3)^2}$$

$$\frac{4x^2 - 20x + 25 + 12x^2 - 18x - 30x + 45 - 20x^2 + 60x - 45}{(2x-3)(4x-10-4x+6)} = \frac{-4x^2 - 8x + 25}{-4(2x-3)}$$

$$y = \frac{-4x^2 - 8x + 25}{-4(2x-3)} = \frac{4x^2 + 8x - 25}{8x - 12}$$

ដូច្នេះសំនុំចំនុច I គឺខ្សែកោង $y = \frac{4x^2 + 8x - 25}{8x - 12}$

ដោះស្រាយតាមក្រាហ្វិកអត្ថិភាព និងសញ្ញាវិសសមីការ $f(x) = K$ ជាសមីការអាប៉ូស៊ីត

រវាងខ្សែកោង (C) និងបន្ទាត់ $y = K$ ។ តាមត្រីកូនយើងបានចំណេះ

K	អត្ថិភាព និង សញ្ញាវិសសមីការ
$-\infty$	សមីការមានឫសពីរ $x_1 < 0 < x_2$
$\frac{3}{2}$	$x_1 = 0 < x_2$
$+\infty$	សមីការមានឫសពីរ $0 < x_1 < x_2$

លំហាត់

អោយអនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{x^2-4}{x-1}$ ដោយមានខ្សែកោងតំនាង (C)

1/. សិក្សាទិសដៅអថេរភាព និងសង់ខ្សែកោង (C) តាមអនុគមន៍នេះក្នុងតំរុយ

អគ្គនិមេ (oxy) ។ រកសមីការបន្ទាត់ខ្សែកោង (C) ត្រង់គល់ O នៃតំរុយ ។

2/. គេមានបន្ទាត់ (D_m) សមីការ $y = mx$ ។ កំនត់ m ដើម្បីអោយ (C) និង (D_m) មានចំនុចប្រសព្វពីរ M និង N ។ រក m កាលណាចំនុចទាំងពីរនេះមិនអាចមិនអាចនៅលើមែកតែម្ខាងរបស់ខ្សែកោង (C) ។ ក្នុងករណីនេះ រកសំនុំចំនុចកណ្តាល I នៃ $[MN]$ កាលណា m ផ្លាស់ប្តូរតំលៃ ។

3/. ដោះស្រាយអត្ថិភាព និងសញ្ញាវិសសមីការតាមតំលៃ K

$$\frac{x^2-4}{x-1} = K$$

ចំណេះ

1/. សិក្សាទិសដៅអថេរភាព និងសង់ខ្សែកោង (C) ក្នុងតំរុយអគ្គនិមេ (oxy)

អនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{x^2-4}{x-1}$ ជាអនុគមន៍ប្រភេទសនិទាន មានភាគបែង $x-1$

$x-1 = 0 \Leftrightarrow x = 1$ ដូច្នេះយើងត្រូវយកផែនកំនត់ $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$

យើងសរសេរ $f(x)$ ជារាងកាណូនិច ដោយចែកភាគយក និងភាគបែងនោះយើងបាន

$$y = f(x) = \frac{x^2-4}{x-1} = x+1 - \frac{3}{x-1}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x = \pm\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3}{x-1} = \infty$$

$$f'(x) = \frac{u'v - v'u}{v^2}, \quad \begin{matrix} u = x^2 - 4 & \Rightarrow & u' = 2x \\ v = x - 1 & \Rightarrow & v' = 1 \end{matrix}$$

$$f'(x) = \frac{2x^2 - 2x - x^2 + 4}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x + 4}{(x-1)^2} \text{ ដោយ } (x-1)^2 > 0 \quad \forall x \in \mathcal{D}$$

នោះ $f'(x)$ យកសញ្ញាតាមតាមក $x^2 - 2x + 4$ ជាត្រីការ៉េក្រេទី ២ នៃ x ដែល

$$\begin{cases} a = 1 > 0 \\ \Delta' = 1 - 4 = -3 < 0 \end{cases} \Rightarrow x^2 - 2x + 4 > 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

$f'(x) > 0 \quad \forall x \in \mathcal{D} \Rightarrow f(x)$ ជាអនុគមន៍កើនក្នុង $\mathcal{D}$

x	$-\infty$		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$		$+$	
$f(x)$	$-\infty$		$+\infty$		$+\infty$

$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty$ នោះយើងបានបន្ទាត់ $x = 1$ ជាអាស៊ីមតូតឈរ

រកសមីការអាស៊ីមតូតទៀត

អនុគមន៍ $y = f(x)$ មានបន្ទាត់ $y = ax + b$ ជាអាស៊ីមតូតទៀតលុះត្រាតែ

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (x+1)] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left[x+1 - \frac{3}{x-1} - (x+1) \right] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} -\frac{3}{x-1} = 0$$

នោះយើងបានតាមនិយមន័យខាងលើ បន្ទាត់ $y = x+1$ ជាអាស៊ីមតូតទៀត

អាស៊ីមតូតឈរ $x = 1$ និងអាស៊ីមតូតទៀត $y = x+1$ កាត់គ្នាត្រង់ $\omega(1;2)$

ខ្សែកោង (C) កាត់ $(x'0x)$ ត្រង់ចំនុចមានអាប់ស៊ីសជាវិសមមីការ

$$\frac{x^2-4}{x-1} = 0 \Leftrightarrow x^2-4 = 0 \Leftrightarrow x^2 = 4 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -2 \\ x_2 = 2 \end{cases}$$

អរដោនេនៃចំនុចប្រសព្វរវាង (C) និង $(y'0y)$ គឺ $y = f(0) = 4$

ស្រាយថា $\omega(1;2)$ ជាផ្ចិតក្នុងរបស់ខ្សែកោង (C) ក្នុងតំបន់ (ωXY) យើងបានតាមរូបមន្ត

$$x = 1 + X$$

$$y = 2 + Y$$

$$\text{នោះនៅជាអនុគមន៍ } 2 + Y = \frac{(1+X)^2 - 4}{1+X-1} = \frac{1+2X+X^2-4}{X} = \frac{X^2+2X-3}{X}$$

$$\text{ដូច្នេះ } Y = f(X) = \frac{X^2+2X-3}{X} - 2 = \frac{X^2+2X-3-2X}{X} = \frac{X^2-3}{X}$$

$$f(-X) = \frac{(-X)^2-3}{-X} = \frac{X^2-3}{-X} = -\frac{X^2-3}{X} = -f(X)$$

$\Rightarrow f(X)$ ជាអនុគមន៍សេស $\Rightarrow \omega(1;2)$ ជាផ្ចិតក្នុងរបស់ខ្សែកោង (C)

រកសមីការបន្ទាត់ប៉ះខ្សែកោង (C) ត្រង់គល់ $O(0;0)$

- មេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ប៉ះខ្សែកោង (C) ត្រង់ O

$$f'(0) = \frac{4}{1} = 4$$

- សមីការបន្ទាត់ប៉ះត្រង់គល់ O

$$4 = \frac{y-0}{x-0} \Leftrightarrow y = 4x$$

2/. សមីការរាបស់ស៊ីសរោង (C) និង (D_m)

$$\frac{x^2-4}{x-1} = mx \Leftrightarrow mx^2 - mx = x^2 - 4$$

$$\Leftrightarrow (m-1)x^2 - mx + 4 = 0 \text{ ជាសមីការរាបស់ស៊ីសរោង (C) និង } (D_m)$$

កំនត់ m ដើម្បីអោយ (C) និង (D_m) មានចំនុចប្រសព្វពីរ M និង N


ដើម្បីអោយមាន M និង N លុះត្រាតែសមីការរាបស់ស៊ីសមានឫសពីរ

$$a = m - 1 \neq 0 \text{ និង } \Delta \geq 0$$

$$a \neq 0 \Leftrightarrow m \neq 1 \quad \Delta = m^2 - 16(m-1) = m^2 - 16m + 16$$

$$\text{ជាត្រីការ៉េក្រេទី ២ នៃ } m \text{ មាន } \Delta' = 64 - 16 = 48 = (4\sqrt{3})^2$$

$$\text{ដូច្នេះ } \Delta \text{ មានឫសគតិរ } m_1 = 8 - 4\sqrt{3} \quad m_2 = 8 + 4\sqrt{3}$$



$$\text{យើងត្រូវយក } m \in]-\infty ; 8 - 4\sqrt{3}] \cup [8 + 4\sqrt{3} ; +\infty[\setminus \{1\}$$

រក m បើ M និង N មិននៅលើមេកតែម្ខាងនៃ (C)

គឺរក m ដើម្បីឲ្យ M និង N នៅលើមេកសងខាងនៃ (C) នោះ។ ត្រូវ

នៅចន្លោះឫសនៃសមីការអាប់ស៊ីស គឺ $af(1) < 0$

$$a = m - 1$$

$$\Rightarrow af(1) = 3(m-1)$$

$$f(1) = m - 1 - m + 4 = 3$$



យើងត្រូវយក

$$m \leq 1$$

រកសំនុំចំនុចកណ្តាល I នៃ $[MN]$

$$x = \frac{x_M + x_N}{2} = \frac{-b}{2a} = \frac{m}{2} \text{ រាបចំ}$$

$$y = mv = \frac{m^2}{2} \text{ រាបចំ}$$

គាង $I(x, y)$

រកទំនាក់ទំនងគ្នានៃ m រវាង y និង x វិសមីការសំនុំចំនុច I


$$x = \frac{m}{2} \Rightarrow m = 2x \Rightarrow y = \frac{(2x)^2}{2} = 2x^2$$

ដូច្នេះ សំនុំចំនុច I ជាប៉ារ៉ាបូល $y = 2x^2$ ដោយ

$$m \leq 1 \Rightarrow x = \frac{m}{2} \leq \frac{1}{2}$$

3/. ដោះស្រាយតាមគ្រាភិចអត្ថិភាព និងសញ្ញាឫសសមីការ $\frac{x^2-4}{x-1} = K$

ជាសមីការអាប់ស៊ីសរវាងខ្សែតោង (C) និងបន្ទាត់ $y = K$ ស្រប $(x'ox)$



K	អត្ថិភាព និង សញ្ញាបូសសមីការ
$-\infty$	សមីការមានបូសពីរ $x_1 < 0 < x_2$
4	សមីការមានបូសពីរ $x_1 = 0 < x_2$
$+\infty$	សមីការមានបូសពីរ $0 < x_1 < x_2$

លំហាត់

គេមានអនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{a}{x} + \frac{b}{x-2}$ ដែលមានខ្សែកោងតំនាង (C)

1/. រកតំលៃ a និង b ដោយដឹងថាខ្សែកោង (C) កាត់តាម $(1; -1)$, $(3; \frac{1}{3})$

2/. ចំពោះតំលៃ a និង b រកឃើញ ចូរសិក្សាទិសដោយរកមេគោតនៃអនុគមន៍ $f(x)$ ។ ស្រាយថាបន្ទាត់ $x = 1$ ជាអ័ក្សឆ្លុះនៃខ្សែកោង (C) រួចសង់ខ្សែកោង (C) ក្នុងតំបន់អក្ខរក្រម (oxy) ។

3/. ដោះស្រាយតាមប្រាក់អត្ថិភាព និងសញ្ញាបូសសមីការដោយពិភាក្សាតាមតំលៃនៃ m : $f(x) = m$

4/. គូសខ្សែកោង (C) តាមអនុគមន៍ $y = |f(x)|$

ចំណើយ

1/. រកតំលៃ a និង b

បើខ្សែកោង (C) កាត់តាម $(1; -1)$ យើងបាន $f(1) = -1$

$$\frac{a}{1} + \frac{b}{1-2} = a - b = -1 \Leftrightarrow a = b - 1$$

បើខ្សែកោង (C) កាត់តាម $(3; \frac{1}{3})$ យើងបាន $f(3) = \frac{1}{3}$

$$\frac{a}{3} + \frac{b}{3-2} = \frac{a}{3} + b = \frac{1}{3} \Leftrightarrow a + 3b = 1 \Leftrightarrow a = -3b + 1$$

$$\text{ដោយ } \begin{cases} a = b - 1 \\ a = -3b + 1 \end{cases} \Rightarrow b - 1 = -3b + 1 \Leftrightarrow 4b = 2 \Leftrightarrow$$

$$b = \frac{1}{2}, \quad a = b - 1 = \frac{1}{2} - 1 = -\frac{1}{2}$$

ដូច្នេះយើងបាន

$$\boxed{a = -\frac{1}{2} \quad ; \quad b = \frac{1}{2}}$$

2/. បើ $a = -\frac{1}{2}$; $b = \frac{1}{2}$ នោះអនុគមន៍ទៅជា :

$$y = f(x) = -\frac{1}{2x} + \frac{1}{2(x-2)} = \frac{-(x-2) + x}{2x(x-2)} = \frac{-x+2+x}{2x(x-2)} \\ = \frac{2}{2x(x-2)} = \frac{1}{x(x-2)}$$

$$y = f(x) = \frac{1}{x(x-2)}$$

$$x(x-2) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases} \text{ យើងបាន } \mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{0; 2\}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x^2} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \infty$$

$$f'(x) = \frac{u'v - v'u}{v^2}, \quad u = 1 \Rightarrow u' = 0, \quad v = x(x-2) = x^2 - 2x \Rightarrow v' = 2x - 2$$

$$f'(x) = \frac{-2x+2}{x^2(x-2)^2}, \quad x^2(x-2)^2 > 0, \quad \forall x \in \mathcal{D} \Rightarrow$$

$f'(x)$ យកសញ្ញាតាមតាមក $-2x+2$ ជាទូទៅគេដឹងថា នៃ x ដែលមានឫស $x=1$

$$\text{បើ } x=1 \Rightarrow y=-1$$

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$
$f'(x)$	+	+	0	-	-
$f(x)$	$+\infty$	$+\infty$	-1	$+\infty$	$+\infty$

អនុគមន៍មានតំលៃអតិបរមាស្មើ 1 គ្រប់ $x=1$

ស្រាយថាបន្ទាត់ $x=1$ ជាអ័ក្សធ្នូរបស់ខ្សែកោង (C)

យើងអាចប្រើពីរបៀបផ្សេងគ្នា

a/. តាមប្រសិទ្ធភាព $x=a$ ជាអ័ក្សធ្នូ លុះត្រាតែ $f(a+x) = f(a-x)$

$$\text{រក } f(1+x) = \frac{1}{(1+x)(1+x-2)} = \frac{1}{(x+1)(x-1)} = \frac{1}{x^2-1}$$

$$\text{រក } f(1-x) = \frac{1}{(1-x)(1-x-2)} = \frac{1}{(1-x)(-1-x)} = \frac{1}{x^2-1}$$

ដោយ $f(1+x) = f(1-x) = \frac{1}{x^2-1}$ នោះយើងបានបន្ទាត់ $x=1$ ជាអ័ក្សធ្នូរបស់ខ្សែកោង (C) ។

b/. តាមវិធីដូរតំរុយ ដោយអនុគមន៍មានតំលៃអប្បបរមាស្មើ -1 គ្រប់ $x=1$

នោះយើងបាន $S(1;-1)$ ជាកំពូលរបស់ខ្សែកោង (C) យើងប្រើតំរុយ (SXY)

តាមរូបមន្តនៃការដូរតំរុយ $x=1+X$, $y=-1+Y$ នោះអនុគមន៍ទៅជា

$$-1+Y = \frac{1}{(1-X)(1-X-2)} = \frac{1}{(1-X)(-1-X)} = \frac{1}{X^2-1}$$

$$\text{ដូច្នេះ } Y = f(X) = \frac{1}{X^2-1} + 1 = \frac{1+X^2-1}{X^2-1} = \frac{X^2}{X^2-1}$$

$$\text{ដោយ } f(-X) = \frac{(-X)^2}{(-X)^2-1} = \frac{X^2}{X^2-1} = f(X) \Rightarrow f(X)$$

ជាអនុគមន៍គូ $\Rightarrow$ អ័ក្ស (SY) សមីការ $x=1$ ជាអ័ក្សធ្នូនៃខ្សែកោង (C)

សង់ខ្សែកោង (C) ក្នុងតំរុយអក្ខរកម្ម (oxy)


ខ្សែកោង (C) មិនកាត់អ័ក្សទាំងពីរទេ ព្រោះយើងពុំអាចអោយតំលៃ $x=0$

$$\text{ហើយ } \lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0$$

ដោយ $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0$ នោះយើងបានបន្ទាត់ $y=0$ ឬ $(x'ox)$ ជាអាស៊ីមតូតដេក

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \infty \quad \text{នោះបន្ទាត់ } x=0 \text{ ឬ } (y'oy) \text{ និង}$$

បន្ទាត់ $x=2$ ជាអាស៊ីមតូតឈរ



3/. រោះស្រាយតាមត្រីកោណ និងសញ្ញាប្រសិទ្ធភាព $f(x) = m$
សមីការ $f(x) = m$ ជាសមីការអន់ស៊ីសរោងខ្សែកោង (C) និងបន្ទាត់ $y = m$ ស្រប ($x'ox$)

K	អត្ថិភាព និង សញ្ញាប្រសិទ្ធភាព
$-\infty$	សមីការមានប្រសិទ្ធភាព $0 < x_1 < x_2$
-1	សមីការមានប្រសិទ្ធភាព $x_1 = x_2 = 1 > 0$
0	សមីការមានប្រសិទ្ធភាព
$+\infty$	សមីការមានប្រសិទ្ធភាព $x_1 < 0 < x_2$


4/. គូសខ្សែកោង (C') តាមអនុគមន៍ $y = |f(x)|$

$$\text{អនុគមន៍ } y = |f(x)| = \left| \frac{1}{x(x-2)} \right| = \left| \frac{1}{x^2 - 2x} \right|$$

មានដែនកំណត់ $\mathcal{D} = \mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{0, 2\}$

យើងបាន បើ $f(x) \geq 0 \Rightarrow |f(x)| = f(x) \Rightarrow (C') = (C)$

បើ $f(x) < 0 \Rightarrow |f(x)| = -f(x)$ នោះ (C') ជាប្រភេទនៃ (C) ធៀប ($x'ox$)



កំណត់សំគាល់ :

បើខ្សែកោង (C) នៅក្រោម ($x'ox$) យើងត្រូវគូសរូបច្នៃរបស់វាធៀប ($x'ox$)
ទើបបាន (C')

បើ (C') នៅលើ ($x'ox$) នោះយើងទុកដដែលទើបបាន (C')

លំហាត់

អោយអនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{ax^2 + bx}{x^2 - 4x + 3}$ ដែលមានខ្សែកោងតំណាង (C)

1/. គណនាតំលៃលេខមេកុណា a និង b ដោយដឹងថាអនុគមន៍មានតំលៃអប្បបរមាស្មើ 4 ត្រង់ $x = 2$ ។

2/. សិក្សាអថេរភាពនៃអនុគមន៍ $y = f(x)$ ចំពោះតំលៃ a និង b ដែលរកឃើញបញ្ជាក់សមីការអាស៊ីមតូតទាំងអស់ ។ ស្រាយថាបន្ទាត់ $x = 2$ ជាអ័ក្សរង្វះរបស់ខ្សែកោង (C) រួចសង់ខ្សែកោង (C) តាងអនុគមន៍នេះក្នុងកំរុយអក្ខរកូអរដោនី (oxy) ។

3/. រកតួអនេចនៃចំនុចប្រសព្វរបស់បន្ទាត់ប៉ះខ្សែកោង (C) ត្រង់ $x = 0$ និង $x = 4$ ។

4/. ដោយប្រើត្រីកោណ ដោះស្រាយអត្ថិភាព និងសញ្ញាបូសសមីការ $(1-k)x^2 - 4(1-k)x - 3k = 0$ ដោយពិភាក្សាទៅតាមតំលៃ k ។

ចំលើយ

1/. គណនាមេកុណា a និង b

$$\text{អនុគមន៍ } y = f(x) = \frac{ax^2 + bx}{x^2 - 4x + 3}$$

$$x^2 - 4x + 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = 3 \end{cases} \quad \text{នោះយើងបានដែនកំនត់ } \mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1; 3\}$$

$$y' = \frac{u'v - v'u}{v^2} \quad \begin{aligned} u &= ax^2 + bx & \Rightarrow & u' = 2ax + b \\ v &= x^2 - 4x + 3 & \Rightarrow & v' = 2x - 4 \end{aligned}$$

$$y' = \frac{(2ax+b)(x^2-4x+3) - (2x-4)(ax^2+bx)}{(x^2-4x+3)^2} = \frac{(-4a-b)x^2 + 6ax + 3b}{(x^2-4x+3)^2}$$

$x = 2$ ធ្វើអោយ $f(x)$ មានតំលៃអប្បបរមានោះ $x = 2$ ជាបូសនៃ $f'(x) \Rightarrow$

$$f'(2) = 0 \Leftrightarrow \frac{(-4a-b)4 + 12a + 3b}{(4-8+3)^2} = 0 \Leftrightarrow -16a - 4b + 12a + 3b = 0$$

$$\Leftrightarrow -4a - b = 0 \Leftrightarrow b = -4a \quad (1)$$

$x = 2$ អនុគមន៍មានតំលៃលេខស្មើ 4 នោះ $f(2) = 4 \Leftrightarrow$

$$\frac{4a + 2b}{4 - 8 + 3} = \frac{4a + 2b}{-1} = 4 \Leftrightarrow 4a + 2b = -4 \Leftrightarrow$$

$$2a + b = -2 \Leftrightarrow b = -2a - 2 \quad (2)$$

ដោយផ្គុំ (1) និង (2) យើងបាន $-2a - 2 = -4a$

$$2a = 2 \Leftrightarrow a = 1 \quad \Rightarrow b = -4a = -4$$

$$\text{យើងបាន } \boxed{a = 1, \quad b = -4}$$

2/. សិក្សាអថេរភាពនៃអនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{x^2 - 4x}{x^2 - 4x + 3}$

ដែនកំនត់ អនុគមន៍ $f(x)$ ជាអនុគមន៍ប្រភាគសនិទានមានភាគបែង $x^2 - 4x + 3$

$$x^2 - 4x + 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 1 \\ x_2 = 3 \end{cases} \quad \text{ដូច្នេះយើងបាន } \mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1; 3\}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2}{x^2} = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty \quad \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \infty$$

$$u = x^2 - 4x \quad \Rightarrow u' = 2x - 4$$

$$f'(x) = \frac{u'v - v'u}{v^2}$$

$$v = x^2 - 4x + 3 \quad \Rightarrow v' = 2x - 4$$

$$f(x) = \frac{(2x-4)(x^2-4x+3)-(2x-4)(x^2-4x)}{(x^2-4x+3)^2} = \frac{(2x-4)(x^2-4x+3-x^2+4x)}{(x^2-4x+3)^2}$$

$$= \frac{(2x-4) \cdot 3}{(x^2-4x+3)^2} = \frac{6(x-2)}{(x^2-4x+3)^2} \text{ ដោយ } (x^2-4x+3)^2 > 0 \quad \forall x \in \mathbb{D}$$

នោះ $f(x)$ យកសញ្ញាតាមភាគយក $6(x-2)$ ដែលជាទ្វេធានីក្រេទី 1 នៃ x
 មានបូល $x = 2$ បើ $x = 2 \Rightarrow y = f(2) = 4$

x	$-\infty$	1	2	3	$+\infty$
$f(x)$	-	-	0	+	+
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$	4	$+\infty$	$+\infty$

អនុគមន៍មានតំលៃអប្បបរមាស្មើ 4 ត្រង់ $x = 2$

- បញ្ជាក់សមីការអាស៊ីមតូតទាំងអស់ដែលមាន

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 1$ នោះយើងបានបន្ទាត់ $y = 1$ ជាអាស៊ីមតូតដេក

$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \infty$

នោះយើងបានបន្ទាត់ $x = 1$ និង $x = 3$ ជាអាស៊ីមតូតឈរ

- ស្រាយបញ្ជាក់ថា បន្ទាត់ $x = 2$ ជាអ័ក្សឆ្លុះរបស់ខ្សែកោង (C)

ដោយអនុគមន៍មានតំលៃអតិបរមាស្មើ 4 ត្រង់ $x = 2$ នោះយើងបាន $S(2;4)$

ជាកំពូលរបស់ខ្សែកោង (C) ។ ត្រង់ជំរុញអត្ថន័យ (SXY) យើងបានតាមរូបមន្តការប្តូរតំរូវ

$x = 2 + X; \quad y = 4 + Y$ នោះអនុគមន៍ទៅជា

$$4 + Y = \frac{(2+X)^2 - 4(2+X)}{(2+X)^2 - 4(2+X) + 3} = \frac{4+4X+X^2-8-4X}{4+4X+X^2-8-4X+3} = \frac{X^2-4}{X^2-1} \Rightarrow$$

$$Y = f(X) = \frac{X^2-4}{X^2-1} - 4$$

$$\text{តែ } f(-X) = \frac{(-X)^2-4}{(-X)^2-1} - 4 = \frac{X^2-4}{X^2-1} - 4 = f(X) \Rightarrow f(X) \text{ ជាអនុគមន៍}$$


$\Rightarrow$ អ័ក្ស (SY) សមីការ $x = 2$ ជាអ័ក្សឆ្លុះរបស់ (C)

- សង់ខ្សែកោង (C)

ខ្សែកោង (C) កាត់ $(x'ox)$ ត្រង់ចំនុចមានអាបស៊ីសជាបូលនៃសមីការ :

$$\frac{x^2-4x}{x^2-4x+3} = 0 \Leftrightarrow x^2-4x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 4 \end{cases}$$

ខ្សែកោង (C) កាត់ $(y'oy)$ ត្រង់ចំនុចមានអរដោនេ : $y = f(o) = 0$



3/. បើ $x = 0 \Rightarrow y = f(0) = 0$ ដូច្នេះគល់ $O(0,0)$

បើ $x = 4 \Rightarrow y = f(4) = 0$ (4,0)

សមីការនៃបន្ទាត់ប៉ះ (C) ត្រង់ $x = 0$: មានមេគុណប្រាប់ទិស $f'(0) = \frac{-12}{9} = -\frac{4}{3}$

មានសមីការ $-\frac{4}{3} = \frac{y-0}{x-0} \Leftrightarrow y = -\frac{4}{3}x$

សមីការនៃបន្ទាត់ប៉ះ (C) ត្រង់ $x = 4$: មានមេគុណប្រាប់ទិស $f'(4) = \frac{12}{9} = \frac{4}{3}$

មានសមីការ $\frac{4}{3} = \frac{y-0}{x-4} \Leftrightarrow y = \frac{4x}{3} - \frac{16}{3}$

គណនាកូអរដោនេចំនុចប្រសព្វនៃបន្ទាត់ប៉ះទាំងពីរ

$$\frac{4}{3}x - \frac{16}{3} = -\frac{4}{3}x \Leftrightarrow \frac{8}{3}x = \frac{16}{3} \Leftrightarrow 8x = 16 \Leftrightarrow x = 2$$

$$\Rightarrow y = -\frac{4}{3} \cdot 2 = -\frac{8}{3} \text{ យើងបានចំនុចប្រសព្វតាមរយៈ } I(2; -\frac{8}{3})$$

4/. ដោះស្រាយតាមត្រាភិចអត្ថិភាព និងសញ្ញាបូសសមីការ

$$(1-K)x^2 - 4(1-K)x - 3K = 0 \Leftrightarrow x^2 - Kx^2 - 4x + 4Kx - 3K = 0$$

$$x^2 - 4x = K(x^2 - 4x + 3) \Leftrightarrow \frac{x^2 - 4x}{x^2 - 4x + 3} = K$$

ជាសមីការអាប៉ូស៊ីសរវាងខ្សែកោង (C) និងបន្ទាត់ $y = K$ ស្រប $(x'Ox)$

K	អត្ថិភាព និងសញ្ញាបូសសមីការ
$-\infty$	សមីការ មានបូសពីរ $0 < x_1 < x_2$
0	សមីការ មានបូសពីរ $x_1 = 0 < x_2 = 4$
	សមីការ មានបូសពីរ $x_1 < 0 < x_2$
1	សមីការ គ្មានបូស
	សមីការ គ្មានបូស
4	សមីការ មានបូសឌុប $x_1 = x_2 = 2 > 0$
$+\infty$	សមីការ មានបូសពីរ $0 < x_1 < x_2$

លំហាត់

1/. គេមានអនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{x^2+1}{x^2-1}$ ដែលមានក្រាបតំណាង (C) ។

សិក្សាទិសដោយប្រើភាពនិងសងខ្សែកោង (C) តាមអនុគមន៍នេះក្នុងតំបន់អន្តរកម្ម (Oxy)

2/. តាម $A \in (C)$ អាប៉ូស៊ីស O គេត្រូវសម្ងាត់ (D_m) មានមេគុណ

ប្រាប់ទិស m ។ សរសេរសមីការបន្ទាត់ (D_m) ។ រួចកំណត់ m ដើម្បីឱ្យកោង (C) និង (D_m) មានចំនុចប្រសព្វពីរទៀត M និង N ខុសពី A ។ រកកូអរដោនេចំនុចកណ្តាល

នៃ $[MN]$ ជាអនុគមន៍នៃ m រួចគេសំនុំចំនុច I បើ m ផ្លាស់ប្តូរតំលៃ ។

3/. ដោះស្រាយតាមត្រាភិចអត្ថិភាព និងសញ្ញាបូសសមីការ ដោយពិភាក្សាទៅតាម តំលៃនៃ K ។ $(K-1)x^2 - K - 1 = 0$

ចំលើយ

1/. សិក្សាទិសដោយប្រើភាពនៃអនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{x^2+1}{x^2-1}$

អនុគមន៍នេះជាប្រភេទអនុគមន៍សនិទានដែលមានភាគបែង x^2-1

$$x^2-1=0 \Leftrightarrow x^2=1 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -1 \\ x_2 = 1 \end{cases} \text{ ដូច្នេះ } D = \mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2}{x^2} = 1 ; \quad \lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \infty ; \quad \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty$$

$$f'(x) = \frac{u'v - v'u}{v^2} \quad \begin{matrix} u = x^2+1 & \Rightarrow & u' = 2x \\ v = x^2-1 & \Leftrightarrow & v' = 2x \end{matrix}$$

$$f'(x) = \frac{2x(x^2-1) - 2x(x^2+1)}{(x^2-1)^2} = \frac{-4x}{(x^2-1)^2} ; f'(x) \text{ យកសញ្ញាតាម } -4x, \forall x \in D$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow -4x = 0 \Leftrightarrow x = 0 \Rightarrow y = f(0) = -1$$

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		$+$	$+$ 0 $-$	$+$ $+$ $+$	
$f(x)$		$+\infty$	-1	$+\infty$	

អនុគមន៍មានតំលៃអតិបរមាស្មើ -1 ត្រង់ $x = 0$

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 1$ ទោះយើងបានបន្ទាត់ $y = 1$ ជាអាស៊ីមតូតដេក

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \infty \quad \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty$$

យើងបានបន្ទាត់ $x = -1$ និង $x = 1$ ជាអាស៊ីមតូតឈរ

អាស៊ីមតូតទទួលបានប្រសព្វរវាងខ្សែកោង (C) និង $(x'Ox)$ ជាបូសនៃសមីការ

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{x^2+1}{x^2-1} = 0 \Leftrightarrow x^2+1 = 0 \Leftrightarrow x^2 = -1 \text{ សមីការគ្មានបូស}$$


ដូច្នេះខ្សែកោង (C) មិនកាត់ $(x'Ox)$ ទេ

អដេនេចំនុចប្រសព្វរវាង (C) និង $(y'Oy)$ គឺ $y = f(0) = -1$

ស្រាយអិក្យូឆ្លៈ

$$\forall x \in \mathcal{D} \text{ យើងបាន } f(-x) = \frac{(-x)^2+1}{(-x)^2-1} = \frac{x^2+1}{x^2-1} = f(x) \text{ យើងបាន}$$

$f(x)$ ជាអនុគមន៍គូ $\Rightarrow (y'Oy)$ ជាអិក្យូឆ្លៈរបស់ខ្សែកោង (C) ។



$$\text{សមីការបន្ទាត់ } (D_m) : m = \frac{y+1}{x-0} \Leftrightarrow y+1 = mx \Leftrightarrow$$

$$(D_m) : y = mx - 1$$

សមីការអាស៊ីមតូតរវាង (C) និង (D_m)

$$\frac{x^2+1}{x^2-1} = mx - 1 \Leftrightarrow mx^3 - mx - x^2 + 1 = x^2 + 1 \Leftrightarrow$$

$$mx^3 - 2x^2 - mx = 0 \Leftrightarrow x(mx^2 - 2x - m) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \text{ អាស៊ីមតូត } A \\ mx^2 - 2x - m = 0 \quad (1) \end{cases}$$

ដើម្បីឆោតមានចំនុចប្រសព្វពីរទៀត M និង N លុះត្រាតែសមីការ (1) មានឫសពីរ

$$\begin{cases} a = m \neq 0 \\ \Delta' = 1 + m^2 > 0 \end{cases}$$

តែ M និង N ខុសពី A នោះ គំរូរ $x = 0$ មិនមែនជាឫសនៃ (1) គឺ $x = 1$

មិនផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការ (1) : $0 - 0 - m \neq 0 \Leftrightarrow m \neq 0$

ដូច្នេះ យើងត្រូវយក

$$m \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

រកអនុគមន៍ I ចំនុចណ្ហានៃ $[MN]$: $I(x, y)$

$$x = \frac{x_M + x_N}{2} = -\frac{b}{2a} - \frac{1}{m} \text{ អថេរ}$$

$$I(x, -\frac{1}{m}; y = 0)$$

$$y = m \cdot \frac{1}{m} - 1 = 1 - 1 = 0 \text{ ថេរ}$$

ដូច្នេះ សំណុំចំនុច I គឺបន្ទាត់សមីការ $y = 0$ (អ័ក្ស $(x'Ox)$)

3/. ដោះស្រាយតាមក្រាតិចអត្ថិភាព និងសញ្ញាបូសសមីការ

$$(K-1)x^2 - K - 1 = 0 \text{ សមីការនេះអាចសរសេរ}$$

$$Kx^2 - x^2 - K - 1 = 0 \Leftrightarrow Kx^2 - x^2 = x^2 + 1 \Leftrightarrow$$

$$K(x^2 - 1) = x^2 + 1 \Leftrightarrow \frac{x^2 + 1}{x^2 - 1} = K \text{ ជាសមីការអាប៉ូស្តូសរវាង (C)}$$

និងបន្ទាត់ $y = K$ ស្រប $(x'Ox)$ ។ តាមក្រាតិចយើងបាន

K	អត្ថិភាព និងសញ្ញាបូសសមីការ
$-\infty$	សមីការ មានឫសពីរ $x_1 < 0 < x_2$
-1	សមីការ មានឫសឌុប $x_1 = x_2 = 0$
	សមីការ គ្មានឫស
1	សមីការ គ្មានឫស
	សមីការ មានឫសពីរ $x_1 < 0 < x_2$
$+\infty$	

លំហាត់

គេមានអនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{3x^2 - 18x + 25}{x^2 - 6x + 8}$ មានក្រាបតំណាង (C)

1/. សិក្សាទិសដៅអថេរភាព $f(x)$ ដោយបញ្ជាក់គ្រប់សមីការអាស៊ីមតូតដែលមានរូបសង់ខ្សែកោង (C) តាងអនុគមន៍នេះក្នុងតំរុយអត្ថន័យ (Oxy) ។

ស្រាយបញ្ជាក់ថា បន្ទាត់ $x = 3$ ជាអ័ក្សឆ្លងរបស់ខ្សែកោង (C) ។

2/. ប្រើក្រាតិចដោះស្រាយវិសមីការ $f(x) \geq 1$

3/. ដោះស្រាយតាមក្រាតិចអត្ថិភាព និង សញ្ញាបូសសមីការ

$$\frac{3x^2 - 18x + 25}{x^2 - 6x + 8} = K \text{ ដោយពិភាក្សាទៅតាមតំលៃ } K$$

ជំរឿន

1/ ទិសដៅអថេរគោតនៃ $y = f(x) = \frac{3x^2 - 18x + 25}{x^2 - 6x + 8}$

$x^2 - 6x + 8$ មាន $\Delta' = 9 - 8 = 1$ ដូច្នេះវាមានឫសពីរ

$x_1 = 3 - 1 = 2$, $x_2 = 3 + 1 = 4$ ដូច្នេះអនុគមន៍ $f(x)$ មានដែនកំណត់

$D = \mathbb{R} \setminus \{2, 4\}$



$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3x^2}{x^2} = 3$, $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = \infty$

$f(x) = \frac{u'v - v'u}{v^2}$ $u = 3x^2 - 18x + 25 \Rightarrow u' = 6x - 18$
 $v = x^2 - 6x + 8 \Rightarrow v' = 2x - 6$

$f'(x) = \frac{6x^3 - 36x^2 + 48x - 18x^2 + 108x - 144 - 6x^3 + 36x^2 - 50x + 18x^2 - 108x + 150}{(x^2 - 6x + 8)^2}$

$f'(x) = \frac{-2x + 6}{(x^2 - 6x + 8)^2} - \frac{-2(x-3)}{(x^2 - 6x + 8)^2}$ ដោយ $(x^2 - 6x + 8)^2 > 0$

$\forall x \in D$ នោះតាមរយៈ $f(x)$ យកសញ្ញាតាម $-2x + 6$, $\forall x \in D$



អនុគមន៍មានតំលៃអតិបរមាស្មើ 2 ចំពោះ $x = 3$

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 3$ យើងបានបន្ទាត់ $y = 3$ ជាអាស៊ីមតូតដេក

$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \infty$, $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = \infty$

នោះយើងបានបន្ទាត់ $x = 2$ និង $x = 4$ ជាអាស៊ីមតូតឈរ

អាស៊ីមតូតចំនុចប្រសព្វរវាង (C) និង $(x'Ox)$ ជាប្លង់នៃសមីការ $\frac{3x^2 - 18x + 25}{x^2 - 6x + 8} = 0$

$\Leftrightarrow 3x^2 - 18x + 25 = 0$, $\Delta' = 81 - 75 = 6$

យើងបានឫស $x_1 = \frac{9 - \sqrt{6}}{3}$, $x_2 = \frac{9 + \sqrt{6}}{3}$

អរដោនេចំនុចប្រសព្វរវាង (C) និង $(y'Oy)$ គឺ $y = f(0) = \frac{25}{8}$

ស្រាយបញ្ជាក់ថាបន្ទាត់ $x = 3$ ជាអ័ក្សធ្វះរបស់ខ្សែកោង (C)

បន្ទាត់ $x = 3$ កាត់ (C) ត្រង់ $y = 2$ ហើយ $S(3,2)$ ជាកំពូលខ្សែកោង (C)

ក្នុងតំរុយ (SXY) យើងបានតាមរូបមន្តនៃការផ្លាស់ប្តូរ

$x = 3 + X$

$y = 2 + Y$ នោះអនុគមន៍ទៅជា


$2 + Y = \frac{3(3+X)^2 - 18(3+X) + 25}{(3+X)^2 - 6(3+X) + 8} = \frac{27 + 18X + 3X^2 - 54 - 18X + 25}{9 + 6X + X^2 - 18 - 6X + 8}$

$= \frac{3X^2 - 2}{X^2 - 1} \Leftrightarrow Y = \frac{3X^2 - 2}{X^2 - 1} - 2 = \frac{3X^2 - 2 - 2X^2 + 2}{X^2 - 1} = \frac{X^2}{X^2 - 1}$

យើងបាន $Y = f(X) = \frac{X^2}{X^2 - 1}$

ដោយ $f(-X) = \frac{(-X)^2}{(-X)^2 - 1} = \frac{X^2}{X^2 - 1} = f(X) \Rightarrow f(X)$ ជាអនុគមន៍គូនោះ

បន្ទាត់ (SY) សមីការ $x = 3$ ជាអ័ក្សធ្វះរបស់ខ្សែកោង (C) ។



2/ ប្រើក្រាហ្វិកដោះស្រាយវិសមីការ $\frac{3x^2 - 18x + 25}{x^2 - 6x + 8} \geq 1$

$y = \frac{3x^2 - 18x + 25}{x^2 - 6x + 8}$ ជាសមីការរបស់ខ្សែកោង (C)

$y = 1$ ជាសមីការបន្ទាត់ស្រប ($x'Ox$)

ចន្លាក់ $y = 1$ កាត់ខ្សែកោង (C) ត្រង់ចំនុចមានអាប់ស៊ីសជាវិសមីការ

$$\frac{3x^2 - 18x + 25}{x^2 - 6x + 8} = 1 \Leftrightarrow 3x^2 - 18x + 25 = x^2 - 6x + 8 \Leftrightarrow$$

$$2x^2 - 12x + 17 = 0$$

$$\Delta' = 36 - 34 = 2$$

នោះយើងបានសមីការមានឫសពីរ

$$x_1 = \frac{6 - \sqrt{2}}{2}$$

$$x_2 = \frac{6 + \sqrt{2}}{2}$$

វិសមីការ $f(x) = \frac{3x^2 - 18x + 25}{x^2 - 6x + 8} \geq 1$ គឺយើងត្រូវជ្រើសរើសរត់លេខ x

ដែលខ្សែកោង (C) នៅលើបន្ទាត់ $y = 1$ ដូច្នេះយើងត្រូវយក

$$x \in]-\infty ; 2[\cup \left[\frac{6 - \sqrt{2}}{2} ; \frac{6 + \sqrt{2}}{2} \right] \cup]4 ; +\infty[$$

3/ ដោះស្រាយតាមក្រាហ្វិក អត្ថិភាព និងសញ្ញាឫស

$$\frac{3x^2 - 18x + 25}{x^2 - 6x + 8} = K \text{ ជាសមីការអាប់ស៊ីសកោងខ្សែកោង (C)}$$

និងបន្ទាត់ $y = K$ ស្រប ($x'Ox$) ដោយពិនិត្យតាមក្រាហ្វិក យើងបាន

K	អត្ថិភាព និងសញ្ញាឫសសមីការ
$-\infty$	សមីការ មានឫសពីរ $0 < x_1 < x_2$
2	សមីការ មានឫសឌុប $x_1 = x_2 = 3 > 0$
	សមីការ គ្មានឫស
3	សមីការ គ្មានឫស
	សមីការ មានឫសពីរ $x_1 < 0 < x_2$
$\frac{25}{8}$	សមីការ មានឫសពីរ $x_1 = 0 < x_2$
$+\infty$	សមីការ មានឫសពីរ $0 < x_1 < x_2$

លំហាត់

គេមានអនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{7x^2 + 20x}{x^2 + 2x - 3}$ ដែលមានក្រាបតំណាង (C)

1. សិក្សាទិសដោយចេតនា និងសង់ខ្សែកោង (C) តាងអនុគមន៍នេះក្នុង
កំរុយអន្តរកាល (Oxy) ។

2. ដោះស្រាយតាមក្រាបតំណាង និងសញ្ញាប្រសិទ្ធភាពទៅតាមតំលៃនៃ m

$$(m-7)x^2 + 2(m-10)x - 3m = 0$$

ចំណើយ

1. សិក្សាទិសដោយចេតនាអនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{7x^2 + 20x}{x^2 + 2x - 3}$

អនុគមន៍នេះ ជាអនុគមន៍ប្រភេទសនិទានមានភាគបែង $x^2 + 2x - 3$


$$x^2 + 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -3 \end{cases} \quad \text{ដូច្នេះ } D = \mathbb{R} \setminus \{-3; 1\}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{7x^2}{x^2} = 7 ; \quad \lim_{x \rightarrow -3} f(x) = \infty ; \quad \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty$$

$$f(x) = \frac{u'v - v'u}{v^2} \quad \begin{aligned} u &= 7x^2 + 20x & \Rightarrow & u' = 14x + 20 \\ v &= x^2 + 2x - 3 & \Rightarrow & v' = 2x + 2 \end{aligned}$$

$$f'(x) = \frac{(14x+20)(x^2+2x-3) - (2x+2)(7x^2+20x)}{(x^2+2x-3)^2} = \frac{-6(x+5)(x+2)}{(x^2+2x-3)^2}$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -5 & \Rightarrow y = f(-5) = \frac{25}{4} \\ x = -2 & \Rightarrow y = f(-2) = 4 \end{cases}$$



អនុគមន៍មានតំលៃអប្បបរមាស្មើ $\frac{25}{4}$ ត្រង់ $x = -5$ ហើយមានតំលៃអតិបរមាស្មើ 4

ចំពោះ $x = -2$

ដោយ $\lim_{x \rightarrow -3} f(x) = \infty$ $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty$ ទោះយើងបានបន្ទាត់ $x = -3$

និង $x = 1$ ជាអាស៊ីមតូតឈររបស់អនុគមន៍

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 7$ ទោះយើងបានបន្ទាត់ $y = 7$ ជាអាស៊ីមតូតដេករបស់អនុគមន៍ខ្សែកោង (C)

កាត់ $(x'Ox)$ ត្រង់ចំនុចមានអាបស៊ីសជាបួសនៃសមីការ


$$\frac{7x^2 + 20x}{x^2 + 2x - 3} = 0 \Leftrightarrow 7x^2 + 20x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -\frac{20}{7} \end{cases}$$

អនុគមន៍ចំនុចប្រសព្វរវាង (C) និង $(y'Oy)$ គឺ $y = f(0) = 0$

ខ្សែកោង (C) កាត់អាស៊ីមតូតដេក $y = 7$ ត្រង់ចំនុចដែលមានអាបស៊ីសជាបួសនៃសមីការ

$$\begin{aligned} \frac{7x^2 + 20x}{x^2 + 2x - 3} &= 7 \Leftrightarrow 7x^2 + 14x - 21 = 7x^2 + 20x \\ &\Leftrightarrow 6x = -21 \Leftrightarrow x = -\frac{21}{6} = -\frac{7}{2} \end{aligned}$$

ខ្សែកោង (C) កាត់អាស៊ីមតូតដេក $y = 1$ ត្រង់ $x = -\frac{7}{2}$



2/ ដោះស្រាយតាមក្រាហ្វិកអត្ថិភាព និងសញ្ញាបូសសមីការ :

$$(m-7)x^2 + 2(m-10)x - 3m = 0$$

អាចសរសេរ $\frac{7x^2 + 20x}{x^2 + 2x - 3} = m$ ជាសមីការអាប់ស៊ីសរាង (C) និងបន្ទាត់ $y = m$

m	អត្ថិភាព និងសញ្ញាបូសសមីការ
$-\infty$	សមីការ មានបូសពីរ $x_1 < 0 < x_2$
0	សមីការ មានបូសពីរ $x_1 = -\frac{20}{7} < x_2 = 0$
	សមីការ មានបូសពីរ $x_1 < x_2 < 0$
4	សមីការ មានបូសពីរ $x_1 < x_2 < 0$
	សមីការ មានបូសពីរ $x_1 = x_2 = -2 < 0$
$\frac{25}{4}$	សមីការ មានបូសពីរ
	សមីការ មានបូសពីរ $x_1 = x_2 = -5 < 0$
7	សមីការ មានបូសពីរ $x_1 < x_2 < 0$
	សមីការ មានបូសពីរ $x_1 = -\frac{7}{2} < 0$
$+\infty$	សមីការ មានបូសពីរ $x_1 < 0 < x_2$

អនុគមន៍រាង $y = f(x) = \frac{(ax^2+bx+c)'}{ax^2+bx+c} = \frac{2ax+b}{ax^2+bx+c}$

1/. សិក្សាទិសដោយដេរីវេនៃអនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{2x-2}{x^2-2x-3}$

- ស្រាយបញ្ជីរោង (C) តាងអនុគមន៍នេះ មានចំនុច / ជាប្រសព្វរោង (C) និង $(x'Ox)$ ជាផ្ចិតចុះ ។

- ដោះស្រាយអត្ថិភាពសញ្ញាបូសសមីការ $\frac{2x-2}{x^2-2x-3} = m$ ដោយពិភាក្សាទៅតាម តំលៃនៃ m ។

ចំណើយ

អនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{2x-2}{x^2-2x-3}$ ជាអនុគមន៍ប្រភាគសនិទានដែលមាន

$N = 2x-2$ និង $D = x^2-2x-3$ រកបូសរបស់ D

$D = x^2-2x-3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -1 \\ x_2 = 3 \end{cases}$ ដូច្នេះ អនុគមន៍នេះមានដែនកំនត់

តាងដោយ $D = \mathbb{R} \setminus \{-1; 3\}$

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2}{x} = 0$

$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \infty$; $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \infty$

$f'(x) = \frac{N'D - D'N}{D^2}$; $N = 2x-2 \Rightarrow N' = 2$

$D = x^2-2x-3 \Rightarrow D' = 2x-2$

ដូច្នេះ $f'(x) = \frac{2(x^2-2x-3)-(2x-2)(2x-2)}{(x^2-2x-3)^2} = \frac{2x^2-4x-6-4x^2+4x+4x-4}{(x^2-2x-3)^2} = \frac{-2x^2+4x-10}{(x^2-2x-3)^2}$

ដោយ $\forall x \in D$; $x^2-2x-3 \neq 0 \Rightarrow (x^2-2x-3)^2 > 0$ ដោះស្រាយដោយ $f'(x)$

យកសញ្ញាតាម $-2x^2+4x-10$ ជាត្រីការ៉េក្រេទី 2 នៃ x

មាន $a = -2 < 0$

$\Delta' = 4-20 = -16 < 0 \Rightarrow -2x^2+4x-10 < 0 \Rightarrow$

$f'(x) = \frac{-2x^2+4x-10}{(x^2-2x-3)^2} < 0$, $\forall x \in D$ មានន័យថា

អនុគមន៍ $f(x)$ ចុះក្នុងដែនកំនត់ $D = \mathbb{R} \setminus \{-1; 3\}$

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$
y'	-		-	-
y	0 	$+\infty$ 	$+\infty$ 	0

ខ្សែរោង (C) មានបន្ទាត់ $y = 0$ ជាអាបស៊ីមតូតដេក ព្រោះ $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0$

មានបន្ទាត់ $x = -1$ និង $x = 3$ ជាអាស៊ីមតូតឈរ ព្រោះ $\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \infty$

និង $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \infty$

ខ្សែរោង (C) កាត់ $(x'Ox)$ ត្រង់ចំនុច / មានអាបស៊ីមតូតបូសនៃសមីការ

$\frac{2x-2}{x^2-2x-3} = 0 \Leftrightarrow 2x-2 = 0 \Leftrightarrow x = 1$, $y = 0$, $I(1;0)$

ខ្សែកោង (C) កាត់ (x'Oy) ត្រង់ចំនុចអដោយ $y = f(0) = \frac{-2}{-3} = \frac{2}{3}$

ស្រាយថា $I(1;0)$ ជាផ្ចិតឆ្លុះរបស់ខ្សែកោង (C)

យកចំនុច I ជាគល់តំរូវថ្មី (IXY) តាមរូបមន្តតំរូវ

$x = 1 + X$ $y = 0 + Y = Y$ ទោះយើងបានសមីការខ្សែកោង (C)

ធៀបតំរូវថ្មី វិសមីការបង្រួមគឺ :

$$Y = \frac{2(1+X)+20}{(1+X)^2-2(1+X)-3} = \frac{2+2X-2}{1+2X+X^2-2-2X-3} = \frac{2X}{X^2-4}$$

$$Y = f(X) = \frac{2X}{X^2-4}$$


$$f(-X) = \frac{2(-X)}{(-X)^2-4} = \frac{-2X}{X^2-4} = -\frac{2X}{X^2-4} = -f(X)$$

$\Rightarrow f(X)$ ជាអនុកម្មន៍សេស $\Rightarrow$ គល់ $I(1;0)$ នៃតំរូវថ្មី (IXY) ជាផ្ចិតឆ្លុះរបស់ខ្សែកោង (C)

ដូច្នេះខ្សែកោង (C) មានចំនុច $I(1;0)$ ជាផ្ចិតឆ្លុះ

សមីការ $\frac{2x-2}{x^2-2x-3} = m$ ជាសមីការដាច់ស្រាវជ្រាវខ្សែកោង (C) និងបន្ទាត់អថេរ

$x = m$ ប្រែប្រួលស្រប (x'Ox) ។



m	អត្ថិភាព និងសញ្ញាបូសសមីការ $\frac{2x-2}{x^2-2x-3} = m$
$-\infty$	សមីការ មានបូសពីរ $x_1 < 0 < x_2$
0	សមីការ មានបូសមួយ $x = 1$
	សមីការ មានបូសពីរ $0 < x_1 < x_2$
$\frac{2}{3}$	សមីការ មានបូសពីរ $x_1 = 0 < x_2$
	សមីការ មានបូសពីរ $x_1 < 0 < x_2$
$+\infty$	

លំហាត់

តេអោយអនុគមន៍នៃចំនួនពិត កំនត់ដោយ $y = f(x) = \frac{-4x+8}{x^2-4x+5}$
ដែលមានខ្សែកោងតំនាង (C) ។

1/. សិក្សាទិសដៅរបស់ខ្សែកោង (C) តាងអនុគមន៍នេះក្នុងកុំរុយ
អន្តរមេ (Oxy) ដោយយក 1 ឯកតាប្រវែង 2cm ។

2/. ខ្សែកោង (C) កាត់ (x'Ox) ត្រង់ A ស្រាយថា A ជាចំណុច
របស់ខ្សែកោង (C)

3/. សិក្សាសញ្ញានៃ $f(x) - (-4x+8)$ ដោយពិភាក្សាទៅតាមតំលៃនៃ x ។

4/. ពិភាក្សាតាមក្រាហ្វិកតាំងបូសសមីការ

$$mx^2 - 4(m-1)x + 5m - 8 = 0 \quad \text{ជឿប} \quad 1, 2, 3$$

ចំណើយ

1/. + តេអោយកំនត់ អនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{-4x+8}{x^2-4x+5}$ ជាអនុគមន៍
ប្រភាគសនិទាន

$D = x^2 - 4x + 5$ ជាត្រីការ៉េក្រេទី 2 នៃ x

$$\begin{cases} a = 1 > 0 \\ \Delta' = (4-5) = -1 < 0 \end{cases} \Rightarrow D > 0, \forall x \in \mathbb{R}$$

ដូច្នេះយើងបាន $D = \mathbb{R}$

+ លីមីត

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{-4x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{-4}{x} = 0$$

+ ដេរីវេ

$$f'(x) = \frac{u'v - v'u}{v^2} \quad \begin{matrix} u = -4x+8 \\ v = x^2-4x+5 \end{matrix} \Rightarrow \begin{matrix} u' = -4 \\ v' = 2x-4 \end{matrix}$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{-4x^2 + 16x - 20 - (2x-4)(-4x+8)}{(x^2-4x+5)^2} \\ &= \frac{-4x^2 + 16x - 20 + 8x^2 - 16x - 16x + 32}{(x^2-4x+5)^2} \\ &= \frac{4x^2 - 16x + 12}{(x^2-4x+5)^2} = \frac{4(x^2-4x+3)}{(x^2-4x+5)^2} \end{aligned}$$

$f'(x)$ យកសញ្ញាតាម x^2-4x+3 ជាត្រីការ៉េក្រេទី 2 នៃ x

$$f'(x) = 0 \Rightarrow \begin{cases} x_1 = 1 & y_1 = 2 \\ x_2 = 3 & y_2 = -2 \end{cases}$$

តារាងទិសដៅរបស់ខ្សែកោង

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$
$f'(x)$		+	-	+
		↖	↘	↗
		2	-2	0

2/ អាប៉ូស៊ីតូនីតប្រសព្វរវាង (C) និង $(x'Ox)$ សមីការ $y = 0$

ជាអាស៊ីមតូតដេក គឺជាប្រសព្វនៃ $f(x) = \frac{-4x+8}{x^2-4x+5} = 0 \Leftrightarrow -4x+8 = 0 \Leftrightarrow x = 2$

ដូច្នេះ : $A(2;0)$

អរដោនេចំនុចប្រសព្វរវាង (C) និង $(x'Oy)$ គឺ $y = f(0) = \frac{8}{5}$

ស្រាយថា $A(2,0)$ ជាផ្ចិតឆ្លុះរបស់ខ្សែកោង (C)

យក $A(2,0)$ ជាគល់នៃតំរុយថ្មី (AXY) នោះយើងបានតាមរូបមន្តនៃការផ្លាស់ប្តូរ $x = 2 + X$

$y = 0 + Y = Y$ សមីការរបស់ខ្សែកោង (C) ធៀបទៅនឹងតំរុយថ្មី វិសមីការប្រែប្រួល


របស់ (C) គឺ $Y = \frac{-4(2+X)+8}{(2+X)^2-4(2+X)+5} =$

$$\frac{-8-4X+8}{4+4X+X^2-8-4X+5} = \frac{-4X}{X^2+1} = f(X)$$

$$f(-X) = \frac{-4(-X)}{(-X)^2+1} = \frac{4X}{X^2+1} = -\frac{-4X}{X^2+1} = -f(X)$$

$f(X)$ ជានុគមន៍សេស ដូច្នេះគល់ $A(2,0)$ នៃតំរុយ (AXY) ជាផ្ចិតឆ្លុះរបស់ខ្សែកោង (C)

ខ្សែកោង (C) មានចំនុច $A(2,0)$ ជាផ្ចិតឆ្លុះ



3/ សិក្សាសញ្ញា $f(x) - (-4x+8)$ ដោយពិភាក្សាទៅតាមតំលៃនៃ x

$$f(x) - (-4x+8) = \frac{-4x+8}{x^2-4x+5} - (-4x+8) =$$

$$= \frac{(-4x+8)(x^2-4x+5)}{x^2-4x+5} - (-4x+8) = \frac{(-4x+8)(x^2-4x+5) - (-4x+8)(x^2-4x+5)}{x^2-4x+5}$$

$$= \frac{(-4x+8)(x^2-4x+4)}{x^2-4x+5} = \frac{(4x-8)(x^2-4x+4)}{x^2-4x+5} = \frac{N}{D}$$

ដោយ $D = x^2-4x+5 > 0, \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow f(x) - (-4x+8)$ យកសញ្ញាតាមភាគយក

$$(4x-8)(x^2-4x+4) = (4x-8)(x-2)^2$$

x	$-\infty$		2	$+\infty$
$4x-8$		-	0	+
$(x-2)^2$		+	0	+
$(4x-8)(x-2)^2$		-	0	+

x	សញ្ញា $f(x) - (-4x+8)$
$-\infty$	$f(x) - (-4x+8) < 0$
2	$f(x) - (-4x+8) = 0$
$+\infty$	$f(x) - (-4x+8) > 0$

4/. ពិភាក្សាតាមត្រាតិចទីតាំងវិសសមីការ $mx^2 - 4(m-1)x + 5m - 8 = 0$

រៀបចំនួន 1, 2, 3

សមីការនេះ អាចសរសេរ $mx^2 - 4(m-1)x + 5m - 8 = 0 \Leftrightarrow$
 $mx^2 - 4mx + 5m = -4x + 8$

$$m(x^2 - 4x + 5) = -4x + 8 \Leftrightarrow \frac{-4x + 8}{x^2 - 4x + 5} = m \text{ ជាសមីការ}$$

អាចស៊ីសរោងខ្សែកោង (C) និងបន្ទាត់ $y = m$ ស្រប ($x'Ox$)

តួសបន្ទាត់ $x = 1$, $x = 2$ និង $x = 3$ ដែលកាត់ខ្សែកោង (C)

ត្រង់ $y = 2$, $y = 0$ និង $y = 3$ រួចតួសបន្ទាត់ $y = m = 2$
 $y = m = 0$
 $y = m = 3$

យើងពិនិត្យអត្ថភាពទីតាំងវិសសមីការលើត្រាតិច

m	ទីតាំងវិសសមីការរៀបចំនួន 1, 2, 3
$-\infty$	សមីការ មានបួសពីរ
-2	សមីការ មានបួសខុប $x_1 = x_2 = 1 < 2 < 3$
	សមីការ មានបួសពីរ $1 < 2 < x_1 < 3 < x_2$
0	សមីការ មានបួសមួយ $1 < x = 2 < 3$
	សមីការ មានបួសពីរ $x_1 < 1 < x_2 < 2 < 3$
2	សមីការ មានបួសខុប $1 < 2 < x_1 = x_2 = 3$
$+\infty$	សមីការ មានបួស

លំហាត់

គេមានអនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{ax+b}{x^2-2x-3}$ ដែលមានខ្សែកោងតំនាង (C) ។

1/. ក. គណនាតំលៃលេខរបស់ a និង b ដោយដឹងថា ខ្សែកោង (C) កាត់តាម $(0, -2)$ និង $(1, 0)$ ។

ខ. ចំពោះតំលៃលេខនៃ a និង b ដែលគេឃើញ ចូរសិក្សាទិសដៅអថេរនៃអនុគមន៍ $f(x)$ ដោយបញ្ជាក់សមីការអាស៊ីមតូត ។

គ. គណនាតំលៃលេខរបស់ f ចំនុចប្រសព្វរវាង (C) និង $(x'Ox)$ ដូចបង្ហាញថា
 1. ជាផ្ចិតឆ្លងខ្សែកោង (C) ។ ផ្ទៃសំនង់ខ្សែកោង (C) ក្នុងតំបន់អត្ថន័យ (Oxy) ។

2. ដោះស្រាយដោយប្រើត្រីកោណ អត្ថិភាព និងសញ្ញាសមីការតាមតំលៃនៃ m
 $mx^2 - 2(m-3)x - 3(m+2) = 0$

3. ពីខ្សែកោង (C) ចេញសំនង់ខ្សែកោង (C') $y = |f(x)|$

ចំណើយ

1/ក. គណនាតំលៃលេខរបស់ a និង b

បើខ្សែកោង (C) កាត់តាម $(0; -2)$ នោះយើងបាន $f(0) = -2 \Leftrightarrow \frac{b}{-3} = -2$
 $\Leftrightarrow b = 6$

បើខ្សែកោង (C) កាត់តាម $(1; 0)$ នោះយើងបាន $f(1) = 0 \Leftrightarrow \frac{a+b}{1-2-3} = 0$
 $\Leftrightarrow \frac{a+6}{-4} = 0 \Leftrightarrow a = -6$ ដូច្នេះ $a = -6, b = 6$

ខ/. យើងបានអនុគមន៍ទៅជា $y = f(x) = \frac{-6x+6}{x^2-2x-3}$

- សិក្សាទិន្នន័យអថេរភាព

$x^2 - 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -1 \\ x_2 = 3 \end{cases}$ ដូច្នេះ អនុគមន៍ប្រកាត់សនិទាន

នេះមានដែនកំនត់ $D = \mathbb{R} \setminus \{-1; 3\}$

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{-6x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{-6}{x} = 0$

$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \infty$
 $u = -6x+6 \Rightarrow u' = -6$
 $v = x^2-2x-3 \Rightarrow v' = 2x-2$

$f'(x) = \frac{u'v - v'u}{v^2}$
 $f'(x) = \frac{-6x^2 + 12x + 18 - (2x-2)(-6x+6)}{(x^2-2x-3)^2}$
 $= \frac{-6x^2 + 12x + 18 + 12x^2 - 12x - 12x + 12}{(x^2-2x-3)^2}$
 $= \frac{6x^2 - 12x + 30}{(x^2-2x-3)^2} = \frac{6(x^2-2x+5)}{(x^2-2x-3)^2}$

$x^2 - 2x - 3 \neq 0, \forall x \in D \Rightarrow (x^2 - 2x - 3)^2 > 0, \forall x \in D \Rightarrow$

$f'(x)$ យកសញ្ញាតាម $6(x^2 - 2x + 5), \forall x \in D \Rightarrow$

$x^2 - 2x + 5$ ជាត្រីការ៉េក្រេទី 2 នៃ x មាន $\begin{cases} a = 1 \\ \Delta' = 1 - 5 = -4 < 0 \end{cases} \Rightarrow$

$x^2 - 2x + 5 > 0, \forall x \in D \Rightarrow 6(x^2 - 2x + 5) > 0, \forall x \in D$

$\Rightarrow f'(x) > 0, \forall x \in D \Rightarrow f(x)$ កើនក្នុង D

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$
$f'(x)$	+	+	+	
$f(x)$	0	$+\infty$	$+\infty$	0

បញ្ជាក់សមីការនៃអាស៊ីមតូត

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0 \Rightarrow$ បន្ទាត់ $y = 0$ គឺអ័ក្ស $(x'Ox)$ ជាអាស៊ីមតូតដេក

$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \infty, \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \infty \Rightarrow$ បន្ទាត់ $x = -1$ គឺអ័ក្ស $x = 3$ ជាអាស៊ីមតូតឈរ

គ. គណនាតួអនេក្រាប I ចំនុចប្រសព្វរវាង (C) និង $(x'Ox)$

ដោយ I ជាចំនុចប្រសព្វរវាង (C) និង $(x'Ox)$ នោះអនេក្រាបនៃ I គឺ $y = 0$

ហើយអាស៊ីមតូតជាបួសនៃ $f(x) = 0 \Leftrightarrow \frac{-6x+6}{x^2-2x-3} = 0 \Leftrightarrow -6x+6 = 0$

$\Leftrightarrow x = 1$ យើងបាន $I(1;0)$

បង្ហាញថា I ជាផ្ចិតឆ្លុះរបស់ខ្សែកោង (C)

យើងត្រូវប្រើវិធីដូរតំរុយ ដោយយក I ជាកល់នៃតំរុយថ្មី (IXY)

តាមរូបមន្តនៃការដូរតំរុយ $x_s = 1 + X$

$y = 0 + Y = Y$ នោះយើងបានអនុគមន៍ទៅជា


$$Y = \frac{-6(1+X)+6}{(1+X)^2-2(1+X)-3} = \frac{-6+6X+6}{1+2X+X^2-2-2X-3} = \frac{6X}{X^2-4}$$

$Y = f(X) = \frac{6X}{X^2-4}$ ជាសមីការបញ្ចូលរបស់ (C)

$$f(-X) = \frac{6(-X)}{(-X)^2-4} = -\frac{6X}{X^2-4} = -f(X)$$

$\Rightarrow f(X)$ ជាអនុគមន៍សេស នោះយើងបាន $I(1;0)$ ជាផ្ចិតឆ្លុះនៃ (C)

សង់ខ្សែកោង (C) (C) កាត់ $(y'Oy)$ ត្រង់ $y = f(0) = \frac{6}{-3} = -2$



2/. ដោះស្រាយតាមត្រាតិចអត្ថិភាព និងសញ្ញាបូសសមីការ :

$$mx^2 - 2(m-3)x - 3(m+2) = 0$$

សមីការនេះអាចសរសេរ : $mx^2 - 2mx + 6x - 3m - 6 = 0 \Leftrightarrow \frac{-6x+6}{x^2-2x-3} = m$

ជាសមីការអាស៊ីមតូតជាបួសខ្សែកោង (C) និងបន្ទាត់ $y = m$ ស្រប $(x'Ox)$


m	អត្ថិភាព និងសញ្ញាបូសសមីការ	
$-\infty$	សមីការ មានបូសពីរ	$x_1 < 0 < x_2$
-2	សមីការ មានបូសពីរ	$x_1 = 0 < x_2$
	សមីការ មានមែកពីរ	$0 < x_1 < x_2$
0	សមីការ មានបូសមួយ	$x = 2 > 0$
$+\infty$	សមីការ មានបូសពីរ	$x_1 < 0 < x_2$

3/ ខ្សែកោង (C) ទាញសំនង់ខ្សែកោង (C')

អនុគមន៍ $y = |f(x)|$ មានដែនកំនត់ $\mathcal{D} = \mathcal{D}$

$\forall x \in \mathcal{D}$ បើ $f(x) \geq 0 \Rightarrow |f(x)| = f(x)$ នោះ (C') = (C)

$\forall x \in \mathcal{D}$ បើ $f(x) < 0 \Rightarrow |f(x)| = -f(x)$ នោះ (C') ជាបញ្ចុះនៃ (C) ធៀប ($x'Ox$)



លំហាត់

មានអនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{2x+2}{x^2+2x-3}$ ដែលខ្សែកោងតាំងវាដោយ (C)

1/ សិក្សាអថេរភាពនៃអនុគមន៍ $f(x)$ ដោយបញ្ជាក់សមីការនៃអាស៊ីមតូត ។

2/ គណនាតួអនេក 1 ដែលជាចំនុចប្រសព្វរវាងខ្សែកោង (C) និង

អ័ក្ស ($x'Ox$) ។

បញ្ហាប្រឆាំង 1 ជាផ្នែកនៃខ្សែកោង (C) រួចសង់ខ្សែកោង (C) នេះ ។

3/ ដោយប្រើត្រីកោណសិក្សាអត្ថិភាព និងសញ្ញានៃបូសសមីការទៅតាមតំលៃនៃ m

ចំណើយ

1/ ក. សិក្សាអថេរភាពនៃអនុគមន៍ $f(x)$:

អនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{2x+2}{x^2+2x-3}$ ជាអនុគមន៍ប្រភាគសនិទានរាង $\frac{U}{V}$

$$U = 2x+2 \quad \text{និង} \quad V = x^2+2x-3$$

$$V = x^2+2x-3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -3 \\ x_2 = 1 \end{cases} \quad \text{ដូច្នេះ យើងបានដែនកំណត់ } \mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-3, 1\}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2}{x} = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -3} f(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{u'v - v'u}{v^2} & u &= 2x+2 & \Rightarrow & u' = 2 \\ & & v &= x^2+2x-3 & \Rightarrow & v' = 2x+2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{2x^2+4x-6-(2x+2)^2}{(x^2+2x-3)^2} = \frac{2x^2+4x-6-4x^2-8x-4}{(x^2+2x-3)^2} = \frac{-2x^2-4x-10}{(x^2+2x-3)^2} \\ &= \frac{-2(x^2+2x+5)}{(x^2+2x-3)^2} \end{aligned}$$

នោះយើងមាន $\forall x \in \mathcal{D}, \quad x^2+2x-3 \neq 0$

$$\Rightarrow (x^2+2x-3)^2 > 0, \quad \forall x \in \mathcal{D} \quad \text{ដែលតំរូវឲ្យ} f'(x) \text{ យកសញ្ញាតាមភាគយក}$$

$$-2(x^2+2x+5) \text{ គឺ } (x^2+2x+5) \text{ ជាត្រីការ៉េក្រេទី 2 នៃ } x \quad \text{ដែលមាន}$$

$$\begin{cases} a = 1 > 0 \\ \Delta' = 1-5 = -4 < 0 \end{cases} \Rightarrow x^2+2x+5 > 0, \quad \forall x \in \mathcal{D} \Rightarrow$$

$$-2(x^2+2x+5) < 0, \quad \forall x \in \mathcal{D} \quad \text{ដូច្នេះ } f'(x) < 0, \quad \forall x \in \mathcal{D}$$

x	$-\infty$	-3	1	$+\infty$
$f'(x)$	-	-	-	
$f(x)$	0 	$+\infty$ 	$+\infty$ 	0

$f(x)$ ជាអនុគមន៍ចុះក្នុង $\mathcal{D}$

ខ. បញ្ជាក់សមីការអាស៊ីមតូតនៃអនុគមន៍ $f(x)$:

យើងមាន $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 0 \Rightarrow$ បន្ទាត់ $y = 0$ គឺបន្ទាត់ $(x'Ox)$ ជាអាស៊ីមតូតដេក

$\lim_{x \rightarrow -3} f(x) = 0$ និង $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty \Rightarrow$ បន្ទាត់ $x = -3$ និង $x = 1$ ជាអាស៊ីមតូតឈរ

2/ ក. គណនាតួអនេក្រាប f ដែលជាចំនុចប្រសព្វរវាងខ្សែកោង (C) និង

អ័ក្ស $(x'Ox)$

បើ f ជាចំនុចប្រសព្វរវាង (C) និង $(x'Ox)$ នោះ f មានអនេក្រាប $y = 0$

និងមានអាស៊ីមតូតជាប្រសព្វនៃសមីការ $\frac{2x+2}{x^2+2x-3} = 0 \Leftrightarrow 2x+2 = 0 \Leftrightarrow$

$$x = -1 \quad \text{ដូច្នេះ តួអនេក្រាបនៃ } f(-1; 0)$$

ខ. បង្ហាញថា f ជាផ្ចិតកណ្តាលនៃខ្សែកោង (C)

យើងត្រូវប្រើវិធីអ៊ីនតេក្រាល ដោយយក $I(-1; 0)$ ជាគល់តំរូវថ្មី (IXY)

នោះយើងបានតាមរូបមន្តនៃការអ៊ីនតេក្រាល

$$\begin{aligned} x &= -1 + X & \text{សមីការថ្មី ហៅថាសមីការ} \\ y &= 0 + Y = Y \end{aligned}$$

បង្កើនទៅជា
$$Y = \frac{2(-1+X)+2}{(-1+X)^2+2(-1+X)-3} = \frac{-2+2X+2}{1-2X+X^2-2+2-3} = \frac{2X}{X^2-4}$$

ដូច្នេះ $f(X) = \frac{2X}{X^2-4}$ ដោយ $f(-X) = \frac{2(-X)}{(-X)^2-4} = -\frac{2X}{X^2-4} = -f(X)$

យើងបាន $f(X) = \frac{2X}{X^2-4}$ ជាអនុគមន៍សេស ដូច្នេះ $I(-1;0)$ ជាផ្ចិតឆ្លុះនៃខ្សែកោង (C) ។

គ/ សង់ខ្សែកោង (C)

ខ្សែកោង (C) កាត់ $(Y'O_Y)$ ត្រង់ចំនុច $y = f(0) = -\frac{2}{3}$

ខ្សែកោង (C) មានអាស៊ីមតូតឈរពីរ $x = -3$ និង $x = 1$

មានអាស៊ីមតូតដេកមួយគឺ $(X'O_X)$ សមីការ $y = 0$ កាត់ $(X'O_X)$ ត្រង់ I

ហើយ I ក៏ជាផ្ចិតឆ្លុះនៃ (C) កាត់ $(Y'O_Y)$ ត្រង់ចំនុចអដ្ឋកោណ $y = -\frac{2}{3}$

3/. ដោយប្រាកដ សិក្សាអត្ថិភាព និងសញ្ញានៃឫសនៃសមីការតាមតំលៃនៃ m

$$mx^2 + 2(m-1)x - (3m+2) = 0$$

- យើងត្រូវពន្លាតសមីការ : $mx^2 + 2mx - 2x - 3m - 2 = 0$

- រក្សាទុកក្នុងលេខមាន m នៅអង្គទី 1 ក្នុងលេខាន m ត្រូវប្រែទៅអង្គទី 2


$$mx^2 + 2mx - 3 = 2x + 2$$

- ដាក់ m ជាគត្តា $m(x^2 + 2x - 3) = 2x + 2$

- ចែកអង្គទាំងពីរនឹងមេគុណរបស់ m

$$m = \frac{2x+2}{x^2+2x-3} \text{ យើងអាចថាជាសមីការអាស៊ីមតូតខ្សែកោង (C) និងបន្ទាត់អថេរ}$$

$y = m$ ប្រែប្រួលស្រប $(X'O_X)$ ដោយពិនិត្យតាមប្រាកដ យើងបានតារាងចំណេញខាងក្រោម



m	អត្ថិភាព និងសញ្ញាឫសសមីការ
$-\infty$	សមីការ មានឫសពីរ $x_1 < 0 < x_2$
$-\frac{2}{3}$	សមីការ មានឫសពីរ $x_1 < x_2 = 0$
	សមីការ មានឫសពីរ $x_1 < x_2 < 0$
0	សមីការ មានឫសតែមួយគត់ $x = -1$
$+\infty$	សមីការ មានឫសពីរ $x_1 < 0 < x_2$

លំហាត់

1/. គេអោយអនុគមន៍ $f(x) = \sin 2x \cos 8x + \sin 4x \cos 2x - \sin x \cos x$

ក/ គណនា : $f'(x)$ និង $\int f(x)dx$

ខ/. ហាមប្រើតារាងត្រីកោណមាត្រ គណនា :

$f(1,5^\circ), f(7,5^\circ), f(12^\circ), f(2^\circ)$ និង $f(33^\circ)$

2/. ស្រាយបញ្ជាក់ថា បើ $a > 1$ និង $\frac{a^m}{a^n} < \sqrt{a}$ នោះគេបាន : $\frac{a^{m-1} + a^n}{a^m + a^n} > \frac{\sqrt{a}}{a}$

3/. អោយអនុគមន៍ $f(x) = \frac{x^2 - x - 2}{x + m}$ ដែលមានខ្សែកោងគំនាង (C_m) ។

ក. កំនត់ m ដើម្បីអោយខ្សែកោង (C_m) ជាបន្ទាត់ ។ ក្នុងករណីដែល (C_m)

មិនមែនជាបន្ទាត់ ស្រាយបញ្ជាក់ថាខ្សែកោង (C_m) កាត់តាមចំនុចនឹងពីរ A និង B ដែលត្រូវរក ។

គេសន្មតយក A ជាចំនុចដែលមានអាប់ស៊ីសតូច ។

ខ/ តើមានតំលៃ m ដែររឺទេ ដែលបន្ទាត់ប៉ះ (C_m) ត្រង់ A និង B ស្របគ្នា ។

គ/ គូសខ្សែកោង (C) តាងអនុគមន៍នេះចំពោះ $m = 2$ ។ រួចគណនាផ្ទៃសរុប

ផ្ទៃក្នុងរង្វង់ខ័ណ្ឌ ដោយខ្សែកោង (C) អាស៊ីមតូតមិនស្របនឹងអ័ក្សអូរដោនេ

បន្ទាត់ $x = 3$ និង $x = 8$

ឃ/ ពិភាក្សាដោយប្រើត្រីកោណមាត្រសមីការ :

$$x^2 - (k+1)x - 2(k+1) = 0$$

ធៀបចំនួន -2 និង 0 ទៅតាមតំលៃនៃ k ។

ចំណើយ

1/. $f(x) = \sin 2x \cos 8x + \sin 4x \cos 2x - \sin x \cos x$

យើងត្រូវប្រើរូបមន្ត បី ដើម្បីបំប្លែង $f(x)$ អោយទៅជាតារាងងាយ

$$\sin b \cos a = \frac{1}{2} \sin(a+b) - \frac{1}{2} \sin(a-b)$$

$$\sin 2x \cos 8x = \frac{1}{2} \sin 10x - \frac{1}{2} \sin 6x \dots\dots\dots (a = 8x \text{ និង } b = 2x)$$

$$\sin 2x \cos b = \frac{1}{2} \sin(a+b) + \frac{1}{2} \sin(a-b)$$

$$\sin 4x \cos 2x = \frac{1}{2} \sin 6x + \frac{1}{2} \sin 2x \dots\dots\dots (a = 4x \text{ និង } b = 2x)$$

$$\sin a \cos a = \frac{1}{2} \sin 2a$$

$$\sin x \cos x = \frac{1}{2} \sin 2x \dots\dots\dots (a = b = x)$$

យើងបាន $f(x) = \frac{1}{2} \sin 10x - \frac{1}{2} \sin 6x + \frac{1}{2} \sin 2x - \frac{1}{2} \sin 2x = \frac{1}{2} \sin 10x$

$$f(x) = \frac{1}{2} \sin 10x$$

ក. គណនា $f'(x) = \frac{1}{2} 10 \cos 10x = 5 \cos 10x$

$$f'(x) = 5 \cos 10x$$

$$\int f(x)dx = \int \frac{1}{2} \sin 10x dx = \frac{1}{2} \int \sin 10x dx = \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{10} \right) \cos 10x + c$$

$$\int f(x)dx = -\frac{1}{20} \cos 10x + c$$

2. គណនា :

$$f(1, 5^\circ) = \frac{1}{2} \sin 15^\circ = \frac{1}{2} \sin(45^\circ - 30^\circ) = \frac{1}{2} [\sin 45^\circ \cos 30^\circ - \sin 30^\circ \cos 45^\circ]$$

$$= \frac{1}{2} \left[\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \right] = \frac{\sqrt{2}}{8} (\sqrt{3} - 1)$$

$$f(1, 5^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{8} (\sqrt{3} - 1)$$

$$f(7, 5^\circ) = \frac{1}{2} \sin 75^\circ = \frac{1}{2} \sin(45^\circ + 30^\circ) = \frac{1}{2} [\sin 45^\circ \cos 30^\circ + \sin 30^\circ \cos 45^\circ]$$

$$= \frac{1}{2} \left[\frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \right] = \frac{\sqrt{2}}{8} (\sqrt{3} + 1)$$

$$f(7, 5^\circ) = \frac{\sqrt{2}}{8} (\sqrt{3} + 1)$$

$$f(12^\circ) = \frac{1}{2} \sin 120^\circ = \frac{1}{2} \sin 60^\circ = \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

$$f(12^\circ) = \frac{\sqrt{3}}{4}$$

$$f(21^\circ) = \frac{1}{2} \sin 210^\circ = -\frac{1}{2} \sin 30^\circ = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}$$

$$f(21^\circ) = -\frac{1}{4}$$

$$f(33^\circ) = \frac{1}{2} \sin 330^\circ = -\frac{1}{2} \sin 30^\circ = -\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}$$

$$f(33^\circ) = -\frac{1}{4}$$

2/ ស្រាយបញ្ជាក់ថា បើ $a > 1$ និង $\frac{a^m}{a^n} < \sqrt{a}$

$$\text{គេបាន : } \frac{a^{m-1} + a^n}{a^m + a^n} < \frac{\sqrt{a}}{a}$$

ដោយយើងដឹងថា $a > 1 \Rightarrow \sqrt{a} > 1 \Rightarrow \sqrt{a} - 1 > 0$

$$\text{ហើយ } (a - \sqrt{a})(\sqrt{a} + 1) = a\sqrt{a} + a - a - \sqrt{a} = a\sqrt{a} - \sqrt{a} = \sqrt{a}(a - 1)$$

$$\text{ដូច្នេះ យើងអាចសរសេរបាន : } \sqrt{a} = \frac{(a - \sqrt{a})(\sqrt{a} + 1)}{a - 1} = \frac{(a - \sqrt{a})(\sqrt{a} + 1)}{(\sqrt{a} + 1)(\sqrt{a} - 1)} = \frac{a - \sqrt{a}}{\sqrt{a} - 1}$$

$$\text{ដូច្នេះ : } \sqrt{a} = \frac{a - \sqrt{a}}{\sqrt{a} - 1} \quad \text{តាមសម្មតិកម្ម} \quad \frac{a^m}{a^n} < \sqrt{a} \Leftrightarrow$$

$$\frac{a^m}{a^n} - \frac{a - \sqrt{a}}{\sqrt{a} - 1} = \frac{\sqrt{a}a^m - a^m - a\sqrt{a} + \sqrt{a}a^n}{a^n(\sqrt{a} - 1)} < 0 \Leftrightarrow$$

$$\sqrt{a}a^m - a^m - a\sqrt{a} + \sqrt{a}a^n < 0 \Leftrightarrow a^m + a\sqrt{a} - \sqrt{a}a^m - \sqrt{a}a^n > 0$$

$$\text{ចង់ស្រាយ} \quad \frac{a^{m-1} + a^n}{a^m + a^n} > \frac{\sqrt{a}}{a} \quad \text{ត្រូវរកអោយបាន} \quad \frac{a^{m-1} + a^n}{a^m + a^n} - \frac{\sqrt{a}}{a} > 0$$

$$\text{រក} \quad \frac{a^{m-1} + a^n}{a^m + a^n} - \frac{\sqrt{a}}{a} = \frac{a^m + a\sqrt{a} - \sqrt{a}a^m - \sqrt{a}a^n}{(a^m + a^n)a}$$

$$\frac{a^m + a\sqrt{a} - \sqrt{a}a^m - \sqrt{a}a^n}{(a^m + a^n)a} > 0 \quad \text{ព្រោះ : } \begin{cases} (a^m + a^n)a > 0 \\ a^m + a\sqrt{a} - \sqrt{a}a^m - \sqrt{a}a^n > 0 \end{cases}$$

$$\text{ដូច្នេះ : } \frac{a^{m-1} + a^n}{a^m + a^n} > \frac{\sqrt{a}}{a}$$

3/ក. គំនិត m ដើម្បីអោយខ្សែកោង (C_m) ជាបន្ទាត់

ដើម្បីអោយខ្សែកោង (C_m) ជាបន្ទាត់ លុះត្រាតែសមីការរបស់វាមានរាង $y = ax + b$

$$y = f(x) = \frac{x^2 - x - 2}{x + m} = \frac{(x+1)(x-2)}{x+m} \quad f(x) \text{ អាចមានរាង } y = ax + b$$

បានលុះត្រាតែ $(x+1)(x-2)$ អាចសម្រួលជាមួយ $x+m$ កើត

ដូចនេះយើងអាចទាញរកតំលៃ m បានគឺត្រូវយក

$$m = 1 \text{ ឬ } m = -2$$

បើ (C_m) មិនមែនជាបន្ទាត់ យើងត្រូវយក $m \in \mathbb{R} \setminus \{-2; 1\}$ ស្រាយថា (C_m) កាត់តាមចំនុចនិងពីរ A និង B ដែលត្រូវរក

សមីការ (C_m) អាចសរសេរ $y = \frac{x^2 - x - 2}{x + m} \Leftrightarrow xy + my = x^2 - x - 2 \Leftrightarrow$
 $my = x^2 - x - 2 - xy$ សមីការនេះផ្ទៀងផ្ទាត់ចំពោះ $\forall m \in \mathbb{R} \setminus \{-2; 1\}$

លុះត្រាតែ $\begin{cases} y = 0 \\ x^2 - x - 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1, y = 0 \\ x = 2, y = 0 \end{cases}$ ដូចនេះ

(C_m) កាត់តាមចំនុចនិងពីរ $A(x = -1, y = 0)$
 $B(x = 2, y = 0)$

ខ. រកតំលៃ m ដែលធ្វើអោយបន្ទាត់ប៉ះ (C_m) ត្រង់ A និង B ស្របគ្នា

អនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{x^2 - x - 2}{x + m}$ មានដេរីវេ $f'(x) = \frac{x^2 + 2mx - m + 2}{(x + m)^2}$

មេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ប៉ះ (C_m) ត្រង់ $A(-1; 0)$ គឺ

$$f'(-1) = \frac{1 - 2m - m + 2}{(-1 + m)^2} = \frac{3 - 3m}{(1 - m)^2} = \frac{3(1 - m)}{(1 - m)^2} = \frac{3}{1 - m}$$

មេគុណប្រាប់ទិសនៃបន្ទាត់ប៉ះ (C_m) ត្រង់ $B(2; 0)$ គឺ

$$f'(2) = \frac{4 + 4m - m + 2}{(2 + m)^2} = \frac{6 + 3m}{(2 + m)^2} = \frac{3(2 + m)}{(2 + m)^2} = \frac{3}{2 + m}$$

ដើម្បីអោយបន្ទាត់ប៉ះ (C_m) ត្រង់ A និង B ស្របគ្នា លុះត្រាតែមេគុណប្រាប់ទិសរបស់វា

ស្មើគ្នាគឺ $\frac{3}{1 - m} = \frac{3}{2 + m} \Leftrightarrow 6 + 3m = 3 - 3m \Leftrightarrow 6m = -3$

ដូច្នេះ $m = -\frac{3}{6} = -\frac{1}{2}$

$$m = -\frac{1}{2}$$


គ. គូសខ្សែកោង (C) តាងអនុគមន៍នេះចំពោះ $m = 2$

បើ $m = 2$ នោះ អនុគមន៍ទៅជា $y = f(x) = \frac{x^2 - x - 2}{x + 2} = x - 3 + \frac{4}{x + 2}$

អនុគមន៍នេះមានដែនកំនត់ $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$

$$f'(x) = \frac{x + 4x}{(x + 2)^2} = \frac{x(x + 4)}{(x + 2)^2}$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = -4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_1 = f(0) = -1 \\ y_2 = f(-4) = -9 \end{cases}$$



$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x - 3 + \frac{4}{x + 2} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x = \pm\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = \lim_{x \rightarrow -2} x - 3 + \frac{4}{x + 2} = \lim_{x \rightarrow -2} \frac{4}{x + 2} = \pm\infty \Rightarrow \text{បន្ទាត់ } x = -2$$

ជាអាស៊ីមតូតឈរ ឬ អាស៊ីមតូតស្រប $(y = 0)$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (x - 3)] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{4}{x + 2} = 0 \Rightarrow \text{បន្ទាត់ } y = x - 3 \text{ ជាអាស៊ីមតូតទ្រេត}$$

ឬ អាស៊ីមតូតមិនស្រប និងអ័ក្សអូរដេក

(C) តាង $(x'Ox)$ ត្រង់ចំនុចមានអាប់ស៊ីសជាបូសនៃ $x^2 - x - 2 = 0$

$$x^2 - x - 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -1 \\ x_2 = 2 \end{cases}$$

(C) តាង $(y'Oy)$ ត្រង់ចំនុចមានអាប់ស៊ីស $y = f(0) = -1$

រកផ្ចិតឆ្លុះ ω របស់ (C)

អាស៊ីមតូតឈរ $x = -2$ និងអាស៊ីមតូតទ្រេត $y = x - 3$, តាងផ្ចិតឆ្លុះ $\omega(-2; -5)$

ក្នុងកំរុយ (ωXY) យើងបានតាមរូបមន្តដូរកំរុយ

$$\begin{cases} x = -2 + X \\ y = -5 + Y \end{cases} \quad \text{នោះអនុគមន៍ទៅជា :}$$

$$-5 + Y = \frac{(-2 + X)^2 - (-2 + X) - 2}{-2 + X + 2} = \frac{4 - 4X + X^2 + 2 - X - 2}{X} = \frac{X^2 - 5X + 4}{X}$$

$$\text{ដូច្នេះយើងបាន : } Y = f(X) = \frac{X^2 - 5X + 4}{X} + 5 = \frac{X^2 - 5X + 4 + 5X}{X}$$

$$Y = f(X) = \frac{X^2 + 4}{X}$$

$$\text{ដោយ } f(-X) = \frac{(-X)^2 + 4}{-X} = -\frac{X^2 + 4}{X} = -f(X) \Leftrightarrow f(X) \text{ ជាអនុគមន៍សេស}$$


$\Rightarrow \omega(-2; -5)$ ជាផ្ចិតឆ្លុះរបស់ខ្សែកោង (C)

គណនាផ្ទៃក្រឡា $\mathcal{S}$ ផ្នែកក្នុងខ័ណ្ឌដោយខ្សែកោង (C) អាស៊ីមតូតមិនស្រប និងអ័ក្សអរដោនេបន្ទាត់ $x = 3$ និង $x = 8$

$$\begin{aligned} &= \int_3^8 [f(x) - (x-3)] dx = \int_3^8 \left[x - 3 + \frac{4}{x+2} - (x-3) \right] dx = \\ &= \int_3^8 \frac{4}{x+2} dx = 4 \int_3^8 \frac{dx}{x+2} = 4 [\ln|x+2|]_3^8 = 4 [\ln 10 - \ln 5] \\ &= 4 \ln \frac{10}{5} = 4 \ln 2 \text{ ឯកតាផ្ទៃ} \end{aligned}$$

ដូច្នេះយើងបាន

$$\mathcal{S} = 4 \ln 2 \text{ ឯកតាផ្ទៃក្រឡា}$$



ឃ. ពិភាក្សាតាមត្រាតិច អត្ថិភាពឫសសមីការ : $x^2 - (k+1)x - 2(k+1) = 0$

ជឿបទៅនឹងចំនួន -2 និង 0 ទៅតាមតំលៃនៃ k ។

សមីការអោយមានសរសេរ $x^2 - kx - x - 2k - 2 = 0 \Leftrightarrow$

$x^2 - x - 2 = k(\lambda + 2) \Leftrightarrow k = \frac{x^2 - x - 2}{x + 2}$ អាចចាត់ទុកជាសមីការអាប់ស៊ីសរវាងខ្សែកោង (C)

និងបញ្ជាក់ $y = k$ ស្រប ($x' O x$)

ដោយពិនិត្យតាមត្រាតិច យើងបានចំណេញក្នុងតារាងសរុបខាងក្រោមនេះ

k	អត្ថិភាពឫសសមីការជឿប -2 និង 0
$-\infty$	សមីការ មានឫសពីរ $x_1 < x_2 < -2 < 0$
-9	សមីការ មានឫសឌុប $x_1 = x_2 = -4 < -2 < 0$
	សមីការ គ្មានឫស
-1	សមីការ មានឫសឌុប $x_1 = x_2 = 0 > -2$
$+\infty$	សមីការ មានឫសពីរ $-2 < x_1 < 0 < x_2$

លំហាត់

គេមានអនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{x^2 - 2x - 3}$ ដែលមានក្រាប (C)

1/. រក a, b និង c ដោយដឹងថា (C) កាត់តាម $(1,0)$, $(-2,0)$, $(0, \frac{2}{3})$

2/. រកទិសដៅអថេរភាពនៃអនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - 2x - 3}$

បញ្ជាក់សមីការអាស៊ីមតូតរបើមាន ។ សង់ខ្សែកោង (C) តាងអនុគមន៍នេះ ដោយបញ្ជាក់អាប់ស៊ីសចំនុចប្រសព្វជាមួយអាស៊ីមតូតជេត ។

3/. ដោះស្រាយតាមត្រាតិច អត្ថិភាព និងសញ្ញាឫសសមីការតាមតំលៃនៃ m

$$(m-1)x^2 - (2m+1)x - 3m + 2 = 0$$

ចំណើយ

អនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{x^2 - 2x - 3}$ ជាអនុគមន៍ប្រភេទសនិទាន

$$D = x^2 - 2x - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -1 \\ x_2 = 3 \end{cases} \text{ ដូច្នេះ } \mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1, 3\}$$

1/. រក a, b, c ដោយដឹងថា (C)

$$(1;0) \Leftrightarrow f(1) = 0 \Leftrightarrow \frac{a+b+c}{1-2-3} = \frac{a+b+c}{-4} = 0 \Leftrightarrow a+b+c = 0$$

$$\Leftrightarrow c = -a-b \quad (1)$$

$$(-2;0) \Leftrightarrow f(-2) = 0 \Leftrightarrow \frac{4a-2b+c}{4+4-3} = \frac{4a-2b+c}{5} = 0 \Leftrightarrow$$

$$4a-2b+c = 0 \Leftrightarrow c = -4a+2b \quad (2)$$

$$\left(0, \frac{2}{3}\right) \Leftrightarrow f(0) = \frac{2}{3} \Leftrightarrow \frac{0+0+c}{0-0-3} = -\frac{c}{3} = \frac{2}{3} \Leftrightarrow c = -2$$

ផ្ទឹម (1) និង (2) យើងអាចទាញបាន $-a-b = -4a+2b \Leftrightarrow$

$$-3b = -3a \Leftrightarrow a = b$$

ក្នុង (2) ជំនួស $b = a$ និង $c = -2$ យើងបាន;

$$-2 = -4a+2a = -2a \Leftrightarrow a = 1, \quad b = 1$$

ដូច្នេះយើងបាន

$$a = b = 1, \quad c = -2$$

2/. សិក្សាទិន្នន័យដោយសម្រេចបាននូវអនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{x^2+x-2}{x^2-2x-3}$

អនុគមន៍នេះមានដែនកំនត់ $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1, 3\}$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \left(\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2}{x^2} = 1 \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \infty$$

$$f'(x) = \frac{u'v - v'u}{v^2} \quad \begin{array}{l} u = x^2 + x - 2 \Rightarrow u' = 2x + 1 \\ v = x^2 - 2x - 3 \Rightarrow v' = 2x - 2 \end{array}$$

$$f'(x) = \frac{2x^3 - 4x^2 - 6x + x^2 - 2x - 3 + 2x^3 - 2x^2 + 4x + 2x^2 + 2x - 4}{(x^2 - 2x - 3)^2}$$

$$f'(x) = \frac{-3x^2 - 2x - 7}{(x^2 - 2x - 3)^2} = \frac{-(3x^2 + 2x + 7)}{(x^2 - 2x - 3)^2}$$

$(x^2 - 2x - 3)^2 > 0, \quad \forall x \in \mathcal{D}$ នោះ $f'(x)$ យកសញ្ញាតាមភាគយក

$-(3x^2 + 2x + 7)$ តែ $(3x^2 + 2x + 7)$ ជាត្រីការ៉េក្រេទី 2 នៃ x , ដែលមាន

$$\begin{cases} a = 3 > 0 \\ \Delta' = 1 - 21 = -20 < 0 \end{cases} \Rightarrow 3x^2 + 2x + 7 > 0 \quad \forall x \in \mathcal{D}$$

$$-(3x^2 + 2x + 7) < 0$$

$$\forall x \in \mathcal{D} \quad \text{ដូច្នេះ} \quad f'(x) < 0$$

$$\forall x \in \mathcal{D}$$

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$
f(x)	-	-	-	-
f'(x)	1 	$+\infty$ 	$+\infty$ 	1

អនុគមន៍នេះជាអនុគមន៍ចុះដាច់ខាតក្នុងដែនកំនត់ $\mathcal{D}$

បញ្ជាក់អាស៊ីមតូតដែលមាន

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 1 \quad \text{នោះយើងបានបន្ទាត់} \quad y = 1 \quad \text{ជាអាស៊ីមតូតដេក}$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \infty, \quad \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = \infty \quad \text{នោះយើងបានបន្ទាត់} \quad x = -1 \quad \text{និង} \quad x = 3 \quad \text{ជាអាស៊ីមតូតឈរ}$$

អាប់ស៊ីសចំនុចប្រសព្វរវាង (C) និង $(x'Oy)$ ជាមួយនៃសមីការ $\frac{x^2+x-2}{x^2-2x-3} = 0$

$$\Leftrightarrow x^2 + x - 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -2 \end{cases}$$

អរដេនេចំនុចប្រសព្វរវាង (C) និង $(y'Ox)$ គឺ $y = f(0) = \frac{2}{3}$

រកអាប់ស៊ីសចំនុចប្រសព្វរវាង (C) និងអាប់ស៊ីមតូតដេក $y = 1$

$$\frac{x^2+x-2}{x^2-2x-3} = 1 \Leftrightarrow x^2+x-2 = x^2-2x-3 \Leftrightarrow$$

$$-3x = 1 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{3}$$

ផ្សេងគ្នា (C) កាត់អាស៊ីមតូតដេក $y = 1$ ត្រង់ចំនុចអាប់ស៊ីស $x = -\frac{1}{3}$

3/. ដោះស្រាយតាមក្រាហ្វិកអត្ថិភាព និងសញ្ញាបូសសមីការ


$$(m-1)x^2 - (2m+1)x - 3m + 2 = 0 \quad \text{សមីការនេះអាចសរសេរ}$$

$$mx^2 - x^2 - 2mx - x - 3m + 2 = 0 \Leftrightarrow$$

$$mx^2 - 2mx - 3m = x^2 + x - 2 \Leftrightarrow m(x^2 - 2x - 3) = x^2 + x - 2$$

$$\Leftrightarrow m = \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - 2x - 3} \quad \text{ដែលជាសមីការអាស៊ីមតោតខាងលើ (C) និងបន្ទាត់ } y = m$$

ស្រប ($x'Ox$) ។ ដោយពិនិត្យតាមក្រាហ្វិក យើងបានចំណេញក្នុងតារាងខាងក្រោម ។



m	អត្ថិភាព និងសញ្ញាបូស
$-\infty$	សមីការ មានឫសពីរ $x_1 < 0 < x_2$
$\frac{2}{3}$	សមីការ មានឫសពីរ $x_1 < x_2 = 0$
	សមីការ មានឫសពីរ $x_1 < x_2 < 0$
1	សមីការ មានឫសមួយ $x = -\frac{1}{3} < 0$
$+\infty$	សមីការ មានឫសពីរ $x_1 < 0 < x_2$

លំហាត់

គេមានអនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{2x^2 + ax + b}{x^2 - 5x + 4}$ ។

1/. គណនា a និង b បើគេដឹងថាតំលៃបរមានៃអនុគមន៍ស្មើ 3 ចំពោះ $x = 0$

2/. ចំពោះតំលៃ a និង b ដែលគេឃើញ ចូរសិក្សាទិសដៅអថេរភាពនៃ

អនុគមន៍ $f(x)$ ដោយបញ្ជាក់សមីការអាស៊ីមតូតទាំងអស់ដែលមាន រួចសង់ខ្សែកោង (C_1) តាងអនុគមន៍នេះក្នុងតំរុយអក្ខរកូសមេ (Oxy) ។ បញ្ជាក់អាស៊ីមតូតចំនុចប្រសព្វរវាង (C_1) និងអាស៊ីមតូតដេក ។

3/. ទាញសំនង់ខ្សែកោង (C_2) តាងអនុគមន៍ $y = g(x) = \frac{2x^2 - 15x + 12}{x^2 - 5x + 4}$

រួចដោះស្រាយអត្ថិភាព និងសញ្ញាបូសសមីការ $g(x) = m$ តាមក្រាហ្វិកដោយពិភាក្សាទៅតាមតំលៃនៃ m ។

ចំណើយ

1/. គណនា a និង b បើគេដឹងថាតំលៃបរមាណុនអនុគមន៍ស្មើ 3 ចំពោះ $x = 0$

អនុគមន៍ $y = f(x) = \frac{2x^2 + ax + b}{x^2 - 5x + 4}$ មានដែនកំនត់ $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1, 4\}$

មានដេរីវេ $y' = \frac{u'v - v'u}{v^2}$ $u = 2x^2 + ax + b \Rightarrow u' = 4x + a$
 $v = x^2 - 5x + 4 \Rightarrow v' = 2x - 5$

$y' = f'(x) = \frac{(4x+a)(x^2-5x+4) - (2x-5)(2x^2+ax+b)}{(x^2-5x+4)^2}$

$f'(x) = \frac{4x^3 - 20x^2 + 16x + ax^2 - 5ax + 4a - 4x^3 + 2ax^2 - 2bx + 10x^2 + 5ax + 5b}{(x^2 - 5x + 4)^2}$

$f'(x) = \frac{(-a-10)x^2 - 2(b-8)x + 4a+5b}{(x^2 - 5x + 4)^2}$

តាមសម្មតិកម្ម $f(x)$ មានតំលៃបរមាស្មើ 3 ចំពោះ $x = 0$ ទោះយើងបាន

$\begin{cases} f(0) = 0 \\ f(0) = 3 \end{cases}$

$f(0) = 0 \Leftrightarrow \frac{4a+5b}{16} = 0 \Leftrightarrow 4a+5b = 0 \quad (1)$

$f(0) = 3 \Leftrightarrow \frac{b}{4} = 3 \Leftrightarrow b = 12 \quad (2)$

យកតំលៃ $b = 12$ ទៅជំនួសក្នុង (1) យើងបាន $4a+60 = 0 \Leftrightarrow a = -15$

យើងបាន

$a = -15$

$b = 12$

$f(0) = \frac{(2x^2+ax+b)}{(x^2-5x+4)} \Big|_{x=0} = \frac{4x+a}{x^2-5} \Big|_{x=0} = \frac{a}{-5}$

274

$f(0) = 3 \Rightarrow \frac{a}{-5} = 3 \Rightarrow a = -5 \times 3 = -15$

$f(0) = 3 \Rightarrow \frac{b}{4} = 3 \Rightarrow b = 12$

2/. បើ $a = -15$ និង $b = 12$ ទោះយើងបានអនុគមន៍

$y = f(x) = \frac{2x^2 - 15x + 12}{x^2 - 5x + 4}$ មានដែនកំនត់ $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1, 4\}$

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x^2}{x^2} = 2$; $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty$; $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = 4$

$f'(x) = \frac{5x^2 - 8x}{(x^2 - 5x + 4)^2} = \frac{x(5x-8)}{(x^2 - 5x + 4)^2}$

$f'(x)$ យកសញ្ញាតាម $5x^2 - 8x$

$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 5x^2 - 8x = x(5x-8) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \Rightarrow y = 3 \\ x = \frac{8}{5} \Rightarrow y = \frac{43}{9} \end{cases}$

តារាងទិន្នន័យអនុគមន៍ :

x	$-\infty$	0	1	$8/5$	4	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	0	+	+
$f(x)$		3		$\frac{43}{9}$		2

អនុគមន៍មានតំលៃអតិបរមាស្មើ 3 ចំពោះ $x = 0$ ហើយមានតំលៃអប្បបរមាស្មើ

$\frac{43}{9}$ ចំពោះ $x = \frac{8}{5}$

បញ្ជាក់សមីការស៊ីមតូតទាំងអស់ដែលមាន

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 2$ យើងបានបន្ទាត់ $y = 2$ ជាអាស៊ីមតូតដេក

$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty$; $\lim_{x \rightarrow 4} f(x) = \infty$ យើងបានបន្ទាត់ $x = 1$ និង $x = 4$ ជាអាស៊ីមតូតឈរ

(C) តាង $(x'Ox)$ ត្រង់ចំនុចមានអាប់ស៊ីសជាបួសនៃសមីការ $\frac{2x^2 - 15x + 12}{x^2 - 5x + 4} = 0 \Leftrightarrow$

$2x^2 - 15x + 12 = 0$ មាន $\Delta = 225 - 96 = 129$ ដូច្នេះសមីការមានឫសពីរ


$$x_1 = \frac{15 - \sqrt{129}}{4} \quad x_2 = \frac{15 + \sqrt{129}}{4}$$

(C) តាង $(y'Oy)$ ត្រង់ចំនុចអដេនេ $y = f(0) = 3$

អាប់ស៊ីសចំនុចប្រសព្វរវាង (C) និងអាស៊ីមតូតដេក $y = 2$ ជាបួសនៃសមីការ

$$\frac{2x^2 - 15x + 12}{x^2 - 5x + 4} = 2 \Leftrightarrow 2x^2 - 15x + 12 = 2x^2 - 10x + 8$$

$$5x \Leftrightarrow x = 4 \Leftrightarrow x = \frac{4}{5}$$



3/. ទាញសំនង់ខ្សែកោង $(C_2) : y = g(x) = \left| \frac{2x^2 - 15x + 12}{x^2 - 5x + 4} \right| = |f(x)|$

អនុគមន៍ $g(x) = |f(x)|$ មានដែនកំនត់ $\mathcal{D} = \mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1, 4\}$

$\forall x \in \mathcal{D} : f(x) \geq 0 \Rightarrow g(x) = |f(x)| = f(x) \Rightarrow$ មែកនៃ (C_2) ជាមែកនៃ (C_1)

ហៅថា (C'_2)

$\forall x \in \mathcal{D} : f(x) < 0 \Rightarrow g(x) = |f(x)| = -f(x) \Rightarrow$ មែកនៃ (C_2) ជារូបភ្លឺនៃមែក (C_1)

រៀប $(x'Ox)$ (គឺមែកមានគំនូសតូចៗ) ហៅ (C''_2)

កំនត់សំគាល់ :

$$(C_2) = (C'_2) \cup (C''_2)$$

ដោះស្រាយអត្ថិភាព និងសញ្ញាបួសសមីការ $g(x) = m$ តាមប្រភេទ ដោយពិភាក្សា

ទៅតាមតំលៃនៃ m

$$g(x) = m \Leftrightarrow \left| \frac{2x^2 - 15x + 12}{x^2 - 5x + 4} \right| = m \text{ ជាសមីការអាប់ស៊ីសរវាង } (C_2) \text{ និងបន្ទាត់ } y = m$$

ស្រប $(x'Ox)$ ។ តាមប្រភេទយើងបានចំណេញក្នុងតារាងខាងក្រោម ។

m	អង្គភាព និងសញ្ញាបួសសមីការ
$-\infty$	សមីការត្មានបួស
0	សមីការមានបួសពីរ $0 < x_1 = \frac{15 - \sqrt{129}}{4} < x_2 = \frac{15 + \sqrt{129}}{4}$
	សមីការមានបួសបួន $0 < x_1 < x_2 < x_3 < x_4$
2	សមីការមានបួសបី $0 < x_1 < x_2 < x_3$
	សមីការមានបួសបួន $x_1 < 0 < x_2 < x_3 < x_4$
3	សមីការមានបួសបី $x_1 = 0 < x_2 < x_3$
	សមីការមានបួសពីរ $0 < x_1 < x_2$
$\frac{43}{9}$	សមីការមានបួសបី $0 < x_1 < x_2 = \frac{8}{5} < x_3$
$+\infty$	សមីការមានបួសបួន $0 < x_1 < x_2 < x_3 < x_4$