

TRẦN ĐỨC HUYỀN

Thạc sĩ Toán

GV Trường PTTH chuyên Lê Hồng Phong

Phương pháp
KHẢO SÁT HÀM SỐ

12 - LUYỆN THI ĐẠI HỌC

(Tái bản lần thứ nhất)

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Phần I

CÁC VẤN ĐỀ VỀ KHẢO SÁT HÀM SỐ

1- HÀM BẬC BA

$$y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d \quad (a \neq 0)$$

I- NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN

1. Miền xác định : $D = R$

2. Đạo hàm :

$$* y' = 3ax^2 + 2bx + c, \quad \Delta' = b^2 - 3ac$$

$\Delta' > 0$: Hàm số có 2 cực trị có hoành độ x_1, x_2

$\Delta' \leq 0$: Hàm số đơn điệu trên R

$$* y'' = 6ax + 2b$$

Đồ thị hàm số luôn có một điểm uốn I có hoành độ $x_0 = -\frac{b}{3a}$

3. Giới hạn :

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \begin{cases} -\infty & (a > 0) \\ +\infty & (a < 0) \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \begin{cases} +\infty & (a > 0) \\ -\infty & (a < 0) \end{cases}$$

4. Bảng biến thiên :


$a > 0$	$\Delta' > 0$
---------	---------------

x	$-\infty$	x_1		x_2	$+\infty$
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	$\nearrow$ CD		$\searrow$ CT $\nearrow$ $+\infty$	


$a > 0$	$\Delta' \leq 0$
---------	------------------

x	$-\infty$	$+\infty$
y'	$+$	
y	$-\infty$	$\nearrow$ $+\infty$



$a < 0$	$\Delta' > 0$
---------	---------------



$a < 0$	$\Delta' \leq 0$
---------	------------------



5. Đồ thị : Luôn nhận điểm uốn I là tâm đối xứng ($h : 1, 2, 3, 4$).



II- BÀI TOÁN MINI HỌA

Đề 1 Khảo sát và vẽ đồ thị của các hàm số :

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. $y = (1 - x)(x + 2)^2$ | 2. $y = 2x^3 - 3x^2 + 1$ |
| 3. $y = -x^3 + 3x^2 - 5x + 2$ | |

Giải

1. $y = (1 - x)(x + 2)^2 \Leftrightarrow y = -x^3 - 3x^2 + 4$

• $D = \mathbb{R}$


• $y' = -3x^2 - 6x = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ hoặc } x = -2$

• $y'' = -6x - 6 = 0 \Leftrightarrow x = -1 \Rightarrow$ điểm uốn $I(-1; 2)$

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$
y'		$-$	0	$+$
y	$+\infty$	0	4	$-\infty$

• $y = 0 \Leftrightarrow x = 1 \text{ hoặc } x = -2$

Đồ thị (hình 5).



Hình 5

2. $y = 2x^3 - 3x^2 + 1$

• $D = \mathbb{R}$


• $y' = 6x^2 - 6x = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee x = 1$

• $y'' = 12x - 6 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{2} \Rightarrow$ điểm uốn $I\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right)$

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
y'		$+$	0	$+$
y	$-\infty$	1	0	$+\infty$

• $y = 0 \Leftrightarrow (x - 1)(2x^2 - x - 1) = 0$

$\Leftrightarrow x = 1 \text{ hoặc } x = -\frac{1}{2}$



Hình 6

Đồ thị (hình 6).

3. $y = -x^3 + 3x^2 - 5x + 2$

• $D = \mathbb{R}$


• $y' = -3x^2 + 6x - 5 < 0, x \in \mathbb{D}$

• $y'' = -6x + 6 = 0 \Leftrightarrow x = 1 \Rightarrow I(1; -1)$ là điểm uốn

x	$-\infty$	1	$+\infty$
y'		$-$	$-$
y	$+\infty$	-1	$-\infty$

• $x = 0 \Rightarrow y = 2$

Đồ thị (hình 7).



Hình 7

Đề 2

Cho hàm số : $y = f(x) = \frac{x^3}{3} - 2x^2 + 3x + 1$.

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2. Tìm tất cả các tâm đối xứng của (C).
3. Tìm điểm trên (C) có hệ số góc tiếp tuyến tại đó nhỏ nhất.
4. Lập phương trình tiếp tuyến của (C) song song với đường thẳng

$$y = 3x - 1.$$

Giải

$$y = f(x) = \frac{x^3}{3} - 2x^2 + 3x + 1 \quad (1)$$

1. D = R


$$y' = x^2 - 4x + 3 = 0 \Leftrightarrow x = 1 \vee x = 3$$

$$y'' = 2x - 4 = 0 \Leftrightarrow x = 2 \Rightarrow I\left(2, \frac{5}{3}\right) \text{ là điểm uốn}$$

x	$-\infty$	1	2	3	$+\infty$
y'	+	0	-	0	+
y	$-\infty$	$\nearrow \frac{7}{3}$	$\searrow -1$	$\nearrow +\infty$	

$$x = 0 \Rightarrow y = 1$$

Đồ thị (hình 8).



Hình 8

2. Chuyển trục : $x = X + x_0$

$$y = Y + y_0$$

Hàm y thành :

$$Y + y_0 = \frac{1}{3}(X + x_0)^3 - 2(X + x_0)^2 + 3(X + x_0) + 1$$

$$\Rightarrow Y = \frac{1}{3}X^3 + (x_0 - 2)X^2 + 3(x_0 - 4x_0 + 3)X + \frac{x_0^3}{3} - 2x_0^2 + 3x_0 + 1 - y_0$$

$I(x_0; y_0)$ làm tâm đối xứng $\Leftrightarrow Y$ là hàm lẻ

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_0 - 2 = 0 \\ \frac{x_0^3}{3} - 2x_0^2 + 3x_0 + 1 = y_0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow x_0 = 2 \quad \text{và} \quad y_0 = \frac{5}{3}.$$

3. $y' = x^2 - 4x + 3 = (x^2 - 4x + 4) - 1 = (x - 2)^2 - 1 \geq -1$

Vậy hệ số góc của tiếp tuyến với đồ thị nhỏ nhất là -1 . Khi đó tiếp điểm là $\left(2, \frac{5}{3}\right)$.

4. Tiếp tuyến tại điểm có hoành độ x_0 song song với đường thẳng $y = 3x - 1$ có phương trình là : $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$

với $f'(x_0) = x_0^2 - 4x_0 + 3 = 3 \Leftrightarrow x_0 = 0 \vee x_0 = 4$

Vậy có hai tiếp tuyến cần tìm $(T_1) : y = 3x + 1$

$(T_2) : y = 3x - \frac{29}{3}$

Đề 3 Cho hàm số : $y = f(x) = -\frac{x^3}{3} + (a - 1)x^2 + (a + 3)x - 4$

1. Xác định a để hàm số đồng biến trong khoảng $0 < x < 3$.
2. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi $a = 0$.
3. Chứng minh rằng đồ thị (C) nhận điểm uốn làm tâm đối xứng.

Giải

$y = f(x) = -\frac{x^3}{3} + (a - 1)x^2 + (a + 3)x - 4$

1. $y' = -x^2 + 2(a - 1)x + (a + 3) = g(x)$

Hàm y đồng biến trong khoảng $(0; 3) \Leftrightarrow g(x) \geq 0 \quad \forall x \in (0; 3)$

$\Leftrightarrow \begin{cases} (-1)g(0) \leq 0 \\ (-1)g(3) \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a + 3 \geq 0 \\ -9 + 7a - 3 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow a \geq \frac{12}{7}$

2. $a = 0$ thì $y = -\frac{x^3}{3} - x^2 + 3x - 4$

$D = \mathbb{R}$


$y' = -x^2 - 2x + 3 = 0 \Leftrightarrow x = -3 \vee x = 1$

$y'' = -2x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = -1$ Vậy $I\left(-1, \frac{-23}{3}\right)$ là điểm uốn.

x	$-\infty$	-3		1	$+\infty$
y'	-	0	+	0	-
y	$+\infty$			$-\frac{7}{3}$	-
		-13			$-\infty$

$x = 0 \Rightarrow y = -4$

Đồ thị (hình 9).



Hình 9

3. Chuyển trục :
$$\begin{cases} x = X - 1 \\ y = Y - \frac{23}{3} \end{cases}$$

Hàm y trở thành :
$$Y - \frac{23}{3} = -\frac{(X-1)^3}{3} - (X-1)^2 + 3(X-1) - 4$$

$$\Leftrightarrow Y = -\frac{X^3}{3} + 4X + 8 - 7$$

Y là hàm lẻ $\Rightarrow \left(-1, -\frac{23}{3}\right)$ là tâm đối xứng.

Đề 4 Cho hàm số : $y = f(x) = \frac{4x^3}{3} - 2(1 - \sin\alpha)x^2 - (1 + \cos 2\alpha)x + 1$ với α là tham số.

1. Tìm các giá trị của α để hàm số luôn luôn tăng.
2. Với giá trị nào của α thì hàm số có cực đại, cực tiểu.
3. Gọi x_1, x_2 là hoành độ các điểm cực trị. Tìm α sao cho $x_1^2 + x_2^2 = 1$.

Giải

$$y = f(x) = \frac{4x^3}{3} - 2(1 - \sin\alpha)x^2 - (1 + \cos 2\alpha)x + 1$$

1. $y' = 4x^2 - 4(1 - \sin\alpha)x - 2\cos^2\alpha = 2[2x^2 - 2(1 - \sin\alpha)x - \cos^2\alpha]$

y luôn tăng $\Leftrightarrow y' \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}$

$$\Leftrightarrow \Delta' = (1 - \sin\alpha)^2 + 2\cos^2\alpha \leq 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \sin\alpha = 1 \\ \cos\alpha = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \alpha = \frac{\pi}{2} + k2\pi, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

2. Hàm số cực đại, cực tiểu $\Leftrightarrow y'$ có hai nghiệm phân biệt

$$\Leftrightarrow \Delta' = (1 - \sin\alpha)^2 + 2\cos^2\alpha > 0$$

$$\Leftrightarrow \sin\alpha \neq 1 \quad \text{hay} \quad \cos\alpha \neq 0$$

$$\Leftrightarrow \alpha \neq \frac{\pi}{2} + k2\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

3. $x_1^2 + x_2^2 = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} y' \text{ có hai nghiệm phân biệt} \\ (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 = 1 \end{cases}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha \neq \frac{\pi}{2} + k2\pi \\ (1 - \sin\alpha)^2 + \cos^2\alpha = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha \neq \frac{\pi}{2} + k2\pi \\ \sin\alpha = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \alpha = \frac{\pi}{6} + k2\pi \quad \text{hay} \quad \alpha = \frac{5\pi}{6} + k2\pi \quad (k \in \mathbb{Z}).$$

Đề 5 Cho hàm số : $y = f(x) = x^3 - 3mx^2 + 3(m^2 - 1)x - (m^2 - 1)$

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số với $m = 0$.
2. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị cắt Ox tại 3 điểm có hoành độ dương.

Giải

$$y = f(x) = x^3 - 3mx^2 + 3(m^2 - 1)x - (m^2 - 1)$$

1. $m = 0$ thì $y = x^3 - 3x + 1$

$$D = \mathbb{R}$$


$$y' = 3x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$$

$$y'' = 6x = 0 \Leftrightarrow x = 0 \Rightarrow I(0; 1) \text{ là điểm uốn}$$

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
y'	+	0	0	+
y	$-\infty$	3	-1	$+\infty$

$$f(0) = 1$$

Đồ thị (hình 10).



Hình 10

2. $y' = 3x^2 - 6mx + 3(m^2 - 1) = 3(x^2 - 2mx + m^2 - 1)$

Đồ thị cắt Ox tại 3 điểm có hoành độ dương

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y' \text{ có hai nghiệm phân biệt } x_1, x_2 \\ f(x_1).f(x_2) < 0 \\ f(0) < 0 \end{cases} \quad (0 < x_1 < x_2) \quad (I)$$

Cần thêm điều kiện cho x_1, x_2 là : $\frac{S}{2} > 0 \Leftrightarrow m > 0$

Vì $f(x) = \frac{y'}{3}(x - m) - 2x + (m - 1)^2(m + 1)$, nên :

$$\begin{aligned} (I) &\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta' = 1 > 0 \\ f(0) = -(m^2 - 1) < 0 \\ f(x_1).f(x_2) = [-2x_1 + (m - 1)^2(m + 1)][-2x_2 + (m - 1)^2(m + 1)] < 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} m^2 > 1 \\ f(x_1).f(x_2) = [-2(m + 1) + (m - 1)^2(m + 1)][-2(m - 1) + (m - 1)^2(m + 1)] < 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} m^2 > 1 \\ (m + 1)[(m - 1)^2 - 2][(m - 1)(m^2 - 1 - 2)] < 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} m^2 > 1 \\ (m^2 - 1)(m^2 - 3)(m^2 - 2m - 1) < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \sqrt{3} < m < 1 + \sqrt{2} \end{aligned}$$

2- HÀM BẬC BỐN TRÙNG PHƯƠNG

$$y = f(x) = ax^4 + bx^2 + c \quad (a \neq 0)$$

I- NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN

1. Miền xác định : $D = \mathbb{R}$

2. Đạo hàm :

$$* \quad y' = 4ax^3 + 2bx = 2x(2ax^2 + b)$$

$$y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x^2 = \frac{-b}{2a} \end{cases}$$

$ab \geq 0$: Hàm số có 1 cực trị $x_0 = 0$

$ab \leq 0$: Hàm số có 3 cực trị $x_0 = 0, \quad x_{1,2} = \pm \sqrt{\frac{-b}{2a}}$

$$* \quad y'' = 12ax^2 + 2b$$

$$y'' = 0 \Leftrightarrow x^2 = \frac{-b}{6a}$$

$ab \geq 0$: Hàm số không có điểm uốn

$ab < 0$: Hàm số có 2 điểm uốn

3. Giới hạn :

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \begin{cases} +\infty & (a > 0) \\ -\infty & (a < 0) \end{cases}$$

4. Bảng biến thiên :

$a > 0$	$b < 0$
x	$-\infty \quad \quad \quad x_1 \quad \quad \quad 0 \quad \quad \quad x_2 \quad \quad \quad +\infty$
f'	$- \quad \quad \quad 0 \quad \quad \quad + \quad \quad \quad - \quad \quad \quad 0 \quad \quad \quad +$
f	$+\infty \quad \quad \quad \swarrow \quad \quad \quad CT \quad \quad \quad \nearrow \quad \quad \quad C\grave{D} \quad \quad \quad \searrow \quad \quad \quad CT \quad \quad \quad \nearrow \quad \quad \quad +\infty$

$a > 0$	$b \geq 0$
x	$-\infty \quad \quad \quad 0 \quad \quad \quad +\infty$
f'	$- \quad \quad \quad 0 \quad \quad \quad +$
f	$+\infty \quad \quad \quad \searrow \quad \quad \quad CT \quad \quad \quad \nearrow \quad \quad \quad +\infty$





$a < 0$	$b > 0$
---------	---------

x	$-\infty$	x_1	0	x_2	$+\infty$
f'	$+$	0	$-$	0	$+$
f	$-\infty \nearrow CD \searrow CT \nearrow CD \searrow -\infty$				

$a < 0$	$b \leq 0$
---------	------------

x	$-\infty$	0	$+\infty$
f'	$+$	0	$-$
f	$-\infty \nearrow CD \searrow -\infty$		

5. Đồ thị : Luôn nhận Oy là trục đối xứng (h : 11, 12, 13, 14)

	$ab < 0$	$ab \geq 0$
$a > 0$	 Hình 11	 Hình 12
$a < 0$	 Hình 13	 Hình 14

II- BÀI TOÁN MINH HỌA

Đề 6 Khảo sát và vẽ đồ thị của các hàm số :

1. $y = f(x) = 2x^2 - x^4$

2. $y = f(x) = x^4 - 4x^2 + 1$

3. $y = f(x) = x^4 - x^2 - 2$

Giải

1. $y = 2x^2 - x^4$


$D = \mathbb{R}$

$y' = -4x^3 + 4x = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee x = \pm 1$

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'	+	0	-	0	+
y	$-\infty$	1	0	1	$-\infty$

$$y = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee x = \pm \sqrt{2}$$

Đồ thị (hình 15).



Hình 15

2. $y = x^4 - 4x^2 + 1$

$$D = \mathbb{R}$$


$$y' = 4x^3 - 8x = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee x = \pm \sqrt{2}$$

x	$-\infty$	$-\sqrt{2}$	0	$\sqrt{2}$	$+\infty$
y'	-	0	+	0	-
y	$+\infty$	-3	1	-3	$+\infty$

$$x = 0 \Rightarrow y = 1$$

$$x = 1 \Rightarrow y = -2$$

Đồ thị (hình 16).



Hình 16

3. $y = x^4 + x^2 - 2$


$$D = \mathbb{R}$$

$$y' = 4x^3 + 2x = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
y'	-	0	+
y	$+\infty$	-2	$+\infty$

$$y = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$$

Đồ thị (hình 17).



Hình 17

Đề 7 Cho hàm số $y = f(x) = x^4 + 2(m-2)x^2 + m^2 - 5m + 5$ (C_m).

1. Khảo sát và vẽ đồ thị (C_1) của hàm số khi $m = 1$.

2. Tìm m để (C_m) cắt Ox tại 4 điểm phân biệt.

Giải

$$y = x^4 + 2(m-2)x^2 + m^2 - 5m + 5 \quad (C_m)$$


1. $m = 1$ thì $y = x^4 - 2x^2 + 1 \quad (C_1)$

$$D = \mathbb{R}$$

$$y' = 4x^3 - 4x = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee x = \pm 1$$

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$		
y'		0	+	0	-	0	+
y	$+\infty$		$\searrow$	$\nearrow$	$\searrow$	$\nearrow$	$+\infty$
		0		1		0	

Đồ thị (hình 18).



Hình 18

2. (C_m) cắt Ox tại 4 điểm phân biệt

$$\Leftrightarrow y = 0 \text{ có 4 nghiệm phân biệt}$$

$$\Leftrightarrow g(t) = t^2 + 2(m-2)t + m^2 - 5m + 5 = 0$$

có hai nghiệm dương phân biệt (với $t = x^2$)

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta = m-1 > 0 \\ g(0) = m^2 - 5m + 5 > 0 \\ 0 < 2-m \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 < m < 2 \\ m > \frac{5+\sqrt{5}}{2} \vee m < \frac{5-\sqrt{5}}{2} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow 1 < m < \frac{5-\sqrt{5}}{2}$$

Đề 8 Cho hàm số : $y = f(x) = (1-m)x^4 - mx^2 + 2m - 1 \quad (C_m)$

1. Tìm m để hàm số có đúng một cực trị.
2. Tìm m để hàm số đạt cực tiểu tại $x = 1$.
3. Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số với giá trị m tìm được ở câu 2.

Giải

$$y = (1-m)x^4 - mx^2 + 2m - 1 \quad (C_m)$$

1. Hàm số có đúng một cực trị

$$\Leftrightarrow y' = 2x [2(1-m)x^2 - m] = 0 \text{ có đúng một nghiệm}$$

$$\Leftrightarrow 2(1-m)x^2 - m = 0 \text{ vô nghiệm hay có nghiệm } x = 0 \text{ hay có nghiệm kép}$$

$$\Leftrightarrow m = 1 \text{ hay } \begin{cases} m \neq 1 \\ m(1-m) < 0 \end{cases} \text{ hay } \begin{cases} m = 0 \\ 1-m \neq 0 \end{cases} \text{ hay } \begin{cases} \frac{m}{2(1-m)} = 0 \\ 1-m \neq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow m \leq 0 \text{ hay } m \geq 1.$$

2. $m \leq 0$ hay $m \geq 1 \Rightarrow$ hàm số có đúng một cực trị tại $x = 0$ nên không thỏa bài toán.

Xét $0 < m < 1$, ta có bảng biến thiên sau :

x	$-\infty$	$-\sqrt{x_0}$	0	$\sqrt{x_0}$	$+\infty$
y'	-	0	+	0	+
y	$+\infty$				$+\infty$

với $x_0 = \frac{m}{2(1-m)}$

Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 1 \Leftrightarrow x_0 = \frac{m}{2(1-m)} = 1 \Leftrightarrow m = \frac{2}{3}$.


3. Với $m = \frac{2}{3}$, ta có bảng biến thiên sau :

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$		
y'		0	+	0	-	0	+
y	$+\infty$			$\frac{1}{3}$			$+\infty$

```

graph LR
    y_inf1[+∞] --> x_minus1[-1]
    x_minus1 --> x_0[0]
    x_0 --> x_1[1]
    x_1 --> y_inf2[+∞]
  
```

Đồ thị (hình 19).



Hình 19

Đề 9 Cho hàm số : $y = f(x) = x^3 - 2(m+1)x^2 + 2m + 1$.

1. Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số khi $m = -2$.
2. Xác định các giá trị của m sao cho đồ thị của hàm số cắt Ox tại 4 điểm có hoành độ tương ứng lập thành một cấp số cộng.

Giải

$$y = x^3 - 2(m+1)x^2 + 2m + 1$$

1. $m = -2 \Rightarrow y = x^3 + 2x^2 - 3$

$$D) = \mathbb{R}$$


$$y' = 3x^2 + 4x = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
y'	-	0	+
y	$+\infty$		$+\infty$

$\nearrow -3 \searrow$

$$y = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$$

Đồ thị (hình 20).



Hình 20

2. Đồ thị cắt Ox tại 4 điểm lập thành cấp số cộng

$$\Leftrightarrow t^2 - 2(m+1)t + 2m+1 = 0 \text{ có 2 nghiệm phân biệt dương}$$

$$0 < t_1 < t_2 \text{ thỏa mãn } \sqrt{t_2} - \sqrt{t_1} = 2\sqrt{t_1}$$

$$\frac{-\sqrt{t_2} - \sqrt{t_1} \quad 0 \quad \sqrt{t_2} - \sqrt{t_1}}{\text{---}}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta' = m^2 > 0 \\ 2m+1 > 0 \\ 0 < m+1 \\ t_2 = 9t_1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 0 \\ m > -\frac{1}{2} \\ 2m+1 = 9 \text{ hoặc } 2m+1 = \frac{1}{9} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = 4 \\ m = -\frac{4}{9} \end{cases}$$

Đề 10 Cho hàm số : $y = f(x) = x^4 - 4x^3 - 2x^2 + 12x - 1$.

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.
2. Chứng minh rằng đồ thị có một trục đối xứng.
3. Xác định giao điểm của đồ thị với Ox.

Giải

$$y = x^4 - 4x^3 - 2x^2 + 12x - 1$$

1. $D = \mathbb{R}$


$$y' = 4(x^3 - 3x^2 - x + 3)$$

$$y' = (x-1)(x^2 - 2x - 3) = 0 \Leftrightarrow x = 1 \vee x = -1, x = 3$$

x	$-\infty$		-1		1		3		$+\infty$		
y'		+		0	+		0	-		0	+
y	$+\infty$										

$$x = 0 \Rightarrow y = -1$$

Đồ thị (hình 21).



Hình 21

2. Chuyển trục $\begin{cases} x = X + x_0 \\ y = Y \end{cases}$

$$y = Y = (X + x_0)^4 - 4(X + x_0)^3 - 2(X + x)^2 + 12(X + x_0) - 1$$

$$\Leftrightarrow Y = X^4 + (4x_0 - 4)X^3 + (6x_0^2 - 12x_0 - 2)X^2 +$$

$$+ (4x_0^3 - 12x_0^2 - 4x_0 + 12)X + x_0^4 - 4x_0^3 - 2x_0^2 + 12x_0 - 1$$

Đường thẳng $x = x_0$ là trục đối xứng $\Leftrightarrow Y$ là hàm chẵn

$\Leftrightarrow$ Hệ số bậc lẻ của Y bằng 0

$\Leftrightarrow x_0 = 1$

Vậy đồ thị chỉ có một trục đối xứng $x = 1$.

3. Đặt $x = X + 1$; $y = 0$

$$\Leftrightarrow (X + 1)^4 - 4(X + 1)^3 - 2(X + 1)^2 + 12(X + 1) - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow X^4 - 8X^2 + 6 = 0$$

$$\Leftrightarrow X = \pm \sqrt{48 \pm \sqrt{10}}$$

$$\Leftrightarrow x = 1 \pm \sqrt{48 \pm \sqrt{10}}$$

3- HÀM NHẤT BIẾN

$$y = f(x) = \frac{ax + b}{cx + d} \quad (c \neq 0)$$

I- NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN

1. Miền xác định : $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{d}{c} \right\}$.

2. Đạo hàm : $f'(x) = \frac{ad - bc}{(cx + d)^2} = \frac{D}{(cx + d)^2}$.

$D > 0$: f tăng trên $\forall (a, b) \in D$

$D < 0$: f giảm trên $\forall (a, b) \in D$

$D = 0$: $f(x) = \text{const} \quad \forall x \in D$.

3. Giới hạn :

$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \frac{a}{c}$: Tiệm cận ngang $y = \frac{a}{c}$

$\lim_{x \rightarrow -\frac{d}{c}} f(x) = \pm\infty$: Tiệm cận đứng $x = -\frac{d}{c}$.


4. Bảng biến thiên :

$D > 0$		Đồng biến	
x	$-\infty$	$-\frac{d}{c}$	$+\infty$
f'	+		+
f	$\frac{a}{c}$	$+\infty$	$\frac{a}{c}$


$D < 0$		Nghịch biến	
x	$-\infty$	$-\frac{d}{c}$	$+\infty$
f'	-		-
f	$\frac{a}{c}$	$+\infty$	$\frac{a}{c}$

5. Đồ thị :


Được gọi là một hyperbol vuông góc có tâm đối xứng $I\left(-\frac{d}{c}, \frac{a}{c}\right)$ là giao của hai tiệm cận.



Hình 22



Hình 23



Hình 24

II- BÀI TOÁN MINH HỌA

ĐỀ 11 Khảo sát và vẽ đồ thị các hàm số :

1. $y = \frac{3x + 4}{x + 2}$

2. $y = \frac{x + 1}{x - 1}$

3. $y = \frac{2 - x}{x + 1}$

Giải

1. $y = \frac{3x + 4}{x + 2}$

$D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$

$y' = \frac{2}{(x + 2)^2}$


$\lim_{x \rightarrow -2} y = \infty \Rightarrow$ đường thẳng $x = -2$ là tiệm cận đứng

$\lim_{x \rightarrow \infty} y = 3 \Rightarrow$ đường thẳng $y = 3$ là tiệm cận ngang

x	$-x$	-2	$+x$
y'			
	+		+
y			
	3		3

$x = 0 \Rightarrow y = 2$

Đồ thị (hình 25).



Hình 25

2. $y = \frac{x + 1}{x - 1}$

$D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$

$$y' = \frac{-2}{(x-1)^2}$$

$\lim_{x \rightarrow 1} y = \infty \Rightarrow x = 1$ là tiệm cận đứng


$\lim_{x \rightarrow \infty} y = 1 \Rightarrow y = 1$ là tiệm cận ngang

x	$-\infty$	1	$+\infty$
y'			
y	1	$+\infty$	1

$$x = 0 \Rightarrow y = -1$$

$$x = -1 \Rightarrow y = 0$$

Đồ thị (hình 26).



Hình 26

3. $y = \frac{2-x}{x+1}$

$$D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$$

$$y' = \frac{-1}{(x+1)^2}$$

$\lim_{x \rightarrow -1} y = \infty \Rightarrow x = -1$ là tiệm cận đứng


$\lim_{x \rightarrow \infty} y = -1 \Rightarrow y = -1$ là tiệm cận ngang

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
y'			
y	-1	$+\infty$	-1

$$x = 0 \Rightarrow y = 2$$

$$x = 2 \Rightarrow y = 0$$

Đồ thị (hình 27).



Hình 27

Đề 12 Cho hàm số : $y = f(x) = \frac{2x-4}{x-3}$.

1. Khảo sát và vẽ đồ thị (H) của hàm số.
2. Tìm tâm đối xứng của (H).
3. Lập phương trình tiếp tuyến với (H) tại giao điểm của (H) với trục hoành.

Giải

1. $y = \frac{2x - 4}{x - 3}$

$D = \mathbb{R} \setminus \{3\}$


$y' = \frac{-2}{(x - 3)^2}$

$\lim_{x \rightarrow 3} y = \infty \Rightarrow x = 3$ là tiệm cận đứng

$\lim_{x \rightarrow \infty} y = 2 \Rightarrow y = 2$ là tiệm cận ngang

x	$-\infty$	3	$+\infty$
y'	-		-
y	2	$+\infty$	2

$x = 2 \Rightarrow y = 0; \quad x = 0 \Rightarrow y = \frac{4}{3}$



Hình 28

Đồ thị (hình 28).

2. Chuyển trục $\begin{cases} x = X + x_0 \\ y = Y + y_0 \end{cases}$

Hàm $y \Leftrightarrow$ Hàm $Y = \frac{2(X + x_0) - 4}{X + x_0 - 3} - y_0$

$\Leftrightarrow Y = \frac{(2 - y_0)X + 2x_0 - 4 - y_0x_0 + 3y_0}{X + x_0 - 3}$

$I(x_0, y_0)$ là tâm đối xứng của đồ thị $\Leftrightarrow Y$ là hàm lẻ

$\Leftrightarrow -Y(X) = Y(-X); \forall X$

$\Leftrightarrow \begin{cases} -\frac{AX + B}{X + D} = \frac{-AX + B}{-X + D} \quad \forall X \text{ (tương đương } 2AX^2 - 2BD = 0; \forall X) \\ A = 2 - y_0 \text{ và } B = 2x_0 - 4 - y_0x_0 + 3y_0 \\ D = x_0 - 3 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} A = 2 - y_0 = 0 \\ BD = 0 = (x_0 - 3)(2x_0 - 4 - y_0x_0 + 3y_0) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = 3 \\ y_0 = 2 \end{cases}$

3. $y = 0 \Leftrightarrow x = 2 \Rightarrow$ đồ thị cắt Ox tại $M(2; 0)$

Phương trình tiếp tuyến $\Delta: y = y'(2)(x - 2) + y(2)$

$\Delta: y = -2x + 4.$

Đề 13 Cho hàm số : $y = f(x) = \frac{mx - 1}{2x + m}$.

1. Chứng minh rằng $\forall m$ hàm số luôn luôn tăng trên mỗi khoảng mà nó xác định.
2. Xác định m để tiệm cận đứng của đồ thị qua $A(-1, \sqrt{2})$.
3. Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số khi $m = 2$.

Giải

1. $y = \frac{mx - 1}{2x + m}$ (H)

$$D = \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{m}{2} \right\}$$

$$y' = \frac{m^2 + 2}{(2x + m)^2} > 0 \quad \forall x \in D \Rightarrow y \text{ luôn tăng trên } D.$$

2. Để tiệm cận đứng của (H) qua $A(-1, \sqrt{2})$ thì :

$$\begin{cases} -\frac{m}{2} = -1 \\ m\left(-\frac{m}{2}\right) - 1 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow m = 2$$

3. $m = 2 \Rightarrow y = \frac{2x - 1}{2x + 2}$

$$D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$$

$$y' = \frac{3}{2(x+1)^2} > 0$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} y = \infty \Rightarrow x = -1 \text{ là tiệm cận đứng}$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = 1 \Rightarrow y = 1 \text{ là tiệm cận ngang}$$

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
y'			
y			

$\begin{matrix} & & & + & & & + & & \\ & & & & & & & & \end{matrix}$


$\begin{matrix} & & & & & & & & \end{matrix}$

$\begin{matrix} & & & & & & & & \end{matrix}$

$$x = 0 \Rightarrow y = -\frac{1}{2}$$

$$x = \frac{1}{2} \Rightarrow y = 0$$

Đồ thị (hình 29).



Hình 29

Đề 14 Cho hàm số : $y = f(x) = \frac{3-x}{2x-1}$

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (H) của hàm số.
2. Tìm những điểm trên (H) có tọa độ là các số nguyên.
3. Dùng đồ thị để giải bất phương trình : $\frac{3-x}{2x-1} < \frac{1}{2}(5x-1)$.

Giải

1. $y = \frac{3-x}{2x-1}$ (H)


$$D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{1}{2} \right\}$$

$$y' = \frac{-5}{(2x-1)^2} < 0; \forall x \in D$$

$$\lim_{x \rightarrow 1/2} y = \infty \Rightarrow x = \frac{1}{2} \text{ là tiệm cận đứng}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} y = -\frac{1}{2} \Rightarrow y = -\frac{1}{2} \text{ là tiệm cận ngang}$$

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
y'	-		-
y	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$	$-\frac{1}{2}$



Hình 30

$$x = 3 \Rightarrow y = 0;$$

$$x = 0 \Rightarrow y = -3$$

Đồ thị (hình 30).

2. $y = -\frac{1}{2} + \frac{5}{2(2x-1)}$ (H)

$$\Leftrightarrow \begin{cases} M(x, y) \in (H) \\ x, y \in \mathbb{Z} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \in \mathbb{Z} \\ -\frac{1}{2} + \frac{5}{2(2x-1)} \in \mathbb{Z} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \in \mathbb{Z} \\ \begin{cases} 2x-1 = \pm 1 \\ 2x-1 = \pm 5 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow x \in \{-2; 0; 1; 3\}$$

Ta có : $\{M_1(-2; -1), M_2(1; 2), M_3(0; -3), M_4(3; 0)\} \subset (H)$.

$$3. \Delta: y = \frac{1}{2}(5x - 1); \quad (H): y = \frac{3-x}{2x-1}$$

$$\frac{3-x}{2x-1} = \frac{1}{2}(5x-1) \Leftrightarrow x = 1 \quad \text{hay} \quad x = -\frac{1}{2}$$

Vậy Δ cắt (H) tại $A\left(-\frac{1}{2}, -\frac{7}{4}\right)$ và $\left(1, \frac{1}{2}\right)$

Theo đồ thị ta có :

$$\frac{3-x}{2x-1} < \frac{1}{2}(5x-1) \Leftrightarrow -\frac{1}{2} < x < \frac{1}{2} \quad \text{hay} \quad x > 1.$$

Đề 15 Cho hàm số : $y = f(x) = \frac{ax+b}{cx+d} \quad (c \neq 0)$

1. Xác định a, b, c, d biết rằng đồ thị của hàm số có tâm đối xứng $I(2; 2)$ và đi qua điểm $A\left(0, \frac{1}{2}\right)$.
2. Khảo sát và vẽ đồ thị (H) của hàm số.
3. Tiếp tuyến với đồ thị tại điểm M bất kì cắt tiệm cận tại P, Q . Chứng minh rằng $MP = MQ$.

Giải

$$y = \frac{ax+b}{cx+d} \quad (c \neq 0)$$

1. Đồ thị hàm số có tâm đối xứng $I(2; 2)$ và qua $A\left(0, \frac{1}{2}\right)$

$$\begin{cases} -\frac{d}{c} = 2 \\ \frac{a}{c} = 2 \\ \frac{b}{d} = \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} d = -2c \\ a = 2c \\ b = -c \end{cases} \quad a\left(-\frac{d}{c}\right) + b \neq 0$$

Vậy $y = \frac{2x-1}{x-2} \quad (H).$

2. $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$

$$y' = \frac{-3}{(x-2)^2} < 0; \quad \forall x \in D$$


$$\lim_{x \rightarrow 2} y = \infty \Rightarrow x = 2 \text{ là tiệm cận đứng}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} y = 2 \Rightarrow y = 2 \text{ là tiệm cận ngang}$$

x	$-\infty$	2	$+\infty$
y'	-		-
y	2	$+\infty$	2

$$x = 0 \Rightarrow y = \frac{1}{2}$$

$$x = \frac{1}{2} \Rightarrow y = 0$$



Hình 31

Đồ thị (hình 31).

3. Phương trình tiếp tuyến tại điểm M có hoành độ x_0 là :

$$(T) : y = \frac{-3}{(x_0 - 2)^2} (x - x_0) + \frac{2x_0 - 1}{x_0 - 2}$$

(T) cắt tiệm cận đứng và ngang lần lượt tại

$$P \begin{cases} x_P = 2 \\ y_P = \frac{-3(2 - x_0)}{(x_0 - 2)^2} + \frac{2x_0 - 1}{x_0 - 2} = \frac{2x_0 + 2}{x_0 - 2} \end{cases}; \quad Q(x_Q; 2)$$

$$y_P + y_Q = \frac{2x_0 + 2}{x_0 - 2} + 2 = 2 \cdot \frac{2x_0 - 1}{x_0 - 2} = 2y_0 \quad (y_0 \text{ là tung độ của M})$$

M, P, Q $\in$ (T) nên M là trung điểm PQ $\Rightarrow$ MP = MQ.

4- HÀM HỮU TỈ BẬC 2/1 (Hyperbol xiên)

$$y = f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{dx + e}$$

$$y = f(x) = Ax + B + \frac{C}{dx + e} \quad (A, C, d \neq 0)$$

I- NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN

1. Miền xác định

$$D = \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{e}{d} \right\}$$

2. Đạo hàm

$$f'(x) = \frac{A(dx + e)^2 - Cd}{(dx + e)^2}$$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow (dx + e)^2 = \frac{Cd}{A}$$

$ACd < 0$: Hàm số không có cực trị

$ACd > 0$: Hàm số có hai cực trị tại x_1, x_2

3. Giới hạn

$$\lim_{x \rightarrow -\frac{e}{d}} f(x) = \infty : \text{Tiệm cận đứng } x = -\frac{e}{d}$$


$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) - (Ax + B) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{C}{dx + e} = 0 : \text{Tiệm cận xiên } y = Ax + B$$


4. Bảng biến thiên

$A > 0$		$ACd > 0$				
x	$-\infty$	x_1	$-\frac{e}{d}$	x_2	$+\infty$	
f'	+	0	-	-	0	+
f	$-\infty$	$\nearrow$	CD	$\searrow$	$-\infty$	$+\infty$
					CT	$+\infty$


$A > 0$	$ACd < 0$
---------	-----------




$A < 0$	$ACd > 0$
---------	-----------



$A < 0$	$ACd < 0$
---------	-----------



5. **Đồ thị** : là một hyperbol xiên nhận giao điểm của hai tiệm cận làm tâm đối xứng (h.32, 33, 34, 35).



II- BÀI TOÁN MINH HỌA

Đề 16 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị các hàm số :

1. $y = f(x) = \frac{x^2}{x+1}$

2. $y = f(x) = 1 - \frac{x}{2} + \frac{2}{1-x}$
3. $y = \frac{x^2 + x - 2}{x+1}$

4. $y = 1 - x + \frac{1}{x-2}$

Giải

1. $y = \frac{x^2}{x+1} \Leftrightarrow y = x - 1 + \frac{1}{x+1}$

$D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$


$y' = \frac{x^2 + 2x}{(x+1)^2} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -2 \end{cases}$

$\lim_{x \rightarrow -1} y = \infty \Rightarrow x = -1$ là tiệm cận đứng

$\lim_{x \rightarrow \infty} |y - (x - 1)| = 0 \Rightarrow y = x - 1$ là tiệm cận xiên

x	$-\infty$	-2		-1		0		$+\infty$
y'	+	0	-		-	0	+	
y	$-\infty$	$\nearrow -4$	$\searrow$	$-\infty$	$\nearrow +\infty$	$\searrow 0$	$\nearrow +\infty$	

Đồ thị (hình 36).



Hình 36

2. $y = 1 - \frac{x}{2} + \frac{2}{1-x}$

$D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$

$y' = \frac{-x^2 + 2x + 3}{2(x-1)^2} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 3 \end{cases}$

$\lim_{x \rightarrow 1} y = \infty \Rightarrow x = 1$ là tiệm cận ngang


$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left[y - \left(1 - \frac{x}{2} \right) \right] = 0 \quad \Rightarrow \quad y = -\frac{1}{2}x + 1 \text{ là tiệm cận xiên}$$

x	$-\infty$	-1	1	3	$+\infty$	
y'	-	0	+	+	0	-
y	$+\infty$			$-\frac{3}{2}$	$-\infty$	

$$x = 0 \Rightarrow y = 3$$

$$x = -1 \Rightarrow y = \frac{5}{2}$$

Đồ thị (hình 37).



$$3. \quad y = \frac{x^2 + x - 2}{x + 1} = x - \frac{2}{x + 1}$$

$$D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$$

$$y' = \frac{x^2 + 2x + 3}{(x + 1)^2} > 0 \quad \forall x \in D$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} y = \infty \quad \Rightarrow \quad x = -1 \text{ là tiệm cận ngang}$$


$$\lim_{x \rightarrow \infty} (y - x) = 0 \quad \Rightarrow \quad y = x \text{ là tiệm cận xiên}$$

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
y'	+		+
y	$-\infty$		$+\infty$

$$x = 0 \Rightarrow y = -2$$

$$x = 1 \vee x = -2 \Rightarrow y = 0$$

Đồ thị (hình 38).



Hình 38

Đề 17 Cho hàm số : $y = f(x) = \frac{2x^2 + (6 - m)x + 4}{mx + 2}$

1. Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số đi qua điểm $A(-1; 1)$.
2. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi $m = 1$.
3. Chứng minh rằng (C) có một tâm đối xứng.

Giải

$$y = \frac{2x^2 + (6-m)x + 4}{mx + 2}$$

1. Đồ thị hàm số qua $A(-1; 1) \Rightarrow 1 = \frac{2 + m - 6 + 4}{-m + 2} \Rightarrow m = 1$


2. $m = 1 \Rightarrow y = \frac{2x^2 + 5x + 4}{x + 2} = 2x + 1 + \frac{2}{x + 2} \quad (C)$

$$D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$$

$$y' = \frac{2(x^2 + 4x + 3)}{(x + 2)^2} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -3 \\ x = -1 \end{cases}$$

$x = -2$ là tiệm cận đứng

$y = 2x + 1$ là tiệm cận xiên



Hình 39

x	$-\infty$	-3	-2	-1	$+\infty$	
y'	+	0	-	-	0	+
y	$-\infty$	-7	$+\infty$	1	$+\infty$	

$x = 0 \Rightarrow y = 2$

Đồ thị (hình 39).

3. Chuyển trục $\begin{cases} x = X + x_0 \\ y = Y + y_0 \end{cases}$

Hàm $y \Leftrightarrow$ hàm $Y = 2(X + x_0) + 1 + \frac{2}{X + x_0 + 2} - y_0$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} Y = 2X + A + \frac{2}{X + B} \\ A = 2x_0 + 1 - y_0 \\ B = 2 + x_0 \end{cases}$$

$I(x_0; y_0)$ là tâm đối xứng của (C) $\Leftrightarrow Y$ là hàm chẵn

$$\Leftrightarrow Y(X) = Y(-X) \quad \forall X$$

$$\Leftrightarrow 2X + A + \frac{2}{X + B} = -2X + A + \frac{2}{-X + B}$$

$$\Leftrightarrow \frac{2A(B^2 - X^2) + 4B}{B^2 - X^2} = 0, \quad \forall X$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} A = 0 \\ 2AB^2 + 4B = 0 \end{cases} \quad \text{Vậy} \quad \begin{cases} x_0 = -2 \\ y_0 = -3. \end{cases}$$

Đề 18 Cho hàm số : $y = f(x) = \frac{x^2 + mx - 1}{x - 1}$

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số với $m = 1$.
2. Tìm m để hàm số :
 - a) Đồng biến trong $(-\infty; 1)$ và trong $(1; +\infty)$.
 - b) Đồng biến trong $(-\infty; 1) \cup (1; +\infty)$.
3. Tìm m để đường $y = m$ cắt đồ thị hàm số tại 2 điểm phân biệt A, B sao cho OA vuông góc với OB.

Giải

$$y = \frac{x^2 + mx - 1}{x - 1}$$

$$1. m = 1 \Rightarrow y = \frac{x^2 + x - 1}{x - 1} = x + 2 + \frac{1}{x - 1}$$

$$D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$$


$$y' = \frac{x^2 - 2x}{(x - 1)^2} = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee x = 2$$

$y' = x + 2$ là tiệm cận xiên

$x = 1$ là tiệm cận đứng

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$
y'	+	0	-	0	+
y	$-\infty$	1	$+\infty$	5	$+\infty$

Đồ thị (hình 40).



Hình 40

$$2. a) \quad y' = \frac{x^2 - 2x - m + 1}{(x-1)^2}$$

y đồng biến trong $(-\infty; 1)$ và $(1; +\infty)$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 2x - m + 1 \geq 0 \quad \forall x \\ 1 + m - 1 \neq 0 \text{ (hàm y không suy biến)} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \Delta' = m \leq 0 \\ m \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow m < 0$$

b) y đồng biến trong $(-\infty; 1) \cup (1; +\infty)$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y \text{ đồng biến trong từng khoảng xác định} \\ \lim_{x \rightarrow 1^-} y \leq \lim_{x \rightarrow 1^+} y \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + mx - 1}{x - 1} \leq \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + mx - 1}{x - 1} \\ m < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 0 \\ +\infty \leq -\infty \end{cases}$$

$\Rightarrow$ không tồn tại m thỏa mãn bài toán

(vì $g(1) = m < 0 \Rightarrow$ khi $x \rightarrow 1$, $g(x) = x^2 + mx - 1 < 0$).

3. (d) : $y = m$,

(d) và (C_m) có phương trình hoành độ giao điểm : $\frac{x^2 + mx - 1}{x - 1} = m$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + mx - 1 = m(x - 1) \\ x \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 = 1 - m \\ x \neq 1 \end{cases} \quad (I)$$

(d) và (C_m) cắt nhau tại 2 điểm $A(x_A; y_A)$, $B(x_B; y_B)$ phân biệt thỏa mãn $OA \perp OB$

$\Leftrightarrow$ (I) có 2 nghiệm x_A, x_B phân biệt và thỏa mãn $x_A \cdot x_B + y_A \cdot y_B = 0$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m < 1 \text{ và } m \neq 0 \\ x_A \cdot x_B + \left(\frac{x_A^2 + mx_A - 1}{x_A - 1} \right) \left(\frac{x_B^2 + mx_B - 1}{x_B - 1} \right) = 0 \\ x_A \text{ và } x_B \text{ là nghiệm của } x^2 = 1 - m \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m < 1 \text{ và } m \neq 0 \\ m - 1 + \frac{1 - m + m\sqrt{1 - m} - 1}{\sqrt{1 - m} - 1} \times \frac{1 - m - m\sqrt{1 - m} - 1}{-\sqrt{1 - m} - 1} = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m < 1 \text{ và } m \neq 0 \\ m^2 + m - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow m = \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}$$

Đề 19

Cho hàm số : $y = f(x) = \frac{2x^2 + (m+1)x - 3}{x+m}$

1. Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số khi $m = 2$.
2. Tìm trên đồ thị tất cả các điểm mà tọa độ là các số nguyên.
3. Với giá trị nào của m thì đồ thị của hàm số không phải là một hyperbol.

Giải

1. $y = \frac{2x^2 + (m+1)x - 3}{x+m}$

$m = 2$ thì : $y = \frac{2x^2 + 3x - 3}{x+2} = 2x - 1 - \frac{1}{x+2}$ (C)

$D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$

$y = 2 + \frac{1}{(x+2)^2} > 0 \quad \forall x \in D$

$x = -2$ là tiệm cận đứng


$y = 2x - 1$ là tiệm cận ngang

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
y'		+	+
y	$-\infty$		$+\infty$

• $x = 0 \Rightarrow y = -\frac{3}{2}$

• $x = -1 \Rightarrow y = -4$

Đồ thị (hình 41).



Hình 41

2. $M(x_0; y_0) \in (C)$ có $x_0, y_0 \in \mathbb{Z}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x_0 \in \mathbb{Z} \\ 2x_0 - 1 - \frac{1}{x_0+2} \in \mathbb{Z} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = -1 \\ y_0 = -4 \end{cases} \text{ hay } \begin{cases} x_0 = -3 \\ y_0 = -6 \end{cases}$

3. Đồ thị không là hyperbol

$\Leftrightarrow$ Nghiệm tử trùng với nghiệm mẫu (hàm suy biến)

$\Leftrightarrow 2m^2 + (m+1)(-m) - 3 = 0$

$\Leftrightarrow m^2 - m - 3 = 0 \Leftrightarrow m = \frac{1 \pm \sqrt{13}}{2}$

Đề 20

Cho hàm số : $y = f(x) = \frac{x^2 - 2mx + 3m^2}{x - 2m}$

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số với $m = -1$.
2. Xác định m để hàm số luôn đồng biến trên các khoảng mà nó xác định.
3. Xác định m để hàm số đồng biến trên khoảng $1 < x < +\infty$.

Giải

1. $y = \frac{x^2 - 2mx + 3m^2}{x - 2m}$

$$m = -1 \Rightarrow y = \frac{x^2 + 2x + 3}{x + 2} = x + \frac{3}{x + 2}$$


$$D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$$

$$y' = \frac{x^2 + 4x + 1}{(x + 2)^2} = 0 \Leftrightarrow x = -2 \pm \sqrt{3}$$

- $x = -2$ là tiệm cận đứng
- $y = x$ là tiệm cận xiên

x	$-\infty$	$-2 - \sqrt{3}$	-2	$-2 + \sqrt{3}$	$+\infty$
y'	+	0		0	+
y	$-\infty$	$-2 - 2\sqrt{3}$	$+\infty$	$2 + 2\sqrt{3}$	$+\infty$

Đồ thị (hình 42).



Hình 42

$$2. y' = \frac{x^2 - 4mx + m^2}{(x - 2m)^2}$$

y đồng biến trên từng khoảng xác định

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (2m)^2 - 2m(2m) + 3m^2 = 0 & (\text{hàm } y \text{ không suy biến}) \\ \Delta' = 4m^2 - m^2 \leq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 0 \\ m = 0 \end{cases}$$

Vậy hàm không tồn tại m thỏa mãn bài toán.

$$3. \text{ Đặt } g(x) = x^2 - 4mx + m^2$$

f(x) đồng biến trên khoảng $(1, +\infty)$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} g(x) \text{ có 2 nghiệm } x_1, x_2 \text{ thỏa mãn} \\ x_1 < x_2 < 1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} g(1) > 0 \\ 2m < 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m^2 - 4m + 1 > 0 \\ 2m < 1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m < 2 - \sqrt{3} \quad \vee \quad m > 2 + \sqrt{3} \\ m < \frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow m < 2 - \sqrt{3}.$$

5- VỊ TRÍ TƯƠNG ĐỐI GIỮA HAI ĐỒ THỊ


I- NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN

Cho hai đồ thị $(C_1) : y = f(x)$

$(C_2) : y = g(x)$

1. **Số giao điểm của (C_1) và (C_2) chính là số nghiệm của phương trình hoành độ giao điểm của (C_1) và (C_2) :**

$$f(x) = g(x) \quad (1)$$



Hình 43

2. Các trường hợp :

(1) vô nghiệm $\Leftrightarrow (C_1)$ và (C_2) không có nghiệm chung

(1) có n nghiệm $\Leftrightarrow (C_1)$ và (C_2) có n điểm chung

(1) có nghiệm đơn $x_0 \Leftrightarrow (C_1)$ cắt (C_2) tại $M_0(x_0, y_0)$

(1) có nghiệm kép $x_0 \Leftrightarrow (C_1)$ tiếp xúc (C_2) tại $M_0(x_0, y_0)$

3. Điều kiện tiếp xúc :


Cách 1 :

(C_1) tiếp xúc với $(C_2) \Leftrightarrow$ phương trình $f(x) = g(x)$ có nghiệm kép

Cách 2 :

(C_1) tiếp xúc với $(C_2) \Leftrightarrow$ hệ phương trình có nghiệm

$$\begin{cases} f(x) = g(x) \\ f'(x) = g'(x) \end{cases}$$



Hình 44

II- BÀI TOÁN MINH HỌA

Đề 21 Cho hàm số : $y = f(x) = x^3 - 4x^2 + 4x$.

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2. Tiếp tuyến của (C) tại gốc tọa độ lại cắt (C) tại điểm A. Tính tọa độ của A.
3. Biện luận theo k vị trí tương đối của (C) với đường thẳng $y = kx$.


Giải

$$y = x^3 - 4x^2 + 4x = f(x) \quad (C)$$

$$1. D = \mathbb{R}$$

$$y' = 3x^2 - 8x + 4 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = 2 \vee x = \frac{2}{3}$$

x	$-\infty$	$\frac{2}{3}$	2	$+\infty$
y'	+	0	0	+
y	$-\infty$	32 27	0	$+\infty$



Hình 45

$$y = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee x = 2 \vee x = 4$$

Đồ thị (hình 45).

2. Tiếp tuyến tại O có phương trình $y = f'(0)x \Rightarrow y = 4x$ (Δ)

Phương trình hoành độ giao điểm của (Δ) và (C) :

$$x^3 - 4x^2 + 4x = 4x \Leftrightarrow x = 0 \text{ hay } x = 4; \quad f(4) = 16$$

Vậy (Δ) cắt (C) tại A(4; 16)

3. (d) : $y = kx$ là đường thẳng qua O có hệ số góc k

Phương trình hoành độ giao điểm của (Δ) và (C) :

$$x^3 - 4x^2 + 4x = kx \Leftrightarrow x^3 - 4x^2 + (4 - k)x = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 0 \vee x^2 + 4x + 4 - k = 0$$

(d) tiếp xúc với (C)

$$\Leftrightarrow x^2 - 4x + 4 - k = 0 \text{ có nghiệm } x = 0 \text{ hay có nghiệm kép}$$

$$\Leftrightarrow k = 4 \text{ hay } k = 0$$

- $k = 4 \vee k = 0$: (d) tiếp xúc (C) tại O và cắt (C) tại một điểm.

- $\begin{cases} k > 0 \\ k \neq 4 \end{cases}$ (d) cắt (C) tại 3 điểm

- $k < 0$: (d) cắt (C) tại 1 điểm là O.

Đề 22 Cho hàm số : $y = f(x) = (4 - x)(x - 1)^2$.

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2. Gọi I là giao điểm của (C) với Oy, d là đường thẳng qua I có hệ số góc m. Định m để d cắt (C) tại 3 điểm phân biệt.

Giải

$$y = (4 - x)(x - 1)^2 = -x^3 + 6x^2 - 9x + 4 \quad (C)$$


1. $D = \mathbb{R}$

$$y' = -3x^2 + 12x - 9 = 0 \Leftrightarrow x = 1 \vee x = 3$$

$$y'' = 3(-2x + 4) = 0 \Leftrightarrow x = 2$$

Vậy S(2; 2) là điểm uốn.

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$		
y'	-	0	+	0	-	
y	$+\infty$			4		$-\infty$
			0			
$x = 0$	$\Rightarrow$	$y = 4$				
$x = 4$	$\Rightarrow$	$y = 0$				



Đồ thị (hình 46).

Hình 46

2. Giao điểm (C) và Oy là I(0; 4)

Đường thẳng qua I hệ số góc m có phương trình (d) : $y = mx + 4$

(d) cắt (C) tại 3 điểm phân biệt

$\Leftrightarrow$ Phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (C) :

$$x^3 - 6x^2 + (9 + m)x = 0 \text{ có 3 nghiệm phân biệt}$$

$\Leftrightarrow x^2 - 6x + 9 + m = 0$ có 2 nghiệm phân biệt khác không

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m \neq -9 \\ \Delta' = 9 - (9 + m) > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq -9 \\ -m > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq -9 \\ m < 0 \end{cases}$$

Đề 23 Cho hàm số : $y = f(x) = -x^4 + 2mx^2 - 2m + 1$ (C_m).

1. Biện luận theo m số cực trị của hàm số f.

2. Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số với $m = 5$.

3. Xác định m sao cho (C_m) tương ứng cắt trục hoành tại 4 điểm lập thành cấp số cộng. Xác định các cấp số này.

Giải

$$y = -x^4 + 2mx^2 - 2m + 1 \quad (C_m)$$

1. $y' = -4x^3 + 4mx = 4x(-x^2 + m)$


$m \leq 0 \Rightarrow y$ có 1 cực trị

$m > 0 \Rightarrow y$ có 3 cực trị

2. $m = 5 \Rightarrow y = -x^4 + 10x^2 - 9$

$D = \mathbb{R}$

$y' = 4x(-x^2 + 5) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee x = \pm\sqrt{5}$



Hình 47

x	$-\infty$	$-\sqrt{5}$	0	$+\sqrt{5}$	$+\infty$
y'	+	0	-	0	-
y	$-\infty$	16	-9	16	$-\infty$

Đồ thị (hình 47).

3. (C_m) cắt Ox tại 4 điểm lập thành cấp số cộng

$\Leftrightarrow g(t) = -t^2 + 2mt - 2m + 1 = 0$ có 2 nghiệm phân biệt dương

$$0 < t_1 < t_2 \quad \text{thỏa mãn} \quad \sqrt{t_2} - \sqrt{t_1} = 2\sqrt{t_1}$$



$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta' = (m-1)^2 > 0 \\ g(0) = 1 - 2m < 0 \\ 2m > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 1 \\ m > \frac{1}{2} \\ m = 5 \text{ hay } m = \frac{5}{9} \end{cases}$$

$$2m - 1 = 9 \quad \text{hay} \quad 1 = 9(2m - 1)$$

- $m = 5 \div -3; -1; 1; 3$
- $m = 1 \div -1; -\frac{1}{3}; \frac{1}{3}; 1.$

Đề 24 Cho hàm số : $y = f(x) = \frac{(m-1)x + m}{x - m} \quad (m \neq 0).$

1. Chứng minh rằng khi m thay đổi thì (H_m) của hàm số luôn tiếp xúc với nhau tại một điểm cố định.
2. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số ứng với $m = 2$.
3. Chứng minh rằng $\forall b$ đường thẳng $\Delta : y = x + b$ luôn cắt (C) tại hai điểm thuộc hai nhánh phân biệt.

Giải

$$1. y = \frac{(m-1)x + m}{x - m} \quad (H_m) \quad (m \neq 0)$$

$$y' = \frac{-m^2}{(x - m)^2}$$

$M(x_0; y_0)$ là điểm cố định của đồ thị

$$\Leftrightarrow y_0 = \frac{(m-1)x_0 + m}{x_0 - m} \quad \forall m$$

$$\Leftrightarrow (x_0 + 1 + y_0)m - (x_0 + x_0 y_0) = 0 \quad \forall m$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_0 + 1 + y_0 = 0 \\ x_0(1 + y_0) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = 0 \\ 1 + y_0 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = 0 \\ y_0 = -1 \end{cases}$$

$y'(0) = -1 \Rightarrow$ các đồ thị (H_m) luôn tiếp xúc tại $(0; -1).$

2. $m = 2 \Rightarrow y = \frac{x+2}{x-2} \quad (H)$


$D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$

$y' = \frac{-4}{(x-2)^2} < 0 \quad \forall x \in D$

x	$-\infty$	2	$+\infty$
y'	-		-
y	2	$+\infty$	2

$x = 0 \Rightarrow y = -1$

$x = -2 \Rightarrow y = 0$



Hình 48

Đồ thị (hình 48).

3. $\Delta : y = x + b$

Phương trình hoành độ giao điểm của Δ và (H) : $x + b = \frac{x+2}{x-2}$

$\Leftrightarrow g(x) = x^2 + (b-3)x - 2b - 2 = 0 \quad (1)$

$g(2) = -4 < 0$

$\Rightarrow$ (1) luôn có 2 nghiệm phân biệt $x_1 < 2 < x_2 \Rightarrow$ điều cần chứng minh.

Đề 25 Cho hàm số : $y = \frac{x^2 - 3x + 3}{1 - x}$.

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2. Tìm trên (C) điểm cách đều các trục tọa độ.
3. Biện luận theo m vị trí tương đối của (C) và đường thẳng d: $y = 3x + m$.
4. Khi d tiếp xúc với (C) hãy xác định các tiếp điểm.

Giải


1. $y = \frac{x^2 - 3x + 3}{1 - x} = -x + 2 + \frac{1}{1 - x} \quad (C)$

$D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$

$y' = \frac{-x^2 + 2x}{(1-x)^2} = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee x = 2$

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$	
y'	-	0	+	+	0	-
y	$+\infty$	$\searrow$	3	$\nearrow$	$+\infty$	
			</			

Đồ thị (hình 49).



2. $M(x; y) \in (C)$ cách đều Ox và Oy

$$\Leftrightarrow \frac{x^2 - 3x + 3}{1 - x} = x \quad \text{hay} \quad \frac{x^2 - 3x + 3}{1 - x} = -x$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \neq 1 \\ 2x^2 - 4x + 3 = 0 \end{cases} \quad \text{hay} \quad \begin{cases} x \neq 1 \\ 2x = 3 \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{3}{2}$$

3. $d: y = 3x + m$

Phương trình hoành độ giao điểm của d và (C) : $3x + m = \frac{x^2 - 3x + 3}{1 - x}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \neq 1 \\ 4x^2 + (m - 6)x + 3 - m = 0 \end{cases} \Leftrightarrow 4x^2 + (m - 6)x + 3 - m = 0 \quad (1)$$

$$\Delta = m^2 + 4m - 12$$

$$\bullet m = -6 \vee m = 2 \Leftrightarrow \Delta = 0 \Leftrightarrow (1) \text{ có nghiệm kép}$$

$$\Leftrightarrow d \text{ tiếp xúc } (C)$$

$$\bullet -6 < m < 2 \Leftrightarrow \Delta < 0 \Leftrightarrow (1) \text{ vô nghiệm}$$

$$\Leftrightarrow d \text{ và } (C) \text{ không có điểm chung}$$

$$\bullet m > 2 \vee m < -6 \Leftrightarrow \Delta > 0 \Leftrightarrow (1) \text{ có hai nghiệm phân biệt}$$

$$\Leftrightarrow d \text{ cắt } (C) \text{ tại hai điểm phân biệt.}$$

4. d tiếp xúc $(C) \Leftrightarrow m = -6 \text{ hay } m = 2$

$$m = -6 \Rightarrow \text{tiếp điểm có hoành độ } x = \frac{3}{2} \text{ là nghiệm của (1)}$$

$$\Rightarrow M_1\left(\frac{3}{2}, -\frac{3}{2}\right)$$

$$m = 2 \Rightarrow \text{tiếp điểm là } M_2\left(\frac{1}{2}, \frac{7}{2}\right) \text{ với } \frac{1}{2} \text{ là nghiệm của (1).}$$

6- TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ

I- NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN

1. Phương trình tiếp tuyến với đồ thị :

$(C) : y = f(x)$ tại điểm $M_0(x_0; y_0)$ là :

$$\Delta : y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0) \quad (1).$$

2. Để lập phương trình tiếp tuyến Δ với (C) khi biết hệ số góc K (h.50)

Cách 1 :

Tìm tiếp điểm $M_0(x_0; y_0)$


Bằng phương trình $f'(x) = K$ rồi dùng công thức (1)

Cách 2 :


Δ có dạng $y = Kx + m$.

Tìm m bằng điều kiện nghiệm kép của phương trình : $f(x) = Kx + m$

$$\begin{aligned} \Delta // d &\Leftrightarrow K_{\Delta} = K_d \\ \Delta \perp d &\Leftrightarrow K_{\Delta} \cdot K_d = -1. \end{aligned}$$



Hình 50



Hình 51


3. Để lập phương trình tiếp tuyến Δ với (C) biết Δ đi qua $A(x_A; y_A)$

Cách 1 :

- Gọi K là hệ số góc của Δ
- Phương trình $\Delta : y = g(x) = K(x - x_A) + y_A$
- Tìm K bằng điều kiện nghiệm kép của phương trình $f(x) = g(x)$

Cách 2 :

- Gọi $M_0(x_0; y_0)$ là tiếp điểm
 - Phương trình $\Delta : y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$
 - Tìm x_0 bằng điều kiện Δ đi qua $A(x_A; y_A)$
- $$y_A - y_0 = f'(x_0)(x_A - x_0).$$




Hình 52

4. Để lập phương trình tiếp tuyến Δ tiếp xúc với (C) tại 2 điểm

Đặt $\Delta : y = ax + b$

- Phương trình hoành độ giao điểm của (C) và $\Delta : f(x) = ax + b \quad (1)$
- Từ điều kiện (1) phải có 2 nghiệm kép x_1, x_2 ta tìm được a, b .



Hình 53

Đề 26 Cho hàm số : $y = x^3 - 3x^2 + 2$.

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2. Viết phương trình tiếp tuyến tại điểm uốn của (C). Khảo sát vị trí tương đối của (C) với tiếp tuyến này.
3. Lập phương trình tiếp tuyến của (C) đi qua điểm A(0; 3).

Giải

$$y = x^3 - 3x^2 + 2 = f(x) \text{ (C)}$$

1. $D = \mathbb{R}$


$$y' = 3x^2 - 6x = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee x = 2$$

$$y'' = 6x - 6 = 0 \Leftrightarrow x = 1 \Rightarrow I(1; 0) \text{ là điểm uốn}$$

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$		
y'	+	0	-	0	+	
y	$-\infty$		2		-2	$+\infty$

$$y = 0 \Leftrightarrow x = 1 \vee x = 1 \pm \sqrt{3}$$

Đồ thị (hình 54).



Hình 54

2. $I(1; 0)$ là điểm uốn

Phương trình tiếp tuyến tại I (T) :

$$y = f'(1)(x - 1) = -3x + 3$$

Phương trình hoành độ giao điểm (T) và (C) :

$$x^3 - 3x^2 + 2 = -3x + 3 \Leftrightarrow (x - 1)^3 = 0$$

Vậy (T) tiếp xúc (C) tại $I(1; 0)$ và là điểm chung duy nhất.

3. $M(x_0; y_0) \in (C)$

Phương trình tiếp tuyến tại M

$$\Delta : y = (3x_0^2 - 6x_0)(x - x_0) + x_0^3 - 3x_0^2 + 2$$

$$\Leftrightarrow \Delta : y = (3x_0^2 - 6x_0)x + 3x_0^2 + 2 - 2x_0^3$$

$$\Delta \text{ qua } A(0; 3) \Leftrightarrow 3 = 3x_0^2 + 2 - 2x_0^3 \Leftrightarrow (x_0 - 1)(2x_0^2 - x_0 - 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow x_0 = 1 \vee x_0 = -\frac{1}{2}$$

Có hai tiếp tuyến với (C) qua $A(0; 3)$ là : $\Delta_1 : y = -3x + 3;$

$$\Delta_2 : y = \frac{15}{4}x + 3.$$

Đề 27 Cho hàm số : $y = f(x) = \frac{3-x}{2x-1}$.

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2. Lập phương trình tiếp tuyến với (C) song song với đường phân giác thứ hai của mặt phẳng tọa độ.
3. Chứng minh rằng đường thẳng $\Delta : y = x + m$ luôn cắt (C) tại 2 điểm thuộc 2 nhánh phân biệt.

Giải


1. $y = \frac{3-x}{2x-1}$ (C)

$$D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{1}{2} \right\}$$

$$y' = \frac{-5}{(2x-1)^2} < 0 \quad \forall x \in D$$

$x = \frac{1}{2}$ và $y = -\frac{1}{2}$ là hai tiệm cận đứng và ngang

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
y'	-		-
y	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$	$-\frac{1}{2}$



Đồ thị (hình 55).

2. Phương trình phân giác thứ hai (d) : $y = -x$.

Tiếp tuyến tại điểm có hoành độ x_0 song song với (d)

$$\Leftrightarrow -\frac{5}{(2x_0-1)^2} = -1 \quad \Leftrightarrow \quad x_0 = \frac{1+\sqrt{5}}{2} \vee x_0 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$$

Hai tiếp tuyến là :

$$(T_1) : y = -\left(x - \frac{1+\sqrt{5}}{2}\right) + \frac{3 - \frac{1+\sqrt{5}}{2}}{\sqrt{5}} = -x + \sqrt{5}$$

$$(T_2) : y = -\left(x - \frac{1-\sqrt{5}}{2}\right) + \frac{3 - \frac{1-\sqrt{5}}{2}}{-\sqrt{5}} = -x - \sqrt{5}.$$

3. $\Delta: y = x + m$

Phương trình hoành độ giao điểm Δ và (C) :

$$x + m = \frac{3 - x}{2x - 1} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{2} \\ g(x) = 2x^2 + 2mx - m - 3 = 0 \end{cases} \quad (1)$$

$$g\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} - 3 < 0 \Rightarrow (1) \text{ có 2 nghiệm phân biệt } x_1 < \frac{1}{2} < x_2$$

$$\Rightarrow \Delta \text{ luôn cắt (C) tại 2 điểm trên hai nhánh.}$$

Đề 28 Cho hàm số : $y = f(x) = \frac{x^2 - mx + m}{2}$

1. Cho $m = 1$. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2. Lập phương trình tiếp tuyến với (C) đi qua điểm $M(2; -1)$. Chứng minh rằng các tiếp tuyến đó vuông góc với nhau.
3. Xác định các giá trị của m sao cho từ $M(2; -1)$ có thể kẻ được 2 tiếp tuyến vuông góc với nhau đến đồ thị.

Giai

1. $y = \frac{x^2 - mx + m}{2} \quad (C_m)$

$$m = 1 \Rightarrow y = \frac{x^2 - x + 1}{2} = f(x) \quad (C)$$


$$D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

$$y' = \frac{x^2 - 1}{x^2} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 1 \end{cases}$$

$x = 0$ là tiệm cận đứng

$$y = x - 1 + \frac{1}{x} \Rightarrow y = x - 1 \text{ là tiệm cận xiên}$$

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'	+	0	-	0	+
y	$-\infty$	$\nearrow -3$	$+\infty$	$\searrow 1$	$+\infty$



Hình 56

Đồ thị (hình 56).

2. Tiếp tuyến với (C) tại $M(x_0; y_0)$ có phương trình

$$\Delta: y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0) \Leftrightarrow \Delta: y = \left(1 - \frac{1}{x_0^2}\right)x - 1 + \frac{2}{x_0}$$

$$\Delta \text{ qua } A(2; -1) \Leftrightarrow -1 = 1 - \frac{2}{x_0^2} + \frac{2}{x_0} \Leftrightarrow \frac{1}{x_0^2} - \frac{1}{x_0} - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow x_0^2 + x_0 - 1 = 0 \quad (1)$$

Có hai tiếp tuyến qua $A(2; -1)$ với hệ số góc $f'(x_1), f'(x_2)$ (x_1, x_2 là hai nghiệm của (1)) và

$$f'(x_1).f'(x_2) = \left(1 - \frac{1}{x_1^2}\right)\left(1 - \frac{1}{x_2^2}\right) = \left(-\frac{1}{x_1}\right)\left(-\frac{1}{x_2}\right) = -1$$

Vậy hai tiếp tuyến $(T_1), (T_2)$ qua $A(2; -1)$ vuông góc với nhau

$$(T_1): y = \frac{\sqrt{5}-1}{2}x + 2 - \sqrt{5}$$

$$(T_2): y = -\frac{\sqrt{5}+1}{2}x + 2 + \sqrt{5}.$$

3. Phương trình hoành độ giao điểm của $d: y = kx - 2k - 1$ (d qua $M(2; -1)$) và (C_m) là:

$$kx - 2k - 1 = \frac{x^2 - \ln x + m}{x}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \neq 0 \\ (k-1)x^2 + (m-2k-1)x - m = 0 \end{cases} \quad (2)$$

Δ tiếp xúc $(C_m) \Leftrightarrow (2)$ có nghiệm kép khác không

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta = 4k^2 + 4k + (1-m)^2 - 4m = 0 \\ m \neq 0 \text{ và } k \neq 1 \end{cases} \quad (3)$$

m thỏa mãn bài toán $\Leftrightarrow (3)$ có hai nghiệm phân biệt k_1, k_2 thỏa mãn

$$\begin{cases} k_1 \neq 1 \text{ và } k_2 \neq 1, \Delta' = 4 + 16m - (1-m)^2 > 0 \\ k_1 k_2 = \frac{(1-m)^2 - 4m}{4} = -1 \\ m \neq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow m = 1 \vee m = 5.$$

Đề 29 Cho hàm số: $y = f(x) = \frac{1}{2}x^4 - 3x^2 + \frac{3}{2}$.

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2. Lập phương trình tiếp tuyến với (C) tại điểm uốn.
3. Lập phương trình các tiếp tuyến với (C) đi qua điểm $A\left(0, \frac{3}{2}\right)$.

Giải

1. $y = f(x) = \frac{1}{2}x^4 - 3x^2 + \frac{3}{2}$


$D = \mathbb{R}$

$y' = 2x^3 - 6x = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ hoặc } x = \pm\sqrt{3}$

$y'' = 6x^2 - 6 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$

$I_1(1; -1)$; $I_2(-1; -1)$ là điểm uốn

x	$-\infty$	$-\sqrt{3}$	0	$\sqrt{3}$	$+\infty$
y'	-	0	+	0	-
y	$+\infty$	-3	$\frac{3}{2}$	-3	$+\infty$



Đồ thị (hình 57).

2. Phương trình tiếp tuyến tại $I_1(1; -1)$

$(d_1): y = f'(1)(x - 1) + f(1) = -4(x - 1) - 1$

$(d_1): y = -4x + 3$

Do tính đối xứng (hàm chẵn), phương trình tiếp tuyến tại $I_2(-1; -1)$:

$(d_2): y = 4x + 3$

3. $M_0(x_0, y_0) \in (C)$

Phương trình tiếp tuyến tại M_0

$(\Delta): y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0) = (2x_0^3 - 6x_0)x + \left(-\frac{3}{2}x_0^4 + 3x_0^2 + \frac{3}{2}\right)$

(Δ) qua $A\left(0, \frac{3}{2}\right) \Leftrightarrow \frac{3}{2} = -\frac{3}{2}x_0^4 + 3x_0^2 + \frac{3}{2}$

$\Leftrightarrow x_0 = 0 \text{ hoặc } x_0 = \pm\sqrt{2}$

$\Delta_1: y = \frac{3}{2}; \quad \Delta_2: y = -2\sqrt{2}x + \frac{3}{2}; \quad \Delta_3: y = 2\sqrt{2}x + \frac{3}{2}$

ĐỀ 30 Cho hàm số: $y = f(x) = x^4 - 2x^3 - 2x^2 + \frac{5}{4}$

1. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2. Lập phương trình của tiếp tuyến Δ với (C) biết rằng Δ tiếp xúc với (C) tại 2 điểm phân biệt.

Giải

$$y = f(x) = x^4 - 2x^3 - 2x^2 + \frac{5}{4} \quad (C)$$

1. $D = \mathbb{R}$

$$y' = 4x^3 - 6x^2 - 4x = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ hay } x = 2 \text{ hay } x = -\frac{1}{2}$$

x.	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	0	2	$+\infty$
y'	-	0	+	0	-
y	$+\infty$	$\frac{17}{16}$	$\frac{5}{4}$	$\frac{27}{4}$	$+\infty$

Đồ thị (hình 58).

2. $\Delta: y = ax + b$

Phương trình hoành độ giao điểm (C) và Δ :

$$x^4 - 2x^3 - 2x^2 - ax + \frac{5}{4} - b = 0 \quad (1)$$

(Δ) tiếp xúc (C) tại hai điểm phân biệt

$$\Leftrightarrow (1) \text{ có dạng: } (x - x_1)^2 (x - x_2)^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^4 - 2(x_1 + x_2)x^3 + (x_1^2 + x_2^2 + 4x_1x_2)x^2 - 2x_1x_2(x_1 + x_2)x + x_1^2x_2^2 = 0 \quad (2)$$


Đồng nhất (1) và (2) bằng hệ:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 1 \\ x_1^2 + x_2^2 + 4x_1x_2 = -2 \\ a = 2x_1x_2(x_1 + x_2) \\ \frac{5}{4} - b = x_1^2x_2^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 = 1 \\ x_1x_2 = -\frac{3}{2} \\ a = 2x_1x_2(x_1 + x_2) \\ b = \frac{5}{4} - x_1^2x_2^2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{1 + \sqrt{7}}{2} \\ x_2 = \frac{1 - \sqrt{7}}{2} \end{cases} \text{ hay } \begin{cases} x_1 = \frac{1 - \sqrt{7}}{2} \\ x_2 = \frac{1 + \sqrt{7}}{2} \end{cases}$$

$$a = -3 \text{ và } b = -1$$

Vậy $\Delta: y = -3x - 1$.



Hình 58

7- BIỆN LUẬN SỐ NGHIỆM CỦA PHƯƠNG TRÌNH BẰNG ĐỒ THỊ

I- NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN

1. Để biện luận số nghiệm của phương trình $P(x) = Q(x)$ (1) bằng đồ thị (C) : $y = f(x)$, ta thực hiện các việc :


- Biến đổi (1) $\Leftrightarrow f(x) = g(x; m)$
- Số nghiệm của phương trình (1) chính là số giao điểm của đồ thị của (C) : $y = f(x)$ và $\Delta : y = g(x; m)$

2. Các dạng chuyển động của $g(x; m)$ theo tham số m


$g(x; m) = m$: Δ vuông góc với Oy tại $M(0; m)$

$g(x; m) = Kx + m$: Δ cùng phương với $y = Kx$ và cắt Oy tại $M(0; m)$


$g(x; m) = m(x - x_0) + y_0$: Δ quay quanh $M_0(x_0; y_0)$ và có hệ số góc m .



Hình 59



Hình 60



Hình 61

II- BÀI TOÁN MINH HỌA

Đề 31 Cho hàm số : $y = f(x) = 4x^3 - 3x$.

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2. Biện luận theo m số nghiệm của phương trình : $4x^3 - 3x - m = 0$.
3. Cho đường thẳng (d) : $y = k(x - 1) - 1$
Tìm k để (d) tiếp xúc với (C).

Giải


$$y = f(x) = 4x^3 - 3x \quad (C)$$

1. $D = \mathbb{R}$

$$y' = 12x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow x = \pm \frac{1}{2}$$

$$y'' = 24x = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

$\Rightarrow O(0; 0)$ là điểm uốn.



Hình 62

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$	
y'	+	0	-	0	+
y	$-\infty$	$\nearrow 1$	$\searrow -1$	$\nearrow +\infty$	

Đồ thị (hình 62).

$$2. 4x^3 - 3x - m = 0 \quad \Leftrightarrow \quad 4x^3 - 3x = m \quad (1)$$

Số nghiệm phương trình là số giao điểm của (C) và đường thẳng (Δ): $y = m$

$m > 1$ hay $m < -1$: (Δ) cắt (C) tại 1 điểm $\Rightarrow$ (1) có 1 nghiệm

$m = 1$ hay $m = -1$: (Δ) cắt (C) tại 1 điểm và tiếp xúc (C) tại 1 điểm
 $\Rightarrow$ (1) có 1 nghiệm đơn và 1 nghiệm kép.

$-1 < m < 1$: (Δ) cắt (C) tại 3 điểm $\Rightarrow$ (1) có 3 nghiệm.

$$3. (d): y = k(x - 1) - 1 \Rightarrow (d) \text{ luôn qua } A(1; -1)$$

Phương trình tiếp tuyến (T) tại $M(x_0; y_0)$ là:

$$(T): y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0) = (12x_0^2 - 3)x - 8x_0^3$$

$$(T) \text{ qua } A(1; -1) \Leftrightarrow -1 = 12x_0^2 - 3 - 8x_0^3$$

$$\Leftrightarrow 4x_0^3 - 6x_0^2 + 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow \left(x_0 - \frac{1}{2}\right)(4x_0^2 - 4x_0 - 2) = 0$$

$$\Leftrightarrow x_0 = \frac{1}{2} \text{ hay } x_0 = \frac{1 \pm \sqrt{3}}{2}$$

$$f'\left(\frac{1}{2}\right) = 0, \quad f'\left(\frac{1 + \sqrt{3}}{2}\right) = 3(4 + 2\sqrt{3}) - 3 = 3(3 + 2\sqrt{3})$$

$$f'\left(\frac{1 - \sqrt{3}}{2}\right) = 3(4 - 2\sqrt{3}) - 3 = 3(3 - 2\sqrt{3})$$

$$\text{Vậy } k = 0 \text{ hay } k = 3\sqrt{3}(\sqrt{3} + 2) \text{ hay } k = 3\sqrt{3}(\sqrt{3} - 2).$$

Đề 32 Cho hàm số: $y = \frac{x^2 + 3x + 3}{x + 2}$.

1. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

2. Biện luận theo m số nghiệm của phương trình:

$$x^2 + (3 - m)x + 3 - 2m = 0 \quad (1)$$

3. Tùy theo m, so sánh các nghiệm của (1) với các số -3 và -1.

Giải

$$y = \frac{x^2 + 3x + 3}{x + 2} \Leftrightarrow y = x + 1 + \frac{1}{x + 2} \quad (C)$$

1. $D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$


$$y' = \frac{x^2 + 4x + 3}{(x + 2)^2} = 0 \Leftrightarrow x = -3 \text{ hay } x = -1$$

$x = -2$ là tiệm cận đứng

$y = x + 1$ là tiệm cận xiên

x	$-\infty$	-3	-2	-1	$+\infty$	
y'	+	0	-	-	0	+
y	$-\infty$	-3	$+\infty$	1	$+\infty$	

Đồ thị (hình 63).



Hình 63

2. $x^2 + (3 - m)x + 3 - 2m = 0 \quad (1)$

$$\Leftrightarrow x^2 + 3x + 3 = m(x + 2) \Leftrightarrow \frac{x^2 + 3x + 3}{x + 2} = m \quad (x \neq -2) \quad (2)$$

Số nghiệm của (2) là số giao điểm của (C) và (d) : $y = m$

- $m > 1$ hay $m < -3$: (1) có hai nghiệm.
- $m = 1$ hay $m = -3$: (1) có một nghiệm kép.
- $-3 < m < 1$: (1) vô nghiệm.

3. • $-3 < m < 1$: (1) vô nghiệm.

- $m = 1$: (1) có nghiệm $x = -1$
- $m = -3$: (1) có nghiệm $x = -3$
- $m > 1$: (1) có 2 nghiệm : $-2 < x_1 < -1 < x_2$
- $m < -3$: (1) có 2 nghiệm : $x_1 < -3 < x_2 < -2 < -1$.

Đề 33

Cho hàm số $y = f(x) = \frac{3-x}{2x-1}$.

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2. Biện luận theo k số nghiệm của phương trình :

$$2x^2 - 2kx - 2x + k + 3 = 0.$$
3. Lập phương trình tiếp tuyến với (C) song song với đường phân giác thứ hai.

Giải

1. $y = f(x) = \frac{3-x}{2x-1}$ (C)

$$D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{1}{2} \right\}$$

$$y' = -\frac{5}{(2x-1)^2} < 0 \quad \forall x \in D$$

$$x = \frac{1}{2} \text{ là tiệm cận đứng}$$


$$y = -\frac{1}{2} \text{ là tiệm cận ngang}$$

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
y'	-		-
y	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$	$-\frac{1}{2}$

$$x = 3 \Leftrightarrow y = 0$$

$$x = 0 \Leftrightarrow y = -3$$

Đồ thị (hình 64).



Hình 64

2. $2x^2 - 2kx - 2x + k + 3 = 0 \Leftrightarrow k - x = \frac{3-x}{2x-1}$ (1)

Hai tiếp tuyến song song với (d) : $y = -x$ là : $d_1 : y = -x + \sqrt{5}$

$$d_2 : y = -x - \sqrt{5}$$

- $-\sqrt{5} < k < \sqrt{5}$: $\Delta : y = -x + k$ không có điểm chung với (C)
 $\Leftrightarrow$ (1) vô nghiệm
- $k = \sqrt{5}$ hay $k = -\sqrt{5}$: Δ tiếp xúc (C) tại 1 điểm $\Leftrightarrow$ (1) có 1 nghiệm kép
- $k > \sqrt{5}$ hay $k < -\sqrt{5}$: Δ cắt (C) tại 2 điểm phân biệt

$\Leftrightarrow$ (1) có hai nghiệm phân biệt.

Đề 34 Cho hàm số : $y = f(x) = x^3 - 3x$.

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2. Tìm tất cả các điểm trên Ox sao cho từ đó có thể kẻ ba tiếp tuyến khác nhau đến (C).
3. Biện luận theo m số nghiệm của phương trình :

$$x^3 - x(m + 3) + m - 2 = 0.$$

Giải


$$y = f(x) = x^3 - 3x \quad (C)$$

1. • D = R

$$y' = 3x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$$

$$y'' = 6x = 0 \Leftrightarrow x = 0 \Leftrightarrow D(0; 0) \text{ là điểm uốn}$$

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
y'	+	0	-	0	+
y		2			$+\infty$
	$-\infty$		-2		



Đồ thị (hình 65).

2. $M(a; 0) \in Ox$

Phương trình tiếp tuyến với (C) tại điểm có hoành độ x_0

$$(T) : y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0) = (3x_0^2 - 3)x - 2x_0^3$$

$$(T) \text{ qua } M(a; 0) \Leftrightarrow 2x_0^3 - 3ax_0^2 + 3a = 0 \quad (1)$$

BỔ ĐỀ : Ta chứng minh số tiếp tuyến với (C) bằng số tiếp điểm (nghĩa là không tồn tại đường thẳng tiếp xúc (C) tại hai điểm phân biệt).

Thật vậy : Giả sử $\Delta : y = kx + b$ tiếp xúc (C) tại $M(x_0; y_0)$

$$\Leftrightarrow \text{Phương trình hoành độ giao điểm có dạng : } (x - x_0)^2 (x - x_1) = 0$$

- $x_1 = x_0 \Leftrightarrow \Delta$ tiếp (C) tại 1 điểm.
- $x_1 \neq x_0 \Leftrightarrow \Delta$ tiếp xúc (C) tại 1 điểm và cắt (C) tại 1 điểm.

Vậy bổ đề chứng minh xong.

$$\text{Đặt } g(x) = 2x^3 - 3ax^2 + 3a.$$

Từ M kẻ được 3 tiếp tuyến với (C) $\Leftrightarrow (1)$ có 3 nghiệm phân biệt.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} g' = 6x_0^2 - 6ax_0 \text{ có hai nghiệm phân biệt } x_1, x_2 \\ g(x_1) \cdot g(x_2) = 3a \cdot (3a - a^3) < 0 \end{cases} \Leftrightarrow a < -\sqrt{3} \text{ hay } a > \sqrt{3}.$$

$$3. \quad x^3 - (m+3)x + m - 2 = 0 \quad (1) \Leftrightarrow x^3 - 3x = m(x-1) + 2$$

(d) : $y = m(x-1) + 2$ luôn qua $A(1; 2)$

Tiếp tuyến với (C) tại điểm có hoành độ x_0 là (T) : $y = (3x_0^2 - 3)x - 2x_0^3$

$$(T) \text{ qua } A(1; 2) \Leftrightarrow 2 = 3x_0^2 - 3 - 2x_0^3$$

$$\Leftrightarrow (x_0 + 1)(2x_0^2 - 5x_0 + 5) = 0 \Leftrightarrow x_0 = -1$$

$$f'(-1) = 0$$

- $m = 0$: (d) tiếp xúc (C) tại 1 điểm và cắt (C) tại 1 điểm $\Leftrightarrow (1)$ có 2 nghiệm.
- $m < 0$: (d) cắt (C) tại 3 điểm phân biệt $\Leftrightarrow (1)$ có 3 nghiệm.
- $m > 0$: (d) cắt (C) tại 1 điểm $\Leftrightarrow (1)$ có 1 nghiệm.

Đề 35 Cho hàm số : $y = (x+1)^2(x-1)^2$.

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2. Biện luận theo m số nghiệm của phương trình : $(x^2 - 1)^2 - 2m + 1 = 0$.
3. Tìm b để (C) tiếp xúc với (P) : $y = 2x^2 + b$.

Giải

$$y = (x+1)^2(x-1)^2 \Leftrightarrow y = (x^2 - 1)^2 \quad (C)$$

1. $D = \mathbb{R}$

$$y' = 4x(x^2 - 1) = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1 \vee x = 0$$

$$y'' = 4(3x^2 - 1) = 0 \Leftrightarrow x = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\Leftrightarrow I_1\left(\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{4}{9}\right) \text{ và } I_2\left(-\frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{4}{9}\right) \text{ là điểm uốn}$$

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'	-	0	+	0	+
y	$+\infty$	$\searrow$ 0	$\nearrow$ 1	$\searrow$ 0	$\nearrow$ $+\infty$


Đồ thị (hình 66).

$$2. \quad (x^2 - 1)^2 - 2m + 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x^2 - 1)^2 = 2m - 1$$

Số nghiệm của phương trình (1) là

số giao điểm của (C) và $(\Delta) : y = 2m - 1$



Hình 66

- $2m - 1 > 1 \Leftrightarrow m > 1$: có 2 giao điểm $\Leftrightarrow (1)$ có 2 nghiệm.
- $2m - 1 = 1 \Leftrightarrow m = 1$: có 1 tiếp điểm và 2 giao điểm $\Rightarrow (1)$ có 3 nghiệm.

- $0 < 2m - 1 < 1 \Leftrightarrow \frac{1}{2} < m < 1$: có 4 giao điểm $\Rightarrow$ (1) có 4 nghiệm.
- $2m - 1 = 0 \Leftrightarrow m = \frac{1}{2}$: có hai tiếp điểm $\Rightarrow$ (1) có 2 nghiệm.
- $2m - 1 < 0 \Leftrightarrow m < \frac{1}{2}$: (A) không cắt (C) $\Leftrightarrow$ (1) vô nghiệm.

3. (P) : $y = 2x^2 + b$

Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (C) :

$$(x^2 - 1)^2 = 2x^2 + b \Leftrightarrow x^4 - 4x^2 + 1 - b = 0 \quad (2)$$

(P) tiếp xúc (C) $\Leftrightarrow$ (2) có nghiệm kép.

$\Leftrightarrow g(t) = t^2 - 4t + 1 - b = 0$ có nghiệm kép dương
hay có nghiệm là $t = 0$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta = 4 + b - 1 = b + 3 = 0 \\ 2 > 0 \text{ hay } b = 1 \end{cases} \Leftrightarrow b = -3 \text{ hay } b = 1.$$

Đề 36 Cho hàm số : $y = f(x) = \frac{x^2 + mx + 2m - 1}{mx + 1}$ (C_m).

1. Xác định m sao cho hàm số có cực trị và đường tiệm cận xiên của (C_m) đi qua gốc tọa độ.
2. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số với $m = 1$.
3. Biện luận theo m số nghiệm của phương trình :

$$\begin{cases} \cos 2x + 2(1 - m)\cos x + 3 - 2m = 0 \\ -\pi < x < \pi \end{cases}$$

Giải

$$y = f(x) = \frac{x^2 + mx + 2m - 1}{mx + 1} \quad (C_m)$$

1. $m = 0 \Rightarrow y = x^2 - 1$, không có tiệm cận xiên.

$$m \neq 0 \Rightarrow y = \frac{1}{m}x + \frac{m^2 - 1}{m^2} + \frac{2m - 1 - \frac{m^2 - 1}{m}}{mx + 1}$$

Tiệm cận xiên qua O $\Leftrightarrow m^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow m = \pm 1$

$$\bullet m = 1 \Leftrightarrow y = \frac{x^2 + x + 1}{x + 1} \Rightarrow y' = \frac{x^2 + 2x}{(x + 1)^2}$$

y' có 2 nghiệm $\Rightarrow y$ có cực trị.

$$\bullet m = -1 \Leftrightarrow y = \frac{x^2 - x - 3}{-x + 1} \Rightarrow y' = \frac{-x^2 + 2x - 4}{(x - 1)^2} = -\frac{(x - 1)^2 + 3}{(x - 1)^2} < 0$$

Tóm lại $m = 1$ là giá trị cần tìm.


$$2. m = 1 \Leftrightarrow y = \frac{x^2 + x + 1}{x + 1} \quad (C)$$

$$D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$$

$$y' = \frac{x(x+2)}{(x+1)^2} = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee x = -2$$

$x = -1$ là tiệm cận đứng

$y = x$ là tiệm cận xiên.



x	$-\infty$	-2	-1	0	$+\infty$	
y'	+	0	-	-	0	+
y	$-\infty$	$\nearrow -3$	$\searrow -\infty$	$+\infty$	$\searrow 1$	$\nearrow +\infty$

Đồ thị (hình 67).

$$3. \begin{cases} \cos 2x + 2(1 - m)\cos x + 3 - 2m = 0 \\ -\pi < x < \pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -\pi < x < \pi \\ \cos^2 x + (1 - m)\cos x + 1 - m = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} -\pi < x < \pi \\ \cos^2 x + \cos x + 1 = m(\cos x + 1) \end{cases} \Leftrightarrow (I) \begin{cases} \frac{\cos^2 x + \cos x + 1}{\cos x + 1} = m \\ -\pi < x < \pi \end{cases}$$

$$\text{Đặt } t = \cos x \Leftrightarrow -1 < t < 1$$

$$f(t) = \frac{t^2 + t + 1}{t + 1} \quad (C_M) \quad \text{miền khảo sát } M = (-1; 1)$$

$$(\Delta) : y = m$$

$$\bullet m < 1 : (C_M) \cap (\Delta) = \emptyset \quad (I) \text{ vô nghiệm.}$$

$$\bullet m = 1 : (C_M) \cap (\Delta) = \{A(0, 1)\} \Leftrightarrow (I) \text{ có 1 nghiệm } x = \pm \frac{\pi}{2}$$

$$\bullet m = \frac{3}{2} : (C_M) \text{ cắt } (\Delta) \text{ tại 2 điểm có hoành độ } x_1 = 1 \text{ và hoành độ}$$

$$-1 < x_2 < 1 \Leftrightarrow (I) \text{ có 3 nghiệm } x \text{ thỏa mãn : } \begin{cases} \cos x = 0 \\ \cos x = x_2 \quad (-1 < x_2 < x_1) \\ -\pi < x < \pi \end{cases}$$

$$\bullet 1 < m < \frac{3}{2} : (C_M) \text{ cắt } (\Delta) \text{ tại 2 điểm có hoành độ } -1 < x_1, x_2 < 1$$

$$\Leftrightarrow (I) \text{ có 4 nghiệm.}$$

$$\bullet m > \frac{3}{2} : (C_M) \text{ cắt } (\Delta) \text{ tại duy nhất 1 điểm có hoành độ thỏa mãn}$$

$$-1 < x_0 < 1 \Leftrightarrow (I) \text{ có hai nghiệm.}$$

8- TÌM TẬP HỢP ĐIỂM

I- NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN

Để tìm tập hợp (L) các điểm M thỏa mãn các điều kiện cho trước, ta thực hiện các việc :

- Xác định tọa độ của điểm M theo tham số của bài toán

$$\begin{cases} x = g(m) \\ y = h(m) \end{cases}$$


- Khử tham số m, ta được hệ thức độc lập giữa x và y :

$$f(x; y) = 0 \quad (1)$$

- Từ điều kiện tồn tại m, ta xét miền giá trị của g(m) hay h(m) và kết hợp với (1) ta được phương trình của tập hợp (L)

$$M \begin{cases} x = g(m) \\ y = h(m) \end{cases}$$

$$(L) : f(x; y) = 0.$$



Hình 68

II- BÀI TOÁN MINH HỌA

Đề 37 Cho hàm số : $y = f(x) = (4 - x)(x - 1)^2$

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2. A là giao điểm của (C) với Oy, Δ là đường thẳng đi qua A có hệ số góc là m.

Tìm m để Δ cắt (C) tại 3 điểm phân biệt A, B, C.

3. Tìm tập hợp trung điểm M của BC.

Giai

$$y = f(x) = (4 - x)(x - 1)^2 = -x^3 + 6x^2 - 9x + 4$$

$$1. D = \mathbb{R}$$

$$y' = 3(-x^2 + 4x - 3) = 0 \Leftrightarrow x = 1 \vee x = 3$$

$$y'' = -6(x - 2) = 0 \Leftrightarrow x = 2 \Rightarrow I(2; 2) \text{ là điểm uốn}$$


x	$-\infty$	1	3	$+\infty$	
y'	-	0	+	0	-
y	$+\infty$			4	

Diagram illustrating the mapping of y' to y:

- At $x = 1$, $y' = 0$, the function y is $+\infty$.
- At $x = 3$, $y' = 0$, the function y is 4 .
- At $x = 1$, $y' = 0$, the function y is 0 .
- At $x = 3$, $y' = 0$, the function y is $-\infty$.

$$f(1) = f(4) = 0 ; \quad f(0) = 4$$

Đồ thị (hình 69).



Hình 69

2. $A(0; 4)$ là giao điểm của (C) và Oy

$(\Delta) : y = mx + 4$ là đường thẳng qua A

- $m = 0$: (Δ) tiếp xúc (C) tại $B(3; 4)$
- Tiếp tuyến với (C) tại A là $y = -9x + 4$

Vậy $m = -9$ không nhận.

- Để (Δ) cắt (C) tại ba điểm phân biệt A, B, C thì $-9 < m < 0$.

3. Trung điểm M của B, C có tọa độ :

$$\begin{cases} x_M = \frac{x_B + x_C}{2} = 3 & (\text{vì } x_B, x_C \text{ là nghiệm của } x^2 - 6x + 9 = 0) \\ y_M = \frac{y_B + y_C}{2} = \frac{(mx_B + 4)(mx_C + 4)}{2} = mx_M + 4 = 3m + 4 \end{cases}$$

$$\Rightarrow -23 < y_M < 4.$$

Vậy quỹ tích M là đoạn thẳng KL với $K(3; 4)$, $L(3; -23)$ và bỏ hai điểm K, L .

Đề 38 Cho hàm số : $y = f(x) = \frac{x + 3m - 1}{(m + 2)x + 4m}$ (H_m).

1. Biện luận theo m chiều biến thiên của (H_m) .
2. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số với $m = 0$.
3. Tìm tập hợp các tâm đối xứng của (H_m) .

Giải

$$y = f(x) = \frac{x + 3m - 1}{(m + 2)x + 4m} \quad (H_m)$$

1. * $m = -2 \Rightarrow y = -\frac{1}{8}(x - 7)$ tăng trên $\mathbb{R}$

* $m \neq -2 \Rightarrow y$ là hàm số $\Leftrightarrow -\frac{4m}{(m + 2)} + 3m - 1 \neq 0$

$\Leftrightarrow m \neq -1$ và $m \neq \frac{2}{3}$

với $m \neq -1$ và $m \neq \frac{2}{3}$

$$y' = \frac{-3m^2 - m + 2}{[(m+2)x + 4m]^2}$$

• $m > \frac{2}{3}$ hay $m < -1 \Rightarrow y' < 0 \Rightarrow y$ giảm trên từng khoảng xác định

• $-1 < m < \frac{2}{3} \Rightarrow y' > 0 \Rightarrow y$ tăng trên từng khoảng xác định M

2. $m = 0 \Rightarrow y = \frac{x-1}{2x}$

$$D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

$$y' = \frac{2}{4x^2} > 0 \quad \forall x \in D$$


$x = 0$ là tiệm cận đứng

$y = \frac{1}{2}$ là tiệm cận ngang

x	$-\infty$	0	$+\infty$
y'	+		+
y	$\frac{1}{2}$	$+\infty$	$\frac{1}{2}$

$$x = 1 \Rightarrow y = 0$$

Đồ thị (hình 70).



Hình 70

3. Tâm đối xứng là giao điểm hai tiệm cận $I\left(\frac{-4m}{m+2}, \frac{1}{m+2}\right)$ với $\begin{cases} m \neq -2 \\ m \neq -1 \\ m \neq \frac{2}{3} \end{cases}$

Thật vậy, chuyển trục $\begin{cases} x = X + x_0 \\ y = Y + y_0 \end{cases}$

$$\text{Hàm } y \Leftrightarrow \text{hàm } Y = \frac{X + x_0 + 3m - 1}{(m+2)(X + x_0) + 4m} - y_0$$

$$Y = \frac{[1 - (m+2)y_0][X - (m+2)x_0y_0 - 4my_0 + x_0 + 3m - 1]}{(m+2)X + (m+2)x_0 + 4m}$$

$$Y = \frac{AX + B}{CX + D}$$

$I(x_0; y_0)$ là tâm đối xứng $\Leftrightarrow Y$ là hàm lẻ

$$\Leftrightarrow \frac{AX + B}{CX + D} = \frac{A(-X) + B}{C(-X) + D}; \forall X$$

$$\Leftrightarrow ACX^2 - BD = 0; \forall X \Leftrightarrow \begin{cases} AC = 0 \\ BD = 0 \end{cases}$$

Vậy
$$\begin{cases} (m+2)[1 - y_0(m+2)] = 0 \\ [(m+2)x_0 + 4m]B = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y_0 = \frac{1}{m+2} \\ x_0 = \frac{-4m}{m+2} \end{cases} \text{ hay } \begin{cases} y_0 = \frac{1}{m+2} \\ -x_0 - \frac{-4m}{m+2} + x_0 + 3m - 1 = 0 \text{ (loại)} \end{cases}$$

$$\Rightarrow y_0 = \frac{x_0}{8} + \frac{1}{2} \text{ với } x_0 \neq 4, x_0 \neq -1 \text{ (vì } m \neq -1 \text{ và } m \neq \frac{2}{3})$$

Đây là phương trình quỹ tích tâm đối xứng.

Đề 39 Cho hàm số : $y = f(x) = \frac{x^2 + mx - 2m - 4}{x + 2} \quad (C_m).$

1. Với giá trị nào của m thì (C_m) có hai cực trị.
2. Tìm tập hợp các điểm cực trị của (C_m) .
3. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số với $m = -1$.
4. Tiếp tuyến tại điểm M tùy ý của (C) cắt hai đường tiệm cận của (C) tại P và Q . Chứng minh rằng $MP = MQ$.

Giải

$$y = f(x) = \frac{x^2 + mx - 2m - 4}{x + 2} \quad (C_m)$$

MXD : $D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$

$$1. y' = \frac{x^2 + 4x + 4m + 4}{(x + 2)^2}$$

$$(C_m) \text{ có hai điểm cực trị} \Leftrightarrow \begin{cases} y \text{ là hàm số} \\ y' \text{ có 2 nghiệm phân biệt khác } -2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 4 - 2m - 2m - 4 \neq 0 \\ 4 - 8 + 4m + 4 \neq 0 \\ \Delta' = 4 - 4m - 4 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow m < 0$$

2. Với x_0 là cực trị thì : $f(x_0) = 2x_0 + m = y_0$

vì x_0 là nghiệm của $y' \Rightarrow m = -\frac{x_0^2 + 4x_0 + 4}{4} < 0$

Vậy $y = -\frac{x^2}{4} + x - 1$ ($x \neq -2$) là phương trình quỹ tích điểm cực trị.

3. $m = -1 \Rightarrow y = \frac{x^2 - x - 2}{x + 2} = x - 3 + \frac{4}{x + 2}$ (C)

• $D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$

• $y' = \frac{x^2 + 4x}{(x + 2)^2} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -4 \\ x = 0 \end{cases}$


• $x = -2$ là tiệm cận đứng

• $y = x - 3$ là tiệm cận xiên

x	$-\infty$	-4	-2	0	$+\infty$					
y'	+	0	-	-	0	+				
y	$-\infty$	$\nearrow$	-9	$\searrow$	$-\infty$	$+\infty$	$\searrow$	-1	$\nearrow$	$+\infty$

$x = -1$ hay $x = 2 \Rightarrow y = 0$

Đồ thị (hình 71).



4. $\Delta: y = kx + b$

Phương trình hoành độ giao điểm của (Δ) và (C) :

$$(k - 1)x^2 + (2k + b + 1)x + 2b + 2 = 0 \quad (1)$$

Giả sử (Δ) tiếp xúc $(C) \Rightarrow (1)$ có nghiệm kép $x_0 = \frac{2k + b + 1}{2(1 - k)}$

(Δ) cắt tiệm cận đứng và tiệm cận xiên tại hai điểm có hoành độ lần lượt $x_P = -2$ và $x_Q = \frac{b + 3}{1 - k}$.

Nhận xét: $\frac{x_P + x_Q}{2} = \frac{1}{2} \left(-2 + \frac{b + 3}{1 - k} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{2k + b + 1}{1 - k} \right) = x_0$

ba điểm M, P, Q thẳng hàng (x_0 là hoành độ của M). Vậy $MP = MQ$.

Đề 40 Cho hàm số : $y = f(x) = \frac{x^2}{x-1}$.

1. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2. Gọi (d) là đường thẳng có phương trình $y = m$. Biện luận bằng phép tính và kiểm lại bằng đồ thị số giao điểm của (C) và (d).
3. Trong trường hợp (d) cắt (C) tại 2 điểm P và Q. Tìm tập hợp trung điểm M của P và Q.

Giải


$$1. y = f(x) = \frac{x^2}{x-1} \Leftrightarrow y = x + 1 + \frac{1}{x-1} \quad (C)$$

$$\bullet D = \mathbb{R} \setminus \{1\};$$

$x = 1$ là tiệm cận đứng

$y = x + 1$ là tiệm cận xiên

$$\bullet y' = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2} = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee x = 2$$



Hình 72

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$	
y'	+	0	-	-	0	+
y	$-\infty$	$\nearrow 0$	$\searrow -\infty$	$+\infty$	$\searrow 4$	$\nearrow +\infty$

Đồ thị (hình 72).

2. Phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (C)

$$\frac{x^2}{x-1} = m \quad (1)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \neq 1 \\ x^2 - mx + m = 0 \end{cases} \Leftrightarrow x^2 - mx + m = 0$$

$$\Delta = m^2 - 4m$$

- $0 < m < 4 \Rightarrow (1)$ vô nghiệm $\Rightarrow$ d không có điểm chung với (C)
- $m > 4$ hay $m < 0 \Rightarrow (1)$ có 2 nghiệm phân biệt $\Rightarrow$ d cắt (C) tại 2 điểm.
- $m = 0$ hay $m = 4 \Rightarrow (1)$ có nghiệm kép $\Rightarrow$ d tiếp xúc (C) tại 1 điểm.

Kiểm tra bằng đồ thị cho kết quả đúng như trên.

3. (C) cắt d tại 2 điểm P, Q $\Rightarrow m > 4$ hay $m < 0$

$$\begin{cases} x_M = \frac{x_P + x_Q}{2} = \frac{m}{2} \quad (\text{vì } x_P, x_Q \text{ là nghiệm của } x^2 - mx + m = 0) \\ y_M = m \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y_M = 2x_M \\ x_M > 2 \text{ hay } x_M < 0 \end{cases}$$

Vậy quỹ tích M là đường thẳng $y = 2x$ với $x > 2$ hay $x < 0$.

Đề 41 Cho Parabol (P) : $y = x^2 - 2x - 3$.

Tìm tập hợp các điểm M trên mặt phẳng tọa độ sao cho từ M ta kẻ được đến (P) hai tiếp tuyến vuông góc với nhau.

Giải

$$(P) : y = x^2 - 2x - 3.$$

Đường thẳng $x = x_0$ luôn cắt (P).

Đường thẳng Δ qua $M(x_0; y_0)$ có hệ số góc k là $(\Delta) : y = kx - kx_0 + y_0$

Phương trình hoành độ giao điểm (Δ) và (P) :

$$kx - kx_0 + y_0 = x^2 - 2x - 3$$

$$\Leftrightarrow x^2 - (2 - k)x - 3 - y_0 + kx_0 = 0 \quad (1)$$

(Δ) tiếp xúc (C) $\Leftrightarrow$ (1) có nghiệm kép

$$\Leftrightarrow \Delta = (2 - k)^2 - 4(kx_0 - 3 - y_0) = 0$$

$$\Leftrightarrow k^2 - 4(1 + x_0)k + 16 + 4y_0 = 0 \quad (2)$$

Từ M kẻ được 2 tiếp tuyến đến (P) và vuông góc nhau

$$\Leftrightarrow (2) \text{ có hai nghiệm phân biệt } k_1, k_2 \text{ thỏa mãn } k_1 k_2 = -1$$

$$\Leftrightarrow 16 + 4y_0 = -1 \quad \Leftrightarrow y_0 = -\frac{17}{4}$$

9- BIÊN LUẬN SỐ ĐƯỜNG CỦA MỘT HỌ CÁC ĐƯỜNG ĐI QUA MỘT ĐIỂM

I- NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN

1. Cho họ các đường (C_m) có phương trình $y = f(x; m)$;


$$A(x_0; y_0) \in (C_m) \Leftrightarrow y_0 = f(x_0; m) \quad (1)$$

2. Xem phương trình (1) là phương trình theo ẩn số m .

(1) vô nghiệm $\Leftrightarrow$ không có đường nào của họ đi qua điểm A . •

(1) có n nghiệm $m \Leftrightarrow$ có n đường của họ đi qua điểm A .

(1) nghiệm đúng $\forall m \Leftrightarrow$ tất cả các đường cong của họ đều đi qua $A \Leftrightarrow A$ là điểm cố định của họ (C_m) .



Hình 73

II- BÀI TOÁN MINH HỌA

Đề 42 Cho hàm số : $y = f(x) = (2m + 1)x^3 - mx - m + 1$.

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi $m = -1$.
2. Tìm tọa độ của điểm trên (C) tại đó tiếp tuyến với (C) có hệ số góc lớn nhất.
3. Tìm điểm cố định mà (C_m) luôn đi qua $\forall m$.
4. Tìm các điểm trên mặt phẳng tọa độ mà $\forall m$ (C_m) không đi qua.

Giải

$$y = f(x) = (2m + 1)x^3 - mx - m + 1 \quad (C_m)$$

1. $m = -1 \Rightarrow y = -x^3 + x + 2 \quad (C)$


$$D = \mathbb{R}$$

$$y' = -3x^2 + 1 = 0 \Leftrightarrow x = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$y'' = -6x = 0 \Leftrightarrow x = 0 \Rightarrow I(0; 2) \text{ là điểm uốn}$$

x	$-\infty$	$-\frac{\sqrt{3}}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	$+\infty$	
y'	-	0	+	0	-
y	$-\infty$	$2 - \frac{2\sqrt{3}}{9}$	$2 + \frac{2\sqrt{3}}{9}$	$-\infty$	

Đồ thị (hình 74).



Hình 74

2. Phương trình tiếp tuyến với (C) tại $M(x_0; y_0)$ là :

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

$$f'(x_0) = -3x_0^2 + 1 \leq 1 \Leftrightarrow x_0 = 0$$

Tiếp tuyến có hệ số góc lớn nhất là (T) : $y = x + 2 \Rightarrow M(0; 2)$

3. $M(x_0; y_0)$ là điểm cố định của (C_m)

$$\Leftrightarrow y_0 = (2m + 1)x_0^3 - mx_0 - m + 1 \quad \forall m$$

$$\Leftrightarrow (2x_0^3 - x_0 - 1)m + x_0^3 + 1 - y_0 = 0 \quad \forall m$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x_0^3 - x_0 - 1 = 0 \\ x_0^3 + 1 - y_0 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = 1 \\ y_0 = 2 \end{cases}$$

4. $M(x_0; y_0)$ là điểm (C_m) không qua $\forall m$

$$\Leftrightarrow (2x_0^3 - x_0 - 1)m + x_0^3 + 1 - y_0 = 0 \text{ vô nghiệm } \forall m \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = 1 \\ y_0 \neq 2 \end{cases}$$

Đề 43 Cho hàm số : $y = f(x) = m + 1 - mx^2 - \frac{x^4}{2}$.

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số với $m = -1$.
2. Chứng minh rằng (C_m) luôn đi qua 2 điểm cố định.
3. Biện luận theo k số nghiệm của phương trình : $x^4 - 2x^2 + 2k = 0$.

Giải

$$y = f(x) = m + 1 - mx^2 - \frac{x^4}{2}$$

$$1. m = -1 \Rightarrow y = -\frac{x^4}{2} + x^2 \quad (C)$$


$$D = \mathbb{R}$$

$$y' = -2x^3 + 2x = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ hay } x = \pm 1$$

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'	+	0	-	0	-
y	$-\infty$	$\nearrow \frac{1}{2}$	$\searrow 0$	$\nearrow \frac{1}{2}$	$\searrow -\infty$

$$x = 0 \text{ hay } x = \pm \sqrt{2} \Rightarrow y = 0$$

Đồ thị (hình 75).



Hình 75

2. $M(x_0; y_0)$ là điểm cố định của (C_m)

$$\Leftrightarrow y_0 = m + 1 - m x_0^2 - \frac{x_0^4}{2} \quad \forall m$$

$$\Leftrightarrow (1 - x_0^2)m + 1 - \frac{x_0^4}{2} - y_0 = 0 \quad \forall m$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (1 - x_0^2) = 0 \\ y_0 = 1 - \frac{x_0^4}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = 1 \\ y_0 = \frac{1}{2} \end{cases} \text{ hay } \begin{cases} x_0 = -1 \\ y_0 = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$3. \quad x^4 - 2x^2 + 2k = 0 \Leftrightarrow \frac{-x^4}{2} + x^2 = k \quad (1)$$

Số nghiệm (1) bằng số giao điểm của (C) và $\Delta : y = k$

- $k > \frac{1}{2}$: (1) vô nghiệm
- $k = \frac{1}{2}$: (1) có 1 nghiệm kép
- $0 < k < \frac{1}{2}$: (1) có 4 nghiệm
- $k = 0$: (1) có 1 nghiệm kép và 2 nghiệm đơn
- $k < 0$: (1) có 2 nghiệm.

Đề 44 Cho hàm số : $y = f(x) = \frac{mx + 4}{x + m}$ (H_m).

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số với $m = 1$.
2. Chứng minh rằng (H_m) luôn đi qua hai điểm cố định khi m thay đổi ngoại trừ một vài giá trị của m mà ta xác định được.
3. Hãy xác định m để các tiếp tuyến với (H_m) tại hai điểm cố định là song song với nhau.

Giải

$$y = f(x) = \frac{mx + 4}{x + m} \quad (H_m)$$

$$1. \quad m = 1 \Rightarrow y = \frac{x + 4}{x + 1}$$

$$D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$$

$$y' = \frac{-3}{(x + 1)^2} < 0 ; \forall x \in D$$


$x = -1$ là tiệm cận đứng

$y = 1$ là tiệm cận ngang

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
y'	-		-
y	1	$+\infty$	1

$$x = -4 \Rightarrow y = 0$$

$$x = 0 \Rightarrow y = 4$$



Hình 76

Đồ thị (hình 76).

2. $M(x_0; y_0)$ là điểm cố định (H_m) đi qua

$$\Leftrightarrow y_0 = \frac{mx_0 + 4}{x_0 + m} \quad \forall m \quad \Leftrightarrow (x_0 - y_0)m + 4 - x_0 y_0 = 0 \quad \forall m$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = y_0 \\ x_0 y_0 = 4 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = y_0 = 2 \\ x_0 = y_0 = -2 \end{cases}$$

Đồ thị (H_m) luôn qua $M_1(2; 2)$ và $M_2(-2; -2)$.

3. Tiếp tuyến tại M_1 (Δ_1) : $y = y'(2)(x - 2) + y(2)$

Tiếp tuyến tại M_2 (Δ_2) : $y = y'(-2)(x + 2) + y(-2)$

$$\Delta_1 // \Delta_2 \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq \pm 2 \text{ (y là hàm số)} \\ y'(2) = y'(-2) \end{cases} \Leftrightarrow m = 0.$$

Đề 45 Cho hàm số : $y = f(x) = \frac{x^2 + mx - 2}{mx - 1} \quad (C_m)$.

1. Với giá trị nào của m thì $f(x)$ có cực trị.
2. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số ứng với $m = 1$.
3. Chứng minh rằng (C_m) luôn đi qua 3 điểm cố định.

Giải

$$y = f(x) = \frac{x^2 + mx - 2}{mx - 1} \quad (C_m)$$

$$1. y' = \frac{mx^2 - 2x + m}{(mx - 1)^2}$$

$$f(x) \text{ có cực trị} \Leftrightarrow \begin{cases} y \text{ là hàm số} \\ mx^2 - 2x + m = 0 \text{ có nghiệm } x_0 \text{ thỏa mãn } mx_0 - 1 \neq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow m = 0 \quad \text{hay} \quad \begin{cases} m \neq 0 \\ m\left(\frac{1}{m}\right)^2 + m\left(\frac{1}{m}\right) - 2 \neq 0 \\ \Delta' = 1 - m^2 \geq 0 \end{cases}$$

$$mx_0 - 1 = \pm \sqrt{1 - m^2} \neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad -1 < m < 1$$

$$2. m = 1 \Rightarrow y = \frac{x^2 + x - 2}{x - 1} = \begin{cases} \infty \text{ nếu } x = 1 \\ x + 2 \text{ nếu } x \neq 1 \end{cases}$$


Đồ thị (hình 77).

3. $M(x_0; y_0)$ là điểm cố định của hàm số

$$\Leftrightarrow y_0 = \frac{x_0^2 + mx_0 - 2}{mx_0 - 1} \quad \forall m$$

$$\Leftrightarrow x_0(y_0 - 1)m - y_0 - x_0^2 + 2 = 0 \quad \forall m$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_0(y_0 - 1) = 0 \\ x_0^2 + y_0 - 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = 0 \\ y_0 = 2 \end{cases} \text{ hay } \begin{cases} x_0 = 1 \\ y_0 = 1 \end{cases} \text{ hay } \begin{cases} x_0 = -1 \\ y_0 = 1 \end{cases}$$



Hình 77

Đề 46 Cho hàm số : $y = f(x) = \frac{(m+1)(x^2 - 3x) + 2(2m+1)}{mx - m}$.

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số ứng với $m = 1$.
2. Tìm trên (C) những điểm có tọa độ là số nguyên.
3. Chứng minh rằng $\forall m \neq 0$ đồ thị (C_m) có một tiệm cận cố định còn tiệm cận thứ hai luôn đi qua một điểm cố định.

Giải

$$y = \frac{(m+1)(x^2 - 3x) + 2(2m+1)}{mx - m}$$

1. $m = 1 \Rightarrow y = \frac{2(x^2 - 3x) + 6}{x - 1} = 2\left(x - 2 + \frac{1}{x - 1}\right) \quad (C)$

$$D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$$


$$y' = \frac{2(x^2 - 2x)}{(x - 1)^2} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$$

$x = 1$ là tiệm cận đứng

$y = 2x - 4$ là tiệm cận xiên

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$	
y'	+	0	-	-	0	+
y	$-\infty$	$\nearrow -6$	$\searrow -\infty$	$+\infty$	$\searrow 2$	$\nearrow +\infty$

Đồ thị (hình 78).



Hình 78

2. $M(x; y)$ trên (C) có tọa độ nguyên

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \in \mathbb{Z} \\ y = 2x - 4 + \frac{2}{x - 1} \in \mathbb{Z} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x - 1 = \pm 1 \\ x - 1 = \pm 2 \end{cases}$$

$\Leftrightarrow x \in \{-1; 0; 2; 3\}$ ta có 4 điểm trên (C) có tọa độ nguyên là

$$M_1(-1; -7), M_2(0; -6), M_3(2; 2), M_4(3; 3).$$

3. $\forall m \neq 0$ nghiệm của mẫu khác nghiệm của tử do đó y là hàm số

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 1} = \infty.$$

Vậy $x = 1$ là tiệm cận đứng cố định.

$$y = \frac{(m+1)(x^2 - 3x) + 2(2m+1)}{mx - m} = \frac{m+1}{m}x - \frac{2(m+1)}{m} + \frac{2m}{mx - m}$$

$$\Rightarrow y = \frac{m+1}{m}x - \frac{2(m+1)}{m} \text{ là phương trình tiệm cận xiên}$$

$M(x_0; y_0)$ là điểm cố định của tiệm cận xiên

$$\Leftrightarrow y_0 = \frac{m+1}{m}x_0 - \frac{2(m+1)}{m} \quad \forall m$$

$$\Leftrightarrow (y_0 + 2 - x_0)m + 2 - x_0 = 0 \quad \forall m$$

$$\Leftrightarrow M(2; 0) \text{ là điểm cố định của tiệm cận xiên.}$$

10- VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ MANG DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI

I- NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN

1. Xét các đồ thị : (C) : $y = f(x)$

$$(C_1) : y = |f(x)|$$

$$(C_2) : y = f(|x|)$$


$$(C_3) : y = |f(|x|)|$$

(C) : Cách vẽ (C₁) suy ra từ đồ thị của (C).


(C₁) : Giữ nguyên phần của (C) ứng với $y \geq 0$ lấy đối xứng của phần của (C) có $y < 0$ qua Ox.

(C₂) : Giữ nguyên phần của (C) ứng với $x \geq 0$ rồi lấy đối xứng của chính phần được giữ nguyên đó qua Oy : (C₂) là đồ thị của hàm số chẵn.


(C₃) : Áp dụng quy tắc để vẽ (C₁) cho (C₂).




Hình 79



Hình 80



Hình 81



Hình 82

2. Để vẽ đồ thị của hàm số $y = f(x, |g(x)|)$ ta thực hiện các việc :

- Xét dấu $g(x)$. Ví dụ :

x	$-\infty$	a	$+\infty$
$g(x)$	-	0	+

- Phân tích : $y = f(x, |g(x)|) = \begin{cases} f(x, -g(x)) & (x \leq a) \quad (C) \\ f(x, g(x)) & (x \geq a) \quad (C') \end{cases}$

- Vẽ (C) và (C') rồi hợp lại.

Đề 47 Cho hàm số : $y = f(x) = \frac{x^2 + 3x + 6}{x + 2}$

1. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2. Từ đồ thị (C) suy ra đồ thị của hàm số :

$$y = |f(x)| = \left| \frac{x^2 + 3x + 6}{x + 2} \right| \quad (C_1)$$

$$y = f(|x|) = \frac{x^2 + 3|x| + 6}{|x| + 2} \quad (C_2)$$

$$y = |f(|x|)| = \frac{x^2 + 3|x| + 6}{|x| + 2} \quad (C_3)$$

Giai


$$1. y = f(x) = \frac{x^2 + 3x + 6}{x + 2} = x + 1 + \frac{4}{x + 2}$$

$$D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$$

$$y' = \frac{x^2 + 4x}{(x + 2)^2} = 0 \Leftrightarrow x = -4 \vee x = 0$$

x	$-\infty$	-4	-2	0	$+\infty$	
y'	+	0	-	-	0	+
y	$-\infty$	$\nearrow -5$	$\searrow -\infty$	$+\infty$	$\searrow 3$	$\nearrow +\infty$


Đồ thị (hình 83):



Hình 83

$$2. y = f(x) = \left| \frac{x^2 + 3x + 6}{x + 2} \right| = \begin{cases} \frac{x^2 + 3x + 6}{x + 2} & \text{nếu } x > -2 \\ -\frac{x^2 + 3x + 6}{x + 2} & \text{nếu } x < -2 \end{cases} \quad (C_1)$$

Suy ra đồ thị hàm số $y = |f(x)|$ (hình 84).



Hình 84

* Hàm $y = f(|x|) = \frac{x^2 + 3|x| + 6}{|x| + 2}$ (C_2)


y là hàm chẵn nên đồ thị đối xứng qua Oy

$\Rightarrow$ Đồ thị (C_2) (hình 85).

* Hàm $y = |f(|x|)| = \frac{x^2 + 3|x| + 6}{|x| + 2}$ (C_3)

$= f(|x|) \quad \forall x \in D$

$\Rightarrow$ Đồ thị (C_3) của hàm số $y = |f(|x|)|$ giống (C_2).



Hình 85

Đề 48 Cho hàm số : $y = f(x) = \frac{x^2 - x - 2}{x - 3}$

1. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

2. Từ đồ thị (C) suy ra đồ thị của các hàm số sau :

$y = |f(x)| = \left| \frac{x^2 - x - 2}{x - 3} \right|$ (C_1).

$y = f(|x|) = \frac{x^2 - |x| - 2}{|x| - 3}$ (C_2).

$y = |f(|x|)| = \left| \frac{x^2 - |x| - 2}{|x| - 3} \right|$ (C_3).

Giải

1. $y = f(x) = \frac{x^2 - x - 2}{x - 3} = x + 2 + \frac{4}{x - 3}$


$D = \mathbb{R} \setminus \{3\}$

$y' = \frac{x^2 - 6x + 5}{(x - 3)^2} = 0 \Rightarrow x = 1 \vee x = 5$

x	$-\infty$	1	3	5	$+\infty$	
y'	+	0	-	-	0	+
y	$-\infty$	1	$-\infty$	$+\infty$	9	$+\infty$

$$f(-1) = f(2) = 0$$

Đồ thị (hình 86).




Hình 86

$$2. * \quad y = |f(x)| = \left| \frac{x^2 - x - 2}{x - 3} \right| \quad (C_1)$$

$$= \begin{cases} \frac{x^2 - x - 2}{x - 3} & \text{nếu } x > 3 \vee -1 \leq x \leq 2 \\ -\frac{x^2 - x - 2}{x - 3} & \text{nếu } 2 < x < 3 \text{ hay } x < -1 \end{cases}$$


Suy ra đồ thị (C_1) (hình 87).



Hình 87

$$* y = f(|x|) = \frac{x^2 - |x| - 2}{|x| - 3} \quad (C_2)$$


$\Rightarrow y$ là hàm chẵn $\Rightarrow (C_2)$ đối xứng qua Oy (hình 88).



Hình 88

$$* y = |f(|x|)| = \left| \frac{x^2 - |x| - 2}{|x| - 3} \right| = \begin{cases} f(|x|) & \text{nếu } |x| > 3 \text{ hay } |x| < 2 \\ -f(|x|) & \text{nếu } 2 < |x| < 3 \end{cases} \quad (C_3)$$

Suy ra đồ thị (hình 89).



Hình 89

Đề 49 Cho hàm số : $y = f(x) = \frac{-x^2 - 4x + 3}{|x + 6|}$.

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số trên.
2. Dùng đồ thị biện luận số nghiệm của phương trình :

$$x^2 + 4x + (\log_1 m) |x + 6| - 3 = 0.$$

Giai

$$y = f(x) = \frac{-x^2 - 4x + 3}{x + 6} \quad (C)$$

Xét hàm $h = \frac{x^2 + 4x - 3}{x + 6} = x - 2 + \frac{9}{x + 6}$

$$D = \mathbb{R} \setminus \{-6\}$$

$$h' = \frac{x^2 + 12x + 27}{(x + 6)^2} = 0 \Leftrightarrow x = -3 \vee x = -9$$

$x = -6$ là tiệm cận đứng

$y = x - 2$ là tiệm cận xiên

$$y = f(x) = \begin{cases} h & \text{nếu } x < -6 \\ -h & \text{nếu } x > -6 \end{cases}$$


Do đó :

x	$-\infty$	-9		-6		-3		$+\infty$
h'		+	0	-		-	0	+
h	$-\infty$		$\nearrow$	-14	$\searrow$	$-\infty$		
						$+\infty$	$\searrow$	-2
							$\nearrow$	$+\infty$

Suy ra

x	$-\infty$	-9		-6		-3		$+\infty$
y'		+	0	-		+	0	-
y	$-\infty$		$\nearrow$	-14	$\searrow$	$-\infty$		
						$-\infty$	$\nearrow$	-2
							$\searrow$	$-\infty$

Đồ thị (hình 90).



Hình 90

2. $x^2 + 4x + (\log_{\frac{1}{2}} m) \|x + 6\| - 3 = 0$

(1)

$$\Leftrightarrow \log_{\frac{1}{2}} m = \frac{-x^2 - 4x + 3}{x + 6}$$

Số nghiệm của (1) là số giao điểm của $(\Delta): y = \log_{\frac{1}{2}} m$ với (C)

$$* \log_{\frac{1}{2}} m > 2 \Leftrightarrow 0 < m < \frac{1}{4} : (1) \text{ vô nghiệm}$$

$$* \log_{\frac{1}{2}} m = 2 \Leftrightarrow m = \frac{1}{4} : (1) \text{ có 1 nghiệm kép}$$

$$* -14 < \log_{\frac{1}{2}} m < 2 \Leftrightarrow \frac{1}{4} < m < 2^{14} : (1) \text{ có 2 nghiệm}$$

$$* \log_{\frac{1}{2}} m = -14 \Leftrightarrow m = 2^{14} : (1) \text{ có 3 nghiệm (2 nghiệm đơn}$$

và 1 nghiệm kép)

$$* \log_{\frac{1}{2}} m < -14 \Leftrightarrow m > 2^{14} : (1) \text{ có 4 nghiệm.}$$

Đề 50 Cho hàm số : $y = \frac{x}{1 + |x|}$

1. Dùng định nghĩa của đạo hàm tính $f'(0)$.

2. Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số.

3. Tìm số a lớn nhất sao cho với mọi x : $\frac{x}{1 + |x|} \geq ax^2 + x$.

Giải

$$y = f(x) = \frac{x}{1 + |x|} \quad (C)$$

$$1. f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{1 + |x|} = 1$$

$$2. y = f(x) = \begin{cases} h(x) = \frac{x}{1 + x} & (C_1) \text{ nếu } x \geq 0 \\ g(x) = \frac{x}{1 - x} & (C_2) \text{ nếu } x < 0 \end{cases}$$


$$D = \mathbb{R}$$

$$h'(x) = \frac{1}{(1 + x)^2} > 0 \quad \forall x \geq 0$$


$$g'(x) = \frac{1}{(1 - x)^2} > 0 \quad \forall x < 0$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} h(x) = 1 \Rightarrow y = 1 \text{ là tiệm cận ngang của } (C_1)$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -1 \Rightarrow y = -1 \text{ là tiệm cận ngang của } (C_2)$$



Đồ thị (chú ý tiếp tuyến tại O là d : y = x) (hình 91).




Hình 91

3. CÁCH 1 : $y = ax^2 + x$ (P)


* $a = 0$ không thỏa mãn bài toán

$$* \quad a > 0 \Rightarrow y' = 2ax + 1 = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{2a}$$

$\Rightarrow a > 0$ không thỏa mãn bài toán



* $a < 0$



$$(P) \text{ tiếp xúc } (C) \Leftrightarrow ax^2 + x = \frac{x}{1+|x|} \quad (1) \text{ có nghiệm kép}$$

$$\Leftrightarrow x^2(a|x| + a + \operatorname{sgn}(x)) = 0 \text{ có nghiệm kép}$$

$$\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} -1 & \text{nếu } x < 0 \\ 0 & \text{nếu } x = 0 \\ 1 & \text{nếu } x > 0 \end{cases}$$

$$\text{Xét } a|x| + a + \operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} ax + 1 + a & \text{nếu } x < 0 \\ a & \text{nếu } x = 0 \\ -ax + a - 1 & \text{nếu } x > 0 \end{cases}$$

- * Nếu $-1 < a < 0$: (1) có nghiệm kép $x = 0$ và 1 nghiệm đơn $x = -\frac{1+a}{a} > 0$
 $\Rightarrow$ (P) cắt (C).

Trường hợp này $\frac{x}{1+|x|} < ax^2 + x, 0 < \forall x < -\frac{1+a}{a}$ không thỏa mãn bài toán.

- * Nếu $a \leq -1$ thì (1) chỉ có nghiệm kép $x = 0 \Rightarrow$ (P) chỉ tiếp xúc (C) tại 0 mà không cắt (C) $\Rightarrow \frac{x}{1+|x|} \geq ax^2 + x \quad \forall x \quad (*)$

Giá trị lớn nhất của a thỏa mãn (*) là $a = -1$.

$$\text{CÁCH 2 : } \frac{x}{1+|x|} \geq ax^2 + x \quad \forall x$$

$$\Leftrightarrow x^2(a|x| + a + \operatorname{sgn}(x)) \leq 0 \quad \forall x$$

$$\Leftrightarrow a|x| + a + \operatorname{sgn}(x) \leq 0 \quad \forall x$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a(1+x) + 1 \leq 0 & \forall x > 0 \\ a \leq 0 & \text{với } x = 0 \\ a(1-x) - 1 \leq 0 & \forall x < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a \leq -\frac{1}{1+x} & \forall x > 0 \\ a \leq 0 & \text{với } x = 0 \quad (1) \\ a \leq \frac{1}{1-x} & \forall x < 0 \end{cases}$$

$$\text{Vì } \forall x > 0, \text{ ta có } -\frac{1}{1+x} > -1$$

$$\forall x < 0, \frac{1}{1-x} > 0$$

$$\text{Vậy } I \Leftrightarrow \begin{cases} a \leq -1 \\ a \leq 0 \\ a < 0 \end{cases} \Leftrightarrow a \leq -1$$


Giá trị lớn nhất của a thỏa mãn bài toán là $a = -1$.

11- ĐƯỜNG THẲNG ĐI QUA CÁC ĐIỂM ĐẶC BIỆT CỦA ĐỒ THỊ

I- NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN

1. Để lập phương trình của đường thẳng Δ đi qua các điểm đặc biệt của đồ thị (C) : $y = f(x)$ ta thực hiện các việc :

- Gọi $M(x; y)$ là điểm đặc biệt
- Lập hệ các phương trình mà tọa độ M phải thỏa mãn.
- Từ hệ phương trình trên rút ra một phương trình hệ quả bậc 1 : $y = ax + b$
- Phương trình Δ là : $y = ax + b$



Hình 92

2. Các trường hợp thường gặp :

- Lập phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị của hàm bậc 3 (C) : $y = f(x)$

* Tính $f'(x)$

* Chia đa thức $f(x) = f'(x)q(x) + ax + b$


* $M(x; y)$ là điểm cực trị

$$\Rightarrow \begin{cases} f'(x) = 0 \\ y = f(x) = f'(x)q(x) + r(x) \end{cases} \Rightarrow y = ax + b$$

* Kết luận $\Delta : y = ax + b$.

- Lập phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị của hàm $y = \frac{u(x)}{v(x)}$

$$\begin{aligned} & * \text{M}(x; y) \text{ là điểm cực trị} \Rightarrow \begin{cases} y = \frac{u(x)}{v(x)} \\ y = \frac{u'(x)}{v'(x)} \end{cases} \Rightarrow y = ax + b \\ & * \text{Kết luận } \Delta : y = ax + b. \end{aligned}$$



Hình 93

II- BÀI TOÁN MINH HỌA

Đề 51 Chứng tỏ rằng các hàm số sau luôn có hai cực trị và viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của hàm số :

1. $y = f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + m$.
2. $y = f(x) = -2x^3 - mx^2 + x + m + 1$.

Giải

$$\begin{aligned}
 1. \quad & y = x^3 - 3x^2 - 9x + m \\
 & y' = 3x^2 - 6x - 9 = 3(x^2 - 2x - 3) \\
 & \Delta' = 9 + 27 = 36 > 0
 \end{aligned}$$

Vậy y' luôn có hai nghiệm phân biệt $x_1, x_2 \Rightarrow y$ luôn có hai cực trị

$$\begin{aligned}
 y &= f(x) = (x-1)(x^2 - 2x - 3) - 8x + m - 3 \\
 &= \frac{(x-1)y'}{3} - 8x + m - 3
 \end{aligned}$$

$$f(x_1) = -8x_1 + m - 3; \quad f(x_2) = -8x_2 + m - 3;$$

$\Rightarrow$ Đường thẳng qua hai điểm cực trị là $d: y = -8x + m - 3$.

$$\begin{aligned}
 2. \quad & y = f(x) = -2x^3 - mx^2 + x + m + 1 \\
 & y' = -6x^2 - 2mx + 1 \\
 & \Delta' = m^2 + 6 > 0 \Rightarrow y \text{ có hai cực trị} \\
 & y = \frac{1}{3} \left(x + \frac{m}{6} \right) y' + \frac{1}{3} \left(2 + \frac{m^2}{3} \right) x + \frac{17m}{18} + 1
 \end{aligned}$$

Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị là $d: y = \frac{1}{3} \left(2 + \frac{m^2}{3} \right) x + \frac{17m}{18} + 1$.

Đề 52 Cho họ đường cong $(C_m): y = f(x) = \frac{x^2 + mx - 6}{x - m}$.

1. Tìm những điểm trong mặt phẳng mà $\forall m (C_m)$ đều không đi qua.
2. Tìm m để (C_m) có hai cực trị. Chứng tỏ rằng lúc đó giá trị hai cực trị là cùng dấu. Lập phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị.
3. Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số với $m = 2$.

Giải

$$y = \frac{x^2 + mx - 6}{x - m} \quad (C_m)$$

$$1. M(x_0; y_0) \notin (C_m) \quad \forall m \Leftrightarrow y_0 = \frac{x_0^2 + mx_0 - 6}{x_0 - m} \text{ vô nghiệm } m$$


$$\Leftrightarrow (x_0 + y_0)m + x_0^2 - 6 - x_0 y_0 = 0 \text{ vô nghiệm } m$$

$$\text{hay có nghiệm } m = x_0 \text{ với } y_0 \neq \frac{x_0^2 + mx_0 - 6}{x_0 - m}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = -y_0 \\ 2x_0^2 \neq 6 \end{cases} \quad \text{hay} \quad \begin{cases} (x_0 + y_0)x_0 + x_0^2 - 6 - x_0 y_0 = 0 \\ y_0 \neq \frac{x_0^2 + mx_0 - 6}{x_0 - m} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = -y_0 \\ x_0 \neq \pm\sqrt{3} \end{cases} \text{ hay } \begin{cases} x_0 = \sqrt{3} \text{ và } \forall y_0 \neq -\sqrt{3} \\ x_0 = -\sqrt{3} \text{ và } \forall y_0 \neq \sqrt{3} \end{cases}$$

Minh họa tập hợp các điểm $M(x_0; y_0) \in (C_m) \forall m$ trên đồ thị (hình 94).



Hình 94

$$2. y' = \frac{x^2 - 2mx + 6 - m^2}{(x - m)^2}$$

$$(C_m) \text{ có hai cực trị } \Leftrightarrow \begin{cases} y \text{ là hàm số} \\ x^2 - 2mx + 6 - m^2 = 0 \\ \text{có 2 nghiệm phân biệt khác } m \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m^2 + m \cdot m - 6 \neq 0 \\ \Delta' = m^2 - 6 + m^2 > 0 \\ m^2 - 2m \cdot m + 6 - m^2 \neq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow m < -\sqrt{3} \text{ hay } m > \sqrt{3}$$

x_1, x_2 là hai nghiệm của y'

$$y(x_1) \cdot y(x_2) = (2x_1 + m)(2x_2 + m) = 4x_1x_2 + 2m(x_1 + x_2) + m^2 = m^2 + 24 > 0$$

$\Rightarrow y(x_1)$ cùng dấu $y(x_2)$

$$3. m = 2 \Rightarrow y = \frac{x^2 + 2x - 6}{x - 2} = x + 4 + \frac{2}{x - 2}$$


$$D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$$

$$y' = \frac{x^2 - 4x + 2}{(x - 2)^2}$$

x	$-\infty$	$2-\sqrt{2}$	1	$2+\sqrt{2}$	$+\infty$	
y'	+	0	-	-	0	+
y	$-\infty$	$2(3-\sqrt{2})$	$+\infty$	$2(3+\sqrt{2})$	$+\infty$	

$$x = 0 \Rightarrow y = 3$$

Đồ thị hình 95).



Hình 95

$$2 - \sqrt{2}$$

Đề 53 Cho hàm số : $y = f(x) = \frac{x^2 + x + m}{x^2 - 1}$.

1. Tìm m để hàm số có cực đại và cực tiểu.
2. Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số với $m = \frac{1}{4}$.
3. Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị.

Giải

$$1. \quad y = f(x) = \frac{x^2 + x + m}{x^2 - 1}$$

$$y' = \frac{-x^2 - 2(m+1)x - 1}{(x^2 - 1)^2};$$

Hàm y có cực đại, cực tiểu nghĩa là :

$$\begin{cases} y \text{ là hàm số} \\ x^2 + 2(m+1)x + 1 = 0 \text{ có hai nghiệm phân biệt} \\ x_1, x_2 \neq \pm 1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 1 - 1 + m \neq 0 \\ 1 + 1 + m \neq 0 \\ 1 + 2(m+1) + 1 \neq 0 \\ 1 - 2(m+1) + 1 \neq 0 \\ \Delta' = (m+1)^2 - 1 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 0 \text{ và } m \neq -2 \\ m^2 + 2m > 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow m < -2 \text{ hay } m > 0.$$

$$2. \quad m = \frac{1}{4} \Rightarrow f(x) = \frac{x^2 + x + \frac{1}{4}}{x^2 - 1}$$

$$D = \mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$$

$$y' = -\frac{\left(x^2 + \frac{5}{2}x + 1\right)}{(x^2 - 1)^2} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 \\ x = -\frac{1}{2} \end{cases}$$


$$\lim_{x \rightarrow 1} y = \infty \quad \text{và} \quad \lim_{x \rightarrow -1} y = \infty \Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -1 \end{cases} \text{ là 2 tiệm cận đứng}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} y = 1 \Rightarrow y = 1 \text{ là tiệm cận ngang}$$

x	$-\infty$	-2	-1	$-\frac{1}{2}$	1	$+\infty$
y'	-	0	+	+	0	-
y	1	$\frac{3}{4}$	$+\infty$	0	$-\infty$	1

$$x = 0 \Rightarrow y = -\frac{1}{4}$$

Đồ thị (hình 96).



Hình 96

$$3. x_0 \text{ là điểm cực trị} \Rightarrow y(x_0) = 1 + \frac{1}{2x_0}$$

Đường thẳng Δ qua hai điểm cực trị $A\left(x_1, 1 + \frac{1}{2x_1}\right)$; $B\left(x_2, 1 + \frac{1}{2x_2}\right)$ có hệ số góc k.

$$k = \frac{y_2 - y_1}{x_2 - x_1} = \frac{\frac{1}{2x_2} - \frac{1}{2x_1}}{x_2 - x_1} = \frac{1}{2} \frac{x_1 - x_2}{(x_2 - x_1)x_1x_2} = -\frac{1}{2}$$

(x_1, x_2 là nghiệm của y')

$$\Rightarrow \Delta : y = -\frac{1}{2}x + b$$

$$y_1 + y_2 = -\frac{1}{2}(x_1 + x_2) + 2b$$

$$2 + \frac{1}{2} \cdot \frac{x_1 + x_2}{x_1x_2} + \frac{1}{2}(x_1 + x_2) = 2b \Rightarrow b = -m$$

$$\Rightarrow \Delta : y = -\frac{1}{2}x - m$$

Đề 54 Cho hàm số : $y = f(x) = \frac{x+m}{x^2+1}$ (C_m).

1. Chứng minh 3 điểm uốn nếu có của (C_m) luôn thẳng hàng.
2. Lập phương trình đường thẳng đi qua 3 điểm uốn.

Giải

1. $y = f(x) = \frac{x+m}{x^2+1}$;

$$y' = \frac{-x^2 - 2mx + 1}{(x^2+1)^2}$$

$$y'' = \frac{2(x^3 + 3mx^2 - 3x - m)}{(x^2+1)^3} = \frac{(x+3m)(x^2+1) - 4(x+m)}{(x^2+1)^3}$$

$M(x_0; y_0)$ là điểm uốn $\rightarrow x_0$ là nghiệm của : $\rightarrow x_0 + 1 = \frac{4(x_0 + m)}{x_0 + 3m}$

Vậy $y_0 = \frac{x_0 + m}{x_0^2 + 1} = \frac{x_0 + 3}{4}$

$\Rightarrow$ M nằm trên (Δ) : $y = \frac{x}{4} + \frac{3}{4}$

$\Rightarrow$ 3 điểm uốn của đồ thị (nếu có) thẳng hàng.

Đề 55 Cho hàm số : $y = f(x) = x^3 - 3mx^2 + 3(m^2 - 1)x - m^3$ với m là tham số.

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi $m = 1$.
2. Chứng minh rằng hàm số luôn luôn có cực đại và cực tiểu. Lập phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị.
3. Xác định m để hàm số tăng trên khoảng $(0; 2)$.

Giải

$$y = f(x) = x^3 - 3mx^2 + 3(m^2 - 1)x - m^3$$

1. $m = 1 \Rightarrow y = x^3 - 3x - 1$


$$D = \mathbb{R}$$

$$y' = 3x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$$

$$y'' = 6x = 0 \Leftrightarrow x = 0 \Rightarrow I(0; -1) \text{ là điểm uốn.}$$

x	$-\infty$	-1		1	$+\infty$
y'	+	0	-	0	+
y	$-\infty$	1		-3	$+\infty$

Đồ thị (hình 97).



Hình 97

2. $y' = 3x^2 - 6mx + 3(m^2 - 1) = 3(x^2 - 2mx + m^2 - 1)$

$\Delta' = 1 > 0 \Rightarrow$ y luôn có cực đại và cực tiểu

$$y = \frac{y'}{3}(x - m) - (2x + m)$$

x_0 là cực trị thì $y_0 = -2x_0 - m$

Đường thẳng qua hai cực trị là $y = -2x - m$.

3. y tăng trên $(0; 2)$

$$\Leftrightarrow x^2 - 2mx + m^2 - 1 \geq 0 \quad \forall x \in (0; 2)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta' = 1 > 0 \\ y'(0) = m^2 - 1 \geq 0 \\ 0 > \frac{S}{2} = m \end{cases} \quad \text{hay} \quad \begin{cases} \Delta' = 1 > 0 \\ y'(2) = m^2 - 4m + 3 \geq 0 \\ 2 < \frac{S}{2} = m \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow m < -1 \quad \text{hay} \quad m \geq 3.$$

12- MỘT HỌ CÁC ĐỒ THỊ TIẾP XÚC VỚI MỘT ĐƯỜNG CỐ ĐỊNH

I- NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN

Để chứng minh họ đồ thị $(C_m) : y = f(x; m)$ luôn tiếp xúc với một đường cố định (L) ta thực hiện các việc :

1. Nếu đã biết dạng của (L) .

Ví dụ : $(L) : y = g(x)$

a) Lập phương trình hoành độ giao điểm của (C_m) và (L) :

$$f(x; m) = g(x) \quad (1)$$

b) Từ điều kiện phương trình (1) phải có nghiệm kép $\forall m$ ta xác định được $g(x)$.

2. Nếu chưa biết dạng của (L)


a) Phân tích $f(x; m) = [a(m).x + b(m)]^2 + g(x)$ trong đó $g(x)$ độc lập với m .

b) Xét đường cố định $(L) : y = g(x)$

c) Do phương trình hoành độ giao điểm của (C_m) và (L) :

$$[a(m)x + b(m)]^2 + g(x) = g(x)$$

luôn có nghiệm kép $\forall m$ vậy (C_m) luôn tiếp xúc với (L) .



Hình 98

II- BÀI TOÁN MINH HỌA

Đề 56 Chứng minh rằng các đường sau luôn tiếp xúc với một đường cố định :

1. $y = f(x) = 5x^2 - (4m + 3)x + m^2 + 2$

2. $y = f(x) = -2mx - m^2 + 1$

3. $y = f(x) = \frac{2x^2 + mx - 1}{-3mx + 3}$

Giải

$$\begin{aligned} 1. \quad y &= f(x) = 5x^2 - (4m + 3)x + m^2 + 2 \quad (C_m) \\ &= (4x^2 - 4mx + m^2) + x^2 - 3x + 2 = (m - 2x)^2 + x^2 - 3x + 2 \\ g(x) &= x^2 - 3x + 2 \quad (P) \end{aligned}$$

Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (C_m)

$$(m - 2x)^2 = 0 \quad \text{có nghiệm kép.}$$

Vậy (C_m) luôn tiếp xúc $(P) \quad \forall m$.

2. $y = f(x) = -2mx - m^2 + 1 \quad (C_m)$

$$= -(m^2 + 2mx + x^2) + x^2 + 1$$

Tương tự (C) : $y = x^2 + 1$ luôn tiếp xúc $(C_m) \quad \forall m$

3. $y = f(x) = \frac{2x^2 + mx - 1}{-3mx + 3} = -\frac{1}{3} - \frac{2x^2}{3(mx - 1)} \quad (C_m)$

(C_m) tiếp xúc với (d) : $y = -\frac{1}{3}$ cố định.

Đề 57 Cho hàm số : $y = f(x) = x^3 - 2x^2 + mx + \frac{1 - m^2}{4}$ có đồ thị là (C_m) .

1. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) với $m = 1$.

2. Dùng đồ thị xét dấu các nghiệm của phương trình : $x^3 - 2x^2 - m = 0$.

3. Chứng minh rằng (C_m) luôn tiếp xúc với một đường cong cố định.

Giải

1. $y = f(x) = x^3 - 2x^2 + mx + \frac{1 - m^2}{4}$

$$m = 1 \Rightarrow y = x^3 - 2x^2 + x$$

$$D = \mathbb{R}$$


$$y' = 3x^2 - 4x + 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1 \vee x = \frac{1}{3}$$

$$y'' = 6x - 4 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{2}{3} \Rightarrow \text{điểm uốn } I\left(\frac{2}{3}, \frac{2}{27}\right)$$

x	$-\infty$	$\frac{1}{3}$	1	$+\infty$	
y'	+	0	-	0	+
y	$-\infty$	$\frac{4}{27}$	0	$+\infty$	

$$x = 0 \vee x = 1 \Rightarrow y = 0$$

Đồ thị (hình 99.1).




Hình 99.1

2. $x^3 - 2x^2 - m = 0 \quad (1) \Leftrightarrow y = x^3 - 2x^2 = m$

$$y' = 3x^2 - 4x = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee x = \frac{4}{3}$$

x	$-\infty$	0	$\frac{4}{3}$	$+\infty$
y'	+	0	0	+
y	$-\infty$	0	$-\frac{32}{27}$	$+\infty$



Hình 99.2

Đồ thị của $y = x^3 - 2x^2$ (hình 99.2).

* $m < -\frac{32}{27}$: (1) có nghiệm âm.

* $m = -\frac{32}{27}$: (1) có 1 nghiệm đơn âm và 1 nghiệm kép $x = \frac{4}{3}$.

* $-\frac{32}{27} < m < 0$: (1) có 2 nghiệm dương và 1 nghiệm âm.

* $m = 0$: (1) có 1 nghiệm kép $x = 0$ và 1 nghiệm dương.

* $m > 0$: (1) có 1 nghiệm dương.

$$\begin{aligned} 3. \quad y &= \frac{1}{4}(-m^2 + 4mx - 4x^2) + x^3 - x^2 + \frac{1}{4} \quad (C_m) \\ &= -\frac{1}{4}(2x - m)^2 + x^3 - x^2 + \frac{1}{4} \end{aligned}$$

Vậy (C_m) luôn tiếp xúc (C) : $y = x^3 - x^2 + \frac{1}{4}$ cố định.

Đề 58 Chứng minh rằng tiệm cận xiên của đồ thị hàm số :

$$(C_m) = y = \frac{(m+1)x^2 - 2mx - m^3 + m^2 + 2}{x - m}$$

luôn tiếp xúc với một đường cố định.

Giải

$$(C_m) = y = \frac{(m+1)x^2 - 2mx - m^3 + m^2 + 2}{x - m} = (m+1)x + m(m-1) + \frac{2}{x-m}$$

(d) : $y = (m+1)x + m(m-1)$ (là tiệm cận xiên)

$$\begin{aligned} &= m^2 + m(x-1) + x = m^2 + m(x-1) + \frac{(x-1)^2}{4} - \frac{(x-1)^2}{4} + x \\ &= \left(\frac{x}{2} + \frac{2m-1}{2}\right)^2 - \frac{x^2 - 6x + 1}{4} \end{aligned}$$

Vậy (C_m) tiếp xúc (C) : $y = \frac{x^2 - 6x + 1}{4}$.

Đề 59 Cho hàm số : $y = f(x) = \frac{2mx^2 - m(m+2)x + m^2 + 1}{x-1}$.

1. Tìm các tiệm cận của đồ thị. Chứng minh rằng khi m thay đổi, tiệm cận xiên của đồ thị tiếp xúc với một parabol cố định.
2. Tìm tập hợp các tâm đối xứng của đồ thị.
3. Xác định m để hàm số đạt cực trị tại các điểm x_1, x_2 thỏa mãn điều kiện : $2x_1 + x_2 - 1 = 0$.

Giải

$$y = f(x) = \frac{2mx^2 - m(m+2)x + m^2 + 1}{x-1}$$

1. $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty \Rightarrow x = 1$ là tiệm cận đứng

$$y = 2mx - m^2 + \frac{1}{x-1} \Rightarrow (d) : y = 2mx - m^2 \text{ là tiệm cận xiên}$$

$$(d) : y = 2mx - m^2 = x^2 - (x-m)^2 \Rightarrow (d) \text{ tiếp xúc với } (P) : y = x^2 \text{ cố định.}$$

2. $2m - m^2$ là giao điểm hai tiệm cận của đồ thị


$$\Rightarrow I \text{ là tâm đối xứng, có hoành độ } x = 1$$

$$\text{tung độ } y = 2m - m^2 = 1 - (1-m)^2 \leq 1$$

$$\text{Dấu "=" xảy ra} \Leftrightarrow m = 1.$$

Tập hợp của $I(1, 2m - m^2)$ là đường thẳng trên đồ thị (hình 100).

$$3. y' = \frac{2mx^2 - 4mx + 2m - 1}{(x-1)^2}$$



Hình 100

$$y \text{ đạt cực trị tại } x_1, x_2 \text{ thỏa mãn : } 2x_1 + x_2 - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow 2mx^2 - 4mx + 2m - 1 = 0 \text{ có hai nghiệm phân biệt } x_1, x_2 \text{ thỏa mãn}$$

$$2x_1 + x_2 - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta' = 4m^2 - 2m(2m-1) = 2m > 0 \\ x_1 = 1 - (x_1 + x_2) = 1 - 2 = -1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m > 0 \\ 2m(-1)^2 - 4m(-1) + 2m - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow m = \frac{1}{8}.$$

Đề 60 Cho hàm số : $y = f(x) = \frac{(m-2)x - (m^2 - 2m + 4)}{x-m}$

1. Chứng minh rằng hàm số luôn luôn tăng trên các khoảng mà nó xác định.

2. Chứng tỏ rằng đồ thị của hàm số luôn tiếp xúc với hai đường thẳng cố định.
3. Tìm các điểm trong mặt phẳng mà đồ thị không thể đi qua dù m lấy bất kì giá trị nào.

Giải

$$y = f(x) = \frac{(m-2)x - (m^2 - 2m + 4)}{x - m} \quad (C_m)$$

$$1. y' = \frac{4}{(x-m)^2} > 0 \Rightarrow y \text{ tăng trên từng khoảng xác định.}$$

2. Đường thẳng $x = a$ không tiếp xúc (C_m)

(d) : $y = kx + b$ tiếp xúc (C_m)

$$\Leftrightarrow kx + b = \frac{(m-2)x - (m^2 - 2m + 4)}{x - m} \text{ có nghiệm kép}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} kx^2 + [b + 2 - (k+1)m]x + m^2 - (b+2)m + 4 = 0 \\ x \neq m \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} k \neq 0 \\ \Delta = (k-1)^2 m^2 + 2(b+2)(k-1)m + (b+2)^2 - 16k = 0 \quad \forall m \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} k = 1 \\ (b+2)^2 = 16k \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k = 1 \\ b = 2 \end{cases} \text{ hay } \begin{cases} k = 1 \\ b = -6 \end{cases}$$

Vậy $d_1 : y = x + 2$

$d_2 : y = x - 6$ đều tiếp xúc $(C_m) \forall m$.

$$3. M(x_0, y_0) \notin (C_m) \forall m \Leftrightarrow y_0 = \frac{(m-2)x_0 - (m^2 - 2m + 4)}{x_0 - m} \text{ vô nghiệm } m$$


$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_0 \neq m \\ m^2 - (y_0 + x_0 + 2)m + x_0 y_0 + 2x_0 + 4 = 0 \text{ vô nghiệm } m \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow m^2 - (y_0 + x_0 + 2)m + x_0 y_0 + 2x_0 + 4 = 0 \text{ vô nghiệm } m$$

$$\Leftrightarrow \Delta = (x_0 + y_0 + 2)^2 - 4(x_0 y_0 + 2x_0 + 4) \\ = (x_0 - y_0 - 6)(x_0 - y_0 + 2) < 0$$

$$\Leftrightarrow x_0 - 6 < y_0 < x_0 + 2$$

Mô tả tập hợp các điểm M trên đồ thị như sau : M trong phần gạch chéo giữa Δ_1 và Δ_2 không thuộc Δ_1, Δ_2 .




Hình 101

13- KHOẢNG CÁCH

I- NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN

1. Khoảng cách giữa 2 điểm $A(x_A, y_A)$, $B(x_B, y_B)$

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$




Hình 102

2. Khoảng cách từ một điểm M_o đến một đường thẳng Δ

$$M_o(x_o, y_o);$$

$$\Delta: Ax + By + C = 0$$

$$d(M_o, \Delta) = \frac{|Ax_o + By_o + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$$



Hình 103


3. Trường hợp đặc biệt :

$$\Delta: x = a$$

$$d(M_o, \Delta) = |x_o - a|$$

$$\Delta': y = b$$

$$d(M_o, \Delta') = |y_o - b|.$$



Hình 104

II- BÀI TOÁN MINH HỌA

ĐỀ 61 Cho hàm số : $y = f(x) = \frac{x^2 - mx + m}{x - 1}$.

1. Định m để $A(1, 2)$ là tâm đối xứng của đồ thị.
2. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số với m vừa tìm được.
3. Xác định k sao cho đường thẳng $y = k$ cắt đồ thị (C) tại hai điểm với khoảng cách giữa hai giao điểm bằng $\sqrt{5}$.

Giải

$$y = f(x) = \frac{x^2 - mx + m}{x - 1}$$

1. Chuyển trục $\begin{cases} x = X + 1 \\ y = Y + 2 \end{cases}$

$$y = f(x) \Leftrightarrow Y = \frac{X^2 - mX + 1}{X}; \quad I(1, 2) \text{ là tâm đối xứng}$$

$$\Leftrightarrow Y \text{ là hàm lẻ}$$

$$\Leftrightarrow X^2 - mX + 1 = X^2 - m(-X) + 1 \quad \forall X$$

$$\Leftrightarrow m = 0.$$

2. $m = 0$


$$y = \frac{x^2}{x-1} = x + 1 + \frac{1}{x-1} \quad (C)$$

$$D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$$

$$y' = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2} = 0 \quad \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$$

$x = 1$ là tiệm cận đứng

$y = x + 1$ là tiệm cận xiên



Hình 105

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$	
y'	+	0	-	-	0	+
y	$-\infty$	0	$+\infty$	4	$+\infty$	

Đồ thị (hình 105).

3. $\Delta: y = k$ cắt (C) tại A, B sao cho $AB = \sqrt{5}$

$$\Leftrightarrow x^2 - kx + k = 0 \quad \text{có hai nghiệm } x_1, x_2 \text{ thỏa mãn:}$$

$$(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 = 5$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta = k^2 - 4k > 0 \\ (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 + \left[x_1 - x_2 + \left(\frac{x_2 - x_1}{x_1x_2 - (x_2 + x_1) + 1} \right) \right]^2 = 5 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} k > 4 \text{ hay } k < 0 \\ k^2 - 4k + \left[x_1 - x_2 + \left(\frac{x_2 - x_1}{k - k + 1} \right) \right]^2 = 5 \end{cases} \quad \Leftrightarrow k = -1 \text{ hay } k = 5$$

Đề 62 Cho hàm số: $y = \frac{x^2 + x - 5}{x - 2}$.

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C).
2. Tìm trên hai nhánh phân biệt của (C) hai điểm A, B sao cho khoảng cách AB ngắn nhất.
3. Chứng minh rằng tích các khoảng cách từ một điểm bất kì trên (C) đến hai tiệm cận luôn bằng một hằng số.

Giải


$$y = \frac{x^2 + x - 5}{x - 2} = x + 3 + \frac{1}{x - 2} \quad (C)$$

1. $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$

$$y' = \frac{x^2 - 4x + 3}{(x - 2)^2} = 0 \Leftrightarrow x = 1 \vee x = 3$$

x	$-\infty$	1	2	3	$+\infty$
y'	+	0	-	-	+
y	$-\infty$	3	$+\infty$	7	$+\infty$

Đồ thị (hình 106).



2. A, B là hai điểm trên hai nhánh của đồ thị có hoành độ

$$\begin{cases} x_1 = 2 - a \\ x_2 = 2 + b \end{cases} \quad a, b \text{ khoảng cách của chúng đến tiệm cận}$$

$$a, b > 0$$

$$\begin{aligned} AB^2 &= (x_1 - x_2)^2 + \left(x_1 - x_2 + \frac{1}{x_1 - 2} - \frac{1}{x_2 - 2} \right)^2 \\ &= (a + b)^2 + (a + b)^2 \left(\frac{1}{ab} + 1 \right)^2 = (a + b)^2 \left(2 + \frac{2}{ab} + \frac{1}{a^2 b^2} \right) \\ &\geq 4ab \left(2 \frac{\sqrt{2}}{ab} + \frac{2}{ab} \right) \geq 8(\sqrt{2} + 1) \end{aligned}$$

$$AB \text{ nhỏ nhất là } 8(\sqrt{2} + 1) \text{ khi đó } a = b = \sqrt[4]{\frac{1}{2}}.$$

3. $M(x_0, y_0) \in (C)$

Khoảng cách từ M đến tiệm cận đứng $d_1 = |x_0 - 2|$, đến tiệm cận xiên

$$d_2 = \frac{|x_0 + 3|}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow d_1 d_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} = \text{const.}$$

Đề 63 Cho hàm số : $y = f(x) = \frac{(m-1)x + m}{x + m}$ (H_m).

1. Khảo sát và vẽ đồ thị (H) với $m = 1$.
2. Tìm trên (H) những điểm có tổng khoảng cách đến hai tiệm cận nhỏ nhất.
3. Chứng minh rằng $\forall m \neq 0$. Đồ thị hàm số luôn luôn tiếp xúc với một đường thẳng cố định.

Giải

1. $y = f(x) = \frac{(m-1)x + m}{x + m}$ (H_m)

$m = 1 \Rightarrow y = \frac{1}{x+1}$ (H)

$D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$

$y' = -\frac{1}{(x+1)^2} < 0 \quad \forall x \in D$


$x = -1$ là tiệm cận đứng

$y = 0$ là tiệm cận ngang

x	$-\infty$	2	$+\infty$
y'	$-$		$-$
y	2	$+\infty$	2

$x = 0 \Rightarrow y = 1$

Đồ thị (hình 107).



2. $M(x_0, y_0) \in C$

Khoảng cách từ M đến tiệm cận đứng $d_1 = |x_0 + 1|$

Khoảng cách từ M đến tiệm cận ngang $d_2 = |y_0| = \frac{1}{|1 + x_0|}$

$\Rightarrow d_1 d_2 \geq 2\sqrt{d_1 d_2} = 2$

Dấu "=" xảy ra $\Leftrightarrow x_0 = 0 \vee x_0 = -2 \Rightarrow (d_1 + d_2)_{\min} = 2$

Ta có 2 điểm cần tìm : $M_1(0; 1), M_2(-2; -1)$.

$$3. \quad y = \frac{(m-1)x + m}{x+m} = \frac{x^2 + mx - x - m - x^2}{x+m} = x - 1 - \frac{x^2}{m+x}$$

$\Rightarrow (H_m)$ luôn tiếp xúc $\Delta : y = x - 1$.

Đề 64 Cho hàm số : $y = \frac{x^2 \cos \alpha + 2x \sin \alpha + 1}{x - 2}$.

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi $\alpha = \pi$.
2. Trong trường hợp tổng quát, xác định phương trình tiệm cận xiên của đồ thị. Tính khoảng cách từ gốc tọa độ đến tiệm cận xiên.
3. Tìm α để khoảng cách ấy lớn nhất.

Giải

$$y = \frac{x^2 \cos \alpha + 2x \sin \alpha + 1}{x - 2}$$

$$1. \quad \alpha = \pi \Rightarrow y = \frac{-x^2 + 1}{x - 2} = -x - 2 - \frac{3}{x - 2} \quad (H)$$

$$D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$$

$$y' = \frac{-x^2 + 4x - 1}{(x - 2)^2} = 0 \Leftrightarrow x = 2 \pm \sqrt{3}$$


$x = 2$ là tiệm cận đứng

$y = -x - 2$ là tiệm cận xiên

x	$-\infty$	$2 - \sqrt{3}$	2	$2 + \sqrt{3}$	$+\infty$	
y'	-	0	+	+	0	-
y	$+\infty$	$-2(2 - \sqrt{3})$	$+\infty$	$-2(2 + \sqrt{3})$	$-\infty$	

$$x = \pm 1 \Rightarrow y \approx 0$$

Đồ thị (hình 108).



Hình 108

2.

$$y = \frac{x^2 \cos \alpha + 2x \sin \alpha + 1}{x - 2}$$
$$= x \cdot \cos \alpha + 2(\sin \alpha + \cos \alpha) + \frac{1 + 4(\sin \alpha + \cos \alpha)}{x - 2}$$

Phương trình tiệm cận xiên $y = x \cdot \cos \alpha + 2(\sin \alpha + \cos \alpha)$

Khoảng cách từ O đến tiệm cận là :

$$d = \frac{2|\sin \alpha + \cos \alpha|}{\sqrt{1 + \cos^2 \alpha}} = \frac{2|\sin \alpha + \cos \alpha|}{\sqrt{2\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha}}$$

3. Bất đẳng thức B.C.S

$$d \leq \frac{\sqrt{4(\sin^2 \alpha + 2\cos^2 \alpha) \left(1 + \frac{1}{2}\right)}}{\sqrt{(2\cos^2 \alpha + \sin^2 \alpha)}} = \sqrt{6}$$

Dấu "=" xảy ra $\Leftrightarrow \sin \alpha = 2\cos \alpha$
 $\Leftrightarrow \alpha = \arctg 2 + k2\pi$ là giá trị cần tìm.

14- HÀM SỐ CÓ CHỨA DẤU CĂN

I- NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN

1. Hàm số $f(x) = \sqrt{ax^2 + bx + c}$ có tiệm cận xiên $\Leftrightarrow a > 0$.

2. $f(x) = \sqrt{a} \left| x + \frac{b}{2a} \right| = \alpha(x)$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \alpha(x) = 0$$

Khi $x \rightarrow +\infty$: Tiệm cận xiên bên phải $y = \sqrt{a} \left(x + \frac{b}{2a} \right)$

Khi $x \rightarrow -\infty$: Tiệm cận xiên bên trái $y = -\sqrt{a} \left(x + \frac{b}{2a} \right)$.

II- BÀI TOÁN MINH HỌA

Đề 65 Cho hàm số : $y = f(x) = x + \sqrt{2x^2 + 1}$.

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2. Biện luận theo m số nghiệm của phương trình : $x + \sqrt{2x^2 + 1} = m$.
3. Viết phương trình của đường thẳng tiếp xúc với (C) tại điểm có hoành độ là 2.
4. Tìm tập hợp các điểm trên Oy mà từ đó có thể kẻ được ít nhất một đường thẳng tiếp xúc với (C).

Giải

$$y = f(x) = x + \sqrt{2x^2 + 1} \quad (C)$$

1. $D = \mathbb{R}$


$$y' = 1 + \frac{2x}{\sqrt{2x^2 + 1}} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$y = x + \sqrt{2} |x| \sqrt{1 + \frac{1}{2x^2}}$$

$$= \begin{cases} (1 + \sqrt{2})x + Q(x) & \text{khi } x \rightarrow +\infty \text{ và } \lim_{x \rightarrow +\infty} Q(x) = 0 \\ (1 - \sqrt{2})x + Q(x) & \text{khi } x \rightarrow -\infty \text{ và } \lim_{x \rightarrow -\infty} Q(x) = 0 \end{cases}$$

Ta có hai tiệm cận xiên $y = (1 + \sqrt{2})x$; $y = (1 - \sqrt{2})x$

x	$-\infty$	$-\frac{\sqrt{2}}{2}$	$+\infty$
y'	$-$	0	$+$
y	$+\infty$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$+\infty$



Hình 109

$$x = 0 \Rightarrow y = 1$$

Đồ thị (hình 109).

$$2. x + \sqrt{2x^2 + 1} = m \quad (1)$$

Dựa vào đồ thị, ta có :

$$* m < \frac{\sqrt{2}}{2} : (1) \text{ vô nghiệm.}$$

$$* m = \frac{\sqrt{2}}{2} : (1) \text{ có nghiệm kép } x = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$* m > \frac{\sqrt{2}}{2} : (1) \text{ có 2 nghiệm phân biệt.}$$

3. Phương trình tiếp tuyến tại $M(x_0; y_0) \in (C)$

$$(T) : y = \left(1 + \frac{2x_0}{\sqrt{2x_0^2 + 1}} \right) (x - x_0) + x_0 + \sqrt{2x_0^2 + 1}$$

$$\text{Với } x_0 = 2 \text{ thì } (T) : y = \frac{7}{3}x + \frac{1}{3}.$$

4. $\Delta : y = kx + b$ qua $M(0; b) \in Oy$, có phương trình hoành độ giao điểm với (C)

$$\sqrt{2x^2 + 1} = (k - 1)x + b$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (k - 1)x + b > 0 \\ [(k - 1)^2 - 2]x^2 + 2b(k - 1)x + b^2 - 1 = 0 \end{cases} \quad (1)$$

$$(2)$$

Δ tiếp xúc $(C) \Leftrightarrow (2)$ có nghiệm kép thỏa mãn (1)

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (k - 1)^2 - 2 \neq 0 \\ \Delta' = b^2(k - 1)^2 - [(k - 1)^2 - 2](b^2 - 1) = 0 \\ (k - 1) \frac{b(1 - k)}{(k - 1)^2 - 2} + b > 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (k-1)^2 \neq 2 \\ (k-1)^2 + 2b^2 - 2 = 0 \\ \frac{b}{(k-1)^2 - 2}(-2) > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b \neq 0 \\ (k-1)^2 - 2 = -2b^2 \\ \frac{b}{(k-1)^2 - 2}(-2) < 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow (I) \begin{cases} b > 0 \\ (k-1)^2 = 2(1-b^2) \end{cases}$$

Từ M kẻ được ít nhất 1 tiếp tuyến đến (C) $\Leftrightarrow$ hệ (I) có nghiệm k
 $\Leftrightarrow 0 < b \leq 1$.

Đề 66 Cho hàm số : $y = f(x) = \sqrt{2x(4-x)}$ (C)

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.
2. Dùng đồ thị biện luận theo m số nghiệm của phương trình :
 $\sqrt{2x(4-x)} = mx + 2\sqrt{2} - 5m$.
3. Gọi (C') là hình đối xứng của (C) qua Ox. Chứng minh rằng (C) và (C') hợp thành đường (E) mà ta viết được phương trình.


Giải

$$y = \sqrt{2x(4-x)} \quad (C)$$

1. $D = [0; 4]$

$$y' = \frac{-2x+4}{\sqrt{2x(4-x)}}$$

x	$-\infty$	0	2	4	$+\infty$
y'			+	0	-
y				$2\sqrt{2}$	



Hình 110

Đồ thị (chú ý : tiếp tuyến tại A(0; 0) và B(4; 0) đứng).

$$2. \sqrt{2x(4-x)} = mx + 2\sqrt{2} - 5m \Leftrightarrow \sqrt{2x(4-x)} = m(x-5) + 2\sqrt{2} \quad (1)$$

Số nghiệm của (1) là số giao điểm của đường thẳng (d) :

$$y = m(x-5) + 2\sqrt{2} \text{ với } (C) \quad ((d) \text{ luôn qua } A(5; 2\sqrt{2}))$$

$$\text{Trên đồ thị, chú ý 2 đường } d_1 : y = \frac{2\sqrt{2}}{5}x$$

$$d_2 : y = 2\sqrt{2}x - 8\sqrt{2}$$

* $m < 0$: (d) không cắt (C) $\Rightarrow$ (1) vô nghiệm.

* $m = 0$: (1) có nghiệm kép $x = 2$.

* $0 < m \leq \frac{2\sqrt{2}}{5}$: (1) có 2 nghiệm.

* $\frac{2\sqrt{2}}{5} < m \leq 2\sqrt{2}$: (1) có 1 nghiệm.

* $m > 2\sqrt{2}$: (1) vô nghiệm.

$$3. \text{ Ta có } y = \sqrt{2x(4-x)} \quad (C)$$

$$y = -\sqrt{2x(4-x)} \quad (C')$$

(C) và (C') hợp thành đường (E) có phương trình (E) : $y^2 = 2x(4-x)$

$$\Leftrightarrow (E) : \frac{y^2}{8} + \frac{(x-2)^2}{4} = 1$$

(E) là Elip.

Đề 67 Cho hàm số : $y = f(x) = -2x + k\sqrt{x^2 + 1}$.

1. Với $k = 3$, hãy lập bảng biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.

2. Tìm k để hàm số có cực tiêu.

Giải

$$y = f(x) = -2x + k\sqrt{x^2 + 1}$$

$$1. k = 3 \Rightarrow y = -2x + 3\sqrt{x^2 + 1}$$

$$D = \mathbb{R}$$

$$y' = -2 + \frac{3x}{\sqrt{x^2 + 1}} = 0 \Leftrightarrow x = \frac{2}{\sqrt{5}}$$


$$y = -2x + 3|x|\sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} = \begin{cases} x + Q(x) & \text{khi } x \rightarrow +\infty, \lim_{x \rightarrow \infty} Q(x) = 0 \\ -5 + Q(x) & \text{khi } x \rightarrow -\infty, \lim_{x \rightarrow -\infty} Q(x) = 0 \end{cases}$$

$$\text{Ta có 2 tiệm cận xiên } \begin{cases} d_1 : y = x \\ d_2 : y = -5x \end{cases}$$

x	$-\infty$	$\frac{2}{\sqrt{5}}$	$+\infty$
y'	-	0	+
y	$+\infty$	$\sqrt{5}$	$+\infty$

$$x = 0 \Rightarrow y = 3$$

Đồ thị (hình 111).



Hình 111

$$2. \quad y' = -2 + \frac{kx}{\sqrt{x^2 + 1}}$$

$$y' = 0 \Leftrightarrow 2\sqrt{x^2 + 1} = kx \Leftrightarrow \begin{cases} kx > 0 \\ (k^2 - 4)x^2 = 4 \end{cases} \quad (1)$$

$$* \quad k^2 \leq 4 \Rightarrow y' = 0 \text{ vô nghiệm}$$

y' liên tục nên có dấu không đổi $\Rightarrow y$ không có cực trị

$$* \quad k^2 > 4 \Rightarrow (1) \text{ có hai nghiệm } x = \frac{\pm 2}{\sqrt{k^2 - 4}}$$

$k > 2$ thì :

x	$-\infty$	$-\frac{2}{\sqrt{k^2 - 4}}$	0	$\frac{2}{\sqrt{k^2 - 4}}$	$+\infty$
y'	-	0	-	0	+
y	$+\infty$	k		$\sqrt{k^2 - 4}$	$+\infty$

$$\text{Khi đó } y \text{ có cực tiểu } x = \frac{2}{\sqrt{k^2 - 4}}$$

$k < -2$ thì :

x	$-\infty$	$-\frac{2}{\sqrt{k^2 - 4}}$	0	$\frac{2}{\sqrt{k^2 - 4}}$	$+\infty$
y'	+	0	-	-	
y					

y' không có cực tiểu

Kết luận : $k > 2$ thì y có cực tiểu.

Đề 68 Cho hàm số : $y = f(x) = mx^2 + ax + b$ ($m \neq 0$) có đồ thị là một parabol đỉnh $S(2; 2)$.

1. Chứng minh rằng $ab \leq 1$.
2. Xác định m để $g(x) = m\cos 2x + 2a\cos x + m + 2b \geq 0$ với mọi giá trị của x .
3. Xác định m để đồ thị hàm số $h(x) = \sqrt{f(x)}$ có tiệm cận, xác định các đường tiệm cận này.

Giải

$$y = f(x) = mx^2 + ax + b \quad (m \neq 0)$$

1. Đồ thị là parabol đỉnh $S(2; 2)$

$$\Rightarrow \begin{cases} 2 = -\frac{a}{2m} \\ 4m + 2a + b = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4m = -a & (1) \\ 2 = a + b & (2) \end{cases}$$

$$* \quad a \leq 0 \xrightarrow{(2)} b > 0 \quad \text{Vậy} \quad ab \leq 0 < 1$$

$$b \leq 0 \xrightarrow{(2)} a > 0 \quad \text{Vậy} \quad ab \leq 0 < 1$$

$$* \quad a > 0, \quad b > 0$$



$$(2) \Rightarrow 2 = a + b \geq 2\sqrt{ab} \Rightarrow ab \leq 1.$$

$$2. \quad g(x) = m\cos 2x + 2a\cos x + m + 2b = 2m\cos^2 x + 2a\cos x + 2b \\ = 2(mt^2 + at + b) = 2f(t) \quad \text{với} \quad \cos x = t \in [-1; 1]$$

$$g(x) \geq 0 \quad \forall x \Leftrightarrow f(t) \geq 0 \quad \forall t \in [-1; 1]$$

$$\Leftrightarrow m > 0 \quad \text{hay} \quad \begin{cases} m < 0 \\ f(-1) \geq 0 \end{cases} \quad (I)$$

Chú thích :



Hình 112

$$(I) \Leftrightarrow m > 0 \quad \text{hay} \quad \begin{cases} m < 0 \\ m - a + b \geq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow m > 0 \quad \text{hay} \quad \begin{cases} m < 0 \\ m - 2a + (a + b) = 9m + 2 \geq 0 \end{cases}$$

(do (1) và (2))

$$\Leftrightarrow m \geq -\frac{2}{9} \quad \text{và} \quad m \neq 0$$

3. (C) : $y = h(x) = \sqrt{f(x)} = \sqrt{mx^2 + ax + b}$

* $m < 0$: (C) không có tiệm cận

* $m > 0 \Rightarrow f(x) \geq 2 > 0 \quad \forall x$ (xem chú thích) do đó miền xác định của $h(x)$ là $D = \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} h(x) &= \sqrt{m} \left| x + \frac{a}{2m} \right| \sqrt{1 - \frac{a^2 - 4bm}{(2mx + a)^2}} \\ &= \sqrt{m} \left(\left| x + \frac{a}{2m} \right| \right) + Q(x) \quad \text{với} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} Q(x) = 0 \end{aligned}$$

Vậy tiệm cận xiên là : $d_1 : y = \sqrt{m}x + \frac{a}{2\sqrt{m}} \quad \text{khi } x \rightarrow +\infty$

$d_2 : y = -\sqrt{m}x - \frac{a}{2\sqrt{m}} \quad \text{khi } x \rightarrow -\infty.$

Đề 69 Cho hàm số : $y = f(x) = \frac{x + m}{\sqrt{x^2 + 1}}$.

1. Tùy theo các giá trị khác nhau của m , lập bảng biến thiên của $f(x)$.

2. Biện luận theo m số nghiệm của phương trình : $x + m = m\sqrt{x^2 + 1}$.

Giải

$$y = \frac{x + m}{\sqrt{x^2 + 1}} \quad (C)$$

1. $D = \mathbb{R}$

$$y' = \frac{1 - mx}{(x^2 + 1)^{3/2}}$$

* $m = 0$

x	$-\infty$	$+\infty$
y'		+
y	-1	1

* $m > 0$

x	$-\infty$	$\frac{1}{m}$	$+\infty$
y'	+	0	-
y	-1	$m^2 + 1$	1

* $m < 0$

x	$-\infty$	$\frac{1}{m}$	$+\infty$
y'	-	0	+
y	-1	$-(1 + m^2)$	1

2. $x + m = m\sqrt{x^2 + 1} \quad (1) \Leftrightarrow m = \frac{x + m}{\sqrt{x^2 + 1}}$

Số nghiệm của (1) bằng số giao điểm của $d : y = m$ với (C)

* $m = 0$: (1) có 1 nghiệm $x = 0$

* $m > 0$: • $m \leq 1$: (1) có 1 nghiệm, • $m > 1$: (1) có 2 nghiệm.

* $m < 0$: • $m \geq -1$: (1) có 1 nghiệm, • $m < -1$: (1) có 2 nghiệm.

Kết luận : $|m| \leq 1$: (1) có 1 nghiệm,

$|m| > 1$: (1) có 2 nghiệm.

Đề 70 Cho hàm số : $y = f(x) = \frac{x + 1}{\sqrt{x^2 - x + 1}}$

Tính đạo hàm y' và xác định dấu của nó, từ đó lập bảng biến thiên của hàm số y và xác định cực đại, cực tiểu (nếu có) của hàm số ấy.

Giải

$$y = \frac{x + 1}{\sqrt{x^2 - x + 1}}$$

$$y' = \frac{-3(x - 1)}{2\sqrt{(x^2 - x + 1)^3}} = 0 \Leftrightarrow x = 1$$

x	$-\infty$	1	$+\infty$
y'	+	0	-
y	-1	2	1

$x = 1$ là cực đại, y không có cực tiểu.

Đề 71 Biện luận theo m miền xác định và tiệm cận của hàm số :

$$y = f(x) = \frac{\sqrt{x^2 - 3x + 2}}{x - m}$$

Giải

$$y = \frac{\sqrt{x^2 - 3x + 2}}{x - m}$$

$m = 2$ hay $m = 1$: hàm suy biến

$m \in (1; 2)$: Miền xác định $D = (-\infty; 1) \cup [2; +\infty)$, **không** có tiệm cận

$m \notin [1; 2]$: Miền xác định $D = (-\infty; 1) \cup [2; +\infty) \setminus \{m\}$

$x = m$ là tiệm cận đứng.

Đề 72 Cho hàm số : $y = mx + m^2 + \sqrt{x^2 + 1}$.

1. Chứng minh rằng tiệm cận xiên bên phải của đồ thị luôn tiếp xúc với một parabol cố định..
2. Khi $m = 1$. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
3. Tìm quỹ tích các điểm trên trục tung mà từ đó có thể kẻ được ít nhất một tiếp tuyến tiếp xúc với đồ thị (C) của hàm số.
4. Với giá trị nào của a thì phương trình sau có nghiệm :

$$x + 1 + \sqrt{x^2 + 1} = a.$$

Giải

$$1. y = mx + m^2 + \sqrt{x^2 + 1} \quad (C_m)$$

$$= mx + m^2 + |x| \sqrt{1 + \frac{1}{x^2}} = mx + m^2 + |x| + Q(x) \quad \text{với } \lim_{x \rightarrow \infty} Q(x) = 0$$

Vậy tiệm cận xiên bên phải là : $d : y = (m + 1)x + m^2$ (do $x \geq 0$)

$$\Leftrightarrow d : y = \left(\frac{x}{2} + m\right)^2 - \frac{x^2}{4} + x$$

Vậy d luôn tiếp xúc với (P) : $y = -\frac{x^2}{4} + x$.

$$2. m = 1 \Rightarrow y = x + 1 + \sqrt{x^2 + 1} \quad (C)$$

$$D = \mathbb{R}$$

$$y' = 1 + \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} > 0 \quad \forall x \in D$$


$$\text{vì } \sqrt{x^2 + 1} + x > |x| + x \geq 0 \quad \forall x$$

$y = 2x + 1$ là tiệm cận xiên bên phải

$y = 1$ là tiệm cận ngang (phía trái)

x	$-\infty$	$+\infty$
y'		+
y		$+\infty$

$$x = 0 \Rightarrow y = 2$$



Hình 113

Đồ thị (hình 113).

3. $\Delta: y = kx + b$ qua $M(0; b) \in Oy$ có phương trình hoành độ giao điểm với (C)

$$\sqrt{x^2 + 1} = (k - 1)x + b - 1$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (k - 1)x + b - 1 \geq 0 & (1) \\ [(k - 1)^2 - 1]x^2 + 2(k - 1)(b - 1)x + (b - 1)^2 - 1 = 0 \end{cases}$$

(2) Δ tiếp xúc (C) $\Leftrightarrow$ (2) có nghiệm kép thỏa mãn (1)

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta' = (k - 1)^2 + (b - 1)^2 - 1 = 0 \\ (k - 1)^2 - 1 \neq 0 \\ (k - 1) \left[\frac{-(k - 1)(b - 1)}{(k - 1)^2 - 1} \right] + b - 1 \geq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} b \neq 1 \\ (k - 1)^2 = -(b - 1)^2 + 1 \\ (k - 1) \left[\frac{(k - 1)(b - 1)}{(b - 1)^2} \right] + b - 1 \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b > 1 \\ (k - 1)^2 = -(b - 1)^2 + 1 & (3) \end{cases}$$

Từ M kẻ được ít nhất 1 tiếp tuyến đến (C)

$$\Leftrightarrow (3) \text{ có nghiệm } k \text{ (với } b > 1) \Leftrightarrow \begin{cases} b > 1 \\ (b - 1)^2 \leq 1 \end{cases} \Leftrightarrow 1 < b \leq 2.$$

$$4. \quad x + 1 + \sqrt{x^2 + 1} = a \quad (1)$$

$$(1) \Leftrightarrow \begin{cases} y = x + 1 + \sqrt{x^2 + 1} & (C) \\ y = a & (\Delta a) \end{cases}$$

$$(1) \text{ có nghiệm} \Leftrightarrow \Delta a \text{ cắt } (C) \Leftrightarrow a > 1.$$

CÁC ĐỀ KHẢO SÁT HÀM SỐ THI VÀO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC

NĂM 2002

1. TUYỂN SINH ĐH, CĐ 2002 – KHỐI A

Cho hàm số : $y = -x^3 + 3mx^2 + 3(1 - m^2)x + m^3 - m^2$ (1)
(m là tham số).

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số (1) khi $m = 1$.
2. Tìm k để phương trình : $-x^3 + 3x^2 + k^3 - 3k^2 = 0$ có ba nghiệm phân biệt.
3. Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số (1).

Giải

1. $m = 1 \Rightarrow y = -x^3 + 3x^2$

Tập xác định $\forall x \in \mathbb{R}$,

$$y' = -3x^2 + 6x = -3x(x - 2), \quad y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 0 \\ x_2 = 2 \end{cases}$$

$$y'' = -6x + 6 = 0, \quad y'' = 0 \Leftrightarrow x = 1$$


Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$
y'	-	0	+	0	-
y''		+	0	-	
y	$+\infty$	lồi CT 0	U 2	4 CĐ lồi	$-\infty$

$$y = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 3 \end{cases};$$

$$y(-1) = 4$$

Đồ thị : hình bên.



2. Cách 1 :

$$\text{Ta có : } -x^3 + 3x^2 + k^3 - 3k^2 = 0 \Leftrightarrow -x^3 + 3x = -k^3 + 3k^2.$$

$$\text{Đặt } a = -k^3 + 3k^2.$$

Dựa vào đồ thị ta thấy phương trình : $-3x^3 + 3x^2 = a$ có 3 nghiệm phân biệt $\Leftrightarrow 0 < a < 4$

$$\Leftrightarrow 0 < -k^3 + 3k^2 < 4 \Leftrightarrow \begin{cases} 0 \neq k < 3 \\ (k+1)(k^2 - 4k + 4) > 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 0 \neq k < 3 \\ (k+1)(k-2)^2 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -1 < k < 3 \\ k \neq 0 \wedge k \neq 2. \end{cases}$$

Cách 2 :

$$\text{Ta có : } -x^3 + 3x^2 + k^3 - 3k^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - k)[x^2 + (k - 3)x + k^2 - 3k] = 0 \text{ có 3 nghiệm phân biệt}$$

$$\Leftrightarrow f(x) = x^2 + (k - 3)x + k^2 - 3k = 0 \text{ có 2 nghiệm phân biệt khác } k$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta = -3k^2 + 6k + 9 > 0 \\ k^2 + k^2 - 3k + k^2 - 3k \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -1 < k < 3 \\ k \neq 0 \wedge k \neq 2. \end{cases}$$

3. Cách 1 : $y' = -3x^2 + 6mx + 3(1 - m^2) = -3(x - m)^2 + 3$

$$y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = m - 1 \\ x_2 = m + 1 \end{cases}$$

Ta thấy $x_1 \neq x_2$ và y' đổi dấu khi qua x_1 và $x_2 \Rightarrow$ hàm số đạt cực trị tại x_1 và x_2 .

$$y_1 = y(x_1) = -m^2 + 3m - 2 \quad \text{và} \quad y_2 = y(x_2) = -m^2 + 3m + 2$$

Phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị

$M_1(m - 1; -m^2 + 3m - 2)$ và $M_2(m + 1; -m^2 + 3m + 2)$ là :

$$\frac{x - m + 1}{2} = \frac{y + m^2 - 3m + 2}{4} \Leftrightarrow y = 2x - m^2 + m.$$

$$\text{Cách 2 : } y' = -3x^2 + 6mx + 3(1 - m^2) = -3(x - m)^2 + 3.$$

Ta thấy : $\Delta' = 9m^2 + 9(1 - m^2) = 9 > 0 \Rightarrow y' = 0$ có 2 nghiệm $x_1 \neq x_2$ và y' đổi dấu khi qua x_1 và x_2 .

$$\text{Ta có : } y = -x^3 + 3mx^2 + 3(1 - m^2)x + m^3 - m^2$$

$$= \left(\frac{1}{3}x - \frac{m}{3}\right)(-3x^2 + 6mx + 3 - 3m^2) + 2x - m^2 + m$$

$$\text{Từ đây ta có : } y_1 = 2x_1 - m^2 + m \quad \text{và} \quad y_2 = 2x_2 - m^2 + m.$$

Vậy phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị là : $y = 2x - m^2 + m$.

2. TUYỂN SINH ĐH, CĐ 2002 – KHỐI B

Cho hàm số : $y = mx^4 + (m^2 - 9)x^2 + 10$ (1) (m là tham số).

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1) khi $m = 1$.
2. Tìm m để hàm số (1) có ba điểm cực trị.

Giải

1. Với $m = 1$ ta có : $y = x^4 - 8x^2 + 10$ là hàm chẵn $\Rightarrow$ đồ thị đối xứng qua Oy.

Tập xác định $\forall x \in \mathbb{R}$

$$y' = 4x^3 - 16x = 4x(x^2 - 4), \quad y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm 2 \end{cases}$$

$$y'' = 12x^2 - 16 = 12 \left(x^2 - \frac{4}{3} \right), \quad y'' = 0 \Leftrightarrow x = \pm \frac{2}{\sqrt{3}}$$

Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	-2	$-\frac{2}{\sqrt{3}}$	0	$\frac{2}{\sqrt{3}}$	2	$+\infty$
y'		-	0	+	0	-	+
y''			+	0	-	0	+
y	$+\infty$			10			$+\infty$
			lồi	Đ	lồi		
			CT	lồi	CT		
			-6			-6	

Hai điểm cực tiểu : $A_1(-2; -6)$

và $A_2(2; -6)$

Một điểm cực đại : $B(0; 10)$

Hai điểm uốn : $U_1\left(-\frac{2}{\sqrt{3}}; \frac{10}{9}\right)$


và $U_2\left(\frac{2}{\sqrt{3}}; \frac{10}{9}\right)$

Giao điểm của đồ thị với trục tung là :

$B(0; 10)$

Đồ thị cắt trục hoành tại 4 điểm có hoành độ :

$$x = \pm \sqrt{4 + \sqrt{6}} \quad \text{và} \quad x = \pm \sqrt{4 - \sqrt{6}}.$$



2. $y' = 4mx^3 + 2(m^2 - 9)x = 2x(2mx^2 + m^2 - 9),$

$$y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ 2mx^2 + m^2 - 9 = 0 \end{cases}$$

Hàm số có ba **điểm cực trị** $\Leftrightarrow$ phương trình $y' = 0$ có 3 nghiệm phân biệt (khi đó y' đổi dấu **khí qua** các nghiệm) $\Leftrightarrow$ phương trình $2mx^2 + m^2 - 9 = 0$ có hai nghiệm **phân biệt khác 0**.

$$2mx^2 + m^2 - 9 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 0 \\ x^2 = \frac{9 - m^2}{2m} \end{cases}$$

Phương trình : $2mx^2 + m^2 - 9 = 0$ có hai nghiệm khác 0 $\Leftrightarrow \begin{cases} m < -3 \\ 0 < m < 3. \end{cases}$

Vậy hàm số có **ba điểm cực trị** $\Leftrightarrow \begin{cases} m < -3 \\ 0 < m < 3. \end{cases}$

3. TUYỂN SINH ĐH, CĐ 2002 – KHỐI D

Cho hàm số : $y = \frac{(2m - 1)x - m^2}{x - 1}$ (1) (m là tham số)

1. Khảo sát sự **biến thiên** và vẽ đồ thị (C) của hàm số (1) ứng với $m = -1$.
2. Tính diện tích hình **phẳng** giới hạn bởi đường cong (C) và hai trục tọa độ.
3. Tìm m để đồ thị của hàm số (1) tiếp xúc với đường thẳng $y = x$.

Giải

1. Khi $m = -1$, ta có : $y = \frac{-3x - 1}{x - 1} = -3 - \frac{4}{x - 1}$

- TXĐ : $x \neq 1$

- CBT : $y' = \frac{4}{(x - 1)^2} > 0, \quad \forall x \neq 1 \Rightarrow$ hàm số không có cực trị.

$\lim_{x \rightarrow \infty} y = -3; \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} y = +\infty; \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} y = -\infty$

- BBT :

x	$-\infty$	1	$+\infty$
y'	+		+
y	-3 $\nearrow$ $+\infty$	$-\infty$ $\nearrow$ -3	

- TC : $x = 1$ là tiệm cận đứng vì $\lim_{x \rightarrow 1} y = \infty$


$y = -3$ là tiệm cận ngang vì $\lim_{x \rightarrow \infty} y = -3$

- Giao với các trục :

$$x = 0 \Rightarrow y = 1;$$

$$y = 0 \Rightarrow x = -\frac{1}{3}$$

- Đồ thị : hình bên



2. Diện tích cần tính là :

$$\begin{aligned} S &= \int_{\frac{1}{3}}^0 \left(\frac{-3x-1}{x-1} \right) dx = -3 \int_{\frac{1}{3}}^0 dx - 4 \int_{\frac{1}{3}}^0 \frac{dx}{x-1} \\ &= -3 \cdot \frac{1}{3} - 4 \ln |x-1| \Big|_{\frac{1}{3}}^0 = -1 + 4 \ln \frac{4}{3} \text{ (đvdt)}. \end{aligned}$$

3. Kí hiệu $f(x) = \frac{(2m-1)x - m^2}{x-1}$. Yêu cầu bài toán tương đương với tìm m

để hệ phương trình sau có nghiệm : (H) $\begin{cases} f(x) = x \\ f'(x) = (x)' \end{cases}$

$$\text{Ta có : (H)} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{-(x-m)^2}{x-1} = 0 \\ \left(\frac{-(x-m)^2}{x-1} \right)' = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{-(x-m)^2}{x-1} = 0 \\ \frac{-2(x-m)(x-1) + (x-m)^2}{(x-1)^2} = 0 \end{cases}$$

Ta thấy với $\forall m \neq 1$; $x = m$ luôn thỏa mãn hệ (H). Vì vậy $\forall m \neq 1$, (H) luôn có nghiệm, đồng thời khi $m = 1$ thì hệ (H) vô nghiệm. Do đó đồ thị hàm số (1) tiếp xúc với đường thẳng $y = x$ khi và chỉ khi $m \neq 1$.

ĐS : $m \neq 1$.

NĂM 2001

4. ĐH QUỐC GIA TP HCM – KHỐI A

Cho hàm số : $y = 2x^3 + 3(m-3)x^2 + 11 - 3m$ (C_m).

- Cho $m = 2$. Tìm phương trình các đường thẳng qua $A\left(\frac{19}{12}, 4\right)$ và tiếp xúc với đồ thị (C_2) của hàm số.
- Tìm m để hàm số có hai cực trị. Gọi M_1 và M_2 là các điểm cực trị, tìm m để các điểm M_1 , M_2 và $B(0; -1)$ thẳng hàng.

Giải

$$y = f(x) = 2x^3 + 3(m-3)x^2 + 11 - 3m \quad (C_m)$$

1. $m = 2 : f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 5 \quad (C_2)$

Phương trình đường thẳng (d) qua $A\left(\frac{19}{12}, 4\right)$ và có hệ số góc k là :

$$y - 4 = k\left(x - \frac{19}{12}\right) \Rightarrow y = k\left(x - \frac{19}{12}\right) + 4 = g(x)$$

(d) tiếp xúc với $(C_2) \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) = g(x) \\ f'(x) = g'(x) \end{cases} \text{ có nghiệm}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x^3 - 3x^2 + 5 = k\left(x - \frac{19}{12}\right) + 4 \\ 6x^2 - 6x = k \end{cases} \text{ có nghiệm}$$

$$\Leftrightarrow 2x^3 - 3x^2 + 5 = (6x^2 - 6x)\left(x - \frac{19}{12}\right) + 4 \text{ có nghiệm} \quad (1)$$

$$(1) \Leftrightarrow 8x^3 - 25x^2 + 19x - 2 = 0 \Leftrightarrow (x-1)(8x^2 - 17x + 2) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ 8x^2 - 17x + 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 2 \\ x = \frac{1}{8} \end{cases}$$

• TH 1 : $x_1 = 1 \Rightarrow k_1 = 0 \Rightarrow (d_1) : y = 4$

• TH 2 : $x_1 = 2 \Rightarrow k_2 = 12 \Rightarrow (d_2) : y = 12x - 15$

• TH 3 : $x_3 = \frac{1}{8} \Rightarrow k_3 = -\frac{21}{32} \Rightarrow (d_3) : y = -\frac{21}{32}x + \frac{645}{128}$

Vậy qua A có 3 đường thẳng $(d_1), (d_2), (d_3)$ tiếp xúc với đồ thị (C_2) .

2. $f'(x) = 6x^2 + 6(m-3)x$.

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 3 - m \end{cases}$$

$$f(x) \text{ có 2 cực trị} \Leftrightarrow 3 - m \neq 0 \Leftrightarrow m \neq 3$$

Ta có : $f(x) = f'(x)\left[\frac{1}{3}x + \frac{m-3}{6}\right] + [-(m-3)^2x + 11 - 3m]$

Phương trình đường thẳng $M_1M_2 : y = -(m-3)^2x + 11 - 3m$

M_1, M_2, B thẳng hàng $\Leftrightarrow B \in M_1M_2$

$$\Leftrightarrow -1 = 11 - 3m \Leftrightarrow m = 4.$$

5. ĐH QUỐC GIA TPHCM – KHỐI B

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số : $y = 3x - 4x^3$.

Giải

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số : $y = f(x) = 3x - 4x^3$.

Miền xác định $D = \mathbb{R}$

$$f'(x) = -12x^2 + 3$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 = \frac{1}{4} \Leftrightarrow x = \pm \frac{1}{2}$$

Bảng biến thiên :


x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$			
f'	-	0	+	0	-		
f	$+\infty$	$\searrow$	-1	$\nearrow$	1	$\searrow$	$-\infty$

$$f''(x) = -24x$$

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

Bảng xét tính lồi lõm :

x	$-\infty$	0	$+\infty$	
f'		+	0	-
f	lõm	Đ uôn (0, 0)	lồi	



Đồ thị : hình bên.

6. ĐH QUỐC GIA TPHCM – KHỐI A, B

Cho hàm số : $y = \frac{x+2}{x-1}$.

- Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
- Cho điểm $A(0, a)$. Xác định a để từ A kẻ được hai tiếp tuyến đến (C) sao cho hai tiếp điểm tương ứng nằm về hai phía đối với trục Ox .

Giải

$$y = f(x) = \frac{x+2}{x-1} \quad (C)$$

- Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

Miền xác định : $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$


$$f'(x) = \frac{-3}{(x-1)^2} < 0$$

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1$: Tiệm cận ngang : $y = 1$.

$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty$: Tiệm cận đứng : $x = 1$.

Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	1	$+\infty$
f'	-		-
f	1 $\searrow$ $-\infty$	$+\infty$	$\searrow$ 1



Đồ thị : hình bên.

2. $A(0; a)$

Phương trình tiếp tuyến (Δ) với (C) tại $M_0(x_0; y_0)$: $y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$

$$A \in (\Delta) \Leftrightarrow a - \left(\frac{x_0 + 2}{x_0 - 1} \right) = \frac{-3}{(x_0 - 1)^2} (0 - x_0)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_0 \neq 1 \\ (a-1)x_0^2 - 2(a+2)x_0 + a+2 = 0 \end{cases}$$

Đặt : $f(x_0) = (a-1)x_0^2 - 2(a+2)x_0 + a+2$

Qua A kẻ được 2 tiếp tuyến $\Leftrightarrow \begin{cases} a \neq 1 \\ \Delta' > 0 \\ f(1) \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a > -2 \\ a \neq 1 \end{cases}$

Khi đó gọi $M_1(x_1; y_1)$, $M_2(x_2; y_2)$ là 2 tiếp điểm ta có : M_1, M_2 nằm về hai phía đối với Ox .

$$\Leftrightarrow y_1 y_2 < 0 \Leftrightarrow \left(\frac{x_1 + 2}{x_1 - 1} \right) \left(\frac{x_2 + 2}{x_2 - 1} \right) < 0 \Leftrightarrow \frac{x_1 x_2 + 2(x_1 + x_2) + 4}{x_1 x_2 - (x_1 + x_2) + 1} < 0 \quad (1)$$

Theo Viét ta có : $\begin{cases} x_1 + x_2 = \frac{2(a+2)}{a-1} \\ x_1 x_2 = \frac{a+2}{a-1} \end{cases}$

$$(1) \Leftrightarrow \frac{a+2+4(a+2)+4(a-1)}{a+2-2(a+2)+(a-1)} < 0 \Leftrightarrow \frac{9a+6}{-3} < 0 \Leftrightarrow a > -\frac{2}{3}$$

Vậy : $\begin{cases} a > -\frac{2}{3} \\ a \neq 1. \end{cases}$

7. DH KINH TẾ

Cho hàm số : $y = \frac{x^2 - 6x + 9}{-x + 2}$.

- a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.
b) Tìm tất cả các điểm M trên trục tung sao cho từ M kẻ được tiếp tuyến với đồ thị, song song với đường thẳng $y = -\frac{3}{4}x$.

Giải

$$y = f(x) = \frac{x^2 - 6x + 9}{-x + 2}$$

- a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số :

$$\text{MXĐ : } D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$$

$$f'(x) = \frac{-x^2 + 4x - 3}{(-x + 2)^2}; \quad f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1 \vee x = 3.$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \infty : \text{Tiệm cận đứng : } x = 2.$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty : \text{Tiệm cận xiên : } y = -x + 4.$$

x	$-\infty$	1	2	3	$+\infty$	
f'	-	0	+	+	0	-
f	$+\infty$		$+\infty$	0		$-\infty$

CT

4

CD

0

Đồ thị : hình bên.

- b) Xét $M(0, m)$ thuộc Oy.

Gọi (d) là đường thẳng qua M và có hệ số góc k.


Ta có phương trình của (d) là : $y - m = kx$.

$$(d) \parallel (\Delta) : y = -\frac{3}{4}x \Rightarrow k = -\frac{3}{4}$$

$$\text{Vậy (d) : } y = -\frac{3}{4}x + m$$

$$(d) \text{ tiếp xúc với (C)} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{x^2 - 6x + 9}{-x + 2} = -\frac{3}{4}x + m \\ -x^2 + 4x - 3 = \frac{3}{4}(-x + 2)^2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 \\ m = \frac{5}{2} \end{cases} \vee \begin{cases} x = 0 \\ m = \frac{9}{2} \end{cases}$$

Vậy có 2 điểm M thỏa mãn đề bài : $M_1\left(0, \frac{9}{2}\right)$ và $M_2\left(0, \frac{5}{2}\right)$.



1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số : $y = \frac{x^2 + 2x - 2}{x - 1}$.
2. Tìm điểm M trên đồ thị của hàm số sao cho khoảng cách từ M đến giao điểm của hai đường tiệm cận là nhỏ nhất.

Giải


$$y = f(x) = \frac{x^2 + 2x - 2}{x - 1}$$

1. Khảo sát hàm số

$$\text{MXD : } D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$$

$$f'(x) = \frac{x^2 - 2x}{(x - 1)^2};$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$$



Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$	
f'	+	0	-	-	0	+
f	$-\infty$	2	$+\infty$	6	$+\infty$	

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$$

$$y = x + 3 + \left(\frac{1}{x - 1} \right)$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x - 1} \right) = 0 : \text{Tiệm cận xiên : } y = x + 3.$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty : \text{Tiệm cận đứng : } x = 1.$$

Đồ thị : hình trên.

2. Xét điểm $M(x_M; y_M)$ trên đồ thị

$$\text{Đặt : } x_M = 1 + a \quad (a > 0) \Rightarrow y_M = a + 4 + \frac{1}{a}$$

Giao điểm của 2 tiệm cận : $I(1; 4)$

$$IM^2 = a^2 + \left(a + \frac{1}{a} \right)^2 = 2a^2 + \frac{1}{a^2} + 2$$

Theo Côsi : $IM^2 \geq 2\sqrt{2} + 2$

$$IM \geq \sqrt{2\sqrt{2} + 2}$$

$$IM \text{ đạt GTNN} \Leftrightarrow IM = \sqrt{2\sqrt{2} + 2} \Leftrightarrow 2a^2 = \frac{1}{a^2}$$

$$\Leftrightarrow a^4 = \frac{1}{2} \Leftrightarrow a = \frac{1}{\sqrt[4]{2}}$$

Do tính đối xứng của đồ thị nên có 2 điểm M thỏa mãn đề bài, đó là :

$$M_1 \begin{cases} x = 1 + \frac{1}{\sqrt[4]{2}} \\ y = 4 + \frac{1}{\sqrt[4]{2}} + \sqrt[4]{2} \end{cases}, \quad M_2 \begin{cases} x = 1 - \frac{1}{\sqrt[4]{2}} \\ y = 4 - \frac{1}{\sqrt[4]{2}} - \sqrt[4]{2} \end{cases}$$

9. ĐH Y DƯỢC TPHCM – KHỐI B

Cho hàm số : $y = \frac{mx^2 + (m^2 + 1)x + 4m^3 + m}{x + m}$ (C_m).

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi $m = -1$.
2. Tìm các giá trị của tham số m để đồ thị (C_m) có điểm cực trị thuộc góc phần tư thứ (II) và một điểm cực trị thuộc góc phần tư thứ (IV) của mặt phẳng tọa độ.

Giải

$$y = f(x) = \frac{mx^2 + (m^2 + 1)x + 4m^3 + m}{x + m} \quad (C_m)$$

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi $m = -1$

$$f(x) = \frac{-x^2 + 2x - 5}{x - 1}$$

Miền xác định : $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$

$$f'(x) = \frac{-x^2 + 2x + 3}{(x - 1)^2}$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -1 \vee x = 3$$

$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty$: Tiệm cận đứng : $x = 1$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$$

$$y = -x + 1 + \frac{4}{x - 1} : \text{Tiệm cận xiên : } y = -x + 1$$

Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$	
f'	-	0	+	+	0	-
f	$+\infty$					$-\infty$

4

CT


$-\infty$

CD

$-\infty$

$-\infty$

Đồ thị :



2.

$$f(x) = \frac{mx^2 + (m^2 + 1)x + 4m^3 + m}{x + m} \quad (C_m)$$

$$f'(x) = \frac{mx^2 + 2m^2x - 3m^3}{(x + m)^2}$$

$$\Delta' = 4m^4$$

$$f(x) \text{ có 2 cực trị} \Leftrightarrow m \neq 0$$

$$\begin{cases} x_1 = \frac{-m^2 - 2m^2}{m} = -3m \\ x_2 = \frac{-m^2 + 2m^2}{m} = m \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_1 = 1 - 5m^2 \\ y_2 = 1 + 3m^2 \end{cases}$$

Do $y_2 > 0$ nên để $M_2(x_2; y_2)$ thuộc góc phần tư thứ (II) của mặt phẳng tọa độ ta phải có : $x_2 < 0 \Leftrightarrow m < 0$ (1)

Khi đó : $x_1 = -3m > 0$

Để $M_1(x_1; y_1)$ thuộc góc phần tư (IV) của mặt phẳng tọa độ ta phải có :

$$y_1 < 0 \Leftrightarrow 1 - 5m^2 < 0 \Leftrightarrow m^2 > \frac{1}{5} \Leftrightarrow \begin{cases} m < -\frac{\sqrt{5}}{5} \\ m > \frac{\sqrt{5}}{5} \end{cases} \quad (2)$$

$$(1) \text{ và } (2) \text{ cho : } m < -\frac{\sqrt{5}}{5}.$$

10. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ Y TẾ TP HCM

Cho hàm số : $y = f(x) = x^3 - (m + 3)x^2 + 3x + 4$ (m là tham số).

1. Tìm m để đồ thị hàm số có điểm cực đại và điểm cực tiểu. Khi đó viết phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị này.
2. Tìm m để $f(x) \geq 3x$ với mọi $x \geq 1$.

Giải

$$y = f(x) = x^3 - (m + 3)x^2 + 3x + 4$$

1. $f'(x) = 3x^2 - 2(m + 3)x + 3$

$$\Delta' = (m + 3)^2 - 9 = m^2 + 6m$$

$$\text{Hàm số có CĐ và CT} \Leftrightarrow \Delta' > 0 \Leftrightarrow m^2 + 6m > 0$$

$$\Leftrightarrow m < -6 \vee m > 0$$

$$\text{Ta có : } f(x) = f'(x) \left(\frac{1}{3}x - \frac{m+3}{9} \right) + \left[2 - \frac{2(m+3)^2}{9} \right]x + \frac{m}{3} + 5$$

$$f(x) = f'(x).q(x) + r(x)$$

$$M(x; y) \text{ là điểm cực trị} \Leftrightarrow \begin{cases} y = f(x) \\ f'(x) = 0 \end{cases}$$

$$\Rightarrow y = f(x) = f'(x).q(x) + r(x) \Rightarrow y = r(x)$$

Vậy phương trình đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị là : $y = r(x)$

$$y = \left[2 - \frac{2(m+3)^2}{9} \right]x + \frac{m}{3} + 5.$$

2. $f(x) \geq 3x, \forall x \geq 1$ (1)

$$\Leftrightarrow x^3 - (m + 3)x^2 + 3x + 4 \geq 3x \Leftrightarrow x^3 - 3x + 4 \geq mx^2$$

$$\Leftrightarrow \frac{x^3 - 3x^2 + 4}{x^2} \geq m \Leftrightarrow x + \frac{4}{x^2} \geq 3 + m, \forall x \geq 1$$

$$\text{Đặt : } g(x) = x + \frac{4}{x^2}; \quad g'(x) = 1 - \frac{8x}{x^4} = \frac{x(x^3 - 8)}{x^4}$$

Bảng biến thiên của $g(x)$:

x	1	2	$+\infty$
g'		0	+
g	5	3	9

$$(1) \Leftrightarrow 3 > 3 + m \Leftrightarrow 0 \geq m$$

Vậy : $0 \geq m$.

- a) Khảo sát, vẽ đồ thị (C) của hàm số : $y = x^3 + 3x^2$.
- b) Tìm tất cả các điểm trên trục hoành mà từ đó vẽ được đúng ba tiếp tuyến của đồ thị (C), trong đó có hai tiếp tuyến vuông góc với nhau.

Giải

$$y = f(x) = x^3 + 3x^2$$

- a) Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số

$$\text{MXD : } D = \mathbb{R}$$

$$f'(x) = 3x^2 + 6x = 3x(x + 2)$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -2 \end{cases}$$

Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$	
f'	+	0	-	0	+
f	$-\infty$	4	0	$+\infty$	


$$f''(x) = 6x + 6$$

$$f'' = 0 \Leftrightarrow x = -1$$

Bảng xét tính lồi lõm :

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
f''	-	0	+
f	lồi	Đ uốn	lõm

Đồ thị : hình bên.



- b) Xét điểm $M(m; 0)$ trên Ox

Phương trình đường thẳng qua M và có hệ số góc k : (d) : $y = k(x - m)$

$$(d) \text{ tiếp xúc với (C)} \Leftrightarrow \begin{cases} x^3 + 3x^2 = k(x - m) \\ 3x^2 + 6x = k \end{cases} \quad \begin{matrix} (1) \\ (2) \end{matrix} \text{ có nghiệm.}$$

$$\text{Thay (2) vào (1) ta có : } 2x^3 - (3m - 3)x^2 - 6mx = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ 2x^2 - (3m - 3)x - 6m = 0 \end{cases} \quad (3)$$

$$x = 0 \Rightarrow k = 0$$

Ta thấy qua M có tiếp tuyến là Ox. Do (C) không thể có tiếp tuyến

vuông góc với Ox nên ta chỉ cần xét phương trình (3). Gọi x_1 và x_2 là nghiệm của (3)

Theo Viét ta có :

$$\begin{cases} x_1 x_2 = -3m \\ x_1 + x_2 = \frac{3m-3}{2} \end{cases}$$

M thỏa mãn đề bài $\Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow (3) \text{ có 2 nghiệm } x_1, x_2 \text{ thỏa mãn : } [3x_1^2 + 3x_1][3x_2^2 + 6x_2] = -1$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (3m-3)^2 + 48 > 0 \\ 9(x_1 x_2)^2 + 18x_1 x_2 (x_1 + x_2) + 36x_1 x_2 + 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow m = \frac{1}{27}$$

Vậy có một điểm M thỏa mãn đề bài là : $M\left(\frac{1}{27}, 0\right)$.

12. ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM – KHỐI A

Cho hàm số : $y = \frac{2x^2 + mx - 2}{x - 1}$ với m là tham số.

- Xác định m để tam giác tạo bởi 2 trục tọa độ và đường tiệm cận xiên của đồ thị của hàm số trên có diện tích bằng 4.
- Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số trên khi $m = -3$.

Giải

1. $y = f(x) = \frac{2x^2 + mx - 2}{x - 1}$

(C_m) có tiệm cận xiên (d) : $y = 2x + m + 2$

(d) cắt Ox, Oy tại : $A\left(\frac{-m-2}{2}, 0\right)$, $B(0; m+2)$.

$$S = dt(OAB) = \frac{1}{2} OA \cdot OB = \frac{1}{4} (m+2)^2$$

$$S = 4 \Leftrightarrow \frac{1}{4} (m+2)^2 = 4 \Leftrightarrow (m+2)^2 = 16 \Leftrightarrow \begin{cases} m = -6 \\ m = 2 \end{cases}$$

2. $m = -3$, ta có : $y = f(x) = \frac{2x^2 - 3x - 2}{x - 1}$

MXĐ : $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$

$$f'(x) = \frac{2x^2 - 4x + 5}{(x-1)^2} > 0, \quad \forall x \neq 1$$

Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	1	$+\infty$
f'		+	+
f	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$


$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty$: Tiệm cận đứng : $x = 1$

$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$

$$y = 2x - 1 - \frac{3}{x-1}$$

Tiệm cận xiên : $y = 2x - 1$

Đồ thị : hình bên.



13. ĐH KIẾN TRÚC TPHCM

a) Khảo sát hàm số : $y = x^2 - 5x + 4$.

b) Cho hai parabol : $y = x^2 - 5x + 6$ và $y = -x^2 + 5x - 11$.

Viết phương trình tiếp tuyến chung của hai parabol trên.

Giải

a) Khảo sát hàm số : $y = f(x) = x^2 - 5x + 4$.

MXĐ : $D = \mathbb{R}$

$$f'(x) = 2x - 5$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{5}{2}$$


Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	$\frac{5}{2}$	$+\infty$
f'	-	0	+
f	$+\infty$	$-\frac{9}{4}$	$+\infty$

Đồ thị : hình bên.

$$y = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 4 \end{cases};$$

$$x = 0 \Rightarrow y = 4$$



b) $(P_1) : y = x^2 - 5x + 6$

$(P_2) : y = -x^2 + 5x - 11$

Gọi $(d) : y = ax + b$ là tiếp tuyến chung của (P_1) và (P_2) .

Ta có hệ phương trình :

$$\begin{cases} x^2 - 5x + 6 = ax + b \\ -x^2 + 5x - 11 = ax + b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - (5+a)x + 6-b = 0 \\ x^2 + (a-5)x + b+11 = 0 \end{cases} \quad (1) \quad (2)$$

$$(1) \text{ và } (2) \text{ có nghiệm kép} \Leftrightarrow \begin{cases} \Delta_1 = 0 \\ \Delta_2 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (a+5)^2 - 4(6-b) = 0 \\ (a-5)^2 - 4(b+11) = 0 \end{cases} \quad (3) \quad (4)$$

$$\text{Lấy } (3) - (4) : 20a + 8b + 20 = 0 \Rightarrow 4b = -10(a+1)$$

$$(3) \Rightarrow a^2 + 10a + 25 - 10(a+1) - 24 = 0$$

$$\Rightarrow a^2 = 9 \Leftrightarrow \begin{cases} a = 3 & b = -10 \\ a = -3 & b = 5 \end{cases}$$

Vậy có hai tiếp tuyến chung của (P_1) và (P_2) là $(d) : y = 3x - 10$

$(d') : y = -3x + 5.$

14. ĐH CẦN THƠ

Cho hàm số $y = \frac{x^2 - 3x + 2}{x}$.

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2. Tìm trên đường thẳng $x = 1$ những điểm M sao cho từ M kẻ được 2 tiếp tuyến tới (C) và hai tiếp tuyến đó vuông góc với nhau.

Giải

$$y = f(x) = \frac{x^2 - 3x + 2}{x}$$

1. Khảo sát và vẽ đồ thị

MXĐ : $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$

$$f'(x) = \frac{x^2 - 2}{x^2}; \quad f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{2}$$


Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	$-\sqrt{2}$	0	$\sqrt{2}$	$+\infty$
f'	+	0	-	0	+
f	$-\infty$	$-(2\sqrt{2}+3)$	$+\infty$	$2\sqrt{2}-3$	$+\infty$

Tiệm cận đứng : $x = 0$.

Tiệm cận xiên : $y = x - 3$.

Đồ thị : (hình vẽ).



2. Xét điểm $(1; m)$ trên đường thẳng $x = 1$

Xét đường thẳng (d) đi qua M và có hệ số góc k :

$$(d) : y - m = k(x - 1)$$

Phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (C) :

$$\frac{x^2 - 3x + 2}{x} = k(x - 1) + m \Leftrightarrow x^2 - 3x + 2 = kx^2 - kx + mx$$

$$\Leftrightarrow (k - 1)x^2 + (3 + m - k)x - 2 = 0 \quad (1)$$

$$(1) \text{ có nghiệm kép } \Leftrightarrow \begin{cases} k \neq 1 \\ \Delta = 0 \end{cases}$$

$$\Delta = 0 \Rightarrow (3 + m - k)^2 + 8(k - 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow k^2 - 2(3 + m)k + 8k + (3 + m)^2 - 8 = 0 \quad (2)$$

Từ M kẻ được hai tiếp tuyến vuông góc đến (C)

$$\Leftrightarrow (2) \text{ có 2 nghiệm } k_1, k_2 \text{ thỏa mãn } k_1 k_2 = -1 \Leftrightarrow \frac{c}{a} = -1$$

$$\Leftrightarrow (3 + m)^2 - 8 = -1 \Leftrightarrow (3 + m)^2 = 7 \Leftrightarrow m = -3 \pm \sqrt{7}$$

Vậy có 2 điểm thỏa mãn đề bài là : $M(1; -3 \pm \sqrt{7})$.

15. ĐH ĐÀ NẴNG – KHỐI B – ĐỢT 1

Cho hàm số : $y = \frac{x^2 + x + 1}{x}$. Khảo sát hàm số trên.

Giải

Khảo sát hàm số : $y = \frac{x^2 + x + 1}{x}$

$$\text{MXĐ : } D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$$

$$f'(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2}$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$$


Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$	
f'	+	0	-	-	0	+
f	$-\infty$	CD -1	$+\infty$	3 CT	$+\infty$	

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \infty : \text{Tiệm cận đứng : } x = 0$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \infty : \text{Tiệm cận xiên : } y = x + 1.$$

Đồ thị : hình bên.



16. ĐH DÀ NẴNG - KHỐI A - ĐỢT 2

Cho hàm số : $y = x^3 - (2m + 1)x^2 + (m^2 - 3m + 2)x + 4$.

a) Khảo sát hàm số khi $m = 1$.

b) Trong trường hợp tổng quát, hãy xác định tất cả các tham số m để đồ thị của hàm số đã cho có điểm cực đại và điểm cực tiểu ở về hai phía của trục tung.

Giải

$$y = f(x) = x^3 - (2m + 1)x^2 + (m^2 - 3m + 2)x + 4$$

a) Khảo sát hàm số khi $m = 1$

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 4$$

Miền xác định : $D = \mathbb{R}$.

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee x = 2$$

Bảng biến thiên :


x	$-\infty$	0	2	$+\infty$			
f'		+	0	-	0	+	
f			4		0		$+\infty$
	$-\infty$						

$$f''(x) = 6x - 6$$

$$\Rightarrow f''(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1$$

Bảng xét tính lồi lõm :

x	$-\infty$	1	$+\infty$	
f''		-	0	+
f	lồi	Đ uôn	lõm	
		(1; 2)		



Đồ thị : hình bên.

b) $f'(x) = 3x^2 - 2(2m + 1)x + m^2 - 3m + 2$

Đồ thị hàm số có điểm cực đại và cực tiểu ở về hai phía của Oy.

$$\Leftrightarrow f'(x) \text{ có 2 nghiệm } x_1, x_2 \text{ trái dấu}$$

$$\Leftrightarrow ac < 0 \Leftrightarrow 3(m^2 - 3m + 2) < 0 \Leftrightarrow 1 < m < 2.$$

NĂM 2000

17. ĐH QUỐC GIA TP HCM – ĐỢT 1

Cho hàm số : $y = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.
2. Tìm tất cả những điểm M trên đồ thị sao cho tổng các khoảng cách từ M đến hai đường tiệm cận là nhỏ nhất.

Giải

$$y = f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1} \quad (C)$$

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị :

a) MXĐ : $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

$$S \text{ đạt GTNN} \Leftrightarrow S = \frac{2}{\sqrt[4]{2}} \Leftrightarrow \frac{1}{\sqrt{2|x-1|}} = |x-1|$$

$$\Leftrightarrow (x-1)^2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \Leftrightarrow \begin{cases} x-1 = \frac{1}{\sqrt[4]{2}} \\ x-1 = -\frac{1}{\sqrt[4]{2}} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 + \frac{1}{\sqrt[4]{2}} \\ x = 1 - \frac{1}{\sqrt[4]{2}} \end{cases}$$

Vậy có 2 điểm M thỏa mãn đề bài :

$$M_1 \begin{cases} x_1 = 1 + \frac{1}{\sqrt[4]{2}} \\ y_1 = 1 + \frac{1}{\sqrt[4]{2}} + \sqrt[4]{2} \end{cases}; \quad M_2 \begin{cases} x_2 = 1 - \frac{1}{\sqrt[4]{2}} \\ y_2 = 1 - \frac{1}{\sqrt[4]{2}} - \sqrt[4]{2} \end{cases}$$

18. ĐH QUỐC GIA TP HCM – ĐỢT 2

Cho hàm số : $y = mx^3 - 3mx^2 + (2m+1)x + 3 - m$ (C_m).

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị khi $m = 4$.
2. Tìm tất cả các giá trị của m sao cho hàm số có cực đại và cực tiểu. Chứng minh rằng khi đó đường thẳng nối hai điểm cực đại và cực tiểu của đồ thị (C_m) luôn đi qua một điểm cố định.

Giải

$$y = f(x) = mx^3 - 3mx^2 + (2m+1)x + 3 - m \quad (C_m)$$

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi $m = 4$

$$y = f(x) = 4x^3 - 12x^2 + 9x - 1$$

a) MXD : $D = \mathbb{R}$

b) $f'(x) = 12x^2 - 24x + 9$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow 4x^2 - 8x + 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{3}{2} \\ x = \frac{1}{2} \end{cases}$$

- c)** Bảng biến thiên :


x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	$\frac{3}{2}$	$+\infty$
f'	+	0	0	+
f	$-\infty$	CD 1	CT -1	$+\infty$

$$\text{CD : } f\left(\frac{1}{2}\right) = 1; \quad \text{CT : } f\left(\frac{3}{2}\right) = -1.$$

d) $f''(x) = 24x - 24; \quad f''(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1$

x	$-\infty$	1	$+\infty$
f''	-	0	+
f	lồi	0	lõm

Điểm uốn : $I(1; 0), \quad x = 0 \Rightarrow y = -1$



c) Đồ thị : hình bên.

2. a) $f(x) = mx^3 - 3mx^2 + (2m + 1)x + 3 - m$

$f'(x) = 3mx^2 - 6mx + 2m + 1$

$f(x)$ có cực đại và cực tiểu $\Leftrightarrow \begin{cases} a \neq 0 \\ \Delta' > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 0 \\ 9m^2 - 3m(2m + 1) > 0 \end{cases}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 0 \\ 3m^2 - 3m > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 0 \\ m > 1 \end{cases}$

b) Ta có : $y = f(x)$

$$y = \left(\frac{x-1}{3} \right) f'(x) + \frac{-2m+2}{3}x + \frac{10-m}{3}$$

Vậy đường thẳng d : $y = \frac{-2m+2}{3}x + \frac{10-m}{3}$ là đường thẳng đi qua các điểm cực trị.

c) Xét điểm cố định $M_0(x_0; y_0)$

$M_0 \in (d) \forall m \Leftrightarrow y_0 = \frac{-2m+2}{3}x_0 + \frac{10-m}{3}, \quad \forall m$

$\Leftrightarrow m(2x_0 + 1) + (3y_0 - 2x_0 - 10) = 0; \forall m$

$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x_0 + 1 = 0 \\ 3y_0 - 2x_0 - 10 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = -\frac{1}{2} \\ y_0 = 3 \end{cases}$

Vậy (d) luôn luôn đi qua điểm cố định $M_0\left(-\frac{1}{2}, 3\right)$.

19. ĐH SƯ PHẠM TP HCM – KHỐI A, B

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số : $y = \frac{x^2 + 2x + 2}{x + 1}$

2. Gọi I là tâm đối xứng của đồ thị (C) và M là một điểm trên (C). Tiếp tuyến tại M cắt hai đường tiệm cận tại A, B. Chứng minh rằng M là trung điểm của đoạn AB và diện tích tam giác IAB không phụ thuộc vào vị trí điểm M trên (C).

Giải

$$y = f(x) = \frac{x^2 + 2x + 2}{x + 1}$$

1. a) MXĐ : $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

b) $f'(x) = \frac{x^2 + 2x}{(x+1)^2}$; $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -2 \end{cases}$

c) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$; $y = x + 1 + \frac{1}{x+1}$.

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x+1} = 0$: Tiệm cận xiên : $y = x + 1$.

$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \infty$: Tiệm cận đứng : $x = -1$.


d) Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	-2	-1	0	$+\infty$					
f'	+	0	-	-	0	+				
f	$-\infty$	$\nearrow$	-2	$\searrow$	$-\infty$	$+\infty$	$\nearrow$	2	$\searrow$	$+\infty$

CD : $f(-1) = -2$;

CT : $f(0) = 2$.

e) Đồ thị :



2. Giao điểm hai tiệm cận : $I(-1; 0)$.

Xét điểm $M_0(x_0; y_0) \in (C)$.

Phương trình tiếp tuyến tại M_0 : $y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$ (d)

$$(d) \cap \text{TCĐ} = \left\{ A\left(-1, \frac{2}{x_0 + 1}\right) \right\}.$$

$$(d) \cap \text{TCX} = \{B(2x_0 + 1; 2x_0 + 2)\}.$$

a) Ta có : $\frac{x_A + x_B}{2} = x_0$ và A, B, M thẳng hàng $\Rightarrow$ M là trung điểm AB.

$$b) \quad S_{IAB} = \frac{1}{2} |(y_A - y_I)(x_B - x_I)| = \frac{1}{2} \left| \begin{pmatrix} 2 \\ x_0 + 1 \end{pmatrix} (2x_0 + 2) \right| = 2.$$

Vậy : $S_{IAB} = 2$ dvdt.

20. ĐH SƯ PHẠM TPHCM – KHỐI D, E

- Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số : $y = \frac{x^2 + 3x + 3}{x + 1}$
- Tại hai điểm A, B trên hai nhánh khác nhau của (C) cho độ dài đoạn AB ngắn nhất

Giải

$$y = f(x) = \frac{x^2 + 3x + 3}{x + 1}$$

- Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị :

a) Miền xác định : $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

$$b) \quad f'(x) = \frac{x^2 + 2x}{(x + 1)^2}; \quad f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -2 \end{cases}$$

$$c) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty; \quad y = x + 2 + \frac{1}{x + 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x + 1} \right) = 0 : \text{Tiệm cận xiên : } y = x + 2.$$

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \infty : \text{Tiệm cận đứng : } x = -1.$$


d) Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	-2	-1	0	$+\infty$
f'	+	0	-	0	+
f	$-\infty$	CD -1	$+\infty$	CT 3	$+\infty$

$$\text{CD : } f(-2) = -1;$$

$$\text{CT : } f(0) = 3.$$

e) Đồ thị : hình bên



2. Xét hai điểm A, B trên hai nhánh phân biệt của đồ thị

$$\text{Ta có : } A \begin{cases} x_A = 1 - \alpha \\ y_A = 1 - \alpha + \frac{1}{\alpha} \end{cases} \quad (\alpha > 0)$$

$$B \begin{cases} x_B = 1 + \beta \\ y_B = 1 + \beta + \frac{1}{\beta} \end{cases} \quad (\beta > 0)$$

$$\begin{aligned} AB^2 &= (x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 = (\beta + \alpha)^2 + \left(\beta + \alpha + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\alpha} \right)^2 \\ &= 2(\beta + \alpha)^2 + \left(\frac{1}{\beta} + \frac{1}{\alpha} \right)^2 + 2(\beta + \alpha) \left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} \right). \end{aligned}$$

$$\text{Theo Côsi ta có : } AB^2 \geq 8\alpha\beta + \frac{4}{\alpha\beta} + 8$$

$$AB^2 \geq 2\sqrt{8\alpha\beta \cdot \frac{4}{\alpha\beta}} + 8 = 8\sqrt{2} + 8.$$

$$AB \text{ đạt GTNN} \Leftrightarrow AB = \sqrt{8(\sqrt{2} + 1)}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = \beta \\ 8\alpha\beta = \frac{4}{\alpha\beta} \end{cases} \Leftrightarrow \alpha = \beta = \frac{1}{\sqrt[4]{2}}$$

Vậy hai điểm cần tìm là :

$$A \begin{cases} x_A = -1 - \frac{1}{\sqrt[4]{2}} \\ y_A = 1 - \frac{1}{\sqrt[4]{2}} - \sqrt[4]{2} \end{cases} ; B \begin{cases} x_A = -1 + \frac{1}{\sqrt[4]{2}} \\ y_A = -1 + \frac{1}{\sqrt[4]{2}} + \sqrt[4]{2} \end{cases}$$

21. HỌC VIỆN NGÂN HÀNG – PHÂN VIỆN TP HCM

Cho hàm số : $y = \frac{x^2 - 5x + 5}{x - 1}$ (C).

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.

2. Từ (C), suy ra đồ thị hàm số $y = \frac{|x^2 - 5x + 5|}{x - 1}$.

Biệt luận theo m số nghiệm t của phương trình :

$$|4t - 5 \cdot 2^t + 5| = m(2^t - 1).$$

Giải

$$y = \frac{x^2 - 5x + 5}{x - 1} \quad (C)$$

1. Khảo sát và vẽ đồ thị (C)

a) MXD : $D \setminus \{1\}$.

b) $f'(x) = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2}$; $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$

c) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$; $y = x - 4 + \left(\frac{1}{x-1}\right)$

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x-1} = 0$: Tiệm cận xiên : $y = x - 4$.

$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty$: Tiệm cận đứng : $x = 1$.


d) Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$	
f'	+	0	-	-	0	+
f	$-\infty$	CD -5	$+\infty$	-1	CT	$+\infty$

CD : $f(0) = -5$;

CT : $f(2) = -1$.

e) Đồ thị : hình bên.



2. a) (C') : $y = \frac{|x^2 - 5x + 5|}{x - 1}$

$x^2 - 5x + 5 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{5 - \sqrt{5}}{2} \\ x_2 = \frac{5 + \sqrt{5}}{2} \end{cases}$


x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$
$x^2 - 5x + 5$	+	0	0	+

(C') : $y = \begin{cases} f(x) & x \in (-\infty, x_1) \cup [x_2, +\infty) \\ -f(x) & x \in (x_1, x_2) \end{cases}$

(C') suy ra từ (C) bằng cách giữ nguyên phần có $x \in (-\infty; x_1) \cup [x_2; +\infty)$.

Và lấy đối xứng qua Ox của phần có $x \in (x_1, x_2)$.

Ta có đồ thị (C') như sau :



b) Xét phương trình : $|4^t - 5.2^t + 5| = m(2^t - 1)$ (1)

Đặt : $x = 2^t, (x > 0)$ (1) $\Leftrightarrow \frac{|x^2 - 5x + 5|}{x - 1} = m.$

Số nghiệm của phương trình (1) chính là số giao điểm của đường thẳng $\Delta : y = m$ và phần đồ thị có $x > 0$. Theo đồ thị ta có :

m	Số nghiệm của phương trình
$+\infty$	2
1	3
	4
0	2
	0
-5	0
$-\infty$	1

22. ĐH Y DƯỢC TPHCM

Cho hàm số : $y = \frac{2x^2 + (1 - m)x + 1 + m}{-x + m} \quad (C_m).$

- Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi $m = 1$.
- Chứng minh rằng với mọi $m \neq -1$, các đường (C_m) tiếp xúc với một đường thẳng cố định tại một điểm cố định. Xác định phương trình đường thẳng cố định đó.

Giải

$$y = \frac{2x^2 + (1 - m)x + 1 + m}{-x + m} \quad (C_m).$$

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi $m = 1$

$$y = f(x) = \frac{2x^2 + 2}{-x + 1}$$

a) MXĐ : $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$

b) $f'(x) = \frac{-2x^2 + 4x + 2}{(-x + 1)^2}$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = 1 - \sqrt{2} \\ x_2 = 1 + \sqrt{2} \end{cases}$$

c) $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$; $y = -2x - 2 + \frac{4}{-x + 1}$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{4}{-x + 1} = 0 : \text{Tiệm cận xiên} : y = -2x - 2.$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty : \text{Tiệm cận đứng} : x = 1.$$

d) Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	x_1		1		x_2	$+\infty$	
f'		-	0	+		+	0	-
f	$+\infty$			$+\infty$		$-\infty$		$-\infty$


$+\infty$
 $\searrow$
 y_1
 $\nearrow$
 $+\infty$

$-\infty$
 $\nearrow$
 y_2
 $\searrow$
 $-\infty$

$$y_1 = f(x_1) = -4x_1 = -4(1 - \sqrt{2}).$$

$$y_2 = f(x_2) = -4x_2 = -4(1 + \sqrt{2}).$$

e) Đồ thị :



2. Xét điểm cố định $M_0(x_0; y_0)$, $M_0 \in (C_m) \forall m$

$$\Leftrightarrow y_0 = \frac{2x_0^2 + (1 - m)x_0 + 1 + m}{-x_0 + m} \quad (m \neq x_0)$$

$$\Leftrightarrow -x_0 y_0 + m y_0 = 2x_0^2 + (1-m)x_0 + 1 + x_0$$

$$\Leftrightarrow m(y_0 + x_0 - 1) = (2x_0^2 + x_0 y_0 + x_0 + 1) = 0, \quad \forall m \neq x_0.$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y_0 + x_0 - 1 = 0 \\ 2x_0^2 + x_0 y_0 + x_0 + 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = -1 \\ y_0 = 2 \end{cases}, \quad (m \neq -1).$$

Ta có : $f'(x) = \frac{-2x^2 + 4mx - m^2 + 2m + 1}{(-x + m)^2}$.

$$f'(-1) = -1.$$

Phương trình tiếp tuyến tại $M_0(-1; 2)$.

$$y - 2 = f'(-1)(x + 1) \quad \Leftrightarrow \quad y = -x + 1 : \quad (d)$$

Vậy : $\forall m \neq -1$, (C_m) luôn tiếp xúc với đường thẳng cố định $(d): y = -x + 1$ tại điểm cố định $M_0(-1; 2)$.

23. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BỒI DƯỠNG CÁN BỘ Y TẾ

Cho hàm số : $y = \frac{x^2 - m(m+1)x + m^3 + 1}{x - m}$; trong đó x là biến số, m là tham số.

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho khi $m = 1$.
2. Chứng minh rằng đồ thị của hàm số đã cho luôn có các điểm cực đại, cực tiểu với mọi giá trị của m . Xác định tọa độ các điểm cực trị đó.
3. Chứng tỏ rằng chỉ có một điểm A duy nhất trên mặt phẳng tọa độ sao cho nó là điểm cực đại của đồ thị ứng với một giá trị thích hợp của m và cũng là điểm cực tiểu của đồ thị ứng với một giá trị thích hợp khác. Tìm tọa độ của A.

Giải

$$y = f(x) = \frac{x^2 - m(m+1)x + m^3 + 1}{x - m}$$

1. $m = 1 : f(x) = \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

a) MXD : $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$

b) $f'(x) = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2}; \quad f'(x) = 0 \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$

c) $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0; \quad y = x - 1 + \frac{1}{x-1}$


$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x-1} \right) = 0 : \text{Tiệm cận xiên} : y = x - 1.$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty : \text{Tiệm cận đứng} : x = 1.$$

d) Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$	
f'	+	0	-	-	0	+
f	$-\infty$	-2	$+\infty$	2	$+\infty$	

e) Đồ thị : hình bên.



$$2. f'(x) = \frac{x^2 - 2mx + m^2 - 1}{(x - m)^2}$$

$$\Delta' = 1 > 0 \Rightarrow f'(x) \text{ có hai nghiệm } x_1, x_2.$$

$\Rightarrow f(x)$ luôn có một điểm cực đại và một điểm cực tiểu.

$$\text{Tọa độ điểm cực đại : } M_1 \begin{cases} x = m - 1 \\ y = 2x - m^2 - m \end{cases}$$

$$\text{Tọa độ điểm cực tiểu : } M_2 \begin{cases} x = m + 1 \\ y = 2x - m^2 - m \end{cases}$$

$$\text{Ta tìm quỹ tích điểm cực đại : } M_1 \begin{cases} x = m - 1 & (1) \\ y = 2x - m^2 - m & (2) \end{cases}$$

$$(1) \Rightarrow m = x + 1$$

$$(2) \Rightarrow y = 2x - (x + 1)^2 - (x + 1)$$

$$y = -x^2 - x - 2 \quad (d).$$

$$\text{Ta tìm quỹ tích điểm cực tiểu : } M_2 \begin{cases} x = m + 1 & (1) \\ y = 2x - m^2 - m & (2) \end{cases}$$

$$(1) \Rightarrow m = x - 1$$

$$(2) \Rightarrow y = 2x - (x - 1)^2 - (x - 1)$$

$$y = -x^2 + 3x \quad (d').$$

3. Điểm A là giao điểm của (d) và (d')

Phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (d') :

$$-x^2 - x - 2 = -x^2 + 3x \Leftrightarrow x = -\frac{1}{2}.$$

$$A \in (d') \Rightarrow y = -\frac{7}{4}.$$

Vậy điểm cần tìm là : $A\left(-\frac{1}{2}; -\frac{7}{4}\right)$.

24. HỌC VIỆN QUAN HỆ QUỐC TẾ

Cho hàm số : $y = 4x^3 - mx^2 - 3x + m$.

1. Chứng minh rằng với mọi m hàm số luôn luôn có cực đại và cực tiểu, đồng thời chứng minh rằng hoành độ cực đại và hoành độ cực tiểu của hàm số luôn luôn trái dấu.
2. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số ứng với $m = 0$.
3. Phương trình : $4x^3 - 3x = \sqrt{1 - x^2}$ có bao nhiêu nghiệm ?

Giải

$$y = f(x) = 4x^3 - mx^2 - 3x + m.$$

1. Ta có : $f'(x) = 12x^2 - 2mx - 3$.

$$f'(x) \text{ có : } \Delta < 0, \forall m.$$

$$\Rightarrow f'(x) \text{ có 2 nghiệm } x_1, x_2 \text{ trái dấu } \forall m.$$

$$\Rightarrow \text{Với mọi m hàm số luôn luôn có cực đại và cực tiểu và hoành độ cực đại và cực tiểu luôn luôn trái dấu.}$$

2. $m = 0 : f(x) = 4x^3 - 3x$.

a) MXĐ : $D = \mathbb{R}$.

b) $f'(x) = 12x^2 - 3; \quad f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \pm \frac{1}{2}.$

c) Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
f'	+	0	0	+
f		CD	-1	$+\infty$
		$\nearrow$	$\searrow$	$\nearrow$
			CT	


$$CD : f\left(-\frac{1}{2}\right) = 1; \quad CT : f\left(\frac{1}{2}\right) = -1.$$

d) $f''(x) = 24x.$

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0.$$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
f''	-	0	+
f	Lồi	0	Lõm

Điểm uốn : $O(0; 0).$



e) Đồ thị : hình bên.

3. Phương trình : $4x^3 - 3x = \sqrt{1-x^2}$ (1) có bao nhiêu nghiệm ?

Ta có : $y = \sqrt{1-x^2}$

$$(C') \Leftrightarrow \begin{cases} y \geq 0 \\ y^2 + x^2 = 1 \end{cases}$$

Vậy đồ thị (C') là nửa trên của đường tròn O bán kính $R = 1$.

Theo đồ thị (C') cắt (C) tại 3 điểm. Vậy phương trình (1) có 3 nghiệm.

25. ĐH NGOẠI THƯƠNG - KHÔI D

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số : $y = x^3 - 6x^2 + 9x - 1$.

2. Từ một điểm bất kì trên đường thẳng $x = 2$, ta có thể kẻ được bao nhiêu tiếp tuyến tới đồ thị của hàm số ?

Giải

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

a) MXĐ : $D = \mathbb{R}.$

b) $f'(x) = 3x^2 - 12x + 9$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 3 \end{cases}$$

c) Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$
f'	+	0	0	+
f	$-\infty$	3	-1	$+\infty$

(CD) CT


d) $f''(x) = 6x - 12$

$$f''(x) = 0 \quad x = 2$$

x	2	+
f''	0	+
f	Lồi	Lõm

Điểm uốn : $(2; 1)$

$$x = 0 \Rightarrow y = -1$$



e) Đồ thị : hình bên.

2. Xét điểm $M(2, m)$ trên đường thẳng $x = 2$

Xét đường thẳng (d) đi qua M : (d) : $y - m = k(x - 2)$

$$y = k(x - 2) + m$$

(d) tiếp xúc với (C) $\Leftrightarrow$ Hệ phương trình sau có nghiệm :

$$\begin{cases} x^3 - 6x^2 + 9x - 1 = k(x - 2) + m \\ 3x^2 - 12x + 9 = k \end{cases}$$

$\Leftrightarrow$ Phương trình sau có nghiệm :

$$x^3 - 6x^2 + 9x - 1 = (3x^2 - 12x + 9)(x - 2) + m \quad (1)$$

Ta có : (1) $\Leftrightarrow -2x^3 + 12x^2 - 24x + 17 = m$

Đặt : $g(x) = -2x^3 + 12x^2 - 24x + 17$

Ta có : $g'(x) = -6x^2 + 24x - 24 = -6(x - 2)^2 \leq 0$.

Ta có bảng biến thiên của $g(x)$:

x	$-\infty$	$+\infty$
g		-
g	$+\infty$	$-\infty$

Vậy phương trình (1) luôn có một nghiệm x duy nhất, từ đó suy ra từ $M(2, m)$ ta luôn kẻ được một tiếp tuyến duy nhất đến (C).

26. ĐH AN NINH - KHỐI A - BAN B

Cho hàm số $y = \frac{2x^2 + (1 - m)x + m + 1}{-x + m} \quad (C_m)$.

1. Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số khi $m = 1$.

2. Chứng minh rằng với mọi $m \neq -1$, các đường cong (C_m) đều tiếp xúc với một đường thẳng cố định tại một điểm cố định.

Giải

1. Khi $m = 1$, ta có : $y = \frac{2x^2 + 2}{-x + 1} = -2x - 2 + \frac{4}{-x + 1}$

MXĐ : $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$

Đạo hàm : $y' = -2 + \frac{4}{(-x + 1)^2}$

$$y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 - \sqrt{2} = x_1 \\ x = 1 + \sqrt{2} = x_2 \end{cases}$$

$$y_1 = f(x_1) = -4(1 - \sqrt{2})$$

$$y_2 = f(x_2) = -4(1 + \sqrt{2})$$


Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	x_1	1	x_2	$+\infty$	
f'	-	0	+	+	0	-
f	$+\infty$	$\swarrow$ CT $\searrow$ $+\infty$		$\swarrow$ CD $\searrow$ $-\infty$		

Tiệm cận đứng : $x = 1$.

Tiệm cận xiên : $y = -2x - 2$.

Đồ thị : hình bên.



2. Ta chứng minh hai điều :

i) Đồ thị (C_m) đi qua điểm cố định.

ii) Đạo hàm của hàm số tại điểm cố định đó là hằng số.

$$\begin{aligned} \text{i) } y = f_m(x) &\Leftrightarrow \begin{cases} (x + y - 1)m = 2x^2 + x + 1 + xy \\ x \neq m \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x + y - 1 = 0 \\ 2x^2 + x + 1 + xy = 0 \\ x \neq m \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ y = 2 \\ m \neq -1 \end{cases} \end{aligned}$$

Vậy (C_m) luôn đi qua $A(-1; 2) \forall m \neq -1$.

ii) Khi $x = -1$ thì : $y' = \frac{-2x^2 + 4mx - m^2 + 2m + 1}{(-x + m)^2}$

trở thành : $y' = \frac{-2 - 4m - m^2 + 2m + 1}{(1 + m)^2} = -1$

Phương trình tiếp tuyến với (C_m) luôn tiếp xúc với đường thẳng cố định (d) tại điểm $A(-1; 2)$ cố định.

27. CAO ĐẲNG MARKETING

Cho hàm số : $y = x(x - 3)^2$ có đồ thị (C).

- Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
- Viết phương trình tiếp tuyến với (C) tại điểm A(4; 4).
- Biện luận theo m số nghiệm của phương trình : $x^3 - 6x^2 + 9x - m = 0$.

Giải

- Khảo sát sự biến thiên và vẽ (C)

Hàm số : $y = x(x - 3)^2 \Leftrightarrow y = x^3 - 6x^2 + 9x$

• MXĐ : $D = \mathbb{R}$

• Đạo hàm : $y' = 3x^2 - 12x + 9$

* $y' = 0 \Leftrightarrow x = 1 \vee x = 3$.

* Khi $x = 1$ thì $y = 4$ (cực đại).

Khi $x = 3$ thì $y = 0$ (cực tiểu).

• Đạo hàm cấp hai : $y'' = 6x - 12$.

* $y'' = 0 \Leftrightarrow x = 2$

* Khi $x = 2$ thì $y = 2$ (điểm uốn).

• Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	1	2	3	$+\infty$	
y'	+	0	-	-	0	+
y	$-\infty$	1	2	0	$+\infty$	

• Giới hạn :


* Khi $x \rightarrow -\infty$, ta có : $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 = -\infty$.

* Khi $x \rightarrow +\infty$, ta có : $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 = +\infty$.

• Đồ thị (C) là đường cong bậc ba, có điểm cực đại (1; 4), điểm cực tiểu (3; 0), điểm uốn (2; 2), qua O(0; 0).

- Phương trình của tiếp tuyến của (C) tại A(4; 4).

Ta thấy, khi $x = 4$ thì $y = 4$ nên $A(4; 4) \in (C)$.



Tiếp tuyến của (C) tại A có phương trình : $y - y_A = y'(x_A)(x - x_A)$ (1)

Mà : $y'(x_A) = 3x_A^2 - 12x_A + 9 = 9$ nên (1) cho : $y - 4 = 9(x - 4)$

$$\Leftrightarrow y = 9x - 32.$$

Đó là phương trình phải tìm.

c) Biện luận theo m số nghiệm của phương trình : $x^3 - 6x^2 + 9x - m = 0$ (2)

Phương trình có thể viết : $x^3 - 6x^2 + 9x = m$.

Đặt : $y = x^3 - 6x^2 + 9x$ có đồ thị (C) đã vẽ ở trên, thì $y = m$ có đồ thị là đường thẳng (cắt Oy tại M có tung độ m). Ta thấy : số nghiệm của phương trình trên là số giao điểm của (C) và (d). Trên đồ thị, ta có :

- * Khi $m > 1$ thì (d) cắt (C) tại 1 điểm đơn : (2) có 1 nghiệm đơn.
- * Khi $m = 4$ thì (d) tiếp xúc với (C) tại điểm cố định có hoành độ $x = 1$ và cắt (C) tại điểm A : (2) có 1 nghiệm kép $x = 1$ và một nghiệm đơn $x \neq 1$.
- * Khi $0 < m < 4$: thì (d) cắt (C) tại 3 điểm phân biệt : (2) có 3 nghiệm đơn.
- * Khi $0 = m$: thì (d) cắt (C) tại O và tiếp xúc Ox tại (3; 0), (2) có một nghiệm đơn $x = 0$ và một nghiệm kép $x = 3$.
- * Khi $0 > m$: thì (d) cắt (C) tại một điểm đơn : (2) có một nghiệm đơn.

28. CAO ĐẲNG SỰ PHẠM MẪU GIÁO TRUNG ƯƠNG 3

Cho hàm số : $y = x^3 + (m - 1)x^2 - (2m + 1)x - 2$ có đồ thị là (C_m) trong đó m là tham số thực.

1. Với giá trị nào của m thì hàm số đạt cực trị tại các điểm có hoành độ x_1, x_2 thỏa mãn : $x_1^2 + x_2^2 = 2$.
2. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi $m = 1$.
3. Với giá trị nào của m thì đồ thị (C_m) tiếp xúc với trục hoành.

Giải

1. Giá trị của m :

$$\text{Hàm số : } y = x^3 + (m - 1)x^2 - (2m + 1)x - 2 \quad (1)$$

$$\text{Đạo hàm : } y' = 3x^2 + 2(m - 1)x - (2m + 1) \quad (2)$$

Hàm số đạt cực trị tại x_1 và x_2

$$\Leftrightarrow x_1 \text{ và } x_2 \text{ là hai nghiệm phân biệt của (2)}$$

$$\Leftrightarrow y' = 0 \text{ có biệt số } \Delta' = (m - 1)^2 + 3(2m + 1) > 0$$

$$\Leftrightarrow (m + 2)^2 > 0 \Leftrightarrow m \neq -2 \quad (3)$$

Mặt khác : x_1, x_2 thỏa mãn : $x_1^2 + x_2^2 = 2$ (4)

Mà (2) có 2 nghiệm : $x_1 = 1 \vee x_2 = \frac{-2m-1}{3}$

nên (4) $\Leftrightarrow 1^2 + \left(\frac{2m+1}{3}\right)^2 = 2 \Leftrightarrow m^2 + m - 2 = 0$

$\Leftrightarrow m = 1 \vee m = -2.$

So với (3) ta chỉ nhận $m = 1$.

- *Chú ý :* Có thể dùng định lí Viét để giải (2) với :
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{2(m-1)}{3} \\ x_1 x_2 = -\frac{(2m+1)}{3} \end{cases}$$

sau khi biến đổi $x_1^2 + x_2^2 = 2$ thành : $(x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = 2$.

2. Khảo sát và vẽ (C_1) khi $m = 1$

Khi $m = 1$ thì hàm số trở thành : $y = x^3 - 3x - 2$

- MXĐ : $D = \mathbb{R}$

- Đạo hàm : $y' = 3x^2 - 3$

* $y' = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$

* Khi $x = -1$ thì $y = 0$ (cực đại).

* Khi $x = 1$ thì $y = -4$ (cực tiểu).


- Đạo hàm $y'' = 6x$

* $y'' = 0 \Leftrightarrow x = 0$.

* $x = 0, y = -2$ (điểm uốn).

- Giới hạn : $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = \lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3) = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = \lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3) = +\infty$.

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$	
y'	+	0	-	-	0	+
y	$-\infty$	0	2	-4	$+\infty$	



- Đồ thị (C_1) là đường cong bậc ba có điểm cực đại $(-1, 0)$, điểm cực tiểu $(1; -4)$, điểm uốn $(0; -2)$, qua các điểm $(-2; -4)$, $(2; 0)$.

3. Giá trị của m : (C_m) tiếp xúc với trục hoành $\Leftrightarrow y(x_1) = 0 \vee y(x_2) = 0$.

Ta có hai trường hợp :

i) $x_1 = 1$. Lúc đó : $y(x_1) = 1 + (m - 1) - (2m + 1) - 2 = -m - 3$

Do đó : $y(x_1) = 0 \Leftrightarrow m = -3$

ii) $x_2 = -\frac{2m+1}{3}$ Lúc đó : $y(x_2) = 0$

$$\Leftrightarrow -\left(\frac{2m+1}{3}\right)^3 + (m-1)\left(\frac{2m+1}{3}\right)^2 + \frac{(2m+1)^2}{3} - 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow -(2m+1)^3 + 3(m-1)(2m+1)^2 + 9(2m+1)^2 - 54 = 0$$

$$\Leftrightarrow 4m^3 + 24m^2 + 21m - 49 = 0$$

$$\Leftrightarrow (m-1)(2m+7)^2 = 0 \Leftrightarrow m = 1 \vee m = -\frac{7}{2}$$

Vậy : khi $m = -3 \vee m = 1 \vee m = -\frac{7}{2}$ thì (C_m) tiếp xúc với trục hoành.

29. CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

Cho họ đường cong (C_m) : $y = 2x^3 + 3(m-1)x^2 + 6(m-2)x - 1$
(m là tham số)

1. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của đường cong (C_m) ứng với $m = 2$.
2. Viết phương trình tất cả các tiếp tuyến của (C) biết chúng đi qua điểm $A(0; -1)$.
3. Định m để (C_m) có 2 cực trị và đường thẳng nối hai điểm cực trị vuông góc với đường thẳng $y = x$.

Giải

1. Khảo sát và vẽ (C) khi $m = 2$

Hàm số : $y = 2x^3 + 3(m-1)x^2 + 6(m-2)x - 1$.

Khi $m = 2$, ta có : $y = 2x^3 + 3x^2 - 1$

• MXĐ : $D = \mathbb{R}$

• Đạo hàm : $y' = 6x^2 + 6x$

* $y' = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee x = -1$

* Khi $x = 0$ thì $y = -1$ (cực tiểu).

* Khi $x = -1$ thì $y = 0$ (cực đại).

- Đạo hàm cấp hai : $y'' = 12x + 6$

$$y'' = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{2}$$


* Khi $x = -\frac{1}{2}$ thì $y = -\frac{1}{2}$ (điểm uốn).

- Giới hạn : $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (2x^3) = \pm\infty$.

- Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	-1	0	$+\infty$
y'	+	0	-	+
y	$-\infty$	0	-1	$+\infty$

- Đồ thị (C) là đường cong bậc ba, có điểm cực đại $(-1; 0)$, điểm cực tiểu $(0; -1)$, điểm uốn $(-\frac{1}{2}; -\frac{1}{2})$.



2. Phương trình tiếp tuyến qua $A(0; -1)$

Gọi k là hệ số góc của tiếp tuyến (d) phải tìm. Phương trình của tiếp tuyến ấy : $y = kx - 1$

Phương trình hoành độ giao điểm của (C) và (d) : $2x^3 + 3x^2 - 1 = kx - 1$

$$\Leftrightarrow x(2x^2 + 3x - k) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 & (1) \\ 2x^2 + 3x - k = 0 & (2) \end{cases}$$

$$(d) \text{ là tiếp tuyến của } (C) \Leftrightarrow \begin{cases} (2) \text{ có nghiệm } x = 0 \\ (2) \text{ có nghiệm kép} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k = 0 \\ k = -\frac{9}{8} \end{cases}$$

Vậy : qua A có hai tiếp tuyến : $y = -1$; $y = -\frac{9}{8}x - 1$.

3. Định m để cho (C_m) :

- i) Có 2 cực trị :

(C_m) có 2 cực trị $\Leftrightarrow y' = 0$ có 2 nghiệm phân biệt.

$$\Leftrightarrow x^2 + (m-1)x + m-2 = 0 \text{ có : } (m-1)^2 - 4(m-2) > 0$$

$$\Leftrightarrow (m-3)^2 > 0 \Leftrightarrow m \neq 3 \quad (3)$$

- ii) Đường thẳng nối 2 cực trị có phương trình là phần dư của y chia cho y' . Ta có phần dư là : $-(m-3)^2x - m^2 + 3m - 3$

Phương trình của đường thẳng nối hai điểm cực trị :

$$y = -(m - 3)^2 x - m^2 + 3m - 3.$$

Đường thẳng này vuông góc với đường thẳng $y = x$

$$\Leftrightarrow -(m - 3)^2 \cdot 1 = -1 \quad \Leftrightarrow \begin{cases} m = 2 \\ m = 4 \end{cases}$$

Giá trị này của m thỏa mãn (3).

Vậy : khi $m = 2 \vee m = 4$ thì (C_m) có 2 cực trị và đường thẳng nối 2 cực trị vuông góc với đường thẳng $y = x$.

30. ĐH THỦY SẢN

Cho hàm số : $y = \frac{x^2 - mx + 2m - 2}{x - 1}$ có đồ thị (C_m) .

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi $m = 2$.
2. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị (C_m) có điểm cực đại và cực tiểu. Chứng minh rằng các điểm cực đại và cực tiểu của đồ thị (C_m) luôn luôn nằm trên một parabol cố định khi m thay đổi.

Giải

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số : $y = \frac{x^2 - mx + 2m - 2}{x - 1}$

Khi $m = 2$ trở thành : $y = \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1} \Leftrightarrow y = x - 1 + \frac{1}{x - 1}$

- MXĐ : $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

- Đạo hàm : $y' = 1 - \frac{1}{(x - 1)^2}$

- * $y' = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee x = 2$

- * Khi $x = 0$ thì $y = -2$ (cực đại)

- * Khi $x = 2$ thì $y = 2$ (cực tiểu)

- Giới hạn :

- * $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(x - 1 + \frac{1}{x - 1} \right) = \pm\infty$.

- * Khi $x \rightarrow \pm\infty$, $\frac{1}{x - 1} \rightarrow 0$, nên : $y = x - 1$ là tiệm cận xiên.

- * $\lim_{x \rightarrow 1} y = \lim_{x \rightarrow 1} \left(x - 1 + \frac{1}{x - 1} \right) = \pm\infty$: tiệm cận đứng : $x = 1$.

- Bảng biến thiên :


x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$	
y'	+	0	-	-	0	+
y	$-\infty$	-2	$+\infty$	2	$+\infty$	

• Đồ thị (C) là một hyperbol xiên góc nhận $x = 1$ làm đường tiệm cận đứng, $y = x - 1$ làm tiệm cận xiên, $(0; -2)$ làm điểm cực đại, $(2; 2)$ làm điểm cực tiểu.

2. Tìm m để (C_m) có điểm cực đại và điểm cực tiểu

Hàm số : $y = \frac{x^2 - mx + 2m - 2}{x - 1}$;

có đạo hàm : $y' = \frac{x^2 - 2x - m + 2}{(x - 1)^2}$



y có cực đại và cực tiểu $\Leftrightarrow y' = 0$ có 2 nghiệm phân biệt.

$$\Leftrightarrow \Delta' = m - 1 > 0$$

$$\Leftrightarrow m > 1.$$

• Chứng minh các điểm cực đại và cực tiểu nằm trên một parabol cố định :

Gọi x_i là hai nghiệm của $y' = 0$

Ta có : $x_i = 1 \pm \sqrt{m - 1} \Leftrightarrow m = (x_i - 1)^2 + 1$

Mà điểm cực trị thuộc đồ thị nên : $y_i = \frac{x_i^2 - (x_i - 2)m - 2}{x_i - 1}$

Thay m ở (1) vào, ta được :

$$y_i = \frac{x_i^2 - (x_i - 2)[(x_i - 1)^2 + 1] - 2}{x_i - 1}$$

$$y_i = \frac{-x_i^3 + 5x_i^2 - 6x_i + 2}{x_i - 1} \quad (x_i \neq 1)$$

$$\Leftrightarrow y_i = -x_i^2 + 4x_i - 2 \quad (x_i \neq 1)$$

Tọa độ (x_i, y_i) của điểm cực trị thỏa mãn hàm số : $y = -x^2 + 4x - 2$ nên điểm cực đại và điểm cực tiểu của (C_m) thuộc parabol cố định :

$$y = -x^2 + 4x - 2 \quad (x \neq 1).$$

31. ĐH HÙNG VƯƠNG – KHỐI A

Cho hàm số : $y = x^3 + (1 - m)x^2 + 2x + m + 2$.

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số y khi $m = -2$.
2. Tìm các điểm mà đồ thị của hàm số y luôn đi qua với mọi m . Xác định các giá trị của m để đồ thị tiếp xúc với trục hoành.

Giải

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị :

Hàm số : $y = x^3 + (1 - m)x^2 + 2x + m + 2$

Khi $m = -2$, ta có : $y = x^3 + 3x^2 + 2x$

• MXĐ : $D = \mathbb{R}$

• Đạo hàm : $y' = 3x^2 + 6x + 2$

$$* y' = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{3 + \sqrt{3}}{3} \vee x = -\frac{3 - \sqrt{3}}{3}$$

$$* \text{ Khi } x = -\frac{3 + \sqrt{3}}{3} \text{ thì } y = \frac{2}{9} \text{ (cực đại)}$$

$$* \text{ Khi } x = -\frac{3 - \sqrt{3}}{3} \text{ thì } y = -\frac{2}{9} \text{ (cực tiểu).}$$

• Đạo hàm cấp hai : $y'' = 6x + 6$

$$* y'' = 0 \Leftrightarrow x = -1$$

* Khi $x = -1$ thì $y = 0$ (điểm uốn).

• Giới hạn : $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} (x^3) = \pm\infty$


• Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	$-\frac{3+\sqrt{3}}{3}$	$-\frac{-3+\sqrt{3}}{3}$	$+\infty$	
y'	+	0	-	0	+
y	$-\infty$	$\nearrow \frac{2}{9}$	$\searrow -\frac{2}{9}$	$\nearrow +\infty$	

• Đồ thị (C) là đường cong bậc ba có

điểm cực đại $\left(-\frac{3 + \sqrt{3}}{3}, \frac{2}{9}\right)$; điểm cực

tiểu $\left(-\frac{3 - \sqrt{3}}{3}, -\frac{2}{9}\right)$; điểm uốn $(-1; 0)$.



2. Các điểm cố định của đồ thị :

$$\text{Hàm số : } y = x^3 + (1 - m)x^2 + 2x + m + 2$$

$$\Leftrightarrow y = x^3 + x^2 + 2x + 2 + m(1 - x^2).$$

Phương trình này được nghiệm đúng với mọi m .

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 1 - x^2 = 0 \\ y = x^3 + x^2 + 2x + 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pm 1 \\ y = 6 \vee y = 0 \end{cases}$$

Vậy : đồ thị của hàm số luôn luôn đi qua các điểm $(1; 6)$, $(-1; 0) \forall m$.

• Xác định m để có đồ thị tiếp xúc với Ox .

Đồ thị của hàm số : $y = x^3 + (1 - m)x^2 + 2x + m + 2$, tiếp xúc với trục hoành khi và chỉ khi $y = 0$ (1) có nghiệm số kép.

$$\text{Mà : (1)} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x^2 - mx + m + 2 = 0 \end{cases} \quad (2)$$

$$\text{nên (1) có nghiệm kép} \Leftrightarrow \begin{cases} (2) \text{ có nghiệm } x = -1 \\ (2) \text{ có } \Delta = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = -\frac{3}{2} \\ m = 2(1 \pm \sqrt{3}) \end{cases}$$

Tóm lại, khi $m = -\frac{3}{2} \vee m = 2(1 \pm \sqrt{3})$ thì đồ thị của hàm số tiếp xúc với Ox .

32. ĐH QUỐC GIA TPHCM – ĐỢT 1 – KHỐI A

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số : $y = \frac{2x^2 + x}{x + 1}$ (H).
2. Tìm những điểm M trên đường thẳng $y = 1$ sao cho từ M có thể kẻ được đúng một tiếp tuyến đến đồ thị (H).

Giải

$$y = f(x) = \frac{2x^2 + x}{x + 1} \quad (H)$$

$$1. \text{MXĐ : } D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$$

$$f'(x) = \frac{2x^2 + 4x + 1}{(x + 1)^2}$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{-2 \pm \sqrt{2}}{2}.$$

Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	x_1	-1	x_2	$+\infty$
f'		+	0	-	
f	$-\infty$				$+\infty$

$-\infty \rightarrow \text{CĐ} \rightarrow -\infty$ $+\infty \rightarrow \text{CT} \rightarrow +\infty$


$$\text{CĐ} = y_1 = f(x_1) = \frac{4x_1 + 1}{1} = 4 \left(\frac{-2 - \sqrt{2}}{2} \right) + 1 = -3 - 2\sqrt{2}$$

$$\text{CT} : y_2 = f(x_2) = -3 + 2\sqrt{2}$$

Tiệm cận đứng : $x = 1$

Tiệm cận xiên : $y = 2x - 1$

Đồ thị : hình bên.



2. Xét điểm $M(x_0; 1) \in A : y = 1$

Xét (d) đi qua M :

$$(d) : y - 1 = K(x - x_0) \Leftrightarrow y = Kx - Kx_0 + 1$$

Phương trình hoành độ giao điểm (d) và (H) :

$$\frac{2x^2 + x}{x + 1} = Kx - Kx_0 + 1$$

$$\Leftrightarrow 2x^2 + x = (x + 1)(Kx - Kx_0 + 1)$$

$$\Leftrightarrow 2x^2 + x = Kx^2 - Kx_0 + x + Kx - Kxx_0 + 1$$

$$\Leftrightarrow (K - 2)x^2 + K(1 - x_0)x + 1 - Kx_0 = 0 \quad (1)$$

$$(1) \text{ có nghiệm kép } \Leftrightarrow \begin{cases} K \neq 2 \\ \Delta = 0 \end{cases}$$

$$\text{Mà : } \Delta = 0 \Leftrightarrow (1 - x_0)^2 K^2 - 4(K - 2)(1 - Kx_0) = 0$$

$$\Leftrightarrow (1 - x_0)^2 K^2 - 4K + 4x_0 K^2 + 8 - 8Kx_0 = 0$$

$$\Leftrightarrow (1 + x_0)^2 K^2 - 4(2x_0 + 1)K + 8 = 0 \quad (2)$$

Ta tìm x_0 để (2) có một nghiệm K duy nhất khác 2. Ta xét các trường hợp sau :

• Trường hợp 1 : $x_0 = -1$

$$(2) \Leftrightarrow 4K + 8 = 0 \Leftrightarrow K = -2$$

• Trường hợp 2 : (2) có 2 nghiệm K_1, K_2 với $K_1 = 2$.

$$\text{Thế vào (2) ta được : } 4(1 - x_0)^2 = 0 \Leftrightarrow x_0 = 1$$

$$(2) \Leftrightarrow (1 + x_0)^2 K^2 - 4(2x_0 + 1)K + 8 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} K = 1 \\ K = 2 \text{ (loại)} \end{cases}$$

• Trường hợp 3 : (2) có 2 nghiệm kép khác 1.

$$\begin{aligned} \Delta' = 0 &\Leftrightarrow 4(2x_0 + 1)^2 - 8(x_0 + 1)^2 = 0 \\ &\Leftrightarrow (2x_0 + 1)^2 - 2(x_0 + 1)^2 = 0 \\ &\Leftrightarrow 2x_0^2 - 1 = 0 \Leftrightarrow x_0 = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}. \end{aligned}$$

Vậy có 4 điểm thỏa mãn đề bài :

$$M_1(-1; 1), \quad M_2(1; 1), \quad M_3\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right), \quad M_4\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 1\right).$$

33. ĐH QUỐC GIA TPHCM – ĐỢT 2 – KHỐI A

Cho hàm số : $y = x^3 - 3mx^2 + 3(m^2 - 1)x - m^3 \quad (C_m).$

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi $m = -2$.
2. Tìm m để đồ thị (C_m) cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt trong đó có đúng hai điểm có hoành độ âm.

Giải

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi $m = -2$

$$y = f(x) = x^3 + 6x^2 + 9x + 8$$

MXĐ : $D = \mathbb{R}$

$$f'(x) = 3x^2 + 12x + 9$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = -3 \end{cases}$$

Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	-3	-1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	0
$f(x)$	$-\infty$	CD 8	4	CT $+\infty$

CD : $f(-3) = 8$

CT : $f(-1) = 4$

$$f''(x) = 6x + 12$$


$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow x = -2$$

$$f(-2) = 6$$

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$f''(x)$	-	0	+
$f(x)$	lồi	6	lõm

Điểm uốn $M(-2; 6)$.

Đồ thị :



2. Phương trình hoành độ giao điểm của (C_m) và Ox :


$$x^3 - 3mx^2 + 3(m^2 - 1)x - m^3 = 0 \quad (1)$$

$$f'(x) = 3x^2 - 6mx + 3(m^2 - 1)$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = m - 1 \\ x_2 = m + 1 \end{cases}$$

$$f(x_1) = -3m + 2$$

$$f(x_2) = -3m - 2.$$



$f(x) = 0$ có 3 nghiệm thỏa mãn : $x_a < x_b < 0 \leq x_c$.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} f(x_1) \cdot f(x_2) < 0 \\ x_1 < 0 \\ f(0) \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 9m^2 - 4 < 0 \\ m - 1 < 0 \\ -m^3 \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m^2 < \frac{4}{9} \\ m < 1 \\ m \geq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow 0 \leq m < \frac{2}{3}.$$

34. ĐH QUỐC GIA TPHCM – ĐỢT 1 – KHỐI D

Cho hàm số : $y = mx^3 - (m - 1)x^2 - (2 + m)x + m - 1 \quad (C_m)$.

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C_1) của hàm số ứng với $m = 1$.
2. Tìm trên đường thẳng $y = 2$ những điểm từ đó có thể kẻ được 3 tiếp tuyến đến (C_1) .
3. Tìm những điểm cố định mà đồ thị (C_m) luôn đi qua với mọi m .

Giải

$$y = f(x) = mx^3 - (m - 1)x^2 - (2 + m)x + m - 1$$

$$1. m = 1 : f(x) = x^3 - 3x \quad (C)$$

$$MXĐ : D = \mathbb{R}$$

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1)$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$$


Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$			
$f'(x)$		+	0	-	0	+	
$f(x)$							
	$-\infty$	$\nearrow$	2	$\searrow$	-2	$\nearrow$	$+\infty$

$$f''(x) = 6x$$

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

$$f(0) = 0. \text{ Điểm uốn } O(0; 0).$$



Đồ thị : hình bên.

2. Xét điểm $A(a; 2)$ trên đường $y = 2$

Xét đường (d) qua A :

$$y - 2 = K(x - a) \Leftrightarrow y = K(x - a) + 2$$

Phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (C)

$$x^3 - 3x = K(x - a) + 2 \Leftrightarrow x^3 - 3x - K(x - a) - 2 = 0 \quad (1)$$

$$(1) \text{ có nghiệm kép} \Rightarrow 3x^2 - 3 - K = 0 \Rightarrow K = 3x^2 - 3 \quad (2)$$

$$\text{Thế vào (1): } x^3 - 3x - (3x^2 - 3)(x - a) - 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow x^3 - 3x - 3x^3 + 3x + 3ax^2 - 3a - 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow 2x^3 - 3ax^2 + 3a + a = 0$$

$$\Leftrightarrow (x + 1)[2x^2 - (3a + 2)x + 3a + 2] = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ 2x^2 - (3a + 2)x + 3a + 2 = 0 \end{cases}$$

$$\text{Đặt: } g(x) = 2x^2 - (3a + 2)x + 3a + 2$$

Từ A kẻ được 3 tiếp tuyến đến (C_1)

$$\Leftrightarrow g(x) \text{ có 2 nghiệm phân biệt khác } -1$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta_g > 0 \\ g(-1) \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (3a + 2)^2 - 8(3a + 2) > 0 \\ 2 + 3a + 2 + 3a + 2 \neq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 3a^2 - 4a - 4 > 0 \\ a \neq -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a < -\frac{2}{3} \vee a > 2 \\ a \neq -1 \end{cases}$$

3. $M_0(x_0; y_0) \in (C_m), \forall m$

$$\Leftrightarrow y_0 = mx_0^3 - (m - 1)x_0^2 - (2 + m)x_0 + m - 1.$$

$$\Rightarrow m(x_0^3 - x_0^2 - x_0 + 1) + (x_0^2 - 2x_0 - 1 - y_0) = 0$$

$$(C_m) \text{ qua } M_0, \forall m \Leftrightarrow \begin{cases} x_0^3 - x_0^2 - x_0 + 1 = 0 \\ x_0^2 - 2x_0 - 1 - y_0 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (x_0 - 1)(x_0^2 - 1) = 0 \\ y_0 = x_0^2 - 2x_0 - 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = 1 \wedge y_0 = -2 \\ x_0 = -1 \wedge y_0 = 2 \end{cases}$$

Vậy (C_m) luôn đi qua 2 điểm cố định : $M_1(1; -2), M_2(-1; 2)$.

35. ĐH QUỐC GIA TPHCM – ĐỢT 2 – KHỐI D

Cho hàm số : $y = f(x) = \frac{2x}{x-1}$.

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2. Từ đồ thị (C) hãy suy ra đồ thị (C_1) của hàm số :

$$y = f_1(x) = \frac{2|x|}{|x|-1} \quad (\text{vẽ hình riêng}).$$

Dùng đồ thị (C_1) để biện luận theo tham số m số nghiệm x thuộc đoạn $[-1; 2]$ của phương trình : $(m-2)|x| - m = 0$.

Giải

1. Khảo sát sự biến thiên :

* MXĐ : $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$

* $f'(x) = \frac{-2}{(x-1)^2} < 0$

* Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$		$ $	
$f(x)$	2	$ $	2


$\nearrow$ $-\infty$ $\searrow$ $+\infty$

* $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 2$: Tiệm cận ngang $y = 2$.

* $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty$: Tiệm cận đứng $x = 1$.

* $x = 0 \Rightarrow y = 0$

* Đồ thị : hình bên.



2. Từ đồ thị (C) suy ra đồ thị (C_1) của hàm số : $y = f_1(x) = \frac{2|x|}{|x|-1}$.

$f_1(x)$ là hàm số chẵn.


(C_1) suy ra từ (C) bằng cách giữ nguyên phần có $x \geq 0$ và lấy đối xứng của chính phần giữ nguyên đó qua Oy.

Dùng (C_1) biện luận theo tham số m số nghiệm x thuộc đoạn $[-1; 2]$ của phương trình :

$$(m - 2) \cdot |x| - m = 0$$

$$(1) \Leftrightarrow 2|x| = m(|x| - 1)$$

$$\frac{2|x|}{|x| - 1} = m \quad x \in [-1; 2].$$



Số nghiệm của (1) chính là giao điểm của (C_1) thỏa mãn $x \in [-1; 2]$ với $y = m$.

Theo đồ thị ta có :

m	số nghiệm của (1)
$+\infty$	1
4	1
	0
0	1
	2
$-\infty$	

36. ĐH QUỐC GIA TPHCM – ĐỢT 1 – KHỐI B

Cho hàm số : $y = \frac{2mx^2 + x + m - 1}{mx + 1} \quad (H_m).$

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số ứng với $m = 1$.
2. Tìm quỹ tích tâm đối xứng của đồ thị (H_m) khi m thay đổi.

Giải

$$y = f(x) = \frac{2mx^2 + x + m - 1}{mx + 1} \quad (H_m).$$

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số ứng với $m = 1$

$$y = f(x) = \frac{2x^2 + x}{x + 1}$$

$$\text{MXĐ : } D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}.$$

$$f'(x) = \frac{2x^2 + 4x + 1}{(x + 1)^2}; \quad f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{-2 \pm \sqrt{2}}{2}$$

Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	x_1	-1	x_2	$+\infty$					
$f'(x)$		+	0	-	-	0	+			
$f(x)$										
	$-\infty$	$\nearrow$	CD	$\searrow$	$-\infty$	$+\infty$	$\searrow$	CT	$\nearrow$	$+\infty$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty \quad y = 2x - 1 + \frac{1}{x+1}$$

Tiệm cận xiên $y = 2x - 1$.

$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \infty$. Tiệm cận đứng $x = -1$.

Cực trị : $f(x_0) = \frac{u'}{v'} = \frac{4x_0 + 1}{1}$

$$f(x_1) = f\left(\frac{-2 - \sqrt{2}}{2}\right) = 4\left(\frac{-2 - \sqrt{2}}{2}\right) + 1 = -3 - 2\sqrt{2}$$

$$f(x_2) = f\left(\frac{-2 + \sqrt{2}}{2}\right) = 4\left(\frac{-2 + \sqrt{2}}{2}\right) + 1 = -3 + 2\sqrt{2}$$

Đồ thị : hình bên.

2. Tìm quỹ tích tâm đối xứng của (H_m)

(H_m) có tiệm cận đứng $d_1 : x = -\frac{1}{m}$

tiệm cận xiên $d_2 : y = 2x - \frac{1}{m}$


Gọi M là tâm đối xứng ta có :

$$M \begin{cases} x = -\frac{1}{m} \\ y = 2x - \frac{1}{m} \end{cases} \Rightarrow y = 2x + x$$

$$\Leftrightarrow y = 3x.$$

Giới hạn : $x = -\frac{1}{m} \neq 0$.

Vậy quỹ tích tâm đối xứng M là đường thẳng $d : y = 3x$ (loại bỏ gốc $O(0; 0)$).



37. HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Cho hàm số : $y = x^3 - 3x - 2$ (H).

- Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (H) của hàm số.
- Xét ba điểm A, B, C thẳng hàng và thuộc (H). Gọi A_1, B_1, C_1 lần lượt là giao điểm của (H) với tiếp tuyến của đồ thị (H) tại A, B, C.
- Chứng minh rằng A_1, B_1, C_1 cũng thẳng hàng.

Giải

$$y = f(x) = x^3 - 3x - 2 \quad (H).$$

- Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (H) của hàm số :

$$\text{MXD : } D = \mathbb{R}$$

$$f'(x) = 3x^2 - 3.$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$$

Bảng biến thiên :


x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$		
$f'(x)$		+	0	-	0	+
$f(x)$			0	CT		$+\infty$
	$-\infty$		CD	-4		

$$f''(x) = 6x.$$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f''(x)$	-	0	+
$f(x)$		-2	
		lồi	lõm

Điểm uốn I(0; -2).

Đồ thị : hình bên.



- 2. ABC thẳng hàng ($A \neq B \neq C$)

$$\Leftrightarrow \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{f(c) - f(a)}{c - a} \Leftrightarrow \frac{b^3 - a^3 - 3(b - a)}{b - a} = \frac{c^3 - a^3 - 3(c - a)}{c - a}$$

$$\Leftrightarrow b^2 + ba + a^2 - 3 = c^2 + ca + a^2 - 3$$

$$\Leftrightarrow b^2 - c^2 + a(b - c) = 0 \Leftrightarrow (b - c)(b + c + a) = 0$$

$$\Leftrightarrow a + b + c = 0$$

Phương trình tiếp tuyến tại A :

$$y - f(a) = f'(a)(x - a) \Leftrightarrow y = f'(a)(x - a) + f(a) \quad (d).$$

Phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (H) :

$$\begin{aligned}
 f(x) &= f'(a)(x-a) + f(a) \Leftrightarrow f(x) - f(a) - f'(a)(x-a) = 0 \\
 \Leftrightarrow x^3 - a^3 - 3(x-a) - (3a^2 - 3)(x-a) &= 0 \\
 \Leftrightarrow x^3 - 3a^2x + 2a^3 = 0 \Leftrightarrow (x-a)^2(x+2a) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = a \\ x = -2a \end{cases}
 \end{aligned}$$

Vậy : $a_1 = -2a$. Tương tự : $b_1 = -2b$; $c_1 = -2c$.

$$\begin{aligned}
 A, B, C \text{ thẳng hàng} &\Rightarrow a + b + c = 0 \\
 &\Rightarrow a_1 + b_1 + c_1 = -2(a + b + c) = 0 \\
 &\Rightarrow A_1, B_1, C_1 \text{ thẳng hàng.}
 \end{aligned}$$

38. ĐH NGOẠI THƯỜNG

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số : $y = \frac{x+2}{x-2}$.
2. Tìm trên đồ thị của hàm số tất cả những điểm cách đều hai trục tọa độ.
3. Viết phương trình tiếp tuyến với đồ thị, biết rằng tiếp tuyến đi qua điểm $A(-6; 5)$.

Giải

$$1. y = f(x) = \frac{x+2}{x-2}.$$

Khảo sát và vẽ đồ thị : MXĐ: $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

$$f'(x) = \frac{-4}{(x-2)^2} < 0.$$


Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	...	...	...
$f(x)$	1 $\swarrow$	$+\infty$	1 $\searrow$

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$: Tiệm cận ngang $y = 1$.

$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \infty$: Tiệm cận đứng $x = 2$.

Đồ thị : hình bên.



2. Tìm trên đồ thị những điểm cách đều 2 trục tọa độ :

$$M(x; y) \in (C) \Leftrightarrow y = \frac{x+2}{x-2}$$

$$|x| = |y| \Leftrightarrow \begin{cases} y = x \\ y = -x \end{cases}$$

• Trường hợp 1 : $y = x$

$$\Leftrightarrow \frac{x+2}{x-2} = x \quad \Leftrightarrow x+2 = x^2 - 2x$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 3x - 2 = 0 \quad \Leftrightarrow x = \frac{3 \pm \sqrt{17}}{2}$$

• Trường hợp 2 : $y = -x$

$$\Leftrightarrow \frac{x+2}{x-2} = -x \quad \Leftrightarrow x+2 = -x^2 + 2x$$

$$\Leftrightarrow x^2 + x + 2 = 0 \text{ (vô nghiệm).}$$

Vậy có 2 nghiệm thỏa mãn đề bài là :

$$M_1\left(\frac{3+\sqrt{17}}{2}; \frac{3+\sqrt{17}}{2}\right) \quad \text{và} \quad M_2\left(\frac{3-\sqrt{17}}{2}; \frac{3-\sqrt{17}}{2}\right).$$

• A(-6; 5).

Xét đường thẳng (d) đi qua A : $y - 5 = K(x + 6)$

$$y = Kx + 6K + 5.$$

Phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (H) :

$$\frac{x+2}{x-2} = Kx + 6K + 5 \quad \Leftrightarrow x+2 = Kx^2 + 6Kx + 5x - 2Kx - 12K - 10$$

$$\Leftrightarrow Kx^2 + 4(K+1)x - 12K - 12 = 0 \quad (1)$$

$$(1) \text{ có nghiệm kép} \quad \Leftrightarrow \begin{cases} K \neq 0 \\ \Delta' = 0 \end{cases}$$

$$\Delta = 0 \quad \Leftrightarrow 4(K+1)^2 + K(12K+12) = 0 \quad \Leftrightarrow (K+1)^2 + K(3K+3) = 0$$

$$\Leftrightarrow 4K^2 + 5K + 1 = 0 \quad \Leftrightarrow \begin{cases} K = -1 \\ K = -\frac{1}{4} \end{cases}$$

Vậy qua A ta kẻ được 2 tiếp tuyến đến (H) đó là :

$$d_1 : y - 5 = -(x + 6) \quad \Leftrightarrow y = -x - 1$$

$$d_2 : y - 5 = -\frac{1}{4}(x + 6) \quad \Leftrightarrow y = -\frac{1}{4}x + \frac{7}{2}.$$

39. HỌC VIỆN NGÂN HÀNG – PHÂN VIỆN TP HCM

Cho hàm số : $y = x^3 - 3x$.

• Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số trên.

• Tìm trên đường thẳng $y = 2$ những điểm từ đó có thể kẻ được 3 tiếp tuyến đến (C).

Giải

$$y = f(x) = x^3 - 3x.$$

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị

Miền xác định : $D = \mathbb{R}$.

$$f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1)$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1.$$


Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$		
$f'(x)$		+	0	-	0	+
$f(x)$						
	$-\infty$	$\nearrow$	2	$\searrow$	CT	$+\infty$
			CD		-2	

$$f''(x) = 6x$$

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0.$$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f''(x)$	-	0	+
$f(x)$		0	
		lồi	lõm



Điểm uốn $O(0; 0)$.

Đồ thị : hình bên.

2. Xét điểm $M(x_0; 2)$ trên đường thẳng $\Delta : y = 2$.

Xét đường thẳng (d) đi qua M :

$$y - 2 = K(x - x_0) \Leftrightarrow y = Kx + 2 - Kx_0.$$

(d) tiếp xúc với (C) khi hệ sau có nghiệm :

$$\begin{cases} x^3 - 3x = Kx + 2 - Kx_0 & (1) \\ 3x^2 - 3 = K & (2) \end{cases}$$

Thế (2) vào (1) ta được :

$$x^3 - 3x = (3x^2 - 3)x + 2 - (3x^2 - 3)x_0.$$

$$\Leftrightarrow 2x^3 - 3x_0x^2 + 2 + 3x_0 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x + 1) [2x^2 - (2 + 3x_0)x + 2 + 3x_0] = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ 2x^2 - (2 + 3x_0)x + 2 + 3x_0 = 0 \end{cases}$$

Đặt : $g(x) = 2x^2 - (2 + 3x_0)x + 2 + 3x_0$.

Từ M kẻ được 3 tiếp tuyến đến (C) $\Leftrightarrow g(x)$ có 2 nghiệm khác -1

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta_g > 0 \\ g(-1) \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (2 + 3x_0)^2 - 8(2 + 3x_0) > 0 \\ 2 + 2 + 3x_0 + 2 + 3x_0 \neq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 9x_0^2 - 12x_0 - 12 > 0 \\ x_0 \neq -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x_0^2 - 4x_0 - 4 > 0 \\ x_0 \neq -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 < -\frac{2}{3} \vee x_0 > 2 \\ x_0 \neq -1. \end{cases}$$

40. ĐH Y TPHCM

Cho hàm số : $y = \frac{x^2 - x + 4}{x - 1}$.

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số trên.
2. Viết phương trình của parabol (P) đi qua điểm cực đại, điểm cực tiểu của (C) và tiếp xúc với đường thẳng có phương trình $y = -4$.
3. Biện luận theo tham số thực m, số nghiệm $t \in [0; \pi]$ của phương trình :

$$\cos^2 t - (1 + m)\cos t + 4 + m = 0.$$

Giải

$$y = f(x) = \frac{x^2 - x + 4}{x - 1} \quad (C).$$

1. MXĐ : $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$

$$f'(x) = \frac{x^2 - 2x - 3}{(x - 1)^2}$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 3 \end{cases}$$

Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	-1	1	3	$+\infty$		
f'(x)		+	0	-	-	0	+
f(x)							


$$\text{CĐ : } f(-1) = -3$$

$$\text{CT : } f(3) = 5.$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty. \quad \text{Tiệm cận đứng } x = 1.$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - x] = 0. \quad \text{Tiệm cận xiên } y = x.$$

Đồ thị :



2. Xét (P) : $y = ax^2 + bx + c$ và (d) : $y = -4$.

Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (d) :

$$ax^2 + bx + c = -4 \Leftrightarrow ax^2 + bx + c + 4 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4a(c + 4)$$

(P) qua $M_1(-1; -3)$, $M_2(3; 5)$ và tiếp xúc với (d)

$$\Leftrightarrow \begin{cases} b^2 - 4a(c + 4) = 0 & (1) \\ a - b + c = -3 & (2) \\ 9a + 3b + c = 5 & (3) \end{cases}$$

$$\Rightarrow 8a + 4b = 8$$

$$4a = 4 - 2b$$

$$c = b - a - 3 = b - \left(1 - \frac{b}{2}\right) - 3 = \frac{3b - 8}{2}$$

$$(1) \Leftrightarrow b^2 - (4 - 2b) \left[\frac{3b - 8}{2} + 4 \right] = 0$$

$$\Leftrightarrow b^2 - (2 - b)3b = 0 \Leftrightarrow 4b^2 - 6b = 0$$

$$\Leftrightarrow 2b(2b - 3) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} b = 0 \\ b = \frac{3}{2} \end{cases}$$

• Trường hợp 1 : $\begin{cases} b = 0 \\ a = 1 \\ c = -4 \end{cases}$

• Trường hợp 2 :
$$\begin{cases} b = \frac{3}{2} \\ a = \frac{1}{4} \\ c = -\frac{7}{4} \end{cases}$$

Vậy : có 2 parabol thỏa mãn đề bài là : $y = x^2 - 4$.

$$y = \frac{1}{4}x^2 + \frac{3}{2}x - \frac{7}{4}.$$

3. Giải phương trình : $\cos^2 t - (1 + m)\cos t + 4 + m = 0 \quad (t \in [0; \pi]).$

Đặt : $x = \cos t \quad x \in [-1; 1]$

$$(1) \Leftrightarrow x^2 - (1 + m)x + 4 + m = 0$$

$$\Leftrightarrow x^2 - x + 4 = m(x - 1) \Leftrightarrow \frac{x^2 - x + 4}{x - 1} = m.$$

Do mỗi nghiệm $x \in [-1; 1]$ ứng với 1 nghiệm $t \in [0; \pi]$ nên theo đồ thị ta có :

m	Số nghiệm t
$+\infty$	0
-3	1
	1
$-\infty$	

41. ĐH DƯỢC TPHCM

- Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số : $y = \frac{x^2 + 1}{x}$.
- Tìm tập hợp các điểm trong mặt phẳng tọa độ để từ điểm đó có thể kẻ đến đồ thị (C) hai tiếp tuyến đó vuông góc nhau.

Giải

$$1. y = f(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$$

Khảo sát và vẽ đồ thị :

MXĐ : $D = \mathbb{R}$.

$$f'(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2}; \quad f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1.$$

Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		+	0	-	+
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$ -2 $\searrow$	$-\infty$	$\nearrow$ 2 $\searrow$	$+\infty$

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \infty$. Tiệm cận đứng : $x = 0$.

$y = x + \frac{1}{x}$. Tiệm cận xiên : $y = x$.

Đồ thị : hình bên.

2. Xét điểm $M_0(x_0; y_0)$.

Gọi (d) là đường thẳng qua M_0 .

$$d : y - y_0 = K(x - x_0)$$

$$y = K(x - x_0) + y_0.$$

Phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (C) :

$$\frac{x^2 + 1}{x} = K(x - x_0) + y_0$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 1 = Kx^2 - Kx_0x + y_0x$$

$$\Leftrightarrow (K - 1)x^2 + (y_0 - Kx_0)x - 1 = 0 \quad (1)$$

$$(1) \text{ có nghiệm kép} \Leftrightarrow \begin{cases} K \neq 1 \\ \Delta = 0 \end{cases}$$

$$\Delta = 0 \Leftrightarrow (y_0 - Kx_0)^2 + 4(K - 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow x_0^2 K^2 + (4 - 2x_0 y_0)K + y_0^2 - 4 = 0 \quad (2)$$

Từ M_0 kẻ được 2 tiếp tuyến vuông góc đến (C)


$$\Leftrightarrow (2) \text{ có 2 nghiệm } K_1, K_2, \text{ thỏa mãn } K_1 K_2 = -1$$

$$\Leftrightarrow \frac{y_0^2 - 4}{x_0^2} = -1 \Leftrightarrow x_0^2 + y_0^2 = 4.$$

Vậy M_0 lưu động trên (C) là đường tròn tâm O bán kính $R = 2$.

$$\text{Giới hạn : } \begin{cases} K \neq 1 \\ x_0 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} y_0 \neq x_0 \\ x_0 \neq 0 \end{cases}$$

Vậy quỹ tích M_0 là (C) loại bỏ 4 giao điểm của (C) với 2 đường tiệm cận.



42. ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

Cho hàm số $f(x) = \frac{mx^2 + 3mx + 2m + 1}{x - 1}$, với m là tham số.

1. Xác định m để đồ thị của hàm số $y = f(x)$ có đường tiệm cận xiên đi qua điểm $A(1; 5)$.
2. Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số $y = f(x)$ với $m = 1$.
3. Tìm giá trị của m để $f(x) > 0$ với mọi x thỏa mãn $4 \leq x \leq 5$.

Giải

1. Xác định m để hàm số có đường tiệm cận xiên qua $A(1; 5)$

Hàm số : $y = \frac{mx^2 + 3mx + 2m + 1}{x - 1}$

có thể viết : $y = mx + 4m + \frac{6m + 1}{x - 1}$ (1)

Khi $m = -\frac{1}{6}$ thì đồ thị suy biến thành đường thẳng ta không có đường tiệm cận xiên.

Khi $m \neq -\frac{1}{6}$ thì (1) cho : $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{6m + 1}{x - 1} \right) = 0$ nên $y = mx + 4m$ là đường tiệm cận xiên của đồ thị. Đường này qua $A(1; 5)$ nên :

$$5 = 1m + 4m \Leftrightarrow m = 1$$

Vậy khi $m = 1$ thì đồ thị của hàm số có đường tiệm cận xiên qua $A(1; 5)$.

2. Khảo sát và vẽ đồ thị khi $m = 1$

Khi $m = 1$, hàm số là: $y = x + 4 + \frac{7}{x - 1}$.

MXD : $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Đạo hàm : $y' = 1 - \frac{7}{(x - 1)^2}$

* $y' = 0 \Leftrightarrow x = 1 + \sqrt{7} \vee x = 1 - \sqrt{7}$.

* Khi $x = 1 + \sqrt{7}$ thì $y = 5 + 2\sqrt{7}$

* Khi $x = 1 - \sqrt{7}$ thì $y = 5 - 2\sqrt{7}$

Giới hạn : * $\lim_{x \rightarrow 1} y = \pm\infty$: đường tiệm cận đứng : $x = 1$.

* $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(x + 4 + \frac{7}{x - 1} \right)$ với $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{7}{x - 1} = 0$ nên đường


tiệm cận xiên : $y = x + 4$.

Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	$1-\sqrt{7}$	1	$1+\sqrt{7}$	$+\infty$
y'		+	0	-	+
y	$-\infty$	$5-2\sqrt{7}$	$+\infty$	$5+2\sqrt{7}$	$+\infty$

Đồ thị là một hyperbol xiên góc có : điểm cực đại : $(1-\sqrt{7}; 5-2\sqrt{7})$,

điểm cực tiểu : $(1+\sqrt{7}; 5+2\sqrt{7})$.



3. Tìm giá trị của m để $f(x) > 0$ với mọi x thỏa mãn $4 \leq x \leq 5$

Khi $x \in [4; 5]$ thì $x > 1$ nên $f(x) > 0 \Rightarrow mx^2 + 3mx + 2m + 1 > 0$

Do đó, bài toán trở thành : Tìm m để $f(x) = mx^2 + 3mx + 2m + 1 > 0$ (1) với mọi x thỏa mãn $4 \leq x \leq 5$.

Ta có các trường hợp sau :

i) $m = 0$. Lúc đó, (1) $\Leftrightarrow f(x) > 0$ với mọi x thỏa mãn $4 \leq x \leq 5$
 $m = 0$ nhận được.

ii) $m > 0$. (1) có đồ thị là parabol (P) với đỉnh S có hoành độ :

$$x_S = -\frac{3}{2}.$$

Do đó, $f(x) > 0$ với mọi x thỏa mãn $4 \leq x \leq 5$, ta chỉ cần $f(4) > 0$

$$\Rightarrow 30m + 1 > 0 \text{ (đúng với } m > 0 \text{)}.$$



Vậy : khi $m > 0$, bài toán được thỏa mãn.

iii) $m < 0$. Lúc này (P) có bề lõm quay về phía y âm nên bài toán được thỏa mãn khi $f(5) > 0$.

$$\Leftrightarrow 42m + 1 > 0 \quad \Leftrightarrow m > -\frac{1}{42}$$

Vậy : khi $-\frac{1}{42} < m < 0$ thì bài toán được thỏa mãn.

Tóm lại : khi $m > -\frac{1}{42}$ thì $f(x) > 0$ với mọi x thỏa mãn $4 \leq x \leq 5$.



NĂM 1998

43. ĐH QUỐC GIA TP HCM – KHỐI A – ĐỢT 1

- Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số : $y = -x^3 + 3x$
Từ đó suy ra đồ thị của hàm số $y = -|x|^3 + 3|x|$ (vẽ hình riêng).
- Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình : $x^3 - 3x = \frac{2m}{m^2 + 1}$
có 3 nghiệm phân biệt.

Giải

- Khảo sát sự biến thiên và vẽ (C) : $y = -x^3 + 3x$.

MXĐ : $D = \mathbb{R}$

$$y = -x^3 + 3x$$

$$\Rightarrow y' = -3x^2 + 3$$

$$y' = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = 1 \text{ hay } x = -1.$$

$$y'' = -6x$$

$$y'' = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = 0$$

Vậy : $I(0; 0)$ vừa là điểm uốn vừa là tâm đối xứng.

Bảng biến thiên :


x	$-\infty$	-1		1	$+\infty$		
y'	-	0	+	0	-		
y	$+\infty$	$\searrow$	-2	$\nearrow$	2	$\searrow$	$-\infty$

Trị đặc biệt : $x = 2 \Rightarrow y = -2$;

$x = -2 \Rightarrow y = 2$.


Suy ra đồ thị hàm số :

$$y = -|x|^3 + 3|x| = \begin{cases} -x^3 + 3x & \text{nếu } x \geq 0 \text{ (} C_1 \text{)} \\ x^3 - 3x & \text{nếu } x < 0 \text{ (} C_2 \text{)} \end{cases}$$



Đồ thị (C_1) là một phần của đồ thị (C) (đã vẽ) khi $x \geq 0$.

Đồ thị (C_2) là phần đối xứng của đồ thị (C_1) qua trục hoành khi $x < 0$.



2. Tìm tất cả giá trị m để phương trình $x^3 - 3x = \frac{2m}{m^2 + 1}$ (1) có 3 nghiệm phân biệt

$$(1) \Leftrightarrow -x^3 + 3x = -\frac{2m}{m^2 + 1}$$

$$\text{Đặt : } k = \frac{-2m}{m^2 + 1} \Rightarrow -x^3 + 3x = k \quad (2)$$

m thỏa mãn bài toán $\Leftrightarrow k$ thỏa mãn (2) có 3 nghiệm phân biệt.

Dựa vào bảng biến thiên, k thỏa mãn bài toán.

$$\Leftrightarrow -2 < k < 2 \Leftrightarrow -2 < \frac{-2m}{m^2 + 1} < 2 \Leftrightarrow \begin{cases} m^2 + 1 > m \\ -m < m^2 + 1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m^2 - m + 1 > 0 \\ m^2 + m + 1 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \left(m - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0 \\ \left(m + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{3}{4} > 0 \end{cases} \begin{matrix} \text{(Đúng } \forall m) \\ \text{(Đúng } \forall m) \end{matrix}$$

Vậy : $\forall m \in \mathbb{R}$ đều thỏa mãn bài toán.

Cho hàm số : $y = \frac{x^2}{x-1}$.

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số. Chứng tỏ rằng (C) có một tâm đối xứng.
2. Tìm tập hợp các điểm trong mặt phẳng tọa độ Oxy để từ đó ta có thể vẽ được hai tiếp tuyến đến đồ thị (C) và hai tiếp tuyến đó vuông góc với nhau.

Giải

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị. Chứng tỏ (C) có đường tiệm cận

$$y = \frac{x^2}{x-1}$$

$$\text{MXĐ : } D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$$

$$y' = \frac{2x(x-1) - x^2}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2}$$

$$y' = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ hay } x = 2.$$

Đường tiệm cận :

- $\lim_{x \rightarrow 1} y = \infty \Rightarrow x = 1$ là đường tiệm cận đứng.

- $y = \frac{x^2}{x-1} = x + 1 + \frac{1}{x-1}$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{x-1} \right) = 0 \Rightarrow y = x + 1 \text{ là đường tiệm cận xiên.}$$

Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$	
y'	+	0	-	-	0	+
y	$-\infty$	0	$-\infty$	$+\infty$	4	$+\infty$

Trị đặc biệt : $x = -1 \Rightarrow y = -\frac{1}{2}$

$x = 3 \Rightarrow y = \frac{9}{2}$

Nhận xét : Tâm đối xứng (nếu có) là giao của hai đường tiệm cận.

Gọi I(x, y) là tâm đối xứng, ta có :

$$\begin{cases} x = 1 \\ y = x + 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 2 \end{cases}$$

Vậy $I(1; 2)$ là tâm đối xứng của (C) .

2. Tìm tập hợp các điểm của mặt phẳng Oxy để từ đó vẽ được 2 tiếp tuyến đến (C) và vuông góc với nhau

Gọi $M(x_0; y_0)$ là các điểm cần tìm.

Phương trình đường thẳng (d) qua M :

$$y = k(x - x_0) + y_0$$

Phương trình hoành độ giao điểm (d) và (C) :

$$\frac{x^2}{x-1} = k(x - x_0) + y_0 \quad (\text{điều kiện } x \neq 1).$$

$$\Leftrightarrow x^2 = k(x - x_0)(x - 1) + y_0(x - 1)$$

$$\Leftrightarrow 0 = (k - 1)x^2 + (y_0 - kx_0 - k)x + kx_0 - y_0$$

(d) tiếp xúc với $(C) \Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow \Delta = [y_0 - k(x_0 + 1)]^2 - 4(kx_0 - y_0)(k - 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow y_0^2 - 2ky_0(x_0 + 1) + k^2(x_0 + 1)^2 - 4(kx_0 - y_0)(k - 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow k^2(x_0 - 1)^2 + 2k[2x_0 + 2y_0 - y_0(x_0 - 1)] - 4y_0 + y_0^2 = 0 (*)$$


$(x_0; y_0)$ thỏa mãn bài toán

$$\Leftrightarrow (*) \text{ có 2 nghiệm } k_1 \text{ và } k_2 \text{ sao cho } k_1 k_2 = -1$$

$$\Leftrightarrow \frac{-4y_0 + y_0^2}{(x_0 - 1)^2} = -1 \quad \Leftrightarrow y_0^2 - 4y_0 = -(x_0 - 1)^2$$

$$\Leftrightarrow (x_0 - 1)^2 + (y_0 - 2)^2 = 4.$$

Vậy : tập hợp những điểm M là đường tròn tâm $I(1; 2)$ (tâm đối xứng của (C)) có bán kính bằng 2, bỏ các điểm $(1; 4)$, $(1; 0)$, $(1 + \sqrt{2}; 2 + \sqrt{2})$, $(1 - \sqrt{2}; 2 - \sqrt{2})$.



45. ĐH QUỐC GIA TPHCM – KHỐI A – ĐỢT 3

Cho hàm số : $y = m^2 x^4 - 2x^2 + m$ với tham số thực $m \neq 0$.

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi $m = 1$.
2. Khảo sát sự biến thiên của hàm số khi $m \neq 0$.

Từ đó xác định m sao cho $m^2 x^4 - 2x^2 + m \geq 0$ với mọi số thực x .

Giải

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị khi $m = 1$

$$y = x^4 - 2x^2 + 1$$

MXĐ : $D = \mathbb{R}$

$$y' = 4x^3 - 4x = 4x(x^2 - 1)$$

$$y' = 0 \Leftrightarrow x = 0 \quad \text{hay} \quad x = 1 \quad \text{hay} \quad x = -1.$$

Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'	-	0	+	0	+
y	$+\infty$	$\searrow$ 0	$\nearrow$ 1	$\searrow$ 0	$\nearrow$ $+\infty$

• Giá trị đặc biệt : $x = 2 \Rightarrow y = 9;$


$x = -2 \Rightarrow y = 9.$

• Giới hạn : $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} x^4 = +\infty.$

• Đồ thị (C) :

- Có giá trị cực đại bằng 1 khi $x = 0.$

- Có giá trị cực tiểu bằng 0 khi $x = \pm 1.$



2. Với $m \neq 0$ khảo sát sự biến thiên :

$$y = m^2x^4 - 2x^2 + m = f(x)$$

$$\Rightarrow y' = 4m^2x^3 - 4x = 4x(m^2x^2 - 1).$$

$$y' = 0 \Leftrightarrow x = 0 \quad \text{hay} \quad x = \frac{1}{m} \quad \text{hay} \quad x = -\frac{1}{m}.$$

• Với $m > 0$:

x	$-\infty$	$-\frac{1}{m}$	0	$\frac{1}{m}$	$+\infty$
y'	-	0	+	0	+
y	$+\infty$	$\searrow$ $\frac{m^3 - 1}{m^2}$	$\nearrow$ m	$\searrow$ $\frac{m^3 - 1}{m^2}$	$\nearrow$ $+\infty$

- Với $m < 0$:

x	$-\infty$	$\frac{1}{m}$		0		$-\frac{1}{m}$	$+\infty$	
y'		-	0	+	0	-	0	+
y	$+\infty$		$\frac{m^3-1}{m^2}$		m		$\frac{m^3-1}{m^2}$	$+\infty$

Vậy : $f(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \frac{m^3 - 1}{m^2} \geq 0 \Leftrightarrow m \geq 1.$

46. ĐN Y DƯỢC TPHCM

Cho hàm số : $y = -x^4 + 2(m+1)x^2 - 2m - 1.$

- Xác định tham số m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại bốn điểm có hoành độ lập thành một cấp số cộng.
- Gọi (C) là đồ thị khi $m = 0$. Tìm tất cả các điểm thuộc trục tung sao cho từ đó có thể kẻ được ba tiếp tuyến với đồ thị (C).

Giải

- Xác định m để hàm số cắt trục hoành tại 4 điểm có hoành độ lập thành 1 cấp số cộng

Đặt : $t = x^2 \quad (t > 0).$

Ta có : $y = f(t) = -t^2 + 2(m+1)t - 2m - 1 \quad (*)$

Điều kiện cần và đủ để (*) có 2 nghiệm dương phân biệt và $t_2 = 9t_1$ là :

$$\begin{cases} \Delta' > 0 \\ S > 0 \\ P > 0 \\ t_2 = 9t_1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \Delta' = m^2 > 0 \\ 2(m+1) > 0 \\ 2m+1 > 0 \\ t_2 = 9t_1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 0 \\ m > -1 \\ m > -\frac{1}{2} \\ t_2 = 9t_1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > -\frac{1}{2} \\ m \neq 0 \\ t_2 = 9t_1 \end{cases}$$

Nhận xét :

Từ (*) ta có :

$$\begin{cases} t = \frac{-(m+1) + m}{-1} = 1 \\ t = \frac{-(m+1) - m}{-1} = 2m+1 \end{cases}$$

Do đó : $t_2 = 9t_1 \Leftrightarrow [1 = 9(2m+1) \text{ hay } (2m+1) = 9]$

$$\Leftrightarrow [1 = 18m + 9 \text{ hay } m = 4].$$

$$\Leftrightarrow \left[m = \frac{-4}{9} \text{ hay } m = 4 \right]$$

Vậy : $m = 4 \text{ hay } m = \frac{-4}{9}$.

2. Tìm tất cả các điểm $\in Oy$ sao cho từ đó ta kẻ được 3 tiếp tuyến đến (C)

Khi $m = 0$ thì $y = -x^4 + 2x^2 - 1$.

Gọi điểm $A(0; a) \in Oy$.

Phương trình tiếp tuyến với (C) tại $M(x_0; y_0)$ là :

$$y = y'(x_0).(x - x_0) + y(x_0)$$

$$y = (-4x_0^3 + 4x_0)(x - x_0) + (-x_0^4 + 2x_0^2 - 1)$$

$$y = (-4x_0^3 + 4x_0)x + 4x_0^4 - 4x_0^2 - x_0^4 + 2x_0^2 - 1$$

$$y = (-4x_0^3 + 4x_0)x + 3x_0^4 - 2x_0^2 - 1$$

$$(\Delta) \text{ qua } A(0; a) \Leftrightarrow a = 3x_0^4 - 2x_0^2 - 1$$

$$\Leftrightarrow 0 = 3x_0^4 - 2x_0^2 - 1 - a \quad (1)$$

Gọi (d) : $y = \alpha x + \beta$ là tiếp tuyến với (C) có 2 tiếp điểm

$\Rightarrow$ Phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (C) có 2 nghiệm kép.

$$\begin{aligned} \Rightarrow x^4 - 2x^2 + 1 + \alpha x + \beta &= (x - b)^2 (x - c)^2 = \\ &= x^4 - 2x^3(b + c) + x^2(b^2 + c^2 + 4bc) - 2bc(b + c)x + b^2c^2. \end{aligned}$$

Đồng nhất hệ số :

$$\begin{cases} b + c = 0 \\ b^2 + c^2 + 4bc = -2 \\ -2bc(b + c) = \alpha \\ b^2c^2 = \beta + 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b + c = 0 \\ bc = -1 \\ \beta = 0 \\ \alpha = 0 \end{cases}$$

Vậy : $y = 0$ là tiếp tuyến duy nhất có 2 tiếp điểm với (C).

• Nếu $a = 0$ thì (1) cho : $3x_0^4 - 2x_0^2 - 1 = 0 \quad (*)$

(*) không có 3 nghiệm phân biệt (không có nghiệm $x_{01}^2 = 0$; $x_{02}^2 > 0$)

• Nếu $a \neq 0$ thì (1) cho : $3x_0^4 - 2x_0^2 - a - 1 = 0 \quad (**)$

($x_{01}^2 = 0$; $x_{02}^2 > 0$)

Muốn (**) có 3 nghiệm phân biệt, ta phải có $a = -1$.

Vậy : điểm cần tìm : $A(0; -1)$.

47. CƠ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI

Cho hàm số : $y = \frac{x^2 + x - 1}{x - 1}$.

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2. Viết phương trình các tiếp tuyến với (C) song song với đường thẳng
 $4y - 3x + 1 = 0$
3. Dùng đồ thị của (C) để biện luận theo m số nghiệm của phương trình :

$$\sin^2 x + (1 - m)\sin x + m - 1 = 0 \quad \left(-\frac{\pi}{2} < x < \frac{\pi}{2} \right).$$

Giải

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ (C) : $y = \frac{x^2 + x - 1}{x - 1}$

- MXĐ : $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$

- $y' = \frac{x^2 - 2x}{(x - 1)^2}$

$$y' = 0 \Leftrightarrow x = 0 \text{ hay } x = 2.$$

- Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$
y'		+	-	-	+
y	$-\infty$	1	$+\infty$	5	$+\infty$

- Đường tiệm cận :

$$\lim_{x \rightarrow 1} y = \infty \Rightarrow x = 1 \text{ là đường tiệm cận đứng.}$$

$$y = \frac{x^2 + x - 1}{x - 1} = x + 2 + \frac{1}{x - 1}$$


$$\text{có } \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x - 1} = 0 \text{ nên } y = x + 2 \text{ là đường tiệm cận xiên.}$$

- Giá trị đặc biệt : $x = 3 \Rightarrow y = \frac{11}{2}$;

$$x = -1 \Rightarrow y = \frac{1}{2}.$$

- Đồ thị : (C) là một hyperbol xiên góc nhọn :
 - Đường thẳng $x = 1$ là tiệm cận đứng.

- Đường thẳng $y = x + 2$ tiếp cận xiên.
- Điểm $(2; 5)$ làm điểm cực tiểu.
- Điểm $(0; 1)$ làm điểm cực đại.



2. Viết phương trình của tiếp tuyến song song với : $4y - 3x + 1 = 0$

Tiếp tuyến có hệ số góc : $k = \frac{3}{4}$

Gọi $M_0(x_0; y_0)$ là tiếp điểm.

$$\text{Ta có : } \frac{x_0^2 - 2x_0}{(x_0 - 1)^2} = \frac{3}{4} \Leftrightarrow 4x_0^2 - 8x_0 = 3x_0^2 - 6x_0 + 3.$$

$$\Leftrightarrow x_0^2 - 2x_0 - 3 = 0 \Leftrightarrow x_0 = -1 \text{ hay } x_0 = 3.$$

$$\text{PTTT : } y = \frac{3}{4}(x + 1) + \frac{1}{2} \Leftrightarrow y = -\frac{3}{4}x + \frac{5}{4}$$

$$\text{và : } y = \frac{3}{4}(x - 3) + \frac{11}{2} \Leftrightarrow y = \frac{3}{4}x + \frac{13}{4}$$

3. Biện luận theo m số nghiệm của : $\sin^2 x + (1 - m)\sin x + m - 1 = 0$ (*)

Đặt : $t = \sin x \quad t \in (-1; 1)$

$$(*) \Leftrightarrow t^2 + (1 - m)t + (m - 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow t^2 + t - mt - 1 + m = 0 \Leftrightarrow t^2 + t - 1 = m(t - 1)$$

$$\Leftrightarrow \frac{t^2 + t - 1}{(t - 1)} = m$$

$$\Leftrightarrow f(t) = m \quad (\text{với } f(t) \text{ là vế trái})$$

$f(x)$ có đồ thị (C) đã vẽ ở trên.

Dựa vào bảng biến thiên và đồ thị (C), ta có :

m	Số nghiệm
$+\infty$	0
1	1
	2
$\frac{1}{2}$	1
	1
$-\infty$	

48. ĐH NGOẠI THƯƠNG – KHỐI D

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số : $y = x^3 + 3x^2 - 9x + 5$.
2. Trong tất cả các tiếp tuyến với đồ thị của hàm số, hãy tìm tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất.

Giải

1. Khảo sát và vẽ $y = x^3 + 3x^2 - 9x + 5$

MXĐ : $D = \mathbb{R}$

$$y' = 3x^2 + 6x - 9 = 3(x^2 + 2x - 3)$$

$$y' = 0 \Leftrightarrow x = 1 \text{ hay } x = -3.$$

$$y'' = 6x + 6$$

$$y'' = 0 \Leftrightarrow x = -1$$

Vậy : $I(-1; 16)$ là tâm đối xứng.

x	$-\infty$	-3	1	$+\infty$	
y'	+	0	-	0	+
y	$-\infty$	32	0	$+\infty$	


2. Trong các tiếp tuyến với (C), tìm tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất.

Phương trình tiếp tuyến có hệ số góc :

$$y'(x_0) = 3x_0^2 + 6x_0 - 9$$

$$y''(x_0) = 6x_0 + 6$$

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
y''	-	0	+
y'	$+\infty$	-12	$+\infty$



Vậy : GTLN của hệ số góc tiếp tuyến là $k = -12$ tại điểm có $x_0 = -1$.

Phương trình tiếp tuyến : $y = y'(-1)(x + 1) + y(-1) = -12(x + 1) + 16$
 $y = -12x + 4$.

49. ĐH DL NGOẠI NGỮ – TIN HỌC

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số : $y = \frac{x^2 - x + 1}{x}$ (C).

Từ đó hãy vẽ đồ thị của hàm số $y = \frac{x^2 - x + 1}{|x|}$ (vẽ hình riêng)

2. Tìm những điểm riêng trên đồ thị (C) sao cho tiếp tuyến tại đó vuông góc với đường thẳng $y = x$.

Giải

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ (C) : $y = \frac{x^2 - x + 1}{x}$

MXĐ : $D = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Đạo hàm : $y' = \frac{(2x - 1)x - (x^2 - x + 1)}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2}$

$y' = 0 \Leftrightarrow x = 1 \text{ hay } x = -1.$

Đường tiệm cận :

• $\lim_{x \rightarrow 0} y = \infty \Rightarrow x = 0$ là đường tiệm cận đứng.

• $y = \frac{x^2 - x + 1}{x} = x - 1 + \frac{1}{x}$


với $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$ nên $y = x - 1$ là đường tiệm cận xiên.

Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$	
y'	+	0	-	-	0	+
y	$-\infty$	-3	$+\infty$	1	$+\infty$	

Giá trị đặc biệt : $x = 2 \Rightarrow y = \frac{3}{2};$


$x = -2 \Rightarrow y = \frac{-7}{2}.$



$$y = \frac{x^2 - x + 1}{|x|} = \begin{cases} \frac{x^2 - x + 1}{|x|} & \text{với } x > 0 (C_1) \\ -\frac{x^2 - x + 1}{|x|} & \text{với } x < 0 (C_2) \end{cases}$$

Đồ thị (C_1) là 1 phần của đồ thị (C) (đã vẽ) khi $x > 0$.

Đồ thị (C_2) là phần đối xứng của (C) qua trục hoành khi $x < 0$.



2. Tìm những điểm trên (C) sao cho tiếp tuyến đó vuông góc với $y = x$

Gọi $M(x_0; y_0)$ là tiếp điểm.

Hệ số góc của tiếp tuyến (Δ) tại M với (C) : $y'(x_0) = \frac{x_0^2 - 1}{x_0^2}$

Ta có : $\frac{x_0^2 - 1}{x_0^2} \cdot 1 = -1$ điều kiện $x_0 \neq 0$.

$$\Leftrightarrow x_0^2 - 1 = -x_0^2 \Leftrightarrow 2x_0^2 = 1.$$

$$\Leftrightarrow x_0 = \frac{\sqrt{2}}{2} \text{ hay } x_0 = -\frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$\bullet \quad x_0 = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow y = \frac{3 - \sqrt{2}}{\sqrt{2}}$$

$$\bullet \quad x_0 = -\frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow y = -\frac{3 + \sqrt{2}}{\sqrt{2}}$$

$$M_1\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{3 - \sqrt{2}}{\sqrt{2}}\right); \quad M_2\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{3 + \sqrt{2}}{\sqrt{2}}\right).$$

50. HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG

Cho hàm số : $y = x^3 - 12x + 12$.

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số đã cho.
2. Xác định giao điểm của đồ thị với đường thẳng $y = -4$.
3. Tìm trên đường thẳng $y = -4$ các điểm mà từ đó có thể kẻ đến đồ thị của hàm số đã cho ba tiếp tuyến phân biệt.

Giải

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ (C) : $y = x^3 - 12x + 12$

MXĐ : $D = \mathbb{R}$.

$$y' = 3x^2 - 12 = 3(x^2 - 4)$$

$$y' = 0 \Leftrightarrow x = 2 \text{ hay } x = -2$$

$$y'' = 6x$$

$$y'' = 0 \Leftrightarrow x = 0$$


Vậy : $I(0; 12)$ là tâm đối xứng vừa là điểm uốn của (C).

Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	-2		2	$+\infty$
y'	+	0	-	0	+
y	$-\infty$	↗ 28	↘ -4	↗ $+\infty$	

Đồ thị (C) :

- Có điểm cực tiểu (2; -4), điểm cực đại (-2; 28)
- Có điểm uốn $I(0; 12)$.



2. Xác định giao điểm của đồ thị với đường thẳng $y = -4$

Phương trình hoành độ giao điểm :

$$x^3 - 12x + 12 = -4 \Leftrightarrow x^3 - 12x + 16 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - 2)(x^2 + 2x - 8) = 0$$

$$\Leftrightarrow x = 2 \text{ (kép)} \quad \text{hay} \quad x = -4 \text{ (đơn)}$$

$$\bullet \quad x = 2 \Rightarrow y = -4 \text{ (tiếp điểm)}$$

$$\bullet \quad x = -4 \Rightarrow y = -4 \text{ (giao điểm).}$$

3. Tìm trên đường thẳng $y = -4$ các điểm mà từ đó kẻ được 3 tiếp tuyến với đồ thị (C)

Nhận xét: Mỗi tiếp tuyến với (C) chỉ có 1 tiếp điểm.

Tiếp tuyến (Δ) tại $M(x_0; y_0)$:

$$y = y'(x_0)(x - x_0) + y(x_0)$$

$$\Rightarrow y = (3x_0^2 - 12)(x - x_0) + x_0^3 - 12x_0 + 12$$

$$(\Delta) \text{ qua } A(a; -4) \Leftrightarrow -4 = (3x_0^2 - 12)(a - x_0) + x_0^3 - 12x_0 + 12$$

$$\Leftrightarrow 0 = -2x_0^3 + 16 + 3(x_0^2 - 4)a.$$

$$\Leftrightarrow 0 = -2(x_0^3 - 8) + 3(x_0^2 - 4)a$$

$$\Leftrightarrow 0 = (x - 2)[3(x + 2)a - 2(x_0^2 + 2x + 4)]$$

$$\Leftrightarrow 0 = (x - 2).g(x)$$

a thỏa mãn bài toán.

$$\text{Với: } g(x) = -2x_0^2 - 4x_0 - 8 + 3ax_0 + 6a$$

$$\Leftrightarrow g(x) = -2x_0^2 + x_0(3a - 4) + 6a - 8$$

($g(x)$ có 2 nghiệm phân biệt khác 2)

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (3a - 4)^2 + 8(6a - 8) > 0 \\ g(2) \neq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a > \frac{4}{3} \text{ hay } a < -4 \\ a \neq 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a > \frac{4}{3} \text{ và } a \neq 2 \\ a < -4. \end{cases}$$

51. CAO ĐẲNG SỬ PHẠM

Cho hàm số: $y = f(x) = \frac{x+1}{x-1}$.

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (H) của hàm số.

2. Gọi (d) là đường thẳng có phương trình: $2x - y + m = 0$ (m là tham số thực)

Chứng minh rằng (d) luôn cắt (H) tại hai điểm phân biệt A, B trên hai nhánh của (H).

3. Xác định m để độ dài đoạn thẳng AB ngắn nhất.

Giải

1. Khảo sát và vẽ đồ thị (H) : $y = \frac{x+1}{x-1}$

MXĐ : $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$

$$\Rightarrow y' = \frac{(x-1) - (x+1)}{(x-1)^2} = \frac{-2}{(x-1)^2} < 0, \forall x \in D.$$

Đường tiệm cận : • $\lim_{x \rightarrow \infty} y = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+1}{x-1} = 1$

$y = 1$ là đường tiệm cận ngang.

• $\lim_{x \rightarrow 1} y = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x+1}{x-1} = \infty$

$x = 1$ là đường tiệm cận đứng.

Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	1	$+\infty$
y'	-		-
y	1	$+\infty$	1

$\swarrow$ $\searrow$
 $-\infty$ 1


Giá trị đặc biệt :

$x = 2 \Rightarrow y = 3$

$x = 0 \Rightarrow y = -1$

$x = 3 \Rightarrow y = 2$

$x = -1 \Rightarrow y = 0$



Đồ thị là một hyperbol vuông góc có đường tiệm cận ngang $y = 1$ và đường tiệm cận đứng $x = 1$.

2. Chứng minh rằng (d) luôn cắt (H) tại hai điểm phân biệt thuộc 2 nhánh khác nhau

Phương trình hoành độ giao điểm của (d) và $y = f(x)$:

$$\frac{x+1}{x-1} = 2x+m \quad (x \neq 1) \Leftrightarrow x+1 = (2x+m)(x-1)$$

$$\Leftrightarrow x+1 = 2x^2 + mx - 2x - m$$

$$\Leftrightarrow 0 = 2x^2 + (m-3)x - (m+1) \quad (1)$$

$$\begin{aligned} 2f(1) &= 2[2 + (m - 3) - m - 1] \\ &= 2(-2) = -4 < 0 \end{aligned}$$

Vậy : (1) có 2 nghiệm phân biệt thỏa mãn $x_1 < 1 < x_2$.

3. Xác định m để AB ngắn nhất

Gọi $A(x_1; y_1)$ và $A(x_2; y_2)$

$$\begin{aligned} AB^2 &= (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 \\ &= (x_2 - x_1)^2 + (2x_2 + m - 2x_1 - m)^2 \\ &= (x_2 - x_1)^2 + 4(x_2 - x_1)^2 = 5(x_2 - x_1)^2 \\ &= 5(x_2 + x_1)^2 - 4x_1x_2 = 5\left[\left(\frac{3-m}{2}\right)^2 + 4\frac{m+1}{2}\right] \\ &= \frac{5}{4}[(3-m)^2 + 8m + 8] = \frac{5}{4}[m^2 + 2m + 17] \\ &= \frac{5}{4}[(m+1)^2 + 15] \geq \frac{5}{4} \cdot 16 = 20 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow AB = 2\sqrt{5} \Leftrightarrow m = -1.$$

52. ĐH VĂN LANG - KHỐI A

Cho hàm số : $y = \frac{x^2 \cos \alpha + x + \sin^2 \alpha \cos \alpha + \sin \alpha}{x + \cos \alpha}$

trong đó tham số $\alpha \neq k\pi$. (k nguyên).

- Tìm giá trị của α để hàm số có cực đại và cực tiểu.
- Chứng minh rằng tiệm cận xiên của đồ thị hàm số luôn tiếp xúc với một parabol (P) cố định.
- Tìm quỹ tích tiếp điểm của tiệm cận xiên với parabol (P).

Giải

- Tìm giá trị của α để hàm số có cực đại và cực tiểu

$$\begin{aligned} y &= \frac{x^2 \cos \alpha + x + \sin^2 \alpha \cos \alpha + \sin \alpha}{x + \cos \alpha} \\ y' &= \frac{x^2 \cos \alpha + 2x \cos^2 \alpha + \cos \alpha - \sin \alpha - \sin^2 \alpha \cos \alpha}{(x + \cos \alpha)^2} \\ &= \frac{g(x)}{(x + \cos \alpha)^2} \end{aligned}$$

α thỏa mãn bài toán.

$$\begin{cases} \Delta'_g > 0 \\ g(-\cos\alpha) \neq 0 \\ \cos\alpha \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sin\alpha \cos\alpha > 0 \\ \alpha \neq k\pi \\ \alpha \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \sin 2\alpha > 0 \\ \alpha \neq \frac{\pi}{2} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} l2\pi < 2\alpha < \pi + l2\pi \\ \alpha \neq \frac{\pi}{2} \end{cases} \Leftrightarrow l\pi < \alpha < \frac{\pi}{2} + l\pi \quad (l \in \mathbb{Z}).$$

Đường tiệm cận xiên tiếp xúc với parabol (P) cố định :

$$y = \frac{x^2 \cos\alpha + \sin^2\alpha \cos\alpha + \sin\alpha}{x + \cos\alpha} = x \cos\alpha + \sin^2\alpha + \frac{\sin\alpha}{x + \cos\alpha}$$

Với $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sin\alpha}{x + \cos\alpha} = 0$ nên $y = x \cos\alpha + \sin^2\alpha$ là đường tiệm cận xiên.

$$\text{Suy ra : } y = x \cos\alpha + 1 - \cos^2\alpha = -\left(\cos\alpha - \frac{1}{2}x\right)^2 + \frac{1}{4}x^2 + 1 \quad (*)$$

(*) chứng tỏ đường tiệm cận xiên luôn tiếp xúc với parabol cố định :

$$y = \frac{1}{4}x^2 + 1 \text{ vì luôn có nghiệm kép } x = 2\cos\alpha.$$

Quy tích tiếp điểm của đường tiệm cận xiên với (P)

Tọa độ tiếp điểm : $x_0 = 2\cos\alpha$;

$$y_0 = \frac{1}{4}4\cos^2\alpha + 1 = \cos^2\alpha + 1$$

Thay $\cos\alpha = \frac{x_0}{2}$ vào $y_0 = 1 + \cos^2\alpha$, ta được : $y_0 = \frac{x_0^2}{4} + 1$

Vậy : quỹ tích của tiếp điểm là parabol cố định ở trên với điều kiện

$$x_0 \neq \frac{1}{2} \quad \text{và} \quad x_0 \neq -\frac{1}{2} \quad (\alpha \neq k\pi).$$

53. DH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ

Cho hàm số : $y = x^3 - mx + m - 2$ có đồ thị là (C_m) .

Tìm điểm cố định của (C_m) khi m thay đổi.

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi $m = 3$.

Dùng đồ thị (C) biện luận theo k số nghiệm của phương trình :

$$x^3 - 3x - k + 1 = 0.$$

Giải

1. Điểm cố định của (C_m)

$$(C_m) : y = x^3 - mx + m - 2 \Leftrightarrow y = x^3 - m(x - 1) - 2$$

$$(1) \text{ nghiệm đúng, } \forall m \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} x - 1 = 0 \\ y = x^3 - 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = -1 \end{cases}$$

Vậy : (C_m) qua $A(1; -1)$, cố định $\forall m \in \mathbb{R}$.

2. Khảo sát và vẽ (C) khi $m = 3$

Ta có : $(C) : y = x^3 - 3x + 1$.

MXĐ : $D = \mathbb{R}$

Đạo hàm : $y' = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1)$

$$y' = 0$$


Điểm cực tiểu : $(1; -1)$.

Điểm cực đại : $(-1; 3)$.

Điểm uốn : $(0; 1)$.

Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'	+	0	-	0	+
y	$-\infty$	3		-1	$+\infty$



3. Biện luận số nghiệm : $x^3 - 3x - k + 1 = 0$

$$\Leftrightarrow x^3 - 3x + 1 = k$$

Đặt : $y = x^3 - 3x + 1$ thì hàm số có đồ thị (C) .

Lúc đó $y = k$ có đồ thị là đường thẳng (d) cùng phương với Ox , cắt Oy $(0; k)$. Trên đồ thị ta có :

- $k > 3$: (d) cắt (C) tại một điểm nên (1) có 1 nghiệm đơn.
- $k = 3$: (d) tiếp xúc với (C) tại điểm $(-1; 3)$ và cắt (C) tại 1 điểm $(2; -1)$ nên (1) có 1 nghiệm kép $x_1 = x_2 = -1$, một nghiệm đơn $x = 2$.
- $3 > k > -1$: (d) cắt (C) tại 3 điểm phân biệt nên (1) có 3 nghiệm đơn.
- $k = -1$: (d) tiếp xúc với (C) tại $(1; -1)$ và cắt (C) tại điểm $(-2; -1)$ nên (1) có 1 nghiệm kép $x_1 = x_2 = 1$, một nghiệm đơn $x = -2$.
- $-1 > k$: (d) cắt (C) tại 1 điểm nên (1) có 1 nghiệm đơn.

Cho hàm số : $y = \frac{x^2 + 3mx + 3m^2}{x + 2m}$

Trong trường hợp đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận, hãy chứng minh rằng giao điểm của hai đường tiệm cận đối xứng của đồ thị hàm số.

Tìm m để đồ thị hàm số có đường tiệm cận xiên đi qua $A(-1, 2)$.

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số ứng với $m = 1$.

Giải

Giao điểm của hai đường tiệm cận :

Hàm số có thể viết thành : $y = x + m + \frac{m^2}{x + 2m}$ (1)

Khi $m \neq 0$ thì hàm số có đường tiệm cận xiên : $y = x + m$.

Hàm số có đường tiệm cận đứng : $x = -2m$.

Giao điểm I của hai đường tiệm cận ấy có tọa độ : $(x = -2m; y = -m)$

Trong phép tịnh tiến $\rightarrow$ OI , công thức đổi trục : $\begin{cases} x = X - 2m \\ y = Y - m \end{cases}$

Thay vào (1), ta có : $Y = X + \frac{m^2}{X}$.

Đây là hàm số lẻ nên đồ thị nhận gốc I làm tâm đối xứng.

Khi $m \neq 0$, đồ thị của hàm số nhận giao điểm I của hai đường tiệm cận làm tâm đối xứng.

Tìm m để đồ thị có đường tiệm cận xiên qua $A(-1; 2)$.

Đường tiệm cận xiên $y = x + m$ qua A nên : $2 = -1 + m \Leftrightarrow m = 3$

Khảo sát và vẽ đồ thị khi $m = 1$

Khi $m = 1$ thì (1) trở thành : $y = x + 1 + \frac{1}{x + 2}$

• MXĐ : $D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$

• Đạo hàm : $y' = 1 - \frac{1}{(x + 2)^2}$

$$y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = -3 \end{cases}$$

• Điểm cực đại : $(-3; -3)$.

• Điểm cực tiểu : $(-1; 1)$.

• Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	-3	-2	-1	$+\infty$
y'		+	0	-	+
y	$-\infty$	$\nearrow$	-3	$\searrow$	$+\infty$
			$-\infty$		
			$+\infty$		
			1		
				$\nearrow$	$+\infty$

• Giới hạn :


+ $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = \pm\infty$. Ngoài ra : $y = x + 1 + \frac{1}{x+2}$ có $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{1}{x+2} \right) = 0$

nên $y = x + 1$ là đường tiệm cận xiên.

+ $\lim_{x \rightarrow -2} y = \lim_{x \rightarrow -2} \left(x + 1 + \frac{1}{x+2} \right) = \pm\infty$

nên $x = -2$ là đường tiệm cận đứng.

• Đồ thị là hyperbol xiên góc (H).



55. ĐH HÀNG HẢI

Cho hàm số : $y = -x^2 + 2x + 3$ (1) và $y = \frac{x^2}{2} - 4x + 3$ (2)

- Vẽ các đường parabol biểu diễn các hàm số (1) và (2) trên cùng một trục tọa độ. Hãy xác định các giá trị của m sao cho đường thẳng $y = m$ cắt cả 2 đường parabol (1) và (2).
- Giả sử m thỏa mãn điều kiện ở câu 1, gọi giao điểm của đường thẳng $y = m$ với parabol (1) là A và B, với parabol (2) là (C) và (D). Hãy xác định sao cho độ dài đoạn thẳng AB bằng độ dài đoạn thẳng CD. Tìm độ dài các đoạn thẳng ấy trong trường hợp chúng bằng nhau.

Giải

1. Vẽ parabol :


$(P_1) : y = -x^2 + 2x + 3$

(P_1) có điểm cực đại (1; 4) qua các điểm (0; 3), (2; 3).

$(P_2) : y = \frac{x^2}{2} - 4x + 3$

(P_2) có điểm cực tiểu (4; -5) qua các điểm (0; 3), (6; -3).

(d) : $y = m$ cắt (P_1) và $(P_2) \Leftrightarrow -5 \leq m \leq 4$ (*)



Xác định m

Phương trình hoành độ giao điểm của (P_1) và đường thẳng $(d) : y = m$ là:

$$-x^2 + 2x + 3 = m. \quad (1)$$

Gọi x_A và x_B là hoành độ giao điểm của (P_1) và (d) thì x_A và x_B là nghiệm của (1).

Mặt khác, AB cùng phương với Ox nên :

$$AB = |x_B - x_A| = 2\sqrt{4 - m} \quad (2)$$

Tương tự, phương trình hoành độ giao điểm C, D của (P_2) và (d) :

$$x^2 - 8x + 6 - 2m = 0$$

$$\text{Suy ra : } CD = |x_D - x_C| = 2\sqrt{10 + 2m} \quad (3)$$

$$\begin{aligned} \text{Theo đề bài } AB = CD &\Leftrightarrow \sqrt{4 - m} = \sqrt{10 + 2m} \quad (\text{do (2) và (3)}) \\ &\Leftrightarrow m = -2. \end{aligned}$$

$m = -2$ thỏa mãn (*), (2) và (3) nên nhận được.

Vậy : khi $m = -2$ thì $(d) : y = m$ cắt (P_1) và (P_2)

Độ dài đoạn thẳng AB

$$\text{Ta có : } AB = 2\sqrt{4 - m} \quad (\text{do (2)}) \Leftrightarrow AB = 2\sqrt{6}.$$

56. ĐH THỦY SẢN

Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số : $y = \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$

Biện luận theo tham số m số nghiệm của phương trình $\frac{x^2 - 2x + 2}{|x - 1|} = m.$

Giải

1. Khảo sát và vẽ đồ thị : $y = \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1} \Leftrightarrow y = x - 1 + \frac{1}{x - 1}$

MXĐ : $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$

Đạo hàm : $y' = 1 - \frac{1}{(x-1)^2}$; $y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$


Điểm cực đại : $(0; -2)$; điểm cực tiểu : $(2; 2)$.

Giới hạn :

- $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = \pm\infty$; $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x-1} = 0$ nên $y = x - 1$ là đường tiệm cận xiên.
- $\lim_{x \rightarrow 1} y = \pm\infty$ nên $x = 1$ là đường tiệm cận đứng.


Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$	
y'	+	0	-	-	0	+
y	$-\infty$	$\nearrow -2$	$\searrow -\infty$	$+\infty$	$\searrow 2$	$\nearrow +\infty$



Đồ thị là 1 hyperbol xiên góc (H).

2. Biện luận :



$$\text{Đặt : } y = \frac{x^2 - 2x + 2}{|x - 1|} = \begin{cases} \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1} & \text{khi } x > 1 \\ \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1} & \text{khi } x < 1 \end{cases} \quad (1)$$

(2)

Do đó, đồ thị của $y = \frac{x^2 - 2x + 2}{|x - 1|}$ gồm hai nhánh :

- Nhánh (C_1) trùng với phần của (H) khi $x > 1$ [do (1)].
- Nhánh (C_2) đối xứng của (H) qua Ox khi $x < 1$ [do (2)].

Mặt khác, vì $\frac{x^2 - 2x + 2}{|x - 1|} = m$ (3)

$$\text{và } y = \frac{x^2 - 2x + 2}{|x - 1|} \text{ nên } y = m$$

Đồ thị của $y = m$ là đường thẳng (d) cùng phương với Ox .

Trên đồ thị, ta thấy :

- $m = 2$: (d) tiếp xúc với (C_1) tại $(2; 2)$ và (C_2) tại $(0; 2)$ nên (3) có 2 nghiệm kép : $(x_1 = x_2 = 2) \vee (x_3 = x_4 = 0)$.
- $m > 2$: (d) cắt (C_1) và (C_2) tại 4 điểm phân biệt nên (3) có 4 nghiệm phân biệt.

NĂM 1997

57. CƠ KINH TẾ ĐỐI NGOẠI – KHỐI A

Cho hàm số : $y = \frac{x^2 - 3x + m}{x - 2}$, đồ thị là (C_m) .

Xác định m để hàm số y có cực trị. Tìm tập hợp các điểm cực trị của (C_m) .

Khảo sát và vẽ đồ thị (C_3) của hàm số khi $m = 3$.

Tìm tiếp tuyến của (C_3) đi qua điểm $(1; 0)$.

Giải

Xác định m để hàm số có cực trị

Miền xác định : $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$

$$\text{Đạo hàm: } y' = \frac{(x - 2)(2x - 3) - (x^2 - 3x + m)}{(x - 2)^2} = \frac{x^2 - 4x + 6 - m}{(x - 2)^2}$$

Hàm số có cực trị $\Leftrightarrow y' = 0$ và đổi dấu

$$\Leftrightarrow x^2 - 4x + 6 - m = 0 \text{ có } \Delta' > 0$$

$$\text{Biệt số : } \Delta' = m - 2. \quad \Delta' \geq 0 \Leftrightarrow m \geq 2.$$

Khi $m = 2$ thì $y' = 1$ (không đổi dấu) nên $m = 2$ (loại).

Vậy hàm số có cực trị khi $m > 2$.

Gọi $M(x_0; y_0)$ là điểm cực trị ta có : $y'(x_0) = \frac{u'v - v'u}{v^2}$

$$y'(x_0) = 0 \Rightarrow \frac{u}{v} = \frac{u'}{v'} \Rightarrow v_0 = \frac{u'}{v'} = 2x_0 - 3 \quad \forall m$$

2. Khảo sát và vẽ đồ thị (C_3) khi $m = 3$

Khi $m = 3$, ta có : $y = \frac{x^2 - 3x + 3}{x - 2} = x - 1 + \frac{1}{x - 2}$

• Miền xác định : $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$

• Đạo hàm : $y' = \frac{x^2 - 4x + 3}{(x - 2)^2}$

$$y' = 0 \Leftrightarrow x = 1 \text{ hay } x = 3.$$

Khi $x = 1$ thì : $y = -1$ (CĐ)

Khi $x = 3$ thì : $y = 3$ (CT).


• $\lim_{x \rightarrow 2} y = \pm \infty$ nên $x = 2$ là tiệm cận đứng.

• $\lim_{x \rightarrow \infty} [y - (x - 1)] = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x - 2} = 0$ nên $y = x - 1$ là **tiệm cận xiên**.

Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	1	2	3	$+\infty$	
y'	+	0	-	-	0	+
y	$-\infty$	$\nearrow -1$	$\searrow -\infty$	$\nearrow +\infty$	$\searrow 3$	$\nearrow +\infty$

Đồ thị (C_1) là một hyperbol xiên góc.



3. Tiếp tuyến của (C_3) đi qua điểm $(1; 0)$

Gọi d là đường thẳng qua $A(1; 0)$ có hệ số góc k .

Phương trình của d : $y = k(x - 1)$

Phương trình hoành độ giao điểm của (C_3) và d :

$$\frac{x^2 - 3x + 3}{x - 2} = kx - k \Leftrightarrow \begin{cases} (1 - k)x^2 - 3(1 - k)x + 3 - 2k = 0 \\ x \neq 2 \end{cases} \quad (1)$$

Để cho d là tiếp tuyến của (C_3) , (1) phải có nghiệm số kép ($x \neq 2$) nghĩa là :

$$\Delta = 0 \Leftrightarrow k^2 + 2k - 3 = 0 \Leftrightarrow k = 1 \vee k = -3.$$

$k = 1 \Rightarrow y = x - 1$ là đường tiệm cận xiên của (C_3) .

$k = 1$ bị loại.

Vậy tiếp tuyến của (C_3) qua $(1; 0)$ là : $y = -3x + 3$.

58. ĐH DL VĂN LANG – KHỐI B, D

Cho hàm số : $y = \frac{x^2 + m(m^2 - 1)x - m^4 + 1}{x - m}$.

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi $m = -1$.
2. Chứng tỏ rằng với mọi m , hàm số luôn luôn có cực trị.
3. Tìm tập hợp điểm cực đại của hàm số khi m thay đổi.

Giải

1. Khảo sát và vẽ đồ thị khi $m = -1$

Khi $m = -1$ thì : $y = \frac{x^2}{x + 1} = x - 1 + \frac{1}{x + 1}$

• Miền xác định : $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

• Đạo hàm : $y' = 1 - \frac{1}{(x + 1)^2}$

$$y' = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee x = -2$$

• Khi $x = 0$ thì $y = 0$


Khi $x = -2$ thì $y = -4$

• $\lim_{x \rightarrow 1} y = \pm\infty \Rightarrow x = 1$ là đường tiệm cận đứng.

• $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [y - (x - 1)] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x + 1} = 0$

$\Rightarrow y = x - 1$ là đường tiệm cận xiên.

Đồ thị là hyperbol xiên góc.



2. Chứng tỏ rằng với mọi m , hàm số luôn luôn có cực trị

$$\text{Ta có : } y = \frac{x^2 + (m^2 - 1)mx + 1 - m^4}{x - m}$$

$$y' = \frac{(x - m)[2x + m(m^2 - 1)] - [x^2 + m(m^2 - 1)x + 1 - m^4]}{(x - m)^2}$$

$$y' = \frac{x^2 - 2mx + m^2 - 1}{(x - m)^2}$$

Ta thấy : $x^2 - 2mx + m^2 - 1 = 0$ có biệt số :

$$\Delta' = m^2 - m^2 + 1 = 1 > 0, \forall m \in \mathbb{R}.$$

Vậy y luôn luôn có cực trị.

3. Tập hợp các điểm cực đại

$$\text{Ta có : } y' = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2mx + m^2 - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = m - 1 \vee x = m + 1.$$

Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	m - 1			m	m + 1			$+\infty$
y'		+	0	-		-	0	+	
y		↗ CD ↘				↘ CT ↗			

$$\text{Điểm cực đại của hàm số có tọa độ : } \begin{cases} x = m - 1 \\ y = 2x + m(m^2 - 1) \end{cases}$$

Khử m giữa (x, y) , ta được : $y = x(x^2 + 3x + 4)$

Vậy tập hợp những điểm cực đại là toàn bộ đồ thị của hàm số :

$$y = x(x^2 + 3x + 4).$$

59. ĐH DL VĂN LANG – KHỐI A

Cho hàm số : $y = \frac{2x^2 + (1 - m)x + 1 + m}{x - m}$ (1)

Với $m = 1$, hãy khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.

Chứng minh rằng với mọi $m \neq -1$, đồ thị hàm số (1) luôn tiếp xúc với một đường thẳng cố định tại một điểm cố định.

Xác định m để hàm số đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$.

Giải

Khảo sát và vẽ đồ thị

Khi $m = 1$ thì (1) $\Rightarrow y = \frac{2x^2 + 2}{x - 1} = 2x + 2 + \frac{4}{x - 1}$

• Miền xác định : $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$

• Đạo hàm : $y' = 2 - \frac{4}{(x - 1)^2}$

$$y' = 0 \Leftrightarrow x = 1 \pm \sqrt{2}$$

– Khi $x = 1 + \sqrt{2}$ thì $y = 4 + 4\sqrt{2}$ (CT)

– Khi $x = 1 - \sqrt{2}$ thì $y = 4 - 4\sqrt{2}$ (CD)

• Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	$1 - \sqrt{2}$	1	$1 + \sqrt{2}$	$+\infty$
y'	+	0	-	0	+
y	$-\infty$	$4 - 4\sqrt{2}$	$+\infty$	$4 + 4\sqrt{2}$	$+\infty$

• $\lim_{x \rightarrow 1} y = \pm \infty$

$x = 1$ là đường tiệm cận đứng.


• $\lim_{x \rightarrow +\infty} [y - (2x + 2)] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{x - 1} = 0$

$y = 2x + 2$ là đường tiệm cận xiên góc.

Đồ thị của (1) tiếp xúc với một đường thẳng cố định tại một điểm cố định

Điểm cố định của đồ thị của (1).

(1) $\Leftrightarrow \begin{cases} x \neq m \\ (x - m)y = 2x^2 + (1 - m)x + 1 + m \end{cases}$



$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \neq m \\ xy - 2x^2 - x - 1 = m(y - x + 1) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} xy - 2x^2 - x - 1 = 0 \\ y - x + 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ y = -2 \end{cases}$$

Vậy đồ thị của (1) qua $A(-1; -2)$ cố định.

• Đạo hàm của y : $y' = \frac{2x^2 - 4mx + m^2 - 2m - 1}{(x - m)^2}$

Khi $x = -1$ thì $y' = 1, \forall m \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

Vậy tiếp tuyến tại $A(-1; -2)$ của đồ thị của (1) có phương trình : $y = x - 1$ nên tiếp tuyến này cố định.

c) Xác định m

Ta có : $y' = \frac{2x^2 - 4mx + m^2 - 2m - 1}{(x - m)^2}$

Dấu của y' là dấu của $f(x) = 2x^2 - 4mx + m^2 - 2m - 1$.

Biệt số : $\Delta' = 4m^2 - 2(m^2 - 2m - 1) = 2m^2 + 4m + 2 = 2(m + 1)^2$.

$f(x)$ có 2 nghiệm : $x_1 = \frac{2m + (m + 1)\sqrt{2}}{2} = \frac{(2 + \sqrt{2})m + \sqrt{2}}{2}$

$$x_2 = \frac{2m - (m + 1)\sqrt{2}}{2} = \frac{(2 - \sqrt{2})m - \sqrt{2}}{2}$$

Ta có : $2(x_1 - x_2) = 2m + (m + 1)\sqrt{2} - [2m - (m + 1)\sqrt{2}]$

$$2(x_1 - x_2) = 2(m + 1)\sqrt{2} \quad (1)$$

Có 2 trường hợp :

i) $m \geq -1$. Lúc đó $x_1 > x_2$ [do (1)]

Để hàm có đồng biến trên $(1; +\infty)$, ta phải có :

$$x_1 \leq 1 \Leftrightarrow \frac{2m + (m + 1)\sqrt{2}}{2} \leq 1 \Leftrightarrow 2m + m\sqrt{2} \leq 2 - \sqrt{2}$$

$$\Leftrightarrow m \leq \frac{2 - \sqrt{2}}{2 + \sqrt{2}} \Leftrightarrow m \leq \frac{(2 - \sqrt{2})^2}{2}$$

Vậy khi $-1 \leq m \leq \frac{(2 - \sqrt{2})^2}{2}$ thì y đồng biến trên $(1; +\infty)$.

ii) $m < -1$. Lúc đó $x_2 > x_1$ [do (1)].

Để hàm số đồng biến trên $(1; +\infty)$, ta phải có :

$$x_2 \leq 1 \Leftrightarrow \frac{2m - (m+1)\sqrt{2}}{2} \leq 1 \Leftrightarrow (2 - \sqrt{2})m \leq 2 + \sqrt{2}$$

$$\Leftrightarrow m \leq \frac{(2 + \sqrt{2})^2}{2} \Leftrightarrow m \leq 3 + 2\sqrt{2}.$$

Vậy khi $m \leq -1$ thì y đồng biến trên $(1; +\infty)$.

Tóm lại, khi $m \leq 3 - 2\sqrt{2}$ thì y đồng biến trên $(1; +\infty)$.

60. ĐH DL NGOẠI NGỮ – TIN HỌC

Cho hàm số : $y = x^3 + k(x + 1) + 1$ (1)

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số ứng với $k = -3$.
2. Biện luận theo tham số m nghiệm của phương trình : $x^3 - 3x = m$.
3. Gọi (C_k) là đồ thị của hàm số (1). Tìm tất cả các giá trị của k để đường thẳng $y = x + 1$ tiếp xúc với (C_k) .

Giải

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị khi $k = -3$

Khi $k = -3$, thì : $y = x^3 - 3(x + 1) + 1$.

• Miền xác định : $D = \mathbb{R}$.

• Đạo hàm : $y' = 3x^2 - 3$

$$y' = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$$

Khi $x = 1$ thì $y = -4$.

Khi $x = -1$ thì $y = 0$.

• Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$		
y'		+	0	-	0	+
y	$-\infty$		0		-4	$+\infty$

• Điểm uốn : $y'' = 6x = 0 \Rightarrow x = 0; y = -2$


$I(0; -2)$.

• Đồ thị : hình bên.

2. Biện luận : (C) : $y = x^3 - 3x - 2$.

$$(d) : y = m - 2.$$

thì $x^3 - 3x = m$ là phương trình hoành độ giao điểm của (C) và (d).



Trên đồ thị, ta có :

- $m - 2 > 0 \Leftrightarrow m > 2$

(C) và (d) có 1 giao điểm duy nhất nên $x^3 - 3x = m$ có một nghiệm đơn

- $m - 2 = 0 \Leftrightarrow m = 2$ thì (C) và (d) tiếp xúc nhau tại : $x = -1$ cắt nhau tại $x = 2$ nên $x^3 - 3x = m$ có 1 nghiệm kép $x = -1$ và nghiệm đơn tại $x = 2$.

- $-4 < m - 2 < 0 \Leftrightarrow -2 < m < 0$ thì (C) và (d) có ba giao điểm khác nhau nên $x^3 - 3x = m$ có ba nghiệm đơn.

- $-4 = m - 2 \Leftrightarrow m = -2$ thì $x^3 - 3x = m$ có một nghiệm kép $x = 1$ và một nghiệm đơn $x = -2$.

- $m - 2 < -4 \Leftrightarrow m < -2$ thì $x^3 - 3x = m$ có một nghiệm đơn.

3. Tìm tất cả các giá trị của k

Phương trình hoành độ giao điểm của (C_k) và $(\Delta) : y = x + 1$ là :

$$x^3 + k(x + 1) + 1 = x + 1 \Leftrightarrow (x + 1)(x^2 - x + 1 + k) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + 1 = 0 & (1) \\ x^2 - x + 1 + k = 0 & (2) \end{cases}$$

$$(C_k) \text{ và } (\Delta) \text{ tiếp xúc với nhau} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \text{ là nghiệm của (2)} \\ \text{Biệt số } \Delta \text{ của (2) bằng 0} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} k = -3 \\ \Delta = 1 - 4(1 + k) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow k = -\frac{3}{4}$$

Vậy khi $k = -3 \vee k = -\frac{3}{4}$ thì (C_k) tiếp xúc với (Δ) .

61. ĐH AN NINH - ĐH CẢNH SÁT - KHỐI A

Cho hàm số : $y = x^3 - (m + 2)x^2 + (1 - m)x + 3m - 1$ (1)

1. Với giá trị nào của m thì hàm số (1) đạt cực trị tại x_1, x_2 thỏa mãn điều kiện : $|x_1 - x_2| = 2$.

2. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi $m = 1$.

Giải

1. Giá trị của m

Đạo hàm : $y' = 3x^2 - 2(m + 2)x + 1 - m$

x_1, x_2 là các nghiệm của $y' = 0$.

Mà : $|x_1 - x_2| = 2$ nên $x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2 - 4 = 0$

$$\Leftrightarrow (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 - 4 = 0 \quad (*)$$

Theo định lí Viét, ta có : $x_1 + x_2 = \frac{2(m+2)}{3}$ và $x_1 \cdot x_2 = \frac{1-m}{3}$

Nên (*) trở thành : $\frac{4}{9}(m+2)^2 - \frac{4}{3}(1-m) - 1 = 0 \Leftrightarrow m = 1 \vee m = -8$.

Mặt khác, $y' = 0$ có 2 nghiệm x_1, x_2 phân biệt khi :

$$\Delta' = (m+2)^2 - 3(1-m) > 0 \Leftrightarrow m^2 + 7m + 1 > 0$$

$$\Leftrightarrow m < \frac{-7-3\sqrt{5}}{2} \vee m > \frac{-7+3\sqrt{5}}{2}$$

Ta nhận được cả 2 giá trị của m đó là : $m = -8 \vee m = 1$.

2. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C)

Khi $m = 1$ thì (1) trở thành : $y = x^3 - 3x^2 + 2$

• Miền xác định : $D = \mathbb{R}$.

• Đạo hàm : $y' = 3x^2 - 6x$


$$y' = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee x = 2$$

• Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
y'	+	0	-	0	+
y			2		$+\infty$
	$-\infty$		-2		

• Điểm uốn : $y'' = 0 \Leftrightarrow 6x - 6 = 0$
 $\Leftrightarrow x = 1$

$I(1; 0)$



62. ĐH THỦY SẢN

Cho hàm số : $y = 2x^3 + 3x^2 - 1$

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.

2. Biện luận theo m số nghiệm của phương trình : $2x^3 + 3x^2 - 1 - m = 0$.

Giải

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị : $y = 2x^3 + 3x^2 - 1$

• Miền xác định : $D = \mathbb{R}$

• Đạo hàm : $y' = 6x^2 + 6x$

$$y' = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee x = -1$$


Khi $x = 0$ thì $y = -1$

Khi $x = -1$ thì $y = 0$

- Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	-1	0	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	0	-1	$+\infty$	

- Điểm uốn : $I\left(-\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right)$
- Đồ thị là đường cong (C).



2. Biện luận số nghiệm của : $2x^3 + 3x^2 - 1 - m = 0$ (1)

Ta có : $2x^3 + 3x^2 - 1 = m$

Đặt $y = 2x^3 + 3x^2 - 1$ có 1 đồ thị là (C) thì $y = m$ có đồ thị là đường thẳng (d) // Ox.

Trên đồ thị ta thấy :

- $m > 0$: (C) và (d) có 1 giao điểm duy nhất nên (1) có 1 nghiệm đơn.
- $0 = m$: (C) và (d) tiếp xúc với nhau tại $x = -1$ và cắt nhau tại 1 điểm nên (1) có 1 nghiệm đơn và 1 nghiệm kép.
- $-1 < m < 0$: (C) và (d) có 3 giao điểm phân biệt nên (1) có 3 nghiệm đơn.
- $m = -1$: (1) có 1 nghiệm đơn và 1 nghiệm kép.
- $m < -1$: (1) có 1 nghiệm đơn.

63. TRUNG HỌC KỸ THUẬT Y TẾ 3

Cho hàm số : $y = \frac{x^2 + x - 3}{x + 2}$.

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2. Tìm các giao điểm của (C) với đường thẳng (D) : $5x - 6y - 13 = 0$.

3. Xác định m để đường thẳng $(\Delta): y = 2x + m$ tiếp xúc với (C) . Dùng kết quả này biện luận theo m số nghiệm của phương trình :

$$\frac{x^2 + x - 3}{x + 2} = 2x + m.$$

4. Tìm trên trục hoành những điểm từ đó kẻ được đúng 2 tiếp tuyến đến (C) .

Giải

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số : $y = \frac{x^2 + x - 3}{x + 2}$

- Miền xác định : $D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$

- Đạo hàm : $y' = x - 1 - \frac{1}{x + 2} > 0, \quad \forall x \in D.$

- Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
y'	$+$		$+$
y	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$

- $\lim_{x \rightarrow -2} y = \pm \infty$ nên $x = -2$ là đường tiệm cận đứng.

- $\lim_{x \rightarrow \pm \infty} y = \pm \infty$

- $\lim_{x \rightarrow \pm \infty} [y - (x - 1)] = \lim_{x \rightarrow \pm \infty} \frac{-1}{x + 2} = 0$


nên $y = x - 1$ là đường tiệm cận xiên.

- Đồ thị (C) là một hyperbol xiên góc qua các điểm :

$$\left(0, -\frac{3}{2}\right),$$

$$(-1; -3),$$

$$(-3; -3).$$



2. Giao điểm của (C) và (D) :

$$\text{Phương trình của (D) : } 5x - 6y - 13 = 0 \Leftrightarrow y = \frac{5}{6}x - \frac{13}{6}.$$

Phương trình hoành độ giao điểm của (C) và (D) :

$$\frac{x^2 + x - 3}{x + 2} = \frac{5}{6}x - \frac{13}{6} \Leftrightarrow 6(x^2 + x - 3) = (5x - 13)(x + 2)$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 9x + 8 = 0$$

$$\Leftrightarrow x = -1 \vee x = -8.$$

Vậy : (C) và (D) cắt nhau tại : $(-1; -3)$ và $\left(-8, -\frac{53}{6}\right)$.

3. Xác định m để (Δ) tiếp xúc với (C) :

Phương trình hoành độ giao điểm của (C) và (Δ) :

$$\frac{x^2 + x - 3}{x + 2} = 2x + m \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq -2 \\ x^2 + x - 3 = (x + 2)(2x + m) \end{cases}$$
$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \neq -2 \\ x^2 + (m + 3)x + 2m + 3 = 0 \quad (*) \end{cases}$$

Để cho (Δ) tiếp xúc với (C), ta phải có :

$$\begin{cases} (*) \text{ có nghiệm } x \neq -2 & (1) \\ \Delta = 0 \text{ (biệt số)} & (2) \end{cases}$$

$$\begin{cases} (1) \text{ thuộc } (*) \text{ với mọi } m \in \mathbb{R} \\ (2) \Leftrightarrow m = -1 \vee m = 3 \end{cases}$$

Vậy khi $m = -1$ hay $m = 3$ thì (Δ) tiếp xúc với (C).

- Biện luận theo m số nghiệm của phương trình :

$$\frac{x^2 + x - 3}{x + 2} = 2x + m \quad (3)$$

Đặt : $y = \frac{x^2 + x - 3}{x + 2}$ thì hàm số này có đồ thị (C) đã vẽ ở trên

Lúc đó, đường $(\Delta) : y = 2x + m$ song song với các tiếp tuyến của (C) lần lượt có phương trình :

$$(\Delta_1) : y = 2x - 1$$

$$(\Delta_2) : y = 2x + 3.$$

Gọi M, M_1, M_2 lần lượt là giao điểm của $(\Delta), (\Delta_1), (\Delta_2)$ với trục tung ta thấy

- Khi $M \in$ tia M_1y thì (Δ) cắt (C) tại 2 điểm phân biệt. Do đó, khi $m > 3$ thì phương trình (3) có 2 nghiệm phân biệt.

Tương tự, khi $M \in M_2$. Do đó : khi $m < -1$, phương trình (3) có hai nghiệm phân biệt.

- Khi $m = 3$ hay $m = -1$ thì (Δ) trùng (Δ_1) hay (Δ_2) nên phương trình (3) có nghiệm số kép : $x_1 = x_2 = -3$ hay $x_1 = x_2 = -1$.
- Khi $m \in \text{đoạn } M_1M_2$ (bỏ M_1 và M_2) thì (Δ) không cắt (C) .

Do đó, khi $-1 < m < 3$ thì phương trình (3) vô nghiệm.

Tóm lại :

- $m < -1$ hay $m > 3$: phương trình (3) có 2 nghiệm phân biệt.
- $m = -1$ hay $m = 3$: phương trình (3) có 1 nghiệm kép :
 $x_1 = x_2 = -3$ hay $x_1 = x_2 = -1$
- $-1 < m < 3$: phương trình (3) vô nghiệm.

4. Điểm trên trục hoành từ đó kẻ được đúng 1 tiếp tuyến (C) :

Gọi $A(x_0; 0)$ là điểm trên Ox , và (d) là đường thẳng qua A có hệ số góc k .
Phương trình của (d) : $y = k(x - x_0) \Leftrightarrow y = kx - kx_0$.

Phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (C) :

$$\frac{x^2 + x - 3}{x + 2} = kx - kx_0 \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq -2 \\ x^2 + x - 3 = (kx - kx_0)(x + 2) \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \neq -2 \\ (k - 1)x^2 + (2k + kx_0 - 1)x + 3 - 2kx_0 = 0 \end{cases} \quad (4)$$

Để cho (d) tiếp xúc với (C) , ta phải có :

$$\begin{cases} k - 1 \neq 0 \\ (4) \text{ có } \Delta = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k \neq 1 \\ (2k - kx_0 - 1)^2 - 4(k - 1)(3 - 2kx_0) = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} k \neq 1 \\ (x_0 + 2)^2 k^2 - 2(3x_0 + 8)k + 13 = 0 \end{cases} \quad (5)$$

$$\begin{aligned} \bullet \text{ Với } k \neq 1, \quad (5) &\Leftrightarrow (x_0 + 2)^2 - 2(3x_0 + 8) + 13 \neq 0 \\ &\Leftrightarrow x_0 - 2x_0 + 1 \neq 0 \Leftrightarrow x_0 \neq 1 \end{aligned} \quad (6)$$

$$\bullet \text{ Với } x_0 + 2 = 0, \quad (5) \Leftrightarrow -4k + 13 = 0 \Leftrightarrow k = \frac{13}{4}.$$

Vậy khi $x_0 = -2$ thì qua A , ta có đúng một tiếp tuyến của (C) , phương trình là : $y = \frac{13}{4}x - \frac{13}{4}(-2) \Leftrightarrow y = \frac{13}{4}x - \frac{13}{2}$

- Với $x_0 + 2 \neq 0$ (5) phải có nghiệm kép, nghĩa là :
biệt số $\Delta' = (3x_0 + 8)^2 - 13(x_0 + 2)^2 = 0$

$$\Leftrightarrow x_0^2 + x_0 - 3 = 0 \quad \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = \frac{-1 + \sqrt{13}}{2} \\ x_0 = \frac{-1 - \sqrt{13}}{2} \end{cases}$$

So với (6), hai nghiệm này đều khác 1 nên nhận được.

Tóm lại, có tất cả ba điểm trên trục hoành, từ đó, ta vẽ được đúng một tiếp tuyến của (C), đó là các điểm

$$A(-2; 0), \quad A_1\left(\frac{-1 + \sqrt{3}}{2}, 0\right), \quad A_2\left(\frac{-1 - \sqrt{3}}{2}, 0\right).$$

Các điểm A_2, A_3 chính là giao điểm của (C) và trục hoành.

64. ĐH QUỐC GIA TPHCM – KHỐI A – ĐỢT 1

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số : $y = \frac{x^2 + x + 2}{x - 1}$.
2. Tìm tất cả các cặp điểm M_1, M_2 ở trên (C) và đối xứng với nhau qua điểm $I\left(0, \frac{5}{2}\right)$.

Giải

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của $y = \frac{x^2 + x + 2}{x - 1}$

- Miền xác định : $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$

- Đạo hàm : $y = x + 2 + \frac{4}{x - 1} \Rightarrow y' = 1 - \frac{4}{(x - 1)^2}$

$$y' = 0 \Rightarrow x = -1 \text{ hay } x = 3$$

- Khi $x = -1$ thì $y = -1$ (cực đại),


Khi $x = 3$ thì $y = 7$ (cực tiểu).

- Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	-1		1		3	$+\infty$
y'	+	0	-		-	0	+
y	$-\infty$	$\nearrow -1$	$\searrow -\infty$		$+\infty$	$\searrow 7$	$\nearrow +\infty$

- Tiệm cận đứng : $x = 1$
- Tiệm cận xiên : $y = x + 2$.

- Đồ thị (C) :



2. Xác định các cặp điểm M_1, M_2

Gọi d là đường thẳng qua $I\left(0, \frac{5}{2}\right)$ có hệ số góc k .

Phương trình của d : $y = kx + \frac{5}{2}$

Phương trình hoành độ giao điểm M_1, M_2 của d và (C) :

$$\frac{x^2 + x + 2}{x - 1} = kx + \frac{5}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} (1 - k)x^2 + \left(k - \frac{3}{2}\right)x + \frac{9}{2} = 0 \\ x \neq 1 \end{cases} \quad (1)$$

Gọi x_1, x_2 lần lượt là hoành độ của M_1, M_2 thì x_1, x_2 là nghiệm của (1).

$$\text{Suy ra : } x_1 + x_2 = \frac{k - \frac{3}{2}}{1 - k} \quad (2)$$

Mặt khác, I là trung điểm của M_1, M_2 nên :

$$x_1 = \frac{x_1 + x_2}{2} \Leftrightarrow x_1 + x_2 = 0 \quad (3)$$

$$(2) \text{ và } (3) \text{ cho : } k - \frac{3}{2} = 0 \Leftrightarrow k = \frac{3}{2}$$

$$\text{Lúc này } (1) \Leftrightarrow x^2 = 9 \Leftrightarrow x = \pm 3.$$

Vậy : có cặp điểm $M_1(3; 7), M_2(-3; -2)$ thỏa mãn đề bài.

65. ĐH QUỐC GIA TP HCM – KHỐI B – ĐỢT 1

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số : $y = \frac{2x - 1}{x - 1}$.
2. M là một điểm bất kì trên (C) có hoành độ $x_M = m$, tiếp tuyến tại M với (C) cắt các tiệm cận tại A, B. Gọi I là giao điểm của các tiệm cận. Chứng minh rằng M là trung điểm của AB và ΔIAB có diện tích không đổi khi m thay đổi.

Giải

$$y = f(x) = \frac{2x - 1}{x - 1} \quad (C).$$

1. Khảo sát và vẽ đồ thị (C)

- Miền xác định : $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

- $f(x) = \frac{-1}{(x - 1)^2} < 0$.

- Bảng biến thiên :


x	$-\infty$	1	$+\infty$
f'	-		-
f	2	$+\infty$	2

$\swarrow$ $-\infty$ $\searrow$

- $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 2$: tiệm cận ngang : $y = 2$.

- $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty$: tiệm cận đứng : $x = 1$.

- Điểm đặc biệt : $x = 0 \Rightarrow y = 1$
 $y = 0 \Rightarrow x = \frac{1}{2}$



2. $M(x_0; y_0)$

Phương trình tiếp tuyến tại M : $y - y_0 = f'(x_0) (x - x_0)$

$$y = \frac{-1}{(m - 1)^2} (x - m) + \frac{2m - 1}{m - 1} \quad (1)$$

Vì $y_B = 2$ nên (1) cho : $x_B = 2m - 1$.

Vì $x_A = 1$ nên : $\frac{x_A + x_B}{2} = \frac{1 + 2m - 1}{2} = m$

Suy ra : $\frac{x_A + x_B}{2} = x_M$. Vậy : $MA = MB$.

$$\forall x_A = 1 \text{ nên (1) cho : } y_A = \frac{m-1}{(m-1)^2} + \frac{2m-1}{m-1} \Leftrightarrow y_A = \frac{2m}{m-1}$$

$$\text{Ta có : } I(1; 2) \Rightarrow \begin{cases} IA = |y_A - y_I| \\ IB = |x_B - x_I| \end{cases}$$

$$\begin{aligned} \text{Do đó : } S_{IAB} &= \frac{1}{2} IA \cdot IB = \frac{1}{2} |(x_B - x_I)(y_A - y_I)| \\ &= \frac{1}{2} \left| (2m-1-1) \left(\frac{2m}{m-1} - 2 \right) \right| = \frac{1}{2} \left| 2(m-1) \cdot \frac{2}{(m-1)} \right| \end{aligned}$$

$$S_{IAB} = 2.$$

Vậy : ΔIAB có diện tích không đổi khi m thay đổi.

66. ĐH QUỐC GIA TP HCM – KHỐI A – ĐỢT 3

Cho họ đường cong (C_m) : $y = \frac{x^2 + mx - 1}{x - 1}$ (m là tham số).

1. Xét đường thẳng (L_m) : $y = mx + 2$. Tìm m sao cho (C_m) cắt (L_m) tại hai điểm phân biệt.
2. Gọi (D_m) là tiệm cận xiên của (C_m) . Tìm m sao cho (D_m) tạo với hai trục tọa độ một tam giác có diện tích bằng 8 (đơn vị diện tích).

Giải

$$(C_m) : y = \frac{x^2 + mx - 1}{x - 1}$$

$$1. (L_m) : y = mx + 2.$$

Phương trình hoành độ giao điểm của (C_m) và (L_m)

$$\frac{x^2 + mx - 1}{x - 1} = mx + 2 \quad (x \neq 1)$$

$$\Leftrightarrow x^2 + mx - 1 = mx^2 + 2x - mx - 2$$

$$\Leftrightarrow (m-1)x^2 + 2(1-m)x - 1 = 0 \quad (1) \quad (1)$$

(C_m) cắt (L_m) tại hai điểm phân biệt :

$$\Leftrightarrow (1) \text{ có 2 nghiệm phân biệt khác 1}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 1 \\ \Delta' > 0 \\ (m-1) + 2(1-m) - 1 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 1 \\ m^2 - m > 0 \\ m \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 0 \\ m > 1. \end{cases}$$

2. $(C_m) : y = x + m + 1 + \frac{m}{x-1}$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{m}{x-1} = 0$$

(C_m) có tiệm cận xiên : $y = x + m + 1$ (D_m)

(D_m) cắt Ox tại $A(-m-1; 0)$

(D_m) cắt Oy tại $B(0; m+1)$.

$$S_{\Delta OAB} = 8 \Leftrightarrow \frac{1}{2} OA \times OB = 8 \Leftrightarrow (m+1)^2 = 16 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 3 \\ m = -5. \end{cases}$$

67. ĐH QUỐC GIA TPHCM – ĐH KINH TẾ – KHỐI A

Cho hàm số : $y = \frac{4(m+1)x^2 - 4mx - (m^3 - m^2 + 2)}{2x - m}$ có đồ thị là đường cong (C_m) .

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C_1) ứng với $m = 1$.

2. Trong trường hợp tổng quát, chứng tỏ rằng tiệm cận xiên của (C_n) luôn luôn tiếp xúc với một parabol cố định khi m thay đổi.

Giải

$$y = \frac{4(m+1)x^2 - 4mx - (m^3 - m^2 + 2)}{2x - m}$$

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C_1) khi $m = 1$

$$y = f(x) = \frac{8x^2 - 4x - 2}{2x - 1} \quad (C_1).$$

Miền xác định : $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{1}{2} \right\}$


$$f'(x) = \frac{16x^2 - 16x + 8}{(2x - 1)^2}$$

$$f'(x) > 0 \quad \forall x \in D \quad (\text{vì } \Delta' < 0).$$

Ta có bảng biến thiên :

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
f'	+		+
f	$-\infty$		$+\infty$

- $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} f(x) = \infty$: Tiệm cận đứng $x = \frac{1}{2}$.
- $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$: (1) $\Leftrightarrow f(x) = 4x - \frac{2}{2x-1}$.
- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{2x-1} = 0$: Tiệm cận xiên $y = 4x$.



Đồ thị : (hình bên).

2. Khi m thay đổi, chứng minh rằng tiệm cận xiên của (C_m) luôn tiếp xúc với một parabol cố định

Ta có : $y = 2(m+1)x + m^2 - m - \frac{2}{2x-m} \quad (C_m).$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2}{2x-m} = 0$$

(C_m) có tiệm cận xiên (Δ_m) có phương trình là :

$$y = 2(m+1)x + m^2 - m \quad (*)$$

Ta có :

$$(\Delta_m) : y = m^2 + 2m \left(\frac{2x-1}{2} \right) + \left(\frac{2x-1}{2} \right)^2 - \left(\frac{2x-1}{2} \right)^2 + 2x$$

$$y = \left[m + \frac{2x-1}{2} \right]^2 + \left(-x^2 + 3x - \frac{1}{4} \right)$$

Đặt (P) : $y = -x^2 + 3x - \frac{1}{4}$

Phương trình hoành độ giao điểm của (Δ_m) và (P) :

$$\begin{aligned} \left[m + \frac{2x-1}{2} \right]^2 + \left(-x^2 + 3x - \frac{1}{4} \right) &= \left(-x^2 + 3x - \frac{1}{4} \right) \\ \Leftrightarrow \left[m + \frac{2x-1}{2} \right]^2 &= 0 \end{aligned} \quad (1)$$

Phương trình (1) luôn có nghiệm kép $x_0 = \frac{1-2m}{2}, \forall m.$

Vậy : (Δ_m) luôn tiếp xúc với parabol cố định.

(P) : $y = -x^2 + 3x - \frac{1}{4}$

68. DH Y DƯỢC TPHCM

Cho hàm số : $y = \frac{ax^2 + (2a+1)x + a+3}{x+2}$ với $a \neq -1$ (1)

1. Chứng minh tiệm cận xiên của đồ thị hàm số (1) luôn đi qua một điểm cố định.

2. Với giá trị nào của a thì đồ thị của (1) tiếp xúc với đường thẳng :

$$y = a + 4 ?$$

Giải

$$y = f(x) = \frac{ax^2 + (2a+1)x + a+3}{x+2} \quad (C) \quad (a \neq -1)$$

1. Ta có : $f(x) = ax + 1 + \frac{a+1}{x+2}$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a+1}{x+2} = 0$$

Vậy đồ thị có tiệm cận xiên : (d) : $y = ax + 1$.

Ta thấy (d) luôn đi qua $M(0; 1)$ cố định.

2. (C) luôn tiếp xúc với (D) : (D) : $y = a + 4$.

Phương trình hoành độ giao điểm của (C) và (D) :

$$\frac{ax^2 + (2a+1)x + a+3}{x+2} = a+4 \quad (x \neq -2)$$

$$\Leftrightarrow ax^2 + (a-3)x - a - 5 = 0 \quad (2)$$

Đặt : $g(x) = ax^2 + (a-3)x - a - 5$

(D) tiếp xúc với (C) $\Leftrightarrow$ (2) có nghiệm kép khác -2

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta = 0 \\ g(-2) \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (a-3)^2 + 4a(a+5) = 0 \\ 4a - 2(a-3) - a - 5 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 5a^2 + 14a + 9 = 0 \\ a+1 \neq 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow a = -\frac{9}{5}$$

Vậy để (C) tiếp xúc với (D) ta phải có : $a = -\frac{9}{5}$.

69. DH NGOẠI THƯƠNG - KHỐI D

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số : $y = \frac{x+1}{x-2}$.

2. Tìm trên đồ thị hàm số điểm M sao cho tổng các khoảng cách từ M đến hai trục tọa độ là nhỏ nhất.

Giải

1. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số : $y = f(x) = \frac{x+1}{x-2}$.

- Miền xác định : $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

- $f'(x) = \frac{-3}{(x-2)^2}$.

- Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	2	$+\infty$
f'	-		-
f	1	$+\infty$	1

$\swarrow$ $-\infty$ $\searrow$


- $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 1$: tiệm cận ngang : $y = 1$

- $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \infty$: tiệm cận đứng : $x = 2$.

- Điểm đặc biệt : $x = 0 \Rightarrow y = -\frac{1}{2}$.

$$y = 0 \Rightarrow x = -1.$$

- Đồ thị : hình bên.



2. Tìm trên đồ thị điểm m sao cho tổng các khoảng cách từ M đến hai trục tọa độ là nhỏ nhất

$$M(x; y) \in (H) \Leftrightarrow y = \frac{x+1}{x-2}$$

$$\text{Đặt : } S = d(M; Ox) + d(M; Oy) \Rightarrow S = |y| + |x| = \left| \frac{x+1}{x-2} \right| + |x|$$

$$\text{Do : } M_0\left(0, \frac{1}{2}\right) \in (H)$$

$$\text{Ta có : } |x_0| + |y_0| = \frac{1}{2} \quad \text{Nên ta chỉ cần xét } -\frac{1}{2} \leq x \leq \frac{1}{2}$$

$$\text{Trường hợp 1 : } 0 \leq x \leq \frac{1}{2}$$

$$S(x) = -\left(\frac{x+1}{x-2}\right) + x = \frac{x^2 - 3x - 1}{x-2}$$

$$[S(x)]' = \frac{x^2 - 4x + 7}{(x-2)^2} > 0.$$

Ta có :

x	0	$\frac{1}{2}$
$[S(x)]'$	+	
S(x)	$\frac{1}{2}$	$\nearrow$

Trường hợp 2 : $-\frac{1}{2} \leq x \leq 0$

$$S(x) = -\left(\frac{x+1}{x-2}\right) - x = \frac{-x^2 + x - 1}{x-2}$$

$$[S(x)]' = \frac{-x^2 + 4x - 1}{(x-2)^2}$$

$$\forall x \in \left[-\frac{1}{2}, 0\right], \quad [S(x)]' < 0$$

Ta có :

x	$-\frac{1}{2}$	0
$[S(x)]'$	-	
S(x)	$\searrow$	$\frac{1}{2}$

$$\text{Vậy : } S \text{ nhỏ nhất} \Leftrightarrow S = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = -\frac{1}{2} \end{cases}$$

Điểm M cần tìm là $M\left(0, -\frac{1}{2}\right)$.

NĂM 1996

70. ĐH QUỐC GIA TP HCM – ĐH LUẬT

Cho hàm số : $y = x^4 - 2mx^2 + m^3 - m^2 \quad (C_m)$.

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị và vẽ đồ thị hàm số khi $m = 1$.
2. Xác định m để đồ thị (C_m) tiếp xúc với trục hoành tại hai điểm phân biệt.

Giải

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi $m = 1$

Khi $m = 1$ thì hàm số trở thành : $y = x^4 - 2x^2$

MXĐ : $D = \mathbb{R}$

Đạo hàm : $y' = 4x^3 - 4x$

$$y' = 0 \Leftrightarrow x = 0 ; x = \pm 1$$

Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'	-	0	+	0	+
y	$+\infty$	-1	0	-1	$+\infty$

Điểm uốn : $y'' = 12x^2 - 4$

$$y'' = 0 \Leftrightarrow x = \pm \frac{\sqrt{3}}{3}$$

Suy ra : $y = -\frac{5}{9}$

Có hai điểm uốn : $\left(\frac{\sqrt{3}}{3}; -\frac{5}{9}\right); \left(-\frac{\sqrt{3}}{3}; -\frac{5}{9}\right)$


Điểm cực tiểu : $(-1; -1)$

Điểm cực đại : $(1; -1)$

Điểm đặc biệt :

$$y = 0 \Rightarrow x = 0, x = \pm \sqrt{2}$$

Đồ thị : hình bên.



2. Xác định m để (C_m) tiếp xúc với trục hoành tại hai điểm phân biệt

Phương trình hoành độ giao điểm của (C_m) và Ox :

$$x^4 - 2mx^2 + m^3 - m^2 = 0 \quad (1)$$

$$\text{Đặt : } t = x^2 \text{ thì (1) trở thành : } \begin{cases} t^2 - 2mt + m^3 - m^2 = 0 \\ t \geq 0 \end{cases} \quad (2)$$

Để (C_m) tiếp xúc với Ox tại hai điểm phân biệt, ắt có và đủ là (2) có nghiệm kép dương, nghĩa là :

$$\begin{cases} m^2 - (m^4 - m^2) = 0 \\ t > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = 0 \text{ hay } m = 2 \\ t > 0 \end{cases}$$

Mà $t = m$ (nghiệm kép) nên $m > 0$.

Vậy : khi $m = 2$ thì (2) có 1 nghiệm kép dương. Suy ra (1) có 2 nghiệm kép phân biệt khác nhau. Nghĩa là (C_m) tiếp xúc với Ox tại hai điểm phân biệt $A(-2; 0), B(2; 0)$.

Cho hàm số : $y = x^3 - 3ax^2 + 4a^3$.

1. Tìm a để các điểm cực đại và cực tiểu của đồ thị đối xứng qua đường thẳng $y = x$.
2. Tìm a để đường thẳng $y = x$ cắt đồ thị tại 3 điểm phân biệt A, B, C với $AB = BC$.

Giải

1. Tìm a để điểm cực đại và cực tiểu của đồ thị đối xứng với nhau qua đường thẳng $y = x$

Ta có : MXD : $D = \mathbb{R}$.

Đạo hàm : $y' = 3x^2 - 6ax$

$$y' = 0 \Leftrightarrow x = 0 \quad \text{hay} \quad x = 2a.$$

Điều kiện để hàm số có cực đại và cực tiểu là $a \neq 0$. Tọa độ điểm cực đại và cực tiểu :

$$(x = 0; y = 4a^3) \quad \text{và} \quad (x = 2a; y = 0) \quad \text{hoặc ngược lại.}$$

Điều kiện để hai điểm này đối xứng qua đường thẳng $y = x$ là :

$$4a^3 = 2a \quad \Leftrightarrow \quad a = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} \quad (\text{loại } a = 0).$$

2. Tìm a để đồ thị cắt đường thẳng $y = x$ tại A, B, C với $AB = BC$

- Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị và đường thẳng $y = x$ là :

$$x^3 - 3ax^2 - x + 4a^3 = 0 \quad (1)$$

Gọi x_A, x_B, x_C là hoành độ của A, B, C thì x_A, x_B, x_C là nghiệm của (1) và

$$x_A + x_C = 2x_B \quad (AB = BC) \quad (2)$$

Mà theo định lý Viét, ta có : $x_A + x_B + x_C = 3a$

$$(2) \text{ và } (3) \text{ cho : } 3x_B = 3a \quad \Leftrightarrow \quad x_B = a.$$

$$\text{Thay vào (1) ta có : } 2a^3 - a = 0 \quad \Leftrightarrow \quad a = 0 \quad \text{hoặc} \quad a = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$$

- Khi $a = 0$ thì (1) cho : $x^3 - x = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = 0, \quad x = -1, \quad x = +1.$

Vậy : A, B, C lần lượt có hoành độ là $-1; 0; 1$.

- Khi $a = \frac{\sqrt{2}}{2}$ thì (1) cho : $x^3 - \frac{3\sqrt{2}}{2}x^2 - x + \sqrt{2} = 0$

$$\Leftrightarrow \quad x_A = \frac{1 - \sqrt{5}}{\sqrt{2}}; \quad x_B = \frac{\sqrt{2}}{2}; \quad x_C = \frac{1 + \sqrt{5}}{\sqrt{2}}$$

- Khi $a = -\frac{\sqrt{2}}{2}$ thì (1) cho : $x^3 + \frac{3\sqrt{2}}{2}x^2 - x - \sqrt{2} = 0$

$$\Leftrightarrow x_A = -\frac{1+\sqrt{5}}{2}; \quad x_B = -\frac{\sqrt{2}}{2}; \quad x_C = \frac{-1+\sqrt{5}}{\sqrt{2}}$$

Vậy giá trị của a phải tìm là : $a = 0$ hay $a = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}$.

72. ĐH NGOẠI THƯƠNG

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số : $y = \frac{x^2 + x + 2}{x - 1}$.
2. Tìm điểm A thuộc trục hoành sao cho qua A chỉ vẽ được duy nhất một tiếp tuyến với đồ thị ở phần 1.

Giải

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của : $y = \frac{x^2 + x + 2}{x - 1} = x + 2 + \frac{4}{x - 1}$

- MXD : $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$

- Đạo hàm : $y' = 1 - \frac{4}{(x - 1)^2}$

$$y' = 0 \Leftrightarrow x = -1 \text{ hay } x = 3.$$

- Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	-1	1	3	$+\infty$				
y'	+	0	-	-	0	+			
y	$-\infty$	$\nearrow$	-1	$\searrow$	$+\infty$	$\nearrow$	7	$\searrow$	$+\infty$

- Điểm cực đại : $x = -1; y = -1$

- Điểm cực tiểu : $x = 3; y = 7$

- Tiệm cận đứng :


$\lim_{x \rightarrow 1} y = \pm\infty$ nên $x = 1$ là đường tiệm cận đứng.

- Tiệm cận xiên :

$$y = x + 2 + \frac{4}{x - 1} \text{ có } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4}{x - 1} = 0$$

nên $y = x + 2$ là đường tiệm cận xiên.

- Đồ thị : (hình vẽ).



2. Tìm điểm A trên x'Ox

Gọi a là hoành độ của A trên x'Ox. Tọa độ của A(a; 0).

Gọi k là hệ số góc của đường thẳng (d) qua A.

Phương trình của (d) : $y = kx - ka$.

Phương trình hoành độ của (d) và (C), đồ thị ở câu 1 :

$$\frac{x^2 + x + 2}{x - 1} = kx - ka \Leftrightarrow \begin{cases} (1 - k)x^2 + (1 + ka + k)x + 2 - ka = 0 \\ x \neq 1 \end{cases} \quad (1)$$

(d) tiếp xúc với (C) $\Leftrightarrow$ (1) có nghiệm số kép :

$$\Leftrightarrow (1 + ka + k)^2 - 4(1 - k)(2 - ka) = 0$$

$$\Leftrightarrow (a - 1)^2 k^2 + 2(3a + 5)k - 7 = 0 \quad (2)$$

Điều kiện : (2) có 1 nghiệm duy nhất theo k. Có 2 trường hợp :

i) (2) có 1 nghiệm đơn $\Leftrightarrow (a - 1)^2 = 0 \Leftrightarrow a = 1$.

ii) (2) có 1 nghiệm kép theo k $\Leftrightarrow (3a + 5)^2 + 7(a - 1)^2 = 0$
 $\Leftrightarrow$ vô nghiệm.

Vậy, khi $a = 1$ thì qua A, ta chỉ vẽ được một tiếp tuyến cho (C).

Hệ số góc của tiếp tuyến này là : $k = \frac{7}{16}$.

73. ĐH ĐẠI CƯƠNG

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số : $y = x^3 - 6x^2 + 9x$.
2. Tìm tất cả các đường thẳng đi qua điểm A(4; 4) và cắt (C) tại ba điểm phân biệt.

Giải

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số : $y = x^3 - 6x^2 + 9x$

MXĐ : $D = \mathbb{R}$

Đạo hàm : $y' = 3x^2 - 12x + 9$


$$y' = 0 \Leftrightarrow x = 1 \text{ hay } x = 3$$

Điểm uốn : $y'' = 6x - 12 = 0 \Leftrightarrow x = 2; y = 2$.

Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	1	2	3	$+\infty$
y''	-	-	0	+	+
y'	+	0	-	0	+
y	$-\infty$	4	2	0	$+\infty$

Đồ thị (C) :



2. Đường thẳng qua A(4; 4) cắt (C)

Cách 1 : Dùng đồ thị (C).

Đường thẳng (d) qua $A(4; 4) \in (C)$ cắt đồ thị tại ba điểm phân biệt khi (d) nằm trong góc $x'Ay'$ tạo bởi $Ax' \parallel Ox$ và $Ay' \parallel Oy$, không trùng với (Δ) là tiếp tuyến của (C) tại A.

Hệ số góc của tiếp tuyến (Δ) là : $y'(x_A) = 9$.

Vậy (d) có hệ số góc thuộc khoảng $(0; +\infty) \setminus \{9\}$.

Cách 2 : Gọi k là hệ số góc của đường thẳng (d) qua A(4; 4).

Phương trình của (d) : $y = k(x - 4) + 4$

Phương trình hoành độ giao điểm của (C) và (d) :

$$\begin{aligned} x^3 - 6x^2 + 9x &= kx - 4k + 4 \\ \Leftrightarrow x^3 - 6x^2 + (9 - k)x + 4k - 4 &= 0 \quad (*) \end{aligned}$$

Vì $A(4; 4) \in (C)$ nên (*) có một nghiệm bằng 4.

$$\text{Suy ra : } (*) \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4 & (1) \\ x^2 - 2x + 1 - k = 0 & (2) \end{cases}$$

Để cho (*) có 3 nghiệm phân biệt, ta phải có :

$$\text{i) } x = 4 \text{ không là nghiệm của (2)} \Leftrightarrow 16 - 8 + 1 - k \neq 0 \Leftrightarrow k \neq 9$$

$$\begin{aligned} \text{ii) (2) có 2 nghiệm phân biệt} \quad &\Leftrightarrow \Delta' > 0 \quad \Leftrightarrow 1 - (1 - k) > 0 \\ &\Leftrightarrow k > 0 \end{aligned}$$

Tóm lại, (d) cắt (C) tại 3 điểm phân biệt khi (d) qua A có hệ số thỏa $k > 0$ và $k \neq 9$.

74. CD SỰ PHẠM TPHCM

Cho hàm số : $y = \frac{2x + 1}{x + 2}$.

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số đồ.
2. Chứng minh rằng đường thẳng $y = -x + m$ luôn cắt đồ thị hàm số tại 2 điểm phân biệt.

Giải

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị : $y = \frac{2x+1}{x+2}$

• MXĐ : $D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$


• Đạo hàm $y' = \frac{3}{(x+2)^2} > 0$

$\Rightarrow y$ luôn luôn tăng

• Tiệm cận đứng : $x = -2$;

tiệm cận ngang : $y = 2$.

• Đồ thị là một hyperbol vuông góc có $I(-2; 2)$ là tâm đối xứng.



2. Đường thẳng cắt đồ thị tại 2 điểm phân biệt

Phương trình hoành độ giao điểm :

$$\frac{2x+1}{x+2} = -x+m \quad (1)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x \neq -2 \\ x^2 + (4-m)x + 1 - 2m = 0 \end{cases} \quad (2)$$

(2) có : $\Delta = (4-m)^2 - 4(1-2m) = 12 + m^2 > 0; \forall m \in \mathbb{R}$.

Vậy, (2) có 2 nghiệm phân biệt, $\forall m \in \mathbb{R}$ và 2 nghiệm đó đều khác -2 , $\forall m \in \mathbb{R}$ [vì $x^2 + (4-m)x + 1 - 2m \neq 0$ khi $x = -2$].

Tóm lại, đường thẳng $y = -x + m$ luôn luôn cắt đồ thị của $y = \frac{2x+1}{x+2}$ tại hai điểm phân biệt, $\forall m \in \mathbb{R}$.

75. CĐ HẢI QUAN

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số : $f(x) = x^3 - 3x + 1$.

2. Tìm a để đồ thị của hàm số $f(x)$ cắt đồ thị hàm số :

$g(x) = a(3a^2 - 3ax + a)$ tại ba điểm phân biệt với hoành độ dương.

Giải

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số: $y = x^3 - 3x + 1$.

MXĐ : $D = \mathbb{R}$

Đạo hàm : $y' = 3x^2 - 3$

$$y' = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$$

Điểm uốn : $y'' = 6x = 0 \Rightarrow x = 0; y = 1$

Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$	
y''		-		+	+	
y'		+	0	-	0	+
y						

$-\infty$

$\nearrow$

3

$\searrow$

1


$\searrow$

-1

$\nearrow$

$+\infty$

Đồ thị :



2. Tìm a để $f(x)$ và $g(x)$ có đồ thị cắt nhau tại ba điểm có hoành độ dương

Phương trình hoành độ giao điểm :

$$\begin{aligned} x^3 - 3x + 1 &= a(3x^2 - 3ax + a) \\ \Leftrightarrow x^3 - 3ax^2 - 3(1 - a^2)x + 1 - a^2 &= 0 \end{aligned} \quad (1)$$

Đặt : $y = x^3 - 3ax^2 - 3(1 - a^2)x + 1 - a^2$

(1) có 3 nghiệm phân biệt dương khi đồ thị (C_a) của hàm số này cắt tia Ox tại ba điểm phân biệt. Các điều kiện là :

i) (C_a) cắt tia đối của tia Oy .

ii) (C_a) có $y_{\max} > 0$ và có $y_{\min} < 0$.

Do đó :

i) (C_a) cắt tia Oy tại $A(0; 1 - a^2)$ nên :

$$1 - a^2 < 0 \Leftrightarrow a < -1 \text{ hay } 1 < a \quad (2)$$

ii) $y' = 3x^2 - 6ax - 3(1 - a^2)$

$$\Delta' = 9a^2 + 9(1 - a^2) = 9$$

$$y' = 0 \Rightarrow x = a + 1 \text{ hay } x = a - 1.$$

Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	$a - 1$		$a + 1$		$+\infty$
y'		+	0	-	0	+
y		$y_{\max}$		$y_{\min}$		$+\infty$
	$-\infty$					

$$\bullet y_{\max} = (a^2 - 3)(a - 1) > 0 \Leftrightarrow -\sqrt{3} < a < 1 \text{ hay } a > \sqrt{3} \quad (3)$$

$$\bullet y_{\min} = (a^2 - 2a - 1)(a + 1) < 0 \Leftrightarrow a < -1 \text{ hay } 1 - \sqrt{2} < a < 1 + \sqrt{2} \quad (4)$$

(2), (3), (4) cho :

a	$-\sqrt{3}$	-1	$1 - \sqrt{2}$	1	$\sqrt{3}$	$1 + \sqrt{2}$
(2)						
(3)						
(4)						
KQ						

Vậy : $-\sqrt{3} < a < -1$ hay $\sqrt{3} < a < 1 + \sqrt{2}$.

76. ĐH QUỐC GIA TPHCM

Cho hàm số : $y = \frac{2x^2 + (1 - m)x + 1 + m}{-x + m} \quad (1)$

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi $m = 1$.
2. Xác định m để hàm số (1) nghịch biến trong khoảng $2 < x < +\infty$.
3. Chứng minh rằng với mọi $m \neq -1$, các đường cong (1) đều tiếp xúc với một đường thẳng cố định tại một điểm cố định.

Giải

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị khi $m = 1$

Khi $m = 1$ thì : $y = \frac{2x^2 + (1 - m)x + 1 + m}{-x + m} \quad (1)$

trở thành : $y = \frac{2x^2 + 2}{-x + 1} = -2x - 2 + \frac{4}{-x + 1}$

MXD : $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$

Đạo hàm : $y' = -2 + \frac{4}{(-x + 1)^2}$


$$y' = 0 \Leftrightarrow x = 1 \pm \sqrt{2}$$

Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	$1-\sqrt{2}$	1	$1+\sqrt{2}$	$+\infty$	
y'	-	0	+	+	0	-
y	$+\infty$	$-4(1-\sqrt{2})$	$+\infty$	$-4(1+\sqrt{2})$	$-\infty$	

Đồ thị :

- Tiệm cận đứng : $x = 1$
- Tiệm cận xiên : $y = -2x - 2$



2. Xác định m để hàm số nghịch biến trong khoảng $2 < x < +\infty$.

Các điều kiện :

i) $x \neq m$

ii) Đạo hàm $y' < 0$, $\forall x \in \mathbb{R} \setminus \{m\}$ hoặc $y' = 0$ có 2 nghiệm x_1, x_2 (giả sử $x_1 < x_2$) với $x_1 < x_2 < 2$. Khi đó, $y' < 0$ với $2 < x$.

Ta có :
$$y' = \frac{-2x^2 + 4mx - m^2 + 2m + 1}{(-x + m)^2}$$

Suy ra :

i) $x \neq m$ nên : $-2(m)^2 + 4m(m) - m^2 + 2m + 1 \neq 0$

$$\Leftrightarrow m^2 + 2m + 1 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq -1$$

ii) $y' = 0 \Leftrightarrow -2x^2 + 4mx - m^2 + 2m + 1 = 0$

$$\Delta' = 4m^2 + 2(-m^2 + 2m + 1) = 2m^2 + 4m + 2 = 2(m + 1)^2$$

$$\Delta' > 0 \quad \forall m \neq -1.$$

Gọi x_1, x_2 là 2 nghiệm của $y' = 0$. Ta phải có :

$$\begin{aligned} x_1 < x_2 < 2 &\Leftrightarrow \begin{cases} af(2) > 0 \\ \frac{S}{2} - 2 < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -2(-8 + 8m - m^2 + 2m + 1) > 0 \\ 2m - 2 < 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} -m^2 + 10m - 7 < 0 \\ m < 1 \end{cases} \Leftrightarrow m < 5 - 3\sqrt{2} \end{aligned}$$

Tóm lại : khi $m < 5 - 3\sqrt{2}$ và $m \neq -1$ thì hàm số nghịch biến trong $(2; +\infty)$.

3. Chứng minh các đường cong (1) luôn luôn tiếp xúc với một đường thẳng cố định tại một điểm cố định

Ta làm hai việc :

i) Đồ thị của (1) đi qua một điểm cố định.

ii) Đạo hàm của (1) tại điểm cố định đó là 1 hằng số.

Ta có :

$$\begin{aligned} \text{i) } (1) &\Leftrightarrow \begin{cases} (x+y-1)m = 2x^2 + x + 1 - xy \\ x \neq m \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x+y-1=0 \\ 2x^2 + x + 1 + xy = 0 \\ x \neq m \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ y = 2 \\ m \neq -1 \end{cases} \end{aligned}$$

Vậy : đồ thị của (1) luôn luôn đi qua A(-1; 2) với $\forall m \neq -1$.

$$\text{ii) Khi } x = -1 \text{ thì : } y' = \frac{-2x^2 + 4mx - m^2 + 2m + 1}{(-x+m)^2}$$

$$\text{trở thành : } y' = \frac{-2 - 4m - m^2 + 2m + 1}{(1+m)^2} = -1 \quad (m \neq -1)$$

Vậy : $y' = -1$ tại A.

Tóm lại, các đồ thị của (1) luôn luôn tiếp xúc với đường thẳng qua A(-1; 2) có hệ số góc $y' = -1$. Đường thẳng này cố định và có phương trình :

$$y = -x + 1.$$

77. ĐH QUỐC GIA TPHCM

Cho hàm số : $y = x^3 + mx^2 + 1 \quad (C_m)$.

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi $m = -3$.
2. Tìm m để (C_m) cắt đường thẳng $y = -x + 1$ tại 3 điểm phân biệt A(0; 1); B; C sao cho các tiếp tuyến với (C_m) tại B và C vuông góc với nhau.

Giải

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị khi $m = -3$

Khi $m = -3$ thì hàm số $y = x^3 + mx^2 + 1$ trở thành : $y = x^3 - 3x^2 + 1$

MXĐ : $D = \mathbb{R}$

Đạo hàm : $y' = 3x^2 - 6x$


$$y' = 0 \Leftrightarrow x = 0 \quad \text{hay} \quad x = 2$$

Điểm uốn : $y'' = 6x - 6 = 0 \Rightarrow x = 1; y = -1.$

Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$
y''	-	-	0	+	+
y'	+	0	-	0	+
y	$-\infty$	1	-1	-3	$+\infty$

Đồ thị :



2. Tìm m để (C_m) cắt đường thẳng $(D) : y = -x + 1$

Phương trình hoành độ giao điểm của (C_m) và $(D) :$

$$x^3 + mx^2 + 1 = -x + 1 \Leftrightarrow x(x^2 + mx + 1) = 0 \quad (1)$$

(C_m) cắt (D) tại 3 điểm phân biệt $\Leftrightarrow (1)$ có 3 nghiệm phân biệt

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \text{ có 3 nghiệm phân biệt.} \\ x^2 + mx + 1 = 0 \end{cases} \quad (2)$$

Vì (2) không nhận $x = 0$ làm nghiệm

do đó, ta chỉ cần (2) có $\Delta > 0 \Leftrightarrow m < -2$ hay $m > 2$.

Theo đề bài, $A(0; 1)$ nên B, C có hoành độ là nghiệm của (2).

Hệ số góc của tiếp tuyến của (C_m) tại $B : y'(x_B)$.

Hệ số góc của tiếp tuyến của (C_m) tại $C : y'(x_C)$.

Hai tiếp tuyến này vuông góc với nhau

$$\Leftrightarrow y'(x_B) \cdot y'(x_C) = -1 \Leftrightarrow (3x_B^2 + 2mx_B)(3x_C^2 + 2mx_C) = -1$$

$$\Leftrightarrow x_B x_C [9x_B x_C + 6m(x_B + x_C) + 4m^2] = -1$$

$$\Leftrightarrow 9 + 6m(-m) + 4m^2 = -1 \Leftrightarrow 2m^2 = 10 \Leftrightarrow m = \pm\sqrt{5}$$

Hai giá trị này của m thỏa : $m < -2$ hay $m > 2$ nên được nhận.

(Nhớ : $y' = 3x^2 + 2mx$; $x_B \cdot x_C = 1$; $x_B + x_C = -m$).

Vậy : khi $m = \pm\sqrt{5}$ thì hai tiếp tuyến của (C_m) tại B và C vuông góc với nhau.

NĂM 1995

78. ĐH TỔNG HỢP TPHCM

Cho hàm số : $f(x) = x^3 - 2x - (m - 1)x + m$.

1. Tìm m để đồ thị $y = f(x)$ tiếp xúc với trục hoành Ox .

2. Tìm m để $f(x) \geq \frac{1}{x}$ với mọi $x \geq 2$.

Giải

Cho hàm số $f(x) = x^3 - 2x^2 - (m-1)x + m$ (C_m)

1. Tìm m để đồ thị $y = f(x)$ tiếp xúc với trục hoành Ox

Phương trình hoành độ giao điểm của (C_m) và Ox :

$$x^3 - 2x^2 - (m-1)x + m = 0 \Leftrightarrow (x-1)(x^2 - x - m) = 0 \quad (1)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x^2 - x - m = 0 \end{cases} \quad (2)$$

(C_m) tiếp xúc với $Ox \Leftrightarrow$ (1) có nghiệm kép

$\Leftrightarrow \begin{cases} \text{Hoặc (2) có nghiệm } x = 1 \\ \text{Hoặc (2) có nghiệm kép} \end{cases}$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 1 - 1 - m = 0 \\ \Delta = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = 0 \\ m = -\frac{1}{4} \end{cases}$$

2. Tìm m để $f(x) \geq \frac{1}{x}$ với mọi $x \geq 2$

Ta có : $f(x) \geq \frac{1}{x} \quad (1)$

$$\Leftrightarrow x^3 - 2x^2 - (m-1)x + m \geq \frac{1}{x} \quad (x \geq 2)$$

$$\Leftrightarrow x^4 - 2x^3 + x^2 - 1 \geq m(x^2 - x)$$

$$\Leftrightarrow \frac{x^4 - 2x^3 + x^2 - 1}{x^2 - x} \geq m \Leftrightarrow \frac{(x^2 - x)^2 - 1}{x^2 - x} \geq m$$

Đặt : $t = x^2 - x$.

Ta có : $x \geq 2 \Leftrightarrow t \geq 2$.

$$(1) \Leftrightarrow \frac{t^2 - 1}{t} \geq m \quad (t \geq 2)$$

Đặt : $g(t) = \frac{t^2 - 1}{t}$ Ta có : $g'(t) = \frac{t^2 + 1}{t^2} > 0 \quad \forall t \geq 2$

t	2	$+\infty$
$g'(t)$		+
$g(t)$	$\frac{3}{2}$	$\nearrow$

Vậy ta phải có $m \geq \frac{3}{2}$.

79. DH KINH TẾ

Cho hàm số : $y = \frac{x^2 + 2x\cos\alpha + 1}{x + 2\sin\alpha}$.

1. Xác định tiệm cận xiên và tâm đối xứng của đồ thị.
2. Tìm α để hàm số có điểm cực đại và cực tiểu.
3. Tìm α để từ gốc tọa độ có thể kẻ đến đồ thị 2 tiếp tuyến phân biệt. Khi đó gọi $(x_1; y_1), (x_2; y_2)$ là tọa độ các tiếp điểm, chứng tỏ rằng :

$$x_1x_2 + y_1y_2 = 0.$$

Giải

$$y = f(x) = \frac{x^2 + 2x\cos\alpha + 1}{x + 2\sin\alpha}$$

1. Xác định tiệm cận xiên và tâm đối xứng của đồ thị

Chia đa thức ta được : $y = x + 2(\cos\alpha - \sin\alpha) + \frac{1 - 4\sin\alpha(\cos\alpha - \sin\alpha)}{x + 2\sin\alpha}$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - 4\sin\alpha(\cos\alpha - \sin\alpha)}{x + 2\sin\alpha} = 0$$

Vậy đồ thị có tiệm cận xiên là : $y = x + 2(\cos\alpha - \sin\alpha)$

Tâm đối xứng $I(x_1; y_1)$ là giao điểm của hai tiệm cận nên ta có :

$$\begin{cases} x_1 = -2\sin\alpha \\ y_1 = -2\sin\alpha + (\cos\alpha - \sin\alpha) = 2\cos\alpha - 4\sin\alpha. \end{cases}$$

2. Tìm α để hàm số có cực đại và cực tiểu

Ta có : $f(x) = \frac{x^2 + 4x\sin\alpha + 4\sin\alpha.\cos\alpha - 1}{(x + 2\sin\alpha)^2}$

Hàm số có cực đại và cực tiểu $\Leftrightarrow \Delta' > 0$

$$\Leftrightarrow 4\sin^2\alpha - 4\sin\alpha.\cos\alpha + 1 > 0$$

$$\Leftrightarrow (2\sin\alpha - \cos\alpha)^2 + \sin^2\alpha > 0 \quad (1)$$

(1) đúng $\forall \alpha$. Vậy với mọi α hàm số luôn có cực đại và cực tiểu.

3. Tìm α để từ gốc tọa độ có thể kẻ đến đồ thị 2 tiếp tuyến phân biệt.

Gọi k là hệ số góc của tiếp tuyến qua O ta có phương trình tiếp tuyến là $(\Delta) : y = kx$

Phương trình hoành độ giao điểm của (Δ) và $(C) : \frac{x^2 + 2x\cos\alpha + 1}{x + 2\sin\alpha} = kx$

$$\Leftrightarrow x^2 + 2x\cos\alpha + 1 = kx^2 + 2kx\sin\alpha$$

$$\Leftrightarrow (1 - k)x^2 + 2(\cos\alpha - k\sin\alpha)x + 1 = 0$$

Điều kiện $k \neq 1$ và $\Delta' = 0$

$$\Delta' = 0 \Leftrightarrow (\cos\alpha - k\sin\alpha)^2 - (1 - k) = 0$$

$$\Leftrightarrow k^2\sin^2\alpha + (1 - 2\sin\alpha\cos\alpha)k + \cos^2\alpha - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow k^2\sin^2\alpha + (1 - 2\sin 2\alpha)k - \sin^2\alpha = 0$$

Để từ gốc tọa độ có thể kẻ đến đồ thị 2 tiếp tuyến phân biệt ta phải có (1) có 2 nghiệm phân biệt.

$$\Leftrightarrow \sin\alpha \neq 0 \Leftrightarrow \alpha \neq k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Gọi $M_1(x_1; y_1)$, $M_2(x_2; y_2)$ là 2 tiếp tuyến, ta có :

$$y_1 = k_1x_1; \quad y_2 = k_2x_2.$$

Do k_1 và k_2 là nghiệm của (1) nên ta có :

$$k_1k_2 = \frac{c}{a} = -\frac{\sin^2\alpha}{\sin^2\alpha} = -1.$$

$$\begin{aligned} \text{Suy ra : } x_1x_2 + y_1y_2 &= x_1x_2 + k_1x_1 + k_2x_2 = x_1x_2(1 + k_1k_2) \\ &= x_1x_2(1 - 1) = 0. \end{aligned}$$

80. ĐH NGOẠI THƯỜNG

Cho hàm số : $y = \frac{mx^2 + 3mx + 2m + 1}{x + 2}$.

1. Chứng minh rằng tiệm cận xiên của đồ thị của hàm số đã cho luôn đi qua một điểm cố định với mọi m .
2. Với giá trị nào của m thì đồ thị của hàm số tiếp xúc với đường thẳng $y = m$.
3. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi $m = -1$.

Giải

Cho hàm số : $y = f(x) = \frac{mx^2 + 3mx + 2m + 1}{x + 2} \quad (C_m)$

1. Chứng minh rằng tiệm cận xiên của đồ thị hàm số đã cho luôn đi qua một điểm cố định với mọi m

$$\text{Ta có : } y = mx + m + \frac{1}{x + 2}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x + 2} = 0$$

Vậy đồ thị hàm số có tiệm cận xiên là : $(\Delta_m) : y = mx + m$

Gọi $M_0(x_0; y_0)$ là điểm cố định, ta có : $M_0 \in \Delta_m \quad \forall m$

$$\Leftrightarrow y_0 = mx_0 + m \quad \forall m \quad \Leftrightarrow m(x_0 + 1) - y_0 = 0 \quad \forall m$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_0 + 1 = 0 \\ y_0 = 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = -1 \\ y_0 = 0 \end{cases}$$

Vậy (Δ_m) luôn đi qua điểm $M_0(-1; 0)$ với mọi m .

2. Với giá trị nào của m thì đồ thị của hàm số tiếp xúc với đường thẳng $y = m$

Phương trình hoành độ giao điểm của (C_m) và đường thẳng $y = m$.

$$\frac{mx^2 + 3mx + 2m + 1}{x + 2} = m \quad (x \neq -2)$$

$$\Leftrightarrow mx^2 + 3mx + 2m + 1 = mx + 2m \quad \Leftrightarrow mx^2 + 2mx + 1 = 0 \quad (1)$$

(C_m) tiếp xúc với $y = m \Leftrightarrow (1)$ có nghiệm kép khác -2 .

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 0 \\ \Delta' = 0 \\ 4m - 4m + 1 \neq 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 0 \\ m^2 - m = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow m = 1$$

Vậy để (C_m) tiếp xúc với $y = m$ ta phải có $m = 1$.

3. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi $m = -1$

$$y = f(x) = \frac{-x^2 - 3x - 1}{x + 2}$$

MXĐ : $D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$

$$f'(x) = \frac{-x^2 - 4x - 5}{(x + 2)^2}$$

$$\Delta' = 4 - 5 = -1 < 0 \Rightarrow f'(x) < 0 \quad \forall x \in D$$

Bảng biến thiên :


x	$-\infty$	-2	$+\infty$
f'			
f	$+\infty$		$+\infty$

$$\lim_{x \rightarrow -2} f(x) = \infty \Rightarrow \text{tiệm cận đứng } x = -2.$$

$$y = -x - 1 + \frac{1}{x + 2}$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x + 2} = 0 \Rightarrow \text{tiệm cận xiên } y = -x - 1.$$

Đồ thị : hình bên.



81. ĐH TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

Cho hàm số : $y = \frac{x^2 - 3x + 4}{2x - 2}$.

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
2. Gọi I là giao điểm của hai tiệm cận, M là một điểm tùy ý thuộc (C). Tiếp tuyến với (C) tại M cắt tiệm cận đứng và tiệm cận xiên lần lượt tại A và B. Chứng tỏ rằng M là trung điểm của đoạn AB và diện tích tam giác IAB không phụ thuộc vào M.
3. Tìm trên (C) hai điểm đối xứng nhau qua đường thẳng $y = x$.

Giải

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số

MXĐ : $D = \mathbb{R}$

$$f'(x) = \frac{2x^2 - 4x - 2}{(2x - 2)^2}$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1 \pm \sqrt{2}$$

Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	$1 - \sqrt{2}$	1	$1 + \sqrt{2}$	$+\infty$
f'	+	0	-	0	+
f	$-\infty$	↗	CD	↘	$-\infty$
			$+\infty$	↗	CT
					$+\infty$

$$\text{CD : } f(1 - \sqrt{2}) = \frac{-1 - 2\sqrt{2}}{2}$$


$$f(1 + \sqrt{2}) = \frac{-1 + 2\sqrt{2}}{2}$$

$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = \infty$: tiệm cận đứng $x = 1$.

$$y = \frac{1}{2}x - 1 + \frac{2}{2x - 2}$$

$$\Rightarrow y = \frac{1}{2}x - 1 : \text{tiệm cận xiên.}$$

Đồ thị : hình bên.



2. $M(x_0; y_0) \in (C)$

Phương trình tiếp tuyến tại M : (d) : $y = y_0 + f'(x_0)(x - x_0)$

(d) cắt tiệm cận đứng tại B, suy ra $x_B = 1$.

Phương trình hoành độ giao điểm của tiệm cận xiên và (d) :

$$\frac{1}{2}x - 1 = y_0 + f'(x_0)(x - x_0)$$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{2}x - 1 = \frac{x_0^2 - 3x_0 + 4}{2x_0 - 2} + \frac{2x_0^2 - 4x_0 - 2}{(2x_0 - 2)^2}(x - x_0)$$

$$x = 2x_0 - 1$$

Vậy : $x_A = 2x_0 - 1$

Suy ra : $\frac{x_A + x_B}{2} = x_0$

Vậy M là trung điểm của AB.

Ta có : $S = S_{\triangle ABI} = \frac{1}{2}BI \cdot HA$ (1)

$$S = \frac{1}{2}[(y_B - y_I)(x_A - x_B)]$$

Mà : $x_A = 2x_0 - 1, \quad x_B = 1, \quad y_I = -\frac{1}{2}$

và : $y_B = \frac{x_0^2 - 3x_0 + 4}{2x_0 - 2} + \frac{2x_0^2 - 4x_0 - 2}{(2x_0 - 2)^2}(1 - x_0)$

$$\Leftrightarrow \frac{x_0^2 - 3x_0 + 4 - x_0^2 + 2x_0 + 1}{2x_0 - 2} \Leftrightarrow y_B = \frac{5 - x_0}{2x_0 - 2}$$

Do đó : (1) $\Leftrightarrow S = \frac{1}{2} \left[\left(\frac{5 - x_0}{2x_0 - 2} + \frac{1}{2} \right) (2x_0 - 1 - 1) \right] = 2 \text{ đvdt.}$

Vậy diện tích tam giác IAB không phụ thuộc vào M.

3. Tiệm cận (C) hai điểm đối xứng nhau qua đường thẳng (a) : $y = x$.

Xét đường thẳng Δ vuông góc với a, ta có $\Delta : y = -x + m$

Phương trình hoành độ giao điểm của Δ và (C) :

$$\begin{aligned} \frac{x^2 - 3x + 4}{2x - 2} = -x + m &\Leftrightarrow x^2 - 3x + 4 = -2x^2 + 3mx + 2x - 2m \\ &\Leftrightarrow 3x^2 - (5 + 2m)x + 2m + 4 = 0 \end{aligned} \quad (1)$$

Giả sử Δ cắt (C) tại $M_1(x_1; y_1), M_2(x_2; y_2)$.

Gọi M là trung điểm của M_1M_2 ta có : $M \begin{cases} x_M = \frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{5 + 2m}{6} \\ y_M = -x_M + m = \frac{4m - 5}{6} \end{cases}$

M_1 và M_2 đối xứng nhau qua (d).

$$\Leftrightarrow M \in d \Leftrightarrow y_M = x_M \Leftrightarrow \frac{5+2m}{6} = \frac{4m-5}{6} \Leftrightarrow m = 5$$

Thay vào (1), ta có : $3x^2 - 15x + 14 = 0 \Rightarrow x_{1,2} = \frac{15 \pm \sqrt{57}}{6}$

Vậy 2 điểm trên (C) đối xứng nhau qua $y = x$ là :

$$M_1 \left(\frac{15 + \sqrt{57}}{6}, \frac{15 - \sqrt{57}}{6} \right); \quad M_2 \left(\frac{15 - \sqrt{57}}{6}, \frac{15 + \sqrt{57}}{6} \right).$$

82. ĐH SƯ PHẠM TPHCM

Cho hàm số : $y = \frac{-x^2 + x + a}{x + a}$ trong đó a là tham số.

1. Xác định a để đồ thị của hàm số có tiệm cận xiên đi qua điểm $A(2; 0)$.
2. Xác định tất cả các giá trị của a để đồ thị của hàm số cắt đường thẳng $y = x - 1$ tại hai điểm phân biệt. Khi đó gọi y_1, y_2 là tung độ của hai giao điểm, hãy tìm mối quan hệ giữa y_1, y_2 không phụ thuộc a .

Giải

Cho hàm số : $y = \frac{-x^2 + x + a}{x + a}$

1. Xác định a để đồ thị của hàm số có tiệm cận xiên đi qua điểm $A(2; 0)$

Ta có : $y = -x + a + 1 - \frac{a^2}{x + a}$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{-a^2}{x + a} = 0 \Rightarrow \text{hàm số có tiệm cận xiên.}$$

$$(\Delta) : y = -x + a + 1$$

$$A \in (\Delta) \Leftrightarrow 0 = -2 + a + 1 \Leftrightarrow a = 1$$

Khi đó ta có : $y = f(x) = \frac{-x^2 + x + 1}{x + 1}$

MXĐ : $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$

$$f'(x) = \frac{-x^2 - 2x}{(x + 1)^2}$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -2 \end{cases}$$


Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	-2	-1	0	$+\infty$
f'		- 0 +		+ 0 -	
f	$+\infty$	↘ 5 ↗	$+\infty$	$-\infty$ ↗ 1 ↘ $-\infty$	

$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \infty$: tiệm cận đứng $x = -1$.

Đồ thị có tiệm cận xiên $y = -x + 2$.

Đồ thị :



2. Xác định tất cả các giá trị của a để đồ thị của hàm số cắt đường thẳng $y = x - 1$ tại hai điểm phân biệt

Phương trình hoành độ giao điểm của (C) và (d).

$$\frac{-x^2 + x + a}{x + a} = x - 1 \quad (x \neq -a)$$

$$\Leftrightarrow -x^2 + x + a = x^2 + ax - a - x$$

$$\Leftrightarrow 2x^2 + (a - 2)x - 2a = 0 \quad (1)$$

$$\Delta = (a - 2)^2 + 16a = a^2 + 12a + 4$$

(C) cắt (d) tại hai điểm phân biệt $\Leftrightarrow (1)$ có 2 nghiệm khác $-a$.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta > 0 \\ a \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a < -6 - 4\sqrt{2} \\ a > -6 + 4\sqrt{2} \end{cases}$$

Gọi x_1, x_2 là 2 nghiệm của (1) theo Viét ta có :

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = \frac{2 - a}{2} \\ x_1 x_2 = -a \end{cases} \quad (1) \quad (2)$$

$$(2) \Rightarrow a = -x_1 x_2.$$

$$(1) \Rightarrow x_1 + x_2 = \frac{2 + x_1 x_2}{2}$$

$$2(x_1 + x_2) = 2 + x_1 x_2 \quad (3)$$

Ta lại có :
$$\begin{cases} y_1 = x_1 - 1 \\ y_2 = x_2 - 1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = y_1 + 1 \\ x_2 = y_2 + 1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} (3) \Rightarrow 2(y_1 + y_2 + 2) &= 2 + (y_1 + 1)(y_2 + 1) \\ \Rightarrow 2(y_1 + y_2) + 4 &= 2 + y_1 y_2 + y_1 + y_2 + 1 \\ \Rightarrow y_1 y_2 - (y_1 + y_2) - 1 &= 0. \end{aligned}$$

83. ĐH KIẾN TRÚC

Cho tham số thực m và (C_m) là đồ thị của hàm số :

$$y = -x^3 + (m - |m|)x^2 + 4x - 4(m - |m|).$$

1. Tìm các điểm cố định của họ đường cong (C_m) .
2. Tìm m sao cho (C_m) tiếp xúc với trục hoành.
3. Tìm quỹ tích điểm uốn I_m của (C_m) khi m thay đổi.

Giải

Cho tham số thực m và (C_m) là đồ thị của hàm số :

$$y = -x^3 + (m - |m|)x^2 + 4x - 4(m - |m|)$$

1. Tìm các điểm cố định của họ đường cong (C_m)

$$\begin{aligned} M(x; y) \in (C_m) \quad \forall m &\Leftrightarrow y = -x^3 + (m - |m|)x^2 + 4x - 4(m - |m|) \\ &\Leftrightarrow (m - |m|)(x^2 - 4) + (-x^3 + 4x - y) = 0 \quad \forall m \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 - 4 = 0 \\ -x^3 + 4x - y = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \vee x = -2 \\ y = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Vậy các điểm cố định của (C_m) là : $M_1(2; 0), M_2(-2; 0)$.

2. Tìm m sao cho (C_m) tiếp xúc với trục hoành

Phương trình hoành độ giao điểm của (C_m) và Ox :

$$\begin{aligned} -x^3 + (m - |m|)x^2 + 4x - 4(m - |m|) &= 0 \\ \Leftrightarrow (m - |m|)(x^2 - 4) - x(x^2 - 4) &= 0 \\ \Leftrightarrow (x^2 - 4)(m - |m| - x) &= 0 \quad (1) \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = -2 \\ x = m - |m| \end{cases} \end{aligned}$$

(C_m) tiếp xúc với Ox :

$$\Leftrightarrow (1) \text{ có nghiệm kép} \Leftrightarrow -2 = m - |m| \Leftrightarrow m = -1.$$

3. Tìm quỹ tích điểm uốn I_m của (C_m) khi m thay đổi

$$I_m(x; y) \text{ là điểm uốn} \Leftrightarrow \begin{cases} y = f(x) \\ f'(x) = 0 \end{cases}$$

$$f'(x) = -3x^2 + 2(m - |m|)x + 4$$

$$f''(x) = -6x + 2(m - |m|)$$

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow m - |m| = 3x$$

$$y = f(x) \Leftrightarrow y = -x^3 + 3x^3 + 4x - 12x$$

$$\Leftrightarrow y = 2x^3 - 8x$$

$$\text{Do: } m - |m| \leq 0 \Rightarrow x \leq 0$$

Vậy quỹ tích I_m là phần của đồ thị hàm số $y = 2x^3 - 8x$ thỏa điều kiện giới hạn $x \leq 0$.

NĂM 1994

84. ĐH TỔNG HỢP TPHCM – KHỐI A, B

Cho hàm số: $y = \frac{x^2 + (m+2)x + 3m + 2}{x+1}$.

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số với $m = 0$.
2. Xác định m để hàm số có cực đại, cực tiểu.
3. Giả sử y có giá trị cực đại y_{CD} và giá trị cực tiểu y_{CT} . Chứng minh rằng:

$$y_{CD}^2 + y_{CT}^2 > \frac{1}{2}.$$

Giải

$$y = f(x) = \frac{x^2 + (m+2)x + 3m + 2}{x+1}$$

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số với $m = 0$

$$f(x) = \frac{x^2 + 2x + 2}{x+1}$$

$$\text{MXD: } D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$$

$$f'(x) = \frac{x^2 + 2x}{(x+1)^2} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -2 \end{cases}$$


Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	-2	-1	0	$+\infty$				
f'		+	0	-	-	0	+		
f			-2*		$+\infty$		2		$+\infty$

Tiệm cận đứng $x = -1$

Tiệm cận xiên $y = x + 1$

Đồ thị :



2. Xác định m để hàm số có cực đại và cực tiểu

Ta có : $f'(x) = \frac{x^2 + 2x - 2m}{(x+1)^2}$

f có cực đại và cực tiểu $\Leftrightarrow \Delta' > 0 \Leftrightarrow 1 + 2m > 0 \Leftrightarrow m > -\frac{1}{2}$

3. Chứng minh rằng : $y_{CD}^2 + y_{CT}^2 > \frac{1}{2}$

Giả sử : $m > -\frac{1}{2}$

f đạt cực trị tại $x_1 > x_2$.

Theo Viét ta có : $\begin{cases} x_1 + x_2 = -2 \\ x_1 x_2 = -2m \end{cases}$

$$\begin{aligned} y_{CD}^2 + y_{CT}^2 &= |2x_1 + m + 2|^2 + |2x_2 + m + 2|^2 \\ &= 4(x_1^2 + x_2^2) + 4(m+2)(x_1 + x_2) + 2(m+2)^2 \\ &= 4|4 + 4m| - 8(m+2) + 2(m+2)^2 = 2m^2 + 16m + 8 \end{aligned}$$

Đặt : $g(m) = 2m^2 + 16m + 8 \Rightarrow g'(m) = 4m + 16 = 0 \Leftrightarrow m = -4$

x	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$
g'		+
g	$\frac{1}{2}$	$\rightarrow +\infty$

Vậy : $y_{CD}^2 + y_{CT}^2 > \frac{1}{2}$

85. ĐH TỔNG HỢP TPHCM – KHỐI D

Cho hàm số : $y = \frac{ax^2 - (3a - 1)x + 2a}{x - 1}$ (1)

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số với $a = 1$.
2. Viết phương trình tiệm cận xiên của đồ thị (1). Chứng minh rằng tiệm cận xiên này luôn đi qua một điểm cố định với mọi a .

Giải

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số với $a = 1$

Ta có : $f(x) = \frac{x^2 - 2x + 2}{x - 1}$

MXĐ : $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$

$$f'(x) = \frac{x^2 - 2x}{(x - 1)^2} \Rightarrow f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$$

Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$				
f'	+	0	-	-	0	+			
f	$-\infty$	$\nearrow$	-2	$\searrow$	$+\infty$	$\nearrow$	2	$\searrow$	$+\infty$

Tiệm cận đứng $x = 1$.

Tiệm cận xiên $y = x - 1$.

Đồ thị : hình bên.

2. Tiệm cận xiên $\Delta : y = ax + 1 - 2a$


$M_0(x_0; y_0) \in \Delta \quad \forall a$

$$\Leftrightarrow y_0 = ax + 1 - 2a, \quad \forall a$$

$$\Leftrightarrow a(x_0 - 2) + 1 - y_0 = 0 \quad \forall a$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_0 - 2 = 0 \\ 1 - y_0 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = 2 \\ y_0 = 1 \end{cases}$$

Vậy Δ luôn đi qua điểm cố định $M_0(2; 1)$.



86. ĐH KINH TẾ

Cho hàm số : $y = x^3 + 3x^2 + mx + 1$ có đồ thị (C_m) .

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi $m = 3$.

2. Chứng minh rằng với mọi m , đồ thị (C_m) của hàm số đã cho luôn luôn cắt đồ thị hàm số $y = x^3 + 2x^2 + 7$ (L) tại hai điểm phân biệt A và B. Tìm quỹ tích trung điểm I của đoạn thẳng AB.
3. Xác định m để đồ thị (C_m) cắt đường thẳng $y = 1$ tại ba điểm phân biệt C(0; 1), D, E. Tìm m để các tiếp tuyến tại D và E với (C_m) vuông góc với nhau.

Giải

$$y = f(x) = x^3 + 3x^2 + mx + 1 \quad (C_m)$$

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi $m = 3$


$$f(x) = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$$

MXĐ : $D = \mathbb{R}$

$$f'(x) = 3x^2 + 6x + 3$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -1$$

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
f'		+	-
	$-\infty$	0	$-\infty$



Đồ thị : hình bên.

2. $y = x^3 + 2x^2 + 7$

Phương trình hoành độ giao điểm của (C_m) và (L).

$$x^3 + 3x^2 + mx + 1 = x^3 + 2x^2 + 7 \Leftrightarrow x^2 + mx - 6 = 0 \quad (1)$$

$$\Delta = m^2 + 24 \Rightarrow \Delta > 0, \quad \forall m$$

Vậy (C_m) cắt (L) tại 2 điểm $A(x_1; y_1), B(x_2; y_2)$.

Theo Viét ta có :

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -m \\ x_1 x_2 = -6 \end{cases}$$

Gọi I là trung điểm của AB ta có :

$$I \begin{cases} x = \frac{x_1 + x_2}{2} = -\frac{m}{2} \\ y = \frac{y_1 + y_2}{2} = \frac{(x_1^3 + x_2^3) + (x_1^2 + x_2^2) + 14}{2} \end{cases} \quad (1)$$

$$I \begin{cases} x = -\frac{m}{2} \\ y = \frac{1}{2}[-m(m^2 + 18) + 2m^2 + 38] \end{cases} \quad (2)$$

$$(1) \Rightarrow m = -2x$$

$$(2) \Rightarrow y = \frac{1}{2} |2x(4x^2 + 18) + 8x^2 + 38|$$

$$\Rightarrow y = 4x^3 + 4x^2 + 18x + 19$$

Vậy quỹ tích trung điểm I của AB là đường : $y = 4x^3 + 4x^2 + 18x + 19$.

3. Phương trình hoành độ giao điểm của (C_m) và đường thẳng $y = 1$

$$x^3 + 3x^2 + mx + 1 = 1 \Leftrightarrow x(x^2 + 3x + m) = 0 \quad (1)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x^2 + 3x + m = 0 \end{cases} \quad (2)$$

(C_m) cắt $y = 1$ tại ba điểm phân biệt C(0; 1), D, E

$\Leftrightarrow (2)$ có 2 nghiệm phân biệt khác 0

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta = 9 - 4m > 0 \\ 0^2 + 3 \cdot 0 + m \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < \frac{9}{4} \\ m \neq 0 \end{cases}$$

Theo Viét ta có : $\begin{cases} x_D + x_E = -3 \\ x_D \cdot x_E = m \end{cases}$

Tiếp tuyến tại D và E vuông góc

$$\Leftrightarrow f'(x_D) f'(x_E) = -1 \Leftrightarrow 4m^2 - 9m = -1$$

$$\Leftrightarrow 4m^2 - 9m + 1 = 0 \Leftrightarrow m = \frac{9 \pm \sqrt{65}}{8}$$

87. ĐH BÁCH KHOA TPHCM

Cho hàm số : $y = \frac{x^2 + 2mx + 1}{x - 1}$ (m : tham số).

1. Khảo sát và vẽ đồ thị (C) của hàm số tương ứng với $m = 1$.

2. Chứng minh rằng nếu đồ thị của hàm số cắt trục hoành tại $x = x_0$

thì $y'(x_0) = \frac{2(x_0 + m)}{x_0 - 1}$.

3. Tìm số a nhỏ nhất để $a(x^2 + x - 1) \leq (x^2 + x + 1)^2$ được thỏa mãn với mọi $x \in [0; 1]$.

Giải

Cho hàm số : $y = \frac{x^2 + 2m + 1}{x - 1}$

1. $m = 1$

Ta có : $f(x) = \frac{x^2 + 2x + 1}{x - 1}$

MXĐ : $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$

$$f'(x) = \frac{x^2 - 2x - 3}{(x - 1)^2} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 3 \end{cases}$$

x	$-\infty$	-1	1	3	$+\infty$				
f'	+	0	-	-	0	+			
f	$-\infty$	$\nearrow$	0	$\searrow$	$+\infty$	$\nearrow$	8	$\searrow$	$+\infty$

Đồ thị : (học sinh tự vẽ).

2. $y = \frac{u(x)}{v(x)}$

Ta có : $u(x_0) = 0$

$$y' = \frac{u'y - uy'}{v^2} \Rightarrow y'(x_0) = \frac{u'(x_0)}{v(x_0)} = \frac{2(x_0 + m)}{x_0 - 1}$$

3. $a(x^2 + x - 1) \leq (x^2 + x + 1)^2 \quad \forall x \in [0; 1]$ (1)

Đặt : $X = x^2 + x$

$$0 \leq x \leq 1 \Leftrightarrow 0 \leq X \leq 2$$

(1) $\Leftrightarrow a(X - 1) \leq (X + 1)^2$ (2)

TH 1 : $X = 1$, ta có (2) đúng $\forall a$.

TH 2 : $0 \leq X \leq 1$: (2) $\Leftrightarrow a \geq \frac{(X + 1)^2}{X - 1} \Leftrightarrow a \geq -1$

TH 3 : $1 < X \leq 2$: (2) $\Leftrightarrow a \leq \frac{(X + 1)^2}{X - 1} \Leftrightarrow a \leq 9$

Vậy : $-1 \leq a \leq 9$.

88. ĐH KIẾN TRÚC TP HCM

Cho hàm số : $y = 4x^3 + mx$.

1. Tùy theo giá trị của m , hãy xét sự biến thiên của hàm số.

2. Xác định m để $|y| \leq 1$ khi $|x| \leq 1$.

Giải

$$y = 4x^3 + mx$$

1. Tùy theo giá trị của m , hãy xét sự biến thiên của hàm số

MXD : $D = \mathbb{R}$

$$y' = 12x^2 + m$$

TH 1 : $m \geq 0 \Rightarrow y' \geq 0$ Hàm số luôn luôn đồng biến.

TH 2 : $m < 0 \quad y' = 0 \Leftrightarrow x = x_{1,2} = \pm \sqrt{\frac{-m}{12}}$

x	$-\infty$	x_1	x_2	$+\infty$
y'	+	0	0	+
y	$-\infty$	$\frac{-2m}{3} \sqrt{\frac{-m}{12}}$	$\frac{2m}{3} \sqrt{\frac{-m}{12}}$	$+\infty$

2. Xác định m để $|y| \leq 1$ khi $|x| \leq 1$

Cho : $x = 1$ Ta có : $4 + m \leq 1 \Leftrightarrow m \leq -3$

Cho : $x = \frac{1}{2}$ Ta có : $-1 \leq \frac{1}{2} + \frac{1}{2}m \Rightarrow m \geq -3$

$$\begin{cases} m \leq -3 \\ m \geq -3 \end{cases} \Rightarrow m = -3$$

Đảo lại, giả sử $m = -3$

$$y = 4x^3 - 3x \quad \forall x \in [-1; 1]$$

Đặt : $x = \cos \alpha \Rightarrow y = 4\cos^3 \alpha - 3\cos \alpha = \cos 3\alpha.$

$$\Rightarrow |y| = |\cos 3\alpha| \leq 1.$$

89. ĐH Y DƯỢC TPHCM

1. Cho hàm số : $y = x + \sqrt{1 - x^2} - m.$

Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số nhận giá trị không dương với mọi $x \in [-1; 1].$

2. Trong hệ trục tọa độ xOy , hãy vẽ tất cả các điểm $M(x; y)$ có tọa độ thỏa điều kiện : $|y| \geq \frac{x^2 - x + 2}{x - 1}.$

3. Cho hàm số $y = x^4 + (m + 3)x^3 + 2(m + 1)x^2 + \dots$

Tìm m để hàm số có cực đại. Khi đó chứng tỏ rằng, điểm cực đại của đồ thị hàm số không có hoành độ dương.

Giải

1. Cho hàm số : $y = x + \sqrt{1 - x^2} - m$

Tất cả các giá trị của m để hàm số nhận giá trị không dương $\forall x \in [-1; 1]$.

$$y = f(x) = x + \sqrt{1 - x^2} - m$$

$$f'(x) = 1 - \frac{2x}{2\sqrt{1 - x^2}} = \frac{\sqrt{1 - x^2} - x}{\sqrt{1 - x^2}}$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \sqrt{1 - x^2} = x \Leftrightarrow x = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Bảng biến thiên :

x	-1	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
f'		+	0
f		+	-

$$f(x) \leq 0 \Leftrightarrow \sqrt{2} - m \leq 0 \Leftrightarrow m \geq \sqrt{2}$$


2. $|y| \geq \frac{x^2 - x + 2}{x - 1}$

Đặt : $f(x) = \frac{x^2 - x + 2}{x - 1}$

Ta có : $|y| \geq f(x)$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y \geq 0 \\ y \geq f(x) \end{cases} \vee \begin{cases} y \leq 0 \\ y \leq -f(x) \end{cases}$$

Tập hợp những điểm $M(x; y)$ thỏa điều kiện $|y| \geq f(x)$ là phần gạch chéo dưới đây của một mặt phẳng tọa độ.



3. $y = f(x) = x^4 + (m + 3)x^3 + 2(m + 1)x^2$

$$f'(x) = 4x^3 + 3(m + 3)x^2 + 4(m + 1)x$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ 4x^2 + 3(m + 3)x + 4(m + 1) = 0 \end{cases} \quad (1)$$

$f(x)$ có cực đại $\Leftrightarrow (1)$ có 2 nghiệm khác 0.

Đặt : $g(x) = 4x^2 + 3(m + 3)x + 4(m + 1)$

$$\begin{aligned}\Delta > 0 &\Leftrightarrow 9(m+3)^2 - 64(m+1) > 0 \\ &\Leftrightarrow 9m^2 - 10m + 17 > 0 \text{ đúng } \forall m \\ g(0) \neq 0 &\Leftrightarrow m \neq -1\end{aligned}$$

Vậy : $m \neq -1$, $g(x)$ luôn có 2 nghiệm x_1, x_2 :

$$\begin{aligned}g(0) &= 4(m+1) \\ \frac{S}{2} &= -\frac{3}{2}(m+1)\end{aligned}$$

$$TH 1 : g(0) < 0 \Leftrightarrow m < -1$$

Ta có bảng biến thiên :

x	$-\infty$	x_1	0	x_2	$+\infty$			
f'		-	0	+	0	-	0	+
f_{CD}	CT CD CT							

$$TH 2 : g(0) > 0 \Leftrightarrow m > -1 \Rightarrow -\frac{3}{4}(m+3) < 0$$

Ta có bảng biến thiên :

x	$-\infty$	x_1	x_2	0	$+\infty$			
f		-	0	+	0	-	0	+
f_{CD}								

Vậy điểm cực đại của đồ thị hàm số không có hoành độ dương.

90. ĐH SƯ PHẠM TPHCM

Cho hàm số : $y = \frac{2x^2 + (1-m)x + 1+m}{-x+m}$ (1)

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số khi $m = 1$.
2. Xác định m để hàm số (1) nghịch biến trong khoảng $2 < x < +\infty$.
3. Chứng minh rằng với mọi $m \neq -1$, các đường cong (1) đều tiếp xúc với một đường thẳng cố định tại một điểm cố định.

Giải

$$y = f(x) = \frac{2x^2 + (1-m)x + 1+m}{-x+m}$$

1. Khảo sát và vẽ đồ thị khi $m = 1$

Học sinh tự vẽ.

2. Xác định m để hàm số nghịch biến trong khoảng $2 < x < +\infty$

$$f(x) = \frac{-2x^2 + 4mx - m^2 - 2m + 1}{(-x + m)^2}$$

Đặt : $g(x) = -2x^2 + 4mx - m^2 + 2m + 1$

$$\Delta' = 4m^2 + 2(-m^2 + 2m + 1) = 2(m + 1)^2$$

TH 1 : $m = -1$

$$g'(x) < 0 \quad \forall x \in D \quad \Rightarrow \quad f(x) \text{ nghịch biến trên } (2; +\infty).$$

TH 2 : $m \neq -1$

$$g(x) \text{ có 2 nghiệm } x_1, x_2.$$

Ta có bảng biến thiên :

x	$-\infty$	x_1	m	x_2	2	$+\infty$
f'	-	0	+	+	0	-
f		$\nearrow$	$\nearrow$	$\nearrow$	$\searrow$	

$f(x)$ nghịch biến trong $(2; +\infty)$

$$\Leftrightarrow x_1 < x_2 \leq 2 \quad \Leftrightarrow \begin{cases} a.g(2) \geq 2 \\ \frac{S}{2} < 2 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \begin{cases} m^2 - 10m + 7 > 0 \\ m < 2 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow m < 5 - \sqrt{18}.$$

3. Gọi $M_0(x_0; y_0)$ là điểm cố định

$$M_0 \in (C_m) \quad \forall m \quad \Leftrightarrow y_0 = \frac{2x_0^2 + 1 - m)x_0 + 1 + m}{-x_0 + m}$$

$$\Leftrightarrow m(x_0 + y_0 - 1) - x_0 y_0 - 2x_0^2 - x_0 - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_0 + y_0 - 1 = 0 \\ 2x_0^2 + y_0 x_0 + x_0 + 1 = 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = -1 \\ y_0 = 2 \end{cases}$$

Ta có : $f'(x) = \frac{-2x^2 + 4mx + 2m - m^2 + 1}{(-x + m)^2}$

$$f'(x) = \frac{-m^2 - 2m - 1}{(m + 1)^2} \quad (\text{vì } x_0 = -1)$$

Phương trình tiếp tuyến Δ với (C_m) tại $M_0(-1; 2)$:

$$\Delta : y - 2 = (-1)(x - 2) \quad \Leftrightarrow \quad y = -x + 4$$

Vậy : (C_m) luôn tiếp xúc với đường thẳng cố định $\Delta : y = -x + 4$ tại điểm cố định $M_0(-1; 2)$.

91. ĐH NGOẠI THƯỜNG

Cho hàm : $y = x^3 - 3(m+1)x^2 + 2(m^2 + 4m + 1)x - 4m(m+1)$.

1. Chứng minh rằng khi m thay đổi, đồ thị của hàm số luôn đi qua một điểm cố định.

Xác định tham số m để đồ thị của hàm số cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt có hoành độ lớn hơn 1.

2. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số khi $m = 0$. Tìm điểm $M \in (C)$ sao cho qua M chỉ vẽ được duy nhất một tiếp tuyến với (C).

Giải

Cho hàm số : $y = f(x) = x^3 - 3(m+1)x^2 + 2(m^2 + 4m + 1)x - 4m(m+1)$

1. Chứng minh rằng khi m thay đổi, đồ thị của hàm số luôn đi qua một điểm cố định

$M_0(x_0; y_0) \in (C_m), \forall m$.

$$\Leftrightarrow y_0 = x_0^3 - 3(m+1)x_0^2 + 2(m^2 + 4m + 1)x_0 - 4m(m+1)$$

$$\Leftrightarrow m^2(2x_0 - 4) + m(-3x_0^2 + 8x_0 - 4) - x_0^3 - 3x_0^2 + 2x_0 - y_0 = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2x_0 - 4 = 0 \\ -3x_0^2 + 8x_0 - 4 = 0 \\ x_0^3 - 3x_0^2 + 2x_0 - y_0 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = 2 \\ y_0 = 0 \end{cases}$$

Vậy (C_m) luôn đi qua $M_0(2; 0)$.

Xác định tham số m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt có hoành độ lớn hơn 1.

$$\text{Ta có : } f(x) = 0 \Leftrightarrow (x-2)[x^2 - (3m+1)x + 2m(m+1)] = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x^2 - (3m+1)x + 2m(m+1) = 0 \end{cases}$$

Đặt : $g(x) = x^2 - (3m+1)x + 2m(m+1)$.

Để $f(x)$ có 3 nghiệm phân biệt thì $g(x)$ phải có 2 nghiệm phân biệt khác 2 thỏa mãn : $1 < x_1 < x_2$.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta > 0 \\ 2f(1) > 0 \\ \frac{S}{2} > 1 \\ f(2) \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m^2 - 2m + 1 > 0 \\ 2m^2 - m > 0 \\ \frac{3m+1}{2} > 1 \\ 2m^2 - 4m + 2 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 0 \vee m > \frac{1}{2} \\ m > \frac{1}{3} \\ m \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > \frac{1}{2} \\ m \neq 1 \end{cases}$$

2. $m = 0$

$$f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x$$

MXĐ : $D = \mathbb{R}$

$$f'(x) = 3x^2 - 6x + 2 \Rightarrow f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{3 \pm \sqrt{3}}{3}$$

Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	$\frac{3-\sqrt{3}}{3}$		$\frac{3+\sqrt{3}}{3}$	$+\infty$	
f'	+	0	-	0	+	
f	$-\infty$	↗ CD ↘		↗ CT ↗		$+\infty$

Học sinh tự vẽ đồ thị.

Xét : $M_0(x_0; y_0) \in (C)$.

Phương trình tiếp tuyến Δ tại $M_0(x_0; y_0)$: $y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$

Phương trình hoành độ giao điểm của Δ và (C) :

$$f(x) = f(x_0)(x - x_0) + f(x_0)$$

$$\Leftrightarrow f(x) - f(x_0) - f'(x_0)(x - x_0) = 0$$

$$\Leftrightarrow x^3 - x_0^3 - 3(x^2 - x_0^2) + 2(x - x_0) - (3x_0^2 - 6x_0 + 2)(x - x_0) = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - x_0)[x^2 + x_0x + x_0^2 - 3(x + x_0) + 2 - 3x_0^2 + 6x_0 - 2] = 0$$

$$\Leftrightarrow (x - x_0)[x^2 + (x_0 - 3)x - 2x_0^2 + 3x_0] = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = x_0 \\ x^2 + (x_0 - 3)x - 2x_0^2 + 3x_0 = 0 \end{cases} \quad (1)$$

Qua M chỉ vẽ được duy nhất một tiếp tuyến đến (C)

$$\Leftrightarrow (1) \text{ có nghiệm kép } x_0 \Leftrightarrow \frac{3 - x_0}{2} = x_0 \Leftrightarrow x_0 = 1.$$

Vậy $M_0(1; 0)$ là điểm cần tìm.

92. ĐH BÁCH KHOA TPHCM

Cho hàm số : $y = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$.

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số. Từ đó suy ra đồ thị của hàm số :

$$y = \frac{x^2 - x + 1}{|x - 1|} \quad (\text{vẽ hình riêng}).$$

2. Tìm tất cả các giá trị của m để cho phương trình :

$$x^2 - (m + 1)x + m + 1 = 0 \text{ có nghiệm.}$$

3. Tìm tất cả các giá trị của m để cho phương trình sau đây có ba nghiệm phân biệt nằm trong đoạn $[-3; 0]$:

$$(t^2 + 2t)^2 - (m + 1)(t^2 + 2t) + m + 1 = 0.$$

Giải

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số. Từ đó suy ra đồ thị của

hàm số $y = \frac{x^2 - x + 1}{|x - 1|}$

Ta có : $f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1}$

MXD : $D = R \setminus \{1\}$

$$f'(x) = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2} \Rightarrow f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$$

Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$
f'	+	0	-	-	0
f	$-\infty$	$\nearrow -1$	$\searrow -\infty$	$+\infty \searrow 3$	$\nearrow +\infty$

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) \rightarrow \infty \quad \Rightarrow \quad \text{đồ thị có tiệm cận đứng } x = 1.$$


$$\left. \begin{array}{l} y = x + \frac{1}{x-1} \\ \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x-1} = 0 \end{array} \right\} \Rightarrow \text{đồ thị có tiệm cận xiên } y = x.$$

Ta có : đồ thị (C) của hàm số như sau :

$$\text{Ta có : } y = g(x) = \frac{x^2 - x + 1}{|x - 1|}$$

$$= \begin{cases} \frac{x^2 - x + 1}{x - 1} & (x > 1) \\ \frac{-(x^2 - x + 1)}{x - 1} & (x < 1) \end{cases}$$


$$g(x) = \begin{cases} f(x) & (x > 1) \\ -f(x) & (x < 1) \end{cases}$$



Đồ thị (C_1) của $g(x)$ suy ra từ đồ thị (C) của $f(x)$ bằng cách :

- Giữ nguyên phần có $x > 1$.
- Lấy đối xứng của phần có $x < 1$ qua Ox.

Ta có đồ thị (C_1) như sau :



2. Tìm tất cả các giá trị của m để cho phương trình sau có nghiệm :

$$x^2 - (m+1)x + m + 1 = 0 \quad (1)$$

Ta có (1) $\Leftrightarrow x^2 - x + 1 = m(x - 1) \quad (x \neq 1)$

$$\Leftrightarrow \frac{x^2 - x + 1}{x - 1} = m \quad \Leftrightarrow f(x) = m$$

Với : $f(x) = \frac{x^2 - x + 1}{x - 1} \quad \Leftrightarrow \begin{cases} y = f(x) \\ y = m \end{cases}$

Số nghiệm của phương trình (1) chính là số giao điểm của (C) và đường thẳng $y = m$. Theo đồ thị ta có : (1) có nghiệm $\Leftrightarrow m \leq -1 \vee m \geq 3$.

3. Tìm tất cả các giá trị của m để cho phương trình sau đây có 3 nghiệm phân biệt nằm trong đoạn $[-3; 0]$

$$(t^2 + 2t)^2 - (m+1)(t^2 + 2t) + m + 1 = 0 \quad (1)$$

Đặt : $u = t^2 + 2t \Rightarrow u' = 2t + 2$. Ta có :

t	-3	-1	0
u'	-	0	+
u	3	0	-1

Ta có : (1) $\Leftrightarrow u^2 - (m+1)u + m + 1 = 0$

$$\Leftrightarrow u^2 - u + 1 = m(u - 1) \quad (u \neq 1)$$

$$\Leftrightarrow \frac{u^2 - u + 1}{u - 1} = m \quad (2)$$

(1) có 3 nghiệm phân biệt nằm trong đoạn $[-3; 0] \Leftrightarrow$ (2) có 2 nghiệm u_1, u_2 thỏa : $-1 \leq u_1 \leq u_2 \leq 3 \Leftrightarrow -\frac{3}{2} \leq m \leq -1$.

93. ĐH SỰ PHẠM KỸ THUẬT – KHỐI B

Cho hàm số : $y = x^3 - 3x^2 + 2$.

- Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số. Xác định các giao điểm của đồ thị với trục hoành.
- Viết phương trình các tiếp tuyến kẻ đến đồ thị từ điểm $A\left(\frac{23}{9}, -2\right)$.
- Tìm trên đường thẳng $y = -2$ các điểm từ đó có thể kẻ đến đồ thị hai tiếp tuyến vuông góc với nhau.

Giải

Cho hàm số : $y = f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$.

- Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số :

MXĐ : $D = \mathbb{R}$.

$$f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x - 2)$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$$

Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
f'	+	0	-	+
f	$-\infty$	2	-2	$+\infty$

$$f''(x) = 6x - 6$$


$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1$$

$$f(1) = 0 \quad \text{Điểm uốn } I(1; 0).$$

Giao điểm với Ox :

$$\begin{aligned} y = 0 &\Rightarrow x^3 - 3x^2 + 2 = 0 \\ &\Rightarrow (x - 1)(x^2 - 2x - 2) = 0 \\ &\Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 1 \pm \sqrt{3} \end{cases} \end{aligned}$$

Đồ thị : hình bên.



- Viết phương trình các tiếp tuyến kẻ đến đồ thị từ điểm $A\left(\frac{23}{9}, -2\right)$

Phương trình đường thẳng d đi qua A và có hệ số góc k :

$$d : y + 2 = k \left(x - \frac{23}{9} \right) \Leftrightarrow y = k \left(x - \frac{23}{9} \right) - 2$$

d tiếp xúc với (C) khi hệ sau có nghiệm.

$$x^3 - 3x^2 + 2 = k \left(x - \frac{23}{9} \right) - 2 \quad (1)$$

$$3x^2 - 6x = k \quad (2)$$

$$\Rightarrow x^3 - 3x + 2 = (3x^2 - 6x) \left(x - \frac{23}{9} \right) - 2$$

$$\Leftrightarrow x^3 - 3x^2 + 4 = 3x(x - 2) \left(x - \frac{23}{9} \right)$$

$$\Leftrightarrow (x + 1)(x - 2)^2 = 3x - 2 \left(x - \frac{23}{9} \right) \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = 3 \\ x = \frac{1}{3} \end{cases}$$

$$* \text{ Với } x = 2 \Rightarrow k = 0 \Rightarrow d : y = -2$$

$$* \text{ Với } x = 3 \Rightarrow k = 9 \Rightarrow d : y = 9x - 25$$

$$* \text{ Với } x = \frac{1}{3} \Rightarrow k = -\frac{5}{3} \Rightarrow d : y = -\frac{5x}{3} + \frac{61}{27}.$$

c) Tìm trên đường thẳng $y = -2$ các điểm từ đó có thể kẻ đến đồ thị hai tiếp tuyến vuông góc với nhau

Gọi : $M(m, -2)$ là một điểm trên đường thẳng $y = -2$. Giả sử từ M ta kẻ được tiếp tuyến Δ tiếp xúc với (C) tại $M_0(x_0, y_0)$.

$$\text{Phương trình } \Delta : y = (3x_0^2 - 6x_0)(x - x_0) + x_0^3 - 3x_0^2 + 2$$

$$M(m, -2) \in \Delta \Rightarrow -2 = (3x_0^2 - 6x_0)(m - x_0) + x_0^3 - 3x_0^2 + 2$$

$$\Leftrightarrow x_0^3 - 3(m + 1)x_0^3 + mx_0 - 4 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x_0 - 2)[2x_0^2 - (3m - 1)x_0 + 2] = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = 2 \\ 2x_0^2 - (3m - 1)x_0 + 2 = 0 \end{cases} \quad (1)$$

$$\text{Gọi } x_1, x_2 \text{ là nghiệm của (1) ta có : } \begin{cases} x_1 \cdot x_2 = 1 \\ x_1 + x_2 = \frac{1}{2}(3m - 1) \end{cases}$$

Từ M kẻ được 2 tiếp tuyến vuông góc đến (C), suy ra :

$$\begin{aligned}
 f'(x_1) \cdot f'(x_2) &= -1 \Rightarrow (3x_1^2 - 6x_1)(3x_2^2 - 6x_2) = -1 \\
 &\Rightarrow 9x_1x_2[x_1x_2 - 2(x_1 + x_2) + 4] = -1 \\
 &\Rightarrow 9[5 - (3m - 1)] = -1 \Rightarrow m = \frac{55}{27}.
 \end{aligned}$$

Thử lại với $m = \frac{55}{27}$, (1) có nghiệm.

Vậy: $M\left(\frac{55}{27}; -2\right)$ là điểm cần tìm.

94. ĐH NÔNG LÂM

Cho hàm số: $y = \frac{2x^2 + (1-m)x + 1 + m}{x - m}$ (1)

- Với $m = 1$, khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số.
- Chứng minh rằng với mọi $m \neq -1$, đồ thị hàm số (1) luôn luôn tiếp xúc với một đường thẳng cố định tại một điểm cố định.
- Xác định m để hàm số (1) tăng trên $(1; +\infty)$.

Giải

- Với $m = 1$, khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

Ta có: $f(x) = \frac{2x^2 + 2}{x - 1}$

MXĐ: $D = \mathbb{R} \setminus \{1\}$

$$f'(x) = \frac{2x^2 - 4x - 2}{(x - 1)^2}$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x - 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 - \sqrt{2} \\ x = 1 + \sqrt{2} \end{cases}$$

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	$1-\sqrt{2}$	1	$1+\sqrt{2}$	$+\infty$					
f'	+	0	-	-	0	+				
f	$-\infty$	$\nearrow$	CĐ	$\searrow$	$-\infty$	$+\infty$	$\searrow$	CT	$\nearrow$	$+\infty$


CĐ: $f(1 - \sqrt{2}) = 4(1 - \sqrt{2})$

CT: $f(1 + \sqrt{2}) = 4(1 + \sqrt{2})$

Tiệm cận đứng : $x = 1$

Tiệm cận xiên : $y = 2x + 2$

Đồ thị : (hình vẽ bên).



2. Chứng minh rằng với mọi $m \neq -1$, đồ thị hàm số luôn tiếp xúc với một đường thẳng cố định tại một điểm cố định

Gọi $M_0(x_0; y_0)$ là điểm cố định.

Ta có : $M_0 \in (C_m)$

$$\Leftrightarrow y_0 = \frac{2x_0^2 + (1-m)x_0 + 1+m}{x_0 - m} \quad (\forall m \neq x_0)$$

$$\Leftrightarrow y_0(x_0 - m) = 2x_0^2 + (1-m)x_0 + 1+m \quad (\forall m \neq x_0)$$

$$\Leftrightarrow (x_0 - y_0 - 1)m + y_0x_0 - 2x_0^2 - x_0 - 1 = 0 \quad (\forall m \neq x_0)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_0 - y_0 = 1 \\ y_0x_0 - 2x_0^2 - x_0 - 1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = -1 \\ y_0 = -2 \end{cases}$$

Vậy : $\forall m \neq -1 (C_m)$ qua $M_0(-1; -2)$

$$f'(x) = \frac{2x^2 - 4mx + m^2 - 2m - 1}{(x - m)^2}$$

$$f'(-1) = \frac{(m+1)^2}{(m+1)^2} = 1 \quad (\forall m \neq -1)$$

Phương trình tiếp tuyến với (C_m) tại $M_0(-1; -2)$

$$y + 2 = (x + 1)$$

$$y = x - 1 \quad (\Delta)$$

Vậy : $\forall m \neq -1 (C_m)$ luôn tiếp xúc với đường (Δ) cố định tại M_0 cố định.

3. Xác định m để hàm số đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$

Ta có : $f'(x) = \frac{2x^2 - 4mx + m^2 - 2m - 1}{(x - m)^2}$

Đặt : $g(x) = 2x^2 - 4mx + m^2 - 2m - 1$

$$\Delta' = 2(m+1)^2$$

TH 1 : $m = -1$ Ta có : f tăng trên $(1; +\infty)$.

TH 2 : $m \neq -1$ $f'(x)$ có 2 nghiệm x_1, x_2 .

x	$-\infty$	x_1	m	x_2	$+\infty$	
f'		+	0	-	0	+
f						

f tăng trên $(1; +\infty)$

$$\Leftrightarrow x_1 < x_2 \leq 1 \Leftrightarrow \begin{cases} 2g(1) \geq 0 \\ \frac{4m}{4} < 1 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m^2 - 6m + 1 \geq 0 \\ m < 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \leq 3 - 2\sqrt{2} \\ m < 1 \end{cases} \Leftrightarrow m < 1.$$

95. ĐH TỔNG HỢP – KHỐI A, B

Cho hàm số : $y = \frac{(m-1)(x^2 - 2x) + m + 4}{mx + m}$,

với tham số m lấy mọi giá trị khác 0 và $-\frac{1}{4}$.

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số ứng với $m = 2$.
2. Với những giá trị nào của m thì đồ thị của hàm số tiếp xúc với đường thẳng $y = 1$.
3. Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số có điểm cực đại và điểm cực tiểu. Xác định m để giá trị cực đại và cực tiểu cùng dấu nhau.

Giải

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số ứng với $m = 2$

$$f'(x) = \frac{x^2 - 2x + 6}{2x + 2}$$

$$\text{MXĐ : } D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$$

$$f'(x) = \frac{2x^2 + 4x - 16}{(2x + 2)^2}; \quad f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -4 \\ x = 2 \end{cases}$$

Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	-4	-1	2	$+\infty$		
f'		+	0	-	-	0	+
f							

$-\infty \rightarrow -5 \rightarrow -\infty$ $+\infty \rightarrow 1 \rightarrow +\infty$

Tiệm cận đứng : $x = -1$.


Tiệm cận xiên : $y = \frac{1}{2}x - \frac{3}{2}$.

Cực đại : $f(-4) = -5$.

Cực tiểu : $f(2) = 1$.

Điểm đặc biệt : $x = 0 \Rightarrow y = 3$.

Đồ thị : hình bên.



2. Với những giá trị nào của m thì đồ thị của hàm số tiếp xúc với đường thẳng $y = 1$

Phương trình hoành độ giao điểm của (C_m) và $\Delta : y = 1$ là :

$$\frac{(m-1)(x^2 - 2x) + m + 4}{mx + m} = 1 \quad (mx + m \neq 0)$$

$$\Leftrightarrow (m-1)(x^2 - 2x) + m + 4 = mx + m$$

$$\Leftrightarrow (m-1)x^2 + (2-3m)x + 4 = 0$$

$$(1) \text{ có nghiệm kép } \Leftrightarrow \begin{cases} m-1 \neq 0 \\ \Delta = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 1 \\ (2-3m)^2 - 16(m-1) = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m = \frac{10}{9} \\ m = 2 \end{cases}$$

3. Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số có cực đại và cực tiểu
Xác định m để giá trị cực đại và cực tiểu cùng dấu nhau.

$$f(x) = \frac{(m-1)(x^2 - 2x) + m + 4}{mx + m}$$

$$f(x) = \frac{(m-1)x^2 - 2(m-1)x + m + 4}{mx + m}$$

$$f'(x) = \frac{m(m-1)x^2 + 2m(m-1)x - 3m^2 - 2m}{(mx + m)^2}$$

$$f \text{ có cực đại và cực tiểu } \Leftrightarrow \begin{cases} m(m-1) \neq 0 & (1) \\ \Delta' > 0 & (2) \end{cases}$$

$$(1) \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 0 \\ m \neq 1 \end{cases}$$

$$(2) \Leftrightarrow \begin{cases} m < -\frac{1}{4} \\ m > 1 \end{cases}$$

Vậy : f có cực đại và cực tiểu $\Leftrightarrow \begin{cases} m < \frac{-1}{4} \\ m > 1 \end{cases} \quad (3)$

Đồ thị của f cắt Ox tại 2 điểm

$\Leftrightarrow$ Phương trình $(m-1)x^2 - 2(m-1)x + m+4 = 0$ có 2 nghiệm khác -1 .

$\Leftrightarrow \Delta' > 0 \Leftrightarrow (m-1)^2 - (m-1)(m+4) > 0 \Leftrightarrow m < 1 \quad (4)$

Đồ thị của f có 2 giá trị cực trị cùng dấu $\Leftrightarrow (3) \text{ và } (4)$

$\Leftrightarrow m < \frac{-1}{4}$

Vậy : $m < \frac{-1}{4}$.

96. ĐH KINH TẾ

Cho hàm số : $y = \frac{x^2 \cos 2a + 2x \sin 2a + 1}{x+2}$.

. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi $a = 0$.

. Xác định a để đường tròn có tâm ở gốc tọa độ và tiếp xúc với tiệm cận xiên của đồ thị hàm số có bán kính lớn nhất.

Giải

. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi $a = 0$

$$f(x) = \frac{x^2 + 1}{x+2}$$

MXĐ : $D = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$

$$f'(x) = \frac{x^2 + 4x - 1}{(x+2)^2}$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 + 4x - 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 - \sqrt{5} \\ x = -2 + \sqrt{5} \end{cases}$$

Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	$-2 - \sqrt{5}$	-2	$-2 + \sqrt{5}$	$+\infty$
f'		$+$	0	$-$	
f	$-\infty$	$\nearrow$	$\searrow$	$\nearrow$	$+\infty$
		CD		CT	

$$CD : f(-2 - \sqrt{5}) = 2(-2 - \sqrt{5})$$

$$CT : f(-2 + \sqrt{5}) = 2(-2 + \sqrt{5})$$


$$\lim_{x \rightarrow -2} = \infty : \text{Tiệm cận đứng } x = -2.$$

$$y = f(x) = x - 2 + \frac{5}{x + 2}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{5}{x + 2} = 0 : \text{Tiệm cận xiên } y = x - 2.$$

$$\text{Điểm đặc biệt : } x = 0 \Rightarrow y = \frac{1}{2}$$

Đồ thị :



2. Xác định a để đường tròn có tâm ở gốc tọa độ và tiếp xúc với tiệm cận xiên của đồ thị hàm số có bán kính lớn nhất

Ta chia đa thức :

$$\begin{array}{r|l} x^2 \cos 2a + 2x \sin 2a + 1 & x + 2 \\ - x^2 \cos 2a - 2x \cos 2a & x \cos 2a + 2(\sin 2a - \cos 2a) \\ \hline 2x(\sin 2a - \cos 2a) + 1 & \\ - 2x(\sin 2a - \cos 2a) - 4(\sin 2a - \cos 2a) & \\ \hline & 1 - 4(\sin 2a - \cos 2a) \end{array}$$

$$\text{Tiệm cận xiên : } \Delta : y = x \cos 2a + 2(\sin 2a - \cos 2a)$$

$$\Leftrightarrow x \cos 2a - y + 2(\sin 2a - \cos 2a) = 0$$

$$R = d(O; \Delta) = \frac{|2(\sin 2a - \cos 2a)|}{\sqrt{\cos^2 2a + 1}}$$

Cách 1 : (Dùng bất đẳng thức Bunhiacôpski)

$$R = \frac{2 \left| (1)(\sin 2a) + \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} \right) (\sqrt{2} \cos 2a) \right|}{\sqrt{2 \cos^2 2a + \sin^2 2a}}$$

$$R \leq \frac{2 \sqrt{\left(1 + \frac{1}{2} \right) (2 \cos^2 2a + \sin^2 2a)}}{\sqrt{2 \cos^2 2a + \sin^2 2a}}$$

$$R \leq \sqrt{6}$$

$$\text{Vậy : } R \text{ lớn nhất} \Leftrightarrow R = \sqrt{6} \Leftrightarrow \frac{\sin 2a}{\sqrt{2} \cos 2a} = -\sqrt{2}$$

$$\Leftrightarrow \operatorname{tg} 2a = -2 \Leftrightarrow 2a = \operatorname{arctg}(-2) + k\pi$$

$$\Leftrightarrow a = \frac{1}{2} \operatorname{arctg}(-2) + \frac{k\pi}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Cách 2 : (Dùng đạo hàm)

$$R^2 = \frac{4(\operatorname{tg} 2a - 1)^2}{(\operatorname{tg}^2 2a + 2)}$$

Đặt : $t = \operatorname{tg} 2a$.

$$R^2 = \frac{4(t^2 - 2t + 1)}{t^2 + 2}$$

Đặt : $g(t) = \frac{t^2 - 2t + 1}{t^2 + 2}$

$$g'(t) = \frac{2t^2 + 2t - 4}{(t^2 + 2)^2}; \quad g'(t) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = -2 \\ t = 1 \end{cases}$$

Bảng biến thiên :

t	$-\infty$	-2	1	$+\infty$		
g'		+	0	-	0	+
g			$\frac{3}{2}$		1	
	1			0		

$$R \text{ lớn nhất} \Leftrightarrow t = -2$$

$$\Leftrightarrow \operatorname{tg} 2a = -2 \Leftrightarrow a = \frac{1}{2} \operatorname{arctg}(-2) + \frac{k\pi}{2}, \quad k \in \mathbb{Z}.$$

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số : $y = \frac{x^2 - 2x + 9}{x - 2}$.
2. Tìm K để đường thẳng $y = Kx + 10 - 5K$ cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt nhận I(5; 10) làm trung điểm.
3. Biện luận theo tham số a số nghiệm $x < 0$ của phương trình :

$$\frac{x^2 - 2|x| + 9}{|x| - 2} = a(x - 2) + 2.$$

Giải

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số

$$y = f(x) = \frac{x^2 - 2x + 9}{x - 2}$$

MXĐ : $D = \mathbb{R} \setminus \{2\}$

$$f'(x) = \frac{x^2 - 4x - 5}{(x - 2)^2}; \quad f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 5 \end{cases}$$

Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	-1		2		5	$+\infty$
f'	+	0	-		-	0	+
f	$-\infty$	-4 (CĐ)	$-\infty$	$+\infty$		8 (CT)	$+\infty$

CĐ : $f(-1) = -4$

CT : $f(5) = 8$

$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \infty$: Tiệm cận đứng $x = 2$


$$f(x) = x + \frac{9}{x - 2}$$

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{9}{x - 2} = 0$: Tiệm cận xiên $y = x$.

Điểm đặc biệt :

$$x = 0; \quad y = -\frac{9}{2}.$$

Đồ thị : hình bên.



2. Tìm K để đường thẳng d : $y = Kx + 10 - 5K$ cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt nhận I(5; 10) làm trung điểm

Phương trình hoành độ giao điểm của (d) và (C) :

$$\frac{x^2 - 2x + 9}{x - 2} = Kx + 10 - 5K \quad (x \neq 2)$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 2x + 9 = Kx^2 + 10x - 5Kx - 2Kx - 20 + 10K.$$

$$\Leftrightarrow (K - 1)x^2 + (12 - 7K)x + 10K - 29 = 0$$

$$\Delta = (12 - 7K)^2 - 4(K - 1)(10K - 29)$$

$$\Delta = 9K^2 - 12K + 28 > 0$$

I là trung điểm của $M_1(x_1; y_1); M_2(x_2; y_2)$.

$$\Leftrightarrow \frac{x_1 + x_2}{2} = 5 \Rightarrow \frac{7K - 12}{2(K - 1)} = 5$$

$$\Leftrightarrow 7K - 12 = 10K - 10 \Leftrightarrow K = -\frac{2}{3}$$

Vậy : $K = -\frac{2}{3}$.

3. Biện luận theo a số nghiệm $x < 0$ của phương trình :

$$\frac{x^2 - 2|x| + 9}{|x| - 2} = a(x - 2) + 2 \quad (1)$$

$$(1) \Leftrightarrow \frac{x^2 + 2x + 9}{-x - 2} = a(x - 2) + 2$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 2x + 9 = -ax^2 + 2ax - 2x - 2ax + 4a - 4$$

$$\Leftrightarrow (a + 1)x^2 + 4x + 13 - 4a = 0.$$

TH 1 : $a = -1$: (1) $\Leftrightarrow 4x + 17 = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{17}{4}$ (nhận).

TH 2 : $a \neq -1$

$$\Delta' = 4 - (a + 1)(13 - 4a) = 4a^2 - 9a - 9$$

$$\Delta = 81 + 144 = 225$$

$$\begin{cases} a_1 = \frac{9 - 15}{8} = -\frac{3}{4} \\ a_2 = \frac{9 + 15}{8} = 3 \end{cases}$$

$$P = x_1 \cdot x_2 = \frac{13 - 4a}{a + 1}; \quad S = -\frac{4}{a + 1}$$

a	4	P	S	x_1, x_2 so với 0	Số nghiệm của (1)
$+\infty$	+	-	-	$x_1 < 0 < x_2$	1
$\frac{13}{4}$		0		$x_1 < x_2 = 0$	1
	+	+	-	$x_1 < x_2 < 0$	2
3	0			$x_1 = x_2 < 0$	1
	-	+	-	VÔ NGHIỆM	0
$-\frac{3}{4}$	0			$x_1 = x_2 < 0$	1
	+	+	-	$x_1 < x_2 < 0$	2
-1		0	0	$x_1 < 0$	1
	+	-	+	$x_1 < 0 < x_2$	1
$-\infty$					

98. ĐH Y DƯỢC TP HCM

Gọi (C_m) là đồ thị hàm số $y = \frac{2x^2 + mx + m}{x + 1}$.

1. Vẽ đồ thị (C_{-1}) ứng với $m = -1$.

Từ đó suy ra đồ thị (P) của hàm số $y = \frac{|x - 1|(2x + 1)}{x + 1}$.

2. Xác định các giá trị m sao cho qua điểm $A(0; 1)$ không có đường thẳng nào tiếp xúc với (C_m) .

3. Xác định các giá trị của m để (C_m) cắt Ox tại hai điểm và hai tiếp tuyến tại hai điểm đó vuông góc với nhau.

Giải

$$y = f(x) = \frac{2x^2 + mx + m}{x + 1}$$

1. Vẽ đồ thị (C_{-1}) ứng với $m = -1$

Từ đó suy ra đồ thị (P) của hàm số : $y = \frac{|x - 1|(2x + 1)}{x + 1}$

$$m = -1 \Rightarrow f(x) = \frac{2x^2 - x - 1}{x + 1}$$

MXĐ : $D = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$

$$f'(x) = \frac{2x^2 + 4x}{(x+1)^2}$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -2 \end{cases}$$

Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	-2	-1	0	$+\infty$	
f'	+	0	-	-	0	+
f		-9 (CĐ)		$+\infty$	-1 (CT)	$+\infty$

CĐ : $f(-2) = -9$

CT : $f(0) = -1$

Tiệm cận đứng : $x = -1$


Tiệm cận xiên : $y = 2x - 3$.

Đồ thị (C_{-1}) :

Ta có : (C_{-1}) : $y = \frac{(x-1)(2x+1)}{x+1}$

(P) : $y = \frac{|x-1|(2x+1)}{x+1}$

Đồ thị (P) suy ra từ đồ thị (C) bằng cách giữ nguyên phần có $x > 1$ và lấy đối xứng của phần có $x < 1$ qua Oy.



2. Xác định m sao cho qua A(0; 1) không có đường thẳng nào tiếp xúc với (C_m)

Xét đường thẳng d đi qua A(0; 1), phương trình của d có dạng :

$$d : y - 1 = Kx$$


$$y = Kx + 1$$

Phương trình hoành độ giao điểm của d và (C_m) :

$$Kx + 1 = \frac{2x^2 + mx + m}{x+1} \quad (x \neq -1)$$

$$Kx^2 + x + Kx + 1 = 2x^2 + mx + m$$

$$\Leftrightarrow (K-2)x^2 + (K+1-m)x + 1-m = 0$$



$$d \text{ tiếp xúc với } (C_m) \Rightarrow \begin{cases} K \neq 2 \\ \Delta = 0 \end{cases}$$

$$\Delta = 0 \Leftrightarrow [K + 1 - m]^2 - 4(K - 2)(1 - m) = 0$$

$$\Leftrightarrow (K + 1)^2 - 2m(K - 1) + m^2 - 4(1 - m)K + 8(1 - m) = 0$$

$$\Leftrightarrow K^2 + 2(m - 1)K + m^2 - 10m + 9 = 0 \quad (1)$$

Để không có đường thẳng qua A và tiếp xúc với (C_m) , (1) phải vô nghiệm.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta' < 0 \\ 4 + 4(m - 1) + m^2 - 10m + 9 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} (m - 1)^2 - m^2 + 10m - 9 < 0 \\ m^2 - 6m + 9 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 8m - 8 < 0 \\ m = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 1 \\ m = 3. \end{cases}$$

3. Phương trình hoành độ giao điểm của (C_m) và Ox : $2x^2 + mx + m = 0$ (1)

$$(1) \text{ có 2 nghiệm } \Leftrightarrow \Delta > 0 \Leftrightarrow m^2 - 8m > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m < 0 \\ m > 8 \end{cases}$$

$$\text{Gọi } x_1, x_2 \text{ là 2 nghiệm của (1) ta có : } \begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{m}{2} \\ x_1 x_2 = \frac{m}{2} \end{cases}$$

$$f'(x_1) = \frac{u'(x_1)v(x_1) - u(x_1)v'(x_1)}{|v(x_1)|^2} = \frac{u'(x_1)}{v(x_1)} \quad \text{vì } u(x_1) = 0$$

$$f'(x_1) = \frac{4x_1 + m}{x_1 + 1}$$

$$f'(x_2) = \frac{4x_2 + m}{x_2 + 1}$$

Hai tiếp tuyến tại $M_1(x_1; 0)$ và $M_2(x_2; 0)$ vuông góc.

$$\Leftrightarrow f'(x_1) f'(x_2) = -1 \quad \Leftrightarrow \frac{(4x_1 + m)(4x_2 + m)}{(x_1 + 1)(x_2 + 1)} = -1$$

$$\Leftrightarrow \frac{16x_1x_2 + 4m(x_1 + x_2) + m^2}{x_1x_2 + x_1 + x_2 + 1} = -1$$

$$\Leftrightarrow \frac{16\left(\frac{m}{2}\right) + 4m\left(\frac{-m}{2}\right) + m^2}{\frac{m}{2} + \left(\frac{-m}{2}\right) + 1} = -1$$

$$\Leftrightarrow m^2 - 8m - 1 = 0 \quad \Leftrightarrow \begin{cases} m = 4 - \sqrt{17} & (\text{nhận}) \\ m = 4 + \sqrt{17} & (\text{nhận}). \end{cases}$$

99. TRUNG TÂM ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG CÁN BỘ Y TẾ

Cho hàm số : $y = \frac{x^2 + 5x + 15}{x + 3}$.

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số.
2. Tìm điểm thuộc đồ thị sao cho tọa độ của điểm đó là các số nguyên.
3. Tìm điểm M thuộc đồ thị sao cho khoảng cách từ M tới trục hoành gấp hai lần khoảng cách từ M tới trục tung.

Giải

$$y = f(x) = \frac{x^2 + 5x + 15}{x + 3}$$

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số

MXD : $D = \mathbb{R} \setminus \{-3\}$

$$f'(x) = \frac{x^2 + 6x}{(x + 3)^2}$$

$$f'(x) = 0 \quad \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -6 \end{cases}$$

Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	-6	-3	0	$+\infty$	
f'	+	0	-	-	0	+
f	$-\infty$	$\nearrow -7$	$\searrow -\infty$	$+\infty$	$\searrow 5$	$\nearrow +\infty$

$$CD : f(-6) = -7$$


$$CT : f(0) = 5$$

$\lim_{x \rightarrow -3} f(x) = \infty$: tiệm cận đứng $x = -3$.

$$y = x + 2 + \frac{9}{x+3}$$

$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{9}{x+3} = 0$: tiệm cận xiên $y = x + 2$.

Đồ thị hàm số : (hình vẽ).



$$2. \quad y = x + 2 + \frac{9}{x+3}$$

$$y \in \mathbb{Z} \Rightarrow \frac{9}{x+3} \in \mathbb{Z}$$

$$\Leftrightarrow (x+3) \in [\pm 1; \pm 3; \pm 9]$$

Ta được các điểm sau :

x	-12	-6	-4	-2	0	6
y	-11	-7	-11	9	5	9

$$3. \quad M(x; y) \text{ có tọa độ là nghiệm của hệ : } \begin{cases} y = \frac{x^2 + 5x + 15}{x+3} \\ |y| = 2|x| \end{cases}$$

$$TH 1 : \begin{cases} y = \frac{x^2 + 5x + 15}{x+3} \\ y = 2x \end{cases}$$

$$\text{Ta được 2 điểm : } M_1\left(\frac{-1 - \sqrt{61}}{2}; -1 - \sqrt{61}\right), M_2\left(\frac{-1 + \sqrt{61}}{2}; -1 + \sqrt{61}\right)$$

$$TH 2 : \begin{cases} y = \frac{x^2 + 5x + 15}{x+3} \\ y = -2x \end{cases} \quad \text{Hệ vô nghiệm.}$$

100. ĐH KIẾN TRÚC

Cho hàm số : $y = x^4 + ax^2 + b$ (1)

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số khi : $a = \frac{3}{10}$, $b = 1$.

2. Giả sử đồ thị của hàm số (1) cắt trục hoành tại 4 điểm có hoành độ lập thành một cấp số cộng. Chứng minh rằng khi đó $9a^2 - 100b = 0$.

Giải

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số : $y = f(x) = x^4 + ax^2 + b$
khi $a = \frac{3}{10}$, $b = 1$

$$f(x) = x^4 + \frac{3}{10}x^2 + 1$$


MXD : $D = \mathbb{R}$

$$f'(x) = 4x^3 + \frac{3}{5}x$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow x(20x^2 + 3) = 0 \Leftrightarrow x = 0$$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
f'	-	0	+
f	$+\infty$	1	$+\infty$

Đồ thị :



2. Phương trình hoành độ giao điểm của (C) và Ox

$$x^4 + ax^2 + b = 0 \tag{1}$$

$$\text{Đặt : } t = x^2, t \geq 0 \text{ ta có : } t^2 + at + b = 0 \tag{2}$$

$$\text{Gọi } t_1 \text{ và } t_2 \text{ là 2 nghiệm của (2), ta có : } \begin{cases} t_1 t_2 = b \\ t_1 + t_2 = -a \end{cases}$$

Theo giả thiết $-\sqrt{t_2}, -\sqrt{t_1}, \sqrt{t_1}, \sqrt{t_2}$ tạo thành một cấp số cộng nên ta có :

$$\sqrt{t_2} = 3\sqrt{t_1} \Rightarrow t_2 = 9t_1$$

$$\Rightarrow t_1 + 9t_1 = -a \Rightarrow \begin{cases} t_1 = -\frac{a}{10} \\ t_2 = \frac{9a}{10} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \left(-\frac{a}{10}\right)\left(\frac{9a}{10}\right) = b \Rightarrow 9a^2 - 100b = 0.$$

101. ĐH NGOẠI THƯƠNG

Cho hàm số : $y = x^3 - 3x^2 - 9x + m$.

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số ứng với $m = 0$.
2. Xác định m để đồ thị của hàm số cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt với các hoành độ lập thành một cấp số cộng.

Giải

$$y = f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x + m$$

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số ứng với $m = 0$

$$f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x$$

MXĐ : $D = \mathbb{R}$

$$f'(x) = 3x^2 - 6x - 9$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 3 \end{cases}$$

Bảng biến thiên :

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$
f'		+	0	-
f	$-\infty$	5	-27	$+\infty$

$$f''(x) = 6x - 6$$

$$f''(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1$$


$$f(1) = -11 \Rightarrow \text{điểm uốn } A(1; -11)$$

2. Xác định m để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt với các hoành độ lập thành một cấp số cộng

Phương trình hoành độ giao điểm của (C_m) và Ox :

$$x^3 - 3x^2 - 9x + m = 0 \tag{1}$$

Đồ thị :



Để (1) có 3 nghiệm x_1, x_2, x_3 ta phải có :

$$(1) \Leftrightarrow (x - x_1)(x - x_2)(x - x_3) = 0$$

$$\Leftrightarrow x^3 - (x_1 + x_2 + x_3)x^2 + (x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1)x - x_1x_2x_3 = 0 \quad (2)$$

So sánh (1) và (2) ta có : $x_1 + x_2 + x_3 = -3$

Để x_1, x_2, x_3 tạo thành một cấp số cộng ta có :

$$x_1 + x_3 = x_2 \Rightarrow 3x_2 = -3 \Rightarrow x_2 = -1$$

Thay vào (1) ta được : $m = -5$

Thử lại thấy điều kiện đề bài được thỏa mãn.

Vậy : $m = 5$.

102. ĐH SƯ PHẠM TPHCM

Cho hàm số : $y = (x + a)^3 + (x + b)^3 - x^3$.

1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số ứng với $a = 1, b = 2$.
2. Trong trường hợp tổng quát, các số a, b phải thỏa mãn điều kiện gì để hàm số có điểm cực đại và điểm cực tiểu.
3. Chứng minh rằng với mọi a, b phương trình : $(x + a)^3 + (x + b)^3 - x^3 = 0$ không thể có 3 nghiệm phân biệt.

Giải

$$y = f(x) = (x + a)^3 + (x + b)^3 - x^3.$$

1. Khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số với $a = 1, b = 2$

Bạn đọc tự vẽ.

$$\begin{aligned} 2. \quad f(x) &= x^3 + 3(a + b)x^2 + 3(a^2 + b^2)x + a^3 + b^3 \\ f'(x) &= 3x^2 + 6(a + b)x + 3(a^2 + b^2) \\ &= 3[x^2 + 2(a + b)x + a^2 + b^2] \end{aligned}$$

Hàm số có cực đại và cực tiểu :

$$\Leftrightarrow f'(x) \text{ có 2 nghiệm phân biệt.}$$

$$\Leftrightarrow \Delta' > 0 \Leftrightarrow (a + b)^2 - (a^2 + b^2) > 0 \Leftrightarrow 2ab > 0$$

$$\dots \Leftrightarrow ab > 0.$$

3. Gọi x_1 và x_2 là nghiệm nếu có của $f'(x)$, ta có :
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -2(a + b) \\ x_1 x_2 = a^2 + b^2 \end{cases}$$

Thực hiện phép chia đa thức $f(x)$ cho $f'(x)$ ta có :

$$f(x) = f'(x).q(x) + r(x)$$

$$r(x) = -ab[4x + a + b]$$

Ta có : $f(x_1).f(x_2) = r(x_1).r(x_2)$

$$= a^2b^2(4x_1 + a + b)(4x_2 + a + b)$$

$$= a^2b^2[16x_1x_2 + 4(a + b)(x_1 + x_2) + (a + b)^2]$$

$$= a^2b^2[16(a^2 + b^2) - 8(a + b)^2 + (a + b)^2]$$

$$= a^2b^2[9(a^2 + b^2) - 14ab]$$

$$= a^2b^2[7(a - b)^2 + 2(a^2 + b^2)] > 0$$

Vậy : nếu $f(x)$ có hai giá trị cực trị thì hai giá trị đó phải cùng dấu.

Suy ra : phương trình $f(x) = 0$ không thể có 3 nghiệm phân biệt.

MỤC LỤC

Lời nói đầu	3
Phần I : CÁC VẤN ĐỀ KHẢO SÁT HÀM SỐ	
1. Hàm bậc 3	5
2. Hàm bậc 4 trùng phương	12
3. Hàm nhất biến (Hàm hữu tỉ bậc 1/1)	19
4. Hàm hữu tỉ bậc 2/1	27
5. Vị trí tương đối giữa hai đồ thị	37
6. Tiếp tuyến của đồ thị	43
7. Biện luận số nghiệm của phương trình bằng đồ thị	50
8. Tìm tập hợp điểm	58
9. Biện luận số đường của một họ các đường đi qua một điểm	65
10. Vẽ đồ thị của hàm số mang dấu giá trị tuyệt đối	71
11. Đường thẳng đi qua các điểm đặc biệt của đồ thị	80
12. Một họ các đồ thị tiếp xúc với một đường cố định	87
13. Khoảng cách	92
14. Đồ thị của hàm số mang dấu căn	98
Phần II : CÁC ĐỀ KHẢO SÁT HÀM SỐ THI VÀO CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC	
Năm 2002	
1. Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng (khối A)	108
2. Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng (khối B)	110
3. Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng (khối D)	111
Năm 2001	
4. ĐH Quốc gia TP.HCM (khối A)	112
5. ĐH Quốc gia TP.HCM (khối B)	114
6. ĐH Quốc gia TP.HCM (khối A, B)	114
7. ĐH Kinh tế	116
8. ĐH Ngoại thương TP.HCM (khối A)	117
9. ĐH Y Dược TP.HCM (khối B)	118
10. TT Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ Y tế TP.HCM	120
11. ĐH Nông lâm TP.HCM	121
12. ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM (khối A)	122

13. ĐH Kiến trúc TP.HCM	123
14. ĐH Cần Thơ	124
15. ĐH Đà Nẵng (khối B) – đợt 1	125
16. ĐH Đà Nẵng (khối A) – đợt 2	126

Năm 2000

17. ĐH Quốc gia TP.HCM – đợt 1	127
18. ĐH Quốc gia TP.HCM – đợt 2	129
19. ĐH Sư phạm TP.HCM (khối A, B)	130
20. ĐH Sư phạm TP.HCM (khối D, E)	132
21. Học viện Ngân hàng – Phân viện TP.HCM	133
22. ĐH Y Dược TP.HCM	135
23. TT Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ Y tế TP.HCM	137
24. Học viện Quan hệ Quốc tế	139
25. ĐH Ngoại thương (khối D)	140
26. ĐH An ninh (khối A) – Ban B	141

Năm 1999

27. Cao đẳng Marketing	143
28. Cao đẳng Sư phạm Mẫu giáo TW3	144
29. Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại	146
30. ĐH Thủy sản	148
31. ĐH Hùng Vương (khối A)	150
32. ĐH Quốc gia TP.HCM (khối A) – đợt 1	151
33. ĐH Quốc gia TP.HCM (khối A) – đợt 2	153
34. ĐH Quốc gia TP.HCM (khối D) – đợt 1	154
35. ĐH Quốc gia TP.HCM (khối D) – đợt 2	156
36. ĐH Quốc gia TP.HCM (khối B) – đợt 1	157
37. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông	159
38. ĐH Ngoại thương	160
39. Học viện Ngân hàng – Phân viện TP.HCM	161
40. ĐH Y TP.HCM	163
41. ĐH Y Dược TP.HCM	165
42. ĐH Giao thông Vận tải	167

Năm 1998

43. ĐH Quốc gia TP.HCM (khối A) – đợt 1	169
44. ĐH Kinh tế TP.HCM (khối A)	171
45. ĐH Quốc gia TP.HCM (khối A) – đợt 3	172
46. ĐH Y Dược TP.HCM	174
47. Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại	176
48. ĐH Ngoại thương (khối D)	178
49. ĐH Dân lập Ngoại ngữ – Tin học	178
50. Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông	181
51. Cao đẳng Sư phạm	182
52. ĐH Văn Lang (khối A)	184
53. ĐH Kỹ thuật Công nghệ	185
54. ĐH Kiến trúc Hà Nội	187
55. ĐH Hàng hải	188
56. ĐH Thủy sản	189

Năm 1997

57. Cao đẳng Kinh tế Đối ngoại (khối A)	191
58. ĐH Dân lập Văn Lang (khối B, D)	193
59. ĐH Dân lập Văn Lang (khối A)	195
60. ĐH Dân lập Ngoại ngữ – Tin học	197
61. ĐH An ninh – ĐH Cảnh sát (khối A)	198
62. ĐH Thủy sản	199
63. Trung học Kỹ thuật Y tế 3	200
64. ĐH Quốc gia TP.HCM (khối A) – đợt 1	204
65. ĐH Quốc gia TP.HCM (khối B) – đợt 1	206
66. ĐH Quốc gia TP.HCM (khối A) – đợt 3	207
67. ĐH Quốc gia TP.HCM (khối A)	208
68. ĐH Y Dược TP.HCM	210
69. ĐH Ngoại thương (khối D)	210

Năm 1996

70. ĐH Quốc gia TP.HCM (Luật)	212
71. ĐH Y Dược TP.HCM	214
72. ĐH Ngoại thương	215

73. ĐH Đại cương	216
74. Cao đẳng Sư phạm TP.HCM	217
75. Cao đẳng Hải quan	218
76. ĐH Quốc gia TP.HCM	220
77. ĐH Quốc gia TP.HCM	222
Năm 1995	
78. ĐH Tổng hợp TP.HCM	223
79. ĐH Kinh tế	225
80. ĐH Ngoại thương	226
81. ĐH Tài chính – Kế toán	228
82. ĐH Sư phạm TP.HCM	230
83. ĐH Kiến trúc	232
Năm 1994	
84. ĐH Tổng hợp TP.HCM (khối A, B)	233
85. ĐH Tổng hợp TP.HCM (khối D)	235
86. ĐH Kinh tế	235
87. ĐH Bách khoa TP.HCM	237
88. ĐH Kiến trúc TP.HCM	238
89. ĐH Y Dược TP.HCM	239
90. ĐH Sư phạm TP.HCM	241
91. ĐH Ngoại thương	243
92. ĐH Bách khoa TP.HCM	244
Năm 1993	
93. ĐH Sư phạm Kỹ thuật (khối B)	247
94. ĐH Nông lâm	249
95. ĐH Tổng hợp (khối A, B)	251
96. ĐH Kinh tế	253
97. ĐH Bách khoa TP.HCM	256
98. ĐH Y Dược TP.HCM	258
99. TT Đào tạo Bồi dưỡng Cán bộ Y tế TP.HCM	261
100. ĐH Kiến trúc	262
101. ĐH Ngoại thương	264
102. ĐH Sư phạm TP.HCM	265

NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

16 Hàng Chuối – Hai Bà Trưng – Hà Nội

Điện thoại: (04) 9718312; (04) 9724770. Fax: (04) 9714899

E-mail: nxb@vnu.edu.vn

* * *

Chịu trách nhiệm xuất bản:

Giám đốc: **PHÙNG QUỐC BẢO**

Tổng biên tập: **NGUYỄN BÁ THÀNH**

Biên tập: **HÀI ĐĂNG**

Sửa bài: **PHẠM THỊ CẨM TIÊU**

Trình bày bìa: **NGỌC ANH**

PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT HÀM SỐ

Mã số: 1L - 143 ĐH 2006

In 2.000 cuốn, khổ 16 × 24cm tại Xưởng in Chi nhánh Công ti Phát triển Công nghệ và Truyền hình - TP. Hồ Chí Minh.

Số xuất bản: 795 - 2006/CXB/ 2 – 159/ĐHQGHN, ngày 20/10/2006.

Quyết định xuất bản số: 376 LK/XB.

In xong và nộp lưu chiểu quý IV năm 2006.