

ក្រុមប្រឹក្សាសាគរណិតវិទ្យា

ក្រុមប្រឹក្សាសាគរណិតវិទ្យា ទូទាំងក្រុងប្រទេស

ចែករំលែកផង



សុខ ពិសិដ្ឋ - Sok Piseth Page
Facebook.com/TeacherSokPiseth



pisethsok.wordpress.com



plus.google.com/+PisethSok_SPS

Handwritten signature and initials in the top right corner.

①

ប្រធានក្រុមការងារសិស្សក្នុងស្ថានភាពប្រទេស
 ផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ គណិតវិទ្យា និងរូបវិទ្យា
 ថ្នាក់ទី៩ និងទី១២ ឆ្នាំសិក្សា ២០០១-២០០២

វិទ្យាស្ថាន
 គណិតវិទ្យា
 TEL: 855 939 010

វិញ្ញាបនា គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ ថ្ងៃទី២៣-៥-០២ (រយៈពេល : ៣ម៉ោង ពិន្ទុ : ១០០)

១. (ពិន្ទុ ១០) ស្រាយបញ្ជាក់ថា $f(n) = 3^{2n} + 7$ ចែកដាច់នឹង ៨ ដែល $n \in \mathbb{N}$ ។
២. (ពិន្ទុ ១០) ចំនួនមួយមានលេខប្រាំខ្ទង់ដែលលេខខ្ទង់ក្រោយតាមលំដាប់ $x; x+1; x+2; 3x; x+3$ ហើយគេដឹងថា ចំនួននោះជាតារាងប្រាកដ ។ ចូររកចំនួននោះ ។
៣. (ពិន្ទុ ១០) ABC ជាត្រីកោណមួយកែងក្រុង B ដែលមាន $[CI]$ ជាកន្លះបន្ទាត់ព្យុះនៃមុំ C ។ បើ $IB = 1 \text{ cm}; BC = 3 \text{ cm}$ ហើយគេដាក់ $AI = x; AC = y$ ចូរគណនា x និង y ។ $\tan 2\theta = \frac{1 + \tan \theta}{1 - \tan \theta}$
៤. (ពិន្ទុ ១០) $\forall n \in \mathbb{N}^*$ ចូរបញ្ជាក់ថា $E = 2903^n - 803^n - 464^n + 261^n$ ជាចំនួនដែលចែកដាច់នឹង 1897 ជានិច្ច ។
៥. (ពិន្ទុ ១០) $a; b; c$ ជាថ្នាំសង្កេតនៃត្រីកោណមួយ ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថា $a^2(b+c-a) + b^2(c+a-b) + c^2(a+b-c) \leq 3abc$ គេដឹងថា $\frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy}$ ។
៦. (ពិន្ទុ ១០) U ជាស្វ៊ីតមួយកំនត់ដោយ $\forall n \in \mathbb{N}$
 $U_{n+1} = 5U_{nn} - 6U_n$
 ចូរកំនត់តំលៃ x ដែលនាំអោយ $V_n = U_{nn} - xU_n$ ជាស្វ៊ីតអរមូលីក ។
៧. (ពិន្ទុ ២០) ដោះស្រាយសមីការ $1 - \frac{x}{2} < \frac{1}{\sqrt{1+x}}$
៨. (ពិន្ទុ ២០) ABC ជាត្រីកោណមួយកែងក្រុង A ដែលមាន $BC = a$ ហើយមានរង្វង់ខ្នងដែលមានកាំ r ចំពោះ ក្នុងត្រីកោណនោះ ។ ចូររកថ្នាំសង្កេតនៃត្រីកោណ ABC ។

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសិស្សសាលាស្រីស្រី
សម័យប្រលង 23-5-02

វិទ្យាល័យ គណិតវិទ្យា ថ្ងៃទី ៩/១២

១៥ (ត្រីកោណ)

1. ប្រធានបញ្ជាក់ $f(n) = 3^{2n} + 7$ តែងតែជាចំនួន 8 ដែល $n \in \mathbb{N}$ គឺ $f(n) \equiv 0 [8]$

$$f(n) = 3^{2n} + 7$$

ចំនោះ $n=0$ $f(0) = 3^0 + 1 = 8 \equiv 0 [8]$

$n=1$ $f(1) = 3^2 + 7 = 16 \equiv 0 [8]$

ឧបនិមិត្តចំនោះ n , $f(n) \equiv 0 [8]$ គេត្រូវស្វែងរក ឲ្យបានថា $f(n+1) \equiv 0 [8]$

$$f(n+1) = 3^{2(n+1)} + 7 = 9 \cdot 3^{2n} + 7 = 8 \cdot 3^{2n} + 3^{2n} + 7 \equiv 0 [8]$$

គេបាន: $8 \cdot 3^{2n} \equiv 0 [8]$; $3^{2n} + 7 \equiv 0 [8]$

ហេតុនេះ $\forall n$, $3^{2n} + 7 \equiv 0 [8]$

① គេបាន
 $9 \equiv 1 [8]$
 $9^n \equiv 1^n [8]$
 $9^n + 7 \equiv 1 + 7 \equiv 0 [8]$

2. រកចំនួនដែលជាការប្រាកដ $x, x+1, x+2, 3x, x+3$

$3x \leq 9$ គេបាន: $x \leq 3$ ដែល $x \neq 0$ ក្នុងចំណោមចំនួនគតិ

បើ $x=1$ ចំនួនគេបាន: 1 2 3 3 4 ក៏ពិតប្រាកដ

បើ $x=2$ ចំនួនគេបាន: 2 3 4 6 5

បើ $x=3$ ចំនួនគេបាន: 3 4 5 9 6

ចំនួនជាការប្រាកដ គឺ $34596 = 186^2$

3. គណិតវិទ្យាស្រី x និង y

ABC (ត្រីកោណកែង) ក្នុង B [CI] ក្នុងបន្ទាត់: មុំ C

IB = 1 cm, BC = 3 cm; AI = x AC = y

$\tan \theta = \frac{1}{3}$ តាមរូបមន្ត $\tan 2\theta = \frac{2 \tan \theta}{1 - \tan^2 \theta} = \frac{3}{4}$

$\tan 2\theta = \frac{x+1}{3}$

$\frac{x+1}{3} = \frac{3}{4}$;
 $x = \frac{5}{4} \text{ cm}$
 $y = \frac{15}{4} \text{ cm}$

សំនួរ 3 គេបានដឹងថា:

$(x+1)^2 + 9 = y^2$

$\frac{x}{y} = \frac{1}{3}$ (តាមរូបមន្ត: បន្ទាត់)


$y = 3x$

$(x+1)^2 + 9 = 9x^2$

$8x^2 - 2x - 10 = 0$

$\Delta' = 1 + 80 = 81$

$x = \frac{1 \pm 9}{8} = \frac{5}{4} \text{ cm}$



7. សំនុំច្បាប់សមីការ $1 - \frac{x}{2} < \frac{1}{\sqrt{1+x}}$

$E =]-1; +\infty[$

a. ករណី $1 - \frac{x}{2} \leq 0$ នោះ

$\begin{cases} 1 - \frac{x}{2} \leq 0 \\ x > -1 \end{cases} \Rightarrow E_1 = [2; +\infty[$

b. ករណី $1 - \frac{x}{2} > 0$

$1 - \frac{x}{2} < \frac{1}{\sqrt{1+x}} ; \left(1 - \frac{x}{2}\right)^2 < \frac{1}{1+x} ; \begin{cases} x^2(x-3) < 0 \\ 1 - \frac{x}{2} > 0 \end{cases} ; E_2 =]-1; 0[\cup]0$

$E = E_1 \cup E_2 =]-1; 0[\cup]0; +\infty[$

8. រកទំហំជ្រុង b និង c

ប្រសិនបើ $p = a + b + c$

$p = r + KC + CH + BH + HI + r$
 $= 2r + 2CH + 2BH + 2r + 2r$
 $= 2r + 2a$

ក្រាហ្វិក (ត្រីកោណ)

$\frac{1}{2}bc = \frac{1}{2}ra + \frac{1}{2}rb + \frac{1}{2}rc$

$\times bc = rp = 2r(a+r)$

ឆ្លើយ $p = a + b + c = 2r + 2a$

$\times b + c = 2r + a$

យើងបាន $\begin{cases} b + c = 2r + a \\ bc = 2r(a+r) \end{cases}$

គេបានសមីការ $x^2 - (a+2r)x + 2r(a+r) = 0$

$\Delta = a^2 - 4ar - 4r^2$

$\Delta \geq 0$ កាលណា $a \geq 2r + 2r\sqrt{2}$

សិក្សាសញ្ញា Δ

$f(a) = a^2 - 4ar - 4r^2$

$\Delta' = 4r^2 + 4r^2$

$\Delta \mid 0 \quad 2r + 2r\sqrt{2}$


$f(a) \mid - \quad +$
 $a \geq 2r + 2r\sqrt{2}$

$b = \frac{1}{2}(a + 2r + \sqrt{a^2 - 4ar - 4r^2})$

ឬ $c = \frac{1}{2}(a + 2r - \sqrt{a^2 - 4ar - 4r^2})$

(ឬ $b = \frac{1}{2}(a + 2r - \sqrt{a^2 - 4ar - 4r^2})$

ឬ $c = \frac{1}{2}(a + 2r + \sqrt{a^2 - 4ar - 4r^2})$)



១) គណិតវិទ្យា

ក្រុម វិទ្យាសាស្ត្រ

ប្រធានប្រើសរសើសសិស្សពូកែទូទាំងប្រទេស
ថ្ងៃកម្សាន្តសិស្សវិទ្យុ គណិតវិទ្យា និងរូបវិទ្យា
ថ្នាក់ទី៩ និងទី១២ ឆ្នាំសិក្សា ២០០១-២០០២

x az

វិទ្យាសា គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ ថ្ងៃទី២៤-៤-០២ (រយៈពេល : ៣ម៉ោង ៣០ ពិនុ : ១០០)

១. (ពិន្ទុ ២០) $\forall n \in \mathbb{N}$: f ជាអនុគមន៍មួយកំណត់ដូចខាងក្រោម :

$$f(n+2) = 2f(n+1) - f(n) + 1 \text{ ដែល } f(0) = f(1) = 0 \text{ ។ ចូរគណនា } f(2002) \text{ ។}$$

២. (ពិន្ទុ ២០) ABC ជាត្រីកោណមួយកែងក្នុង C ដែលមានរង្វាស់ជ្រុង $a; b; c$ ។ P ជាចំណុចក្នុងអង្កត់ $[AC]$ ដែលអាចរកបានរង្វាស់ពីរឆ្នាំក្នុងត្រីកោណរៀងគ្នា PBA និងត្រីកោណ PBC ។ បើ $PC = x$ តើ x ជាអនុគមន៍នៃ $a; b; c$ ។

៣. (ពិន្ទុ ២០) $abcde$ ជាចំនួនមួយដែលមានប្រាំខ្ទង់ដែល $a; b; c; d; e$ ជាលេខ ។ ជាការគូរអោយ ប្រែក្លាយពេលដែលគេតុល្យាចំនួននោះនឹង ៤ គេទទួលបានលទ្ធផលជាចំនួនមានប្រាំខ្ទង់គឺ $edcba$ ។

$$\frac{abcde}{edcba} = \frac{x}{4}$$

៤. (ពិន្ទុ ២០) រង្វាស់ពីរដែលទាក់ទងគ្នា A និង B ដែល $AB = a$ និងមានរង្វាស់កាំរៀងគ្នា R និង r ដែល $R > r$ ។ AC និង BD ជាកាំនៃរង្វាស់ទាំងពីរស្របគ្នាហើយមានទិសដៅដូចគ្នា ហើយ M ជាចំណុចកណ្តាលនៃ $[CD]$ ។ រកស្ថានភាពនៃ M គណនាកាំ AC និង BD ចល័តដោយរក្សាស្របគ្នា និងទិសដៅ ដូចគ្នាដដែល ។

៥. (ពិន្ទុ ២០) ស្ថានភាពអង្គធាតុអាចត្រូវបានបង្ហាញដោយរូបភាពខាងក្រោមនេះ មុនស្របតាមតំបន់ក្រៅស្ថានភាពនោះដោយមានច្រឡំបំផុតក្នុងកម្រិតមួយគត់ ម្យ៉ាងទៀតស្រៀងនឹងការកើនឡើងស្ថានភាពសុទ្ធតែត្រូវបានគេ គិតជា ១ 1mm អត្ថន័យ ២ 3mm អត្ថន័យ ៣ 6mm អត្ថន័យ ៤ 8mm និងអត្ថន័យ ៥ 12mm ។ វិធីដែលឆ្លងស្ថានភាពតែមួយគត់គឺឆ្លងម្តងពីរដង ដោយអោយអ្នកដែល មានល្បឿន យឺតយ៉ាវច្រឡំបំផុត ធ្វើជាអ្នកបំផ្លាញ ។ នៅពេលអ្នកទាំងពីរឆ្លងដល់គ្រឹះម្ខាងហើយ ត្រូវមានម្នាក់ជាអ្នកកាន់ច្រឡំវិញគ្រប់មុខវិញ ដើម្បីនាំមុនស្របតាមស្ថានភាពស្រដៀងគ្នា ។ ចូររករយៈពេលខ្លីបំផុតដើម្បីអោយអ្នកនេះឆ្លង ស្ថានភាព ដោយបញ្ចប់ដំណើររបស់ឆ្លងស្ថាន ។



ឆ្លើយ $f(2002)$; $f(n+2) = 2f(n+1) - f(n) + 1$

$$\left. \begin{aligned} f(n+2) - 2f(n+1) + f(n) - 1 &= 0 \\ f(n+1) - 2f(n) + f(n-1) - 1 &= 0 \\ f(n) - 2f(n-1) + f(n-2) - 1 &= 0 \\ f(n-1) - 2f(n-2) + f(n-3) - 1 &= 0 \\ f(4) - 2f(3) + f(2) - 1 &= 0 \\ f(3) - 2f(2) + f(1) - 1 &= 0 \\ f(2) - 2f(1) + f(0) - 1 &= 0 \end{aligned} \right\} \begin{array}{l} \text{មាន } 2 \text{ ឡ} \\ \\ \\ \text{មាន } n-1 \text{ ឡ} \end{array}$$

$f(n+2) - f(n+1) - f(1) + f(0) - (n+1) = 0$ ដោយ $f(1) = f(0) = 0$

ដូច្នេះ $f(n+2) - f(n+1) = n+1 \rightarrow (8)$

$f(n+2) - f(n+1) = n+1$

$f(n+1) - f(n) = n$

$f(n) - f(n-1) = n-1$

$f(n-1) - f(n-2) = n-2$

$f(3) - f(2) = 2$

$f(2) - f(1) = 1$

$f(n+2) - f(n) = 1+2+3+\dots+n+n+1$

$f(n+2) = \frac{1}{2}(n+1)(n+2)$ ដោយ $\frac{f(n)}{n} = \frac{1}{2}(n-1)(n) \rightarrow (8)$

$n = 2002 : f(2002) = \frac{1}{2}(2001) \cdot 2002 = 1001 \cdot 2001 = (1000+1)2001$
 $= 2001000 + 2001 = 2003001 \rightarrow (9)$

ឆ្នាំ 2002 $f(2002)$

$$f(n+2) = 2f(n+1) - f(n) + 1 \quad ; \quad f(0) = f(1) = 0$$

$$f(n+2) - f(n+1) = f(n+1) - f(n) + 1 \quad (1)$$

តើ $g(n) = f(n+1) - f(n)$ យើងបាន $g(n+1) = f(n+2) - f(n+1)$

$$(1) \quad g(n+1) = g(n) + 1$$

$$g(n+1) - g(n) = 1 \quad \text{គេបាន}$$

យើងបាន $g(n)$ ជាជំនួសនៃ n ដោយយក $d=1$

$$\text{ដូច្នេះ} \quad g(n) = g(0) + nd = 0 + n = n$$

$$g(n+1) = n+1$$

$$\text{ដូច្នេះ} : g(n+1) - g(n) = n$$

$$\text{ឲ្យ } n=0 \quad g(1) - g(0) = 0$$

$$n=1 \quad g(2) - g(1) = 1$$

$$n=2 \quad g(3) - g(2) = 2$$

$\vdots$

$$n=k \quad g(k+1) - g(k) = k$$

$$\text{បន្តបន្ទាប់ :} \quad g(k+1) - g(0) = 0 + 1 + 2 + \dots + k = \frac{k}{2}(k+1)$$

$$g(k+1) = \frac{k}{2}(k+1)$$

$$\text{ឲ្យ } k=2001 : g(2002) = \frac{2001}{2}(2002) = 2003001$$

$$\text{ឲ្យ } n=1 : f(n+2) - f(n+1) = f(n+1) - f(n) + 1$$

$$\text{ឲ្យ } n+1=k : f(k+1) - f(k) = f(k) - f(k-1) + 1$$

$$\text{ឲ្យ } k=1 \quad f(2) - f(1) = f(1) - f(0) + 1$$

$$k=2 \quad f(3) - f(2) = f(2) - f(1) + 1$$

$$k=n-1 \quad f(n) - f(n-1) = f(n-1) - f(n-2) + 1$$

$$f(n) - f(1) = f(n-1) - f(0) + (n-1)$$

$$f(n) - f(1) = (n-1) \quad (f(1) = f(0) = 0)$$

$$\text{ឲ្យ } n=1$$

$$n=2$$

$$\vdots$$

$$n=n$$

$$f(1) - f(0) = 0$$

$$f(2) - f(1) = 1$$

$$f(n) - f(n-1) = (n-1)$$


$$f(n) - f(0) = 1 + 2 + \dots + (n-1) = \frac{(n-1)(n-1+1)}{2}$$

$$2003001$$



② කොටස් 2 ක් > 0
 කොටස් 2 $x = \frac{5}{P/2}$

$$\frac{\frac{1}{2}xa}{\frac{1}{2}(a+\sqrt{x^2+a^2}+x)} = \frac{\frac{1}{2}(b-x)a}{\frac{1}{2}(c+\sqrt{x^2+a^2}+b-x)} \quad (5)$$



$$x(c+x) - ab = (b-x)\sqrt{x^2+a^2}$$

$$(b-x)^2(x^2+a^2) - (x(c+x)-ab)^2 = 0$$

$$Lx^4 - Lbx^3 + (3a^2+b^2-c^2-2ac)x^2 + (2abc-2a^2b)x = 0$$

$$2x(x-b)[2x^2+(a^2-ac)] = 0 \quad (10)$$

කොටස් 2: $0 < x < b$ වන්නේ: $x = \sqrt{\frac{ac-a^2}{2}}$ නිසා $ac-a^2 = a(c-a)$ නිසා $c > a$

③ A, B, C, D, E

* A එකතරස්තියේ $A \leq 2$

වි A=1 නො: $A \times 4 = E = 4$

වි E=4 නො: $4 \times E = 16$ නැතිනම් A=6 බැවින් එකතරස්තියේ

ගෙන: $A = 2$ බැවින් $E = 8$ නිසා $4 \times A = E$

විස්තර

$$\begin{array}{r} A B C D E \\ \times \quad 4 \\ \hline E D C B A \end{array} \quad \longrightarrow \quad \begin{array}{r} 2 B C D 8 \\ \times \quad 4 \\ \hline 8 D C B 2 \end{array}$$

තරස්
 ගණ

$\rightarrow A=2$

$E=8$

$B=$

$D=$

$C=$

නිසා 4:

විස්තර

තරස්

* පැහැදිලිව B එකතරස්තියේ $B \leq 2$

වි B=1 නො: විස්තර

$$\begin{array}{r} 21 C D 8 \\ \times \quad 4 \\ \hline 8 D E 1 2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 21 C 7 8 \\ \times \quad 4 \\ \hline 8 7 C 1 2 \end{array}$$

දිගුව: විස්තර නිසා D
 වි D 8 වන්නේ නිසා
 තරස් $4 \times D$ වන්නේ

තරස්: පහත


$C=9$

ගෙන: විස්තර

ගෙන: $D=7$ $D \times 4 = 28$ පැහැදිලිව

$$21 9 7 8$$

6



24 (MC) / (AC) / (DB)

$$0 \leq \frac{f(x)}{g(x)} \leq 1 \text{ auf } A \cap B \Rightarrow 0 \leq f|_B \leq g|_B$$
$$S = (C \cup D) \cap (A \cup B)$$

ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାଟ ରଙ୍ଗ: (

විෂයය :

20 20 0

$$ASOM \sim ASAC \sim ASBD$$

$$\frac{SOM}{SBD} \Rightarrow \frac{BD}{SB} = \frac{OM}{SO} \Rightarrow \frac{BD}{SB} = \frac{AC}{SA} = \frac{AC+BD}{SB+SA} \quad (1)$$

SOM / SAC $\Rightarrow \frac{OM}{SO} = \frac{AC}{SA}$

$$S_D = \frac{S_A + S_B}{2}$$

$$(1) \text{ मरुतु } \frac{BD}{SB} = \frac{AC}{SA} = \frac{R+12}{250} = \frac{R+12}{250}$$

উদাহরণ: $\frac{R+k}{250} = \frac{OM}{50} \Rightarrow OM = \frac{R+k}{2} \Rightarrow H \in (0, \frac{R+k}{2})$

57

← $\frac{3}{1} = 3$ → $\frac{1}{1}$ →

$\begin{array}{r} \leftarrow 12/8 \\ \hline \rightarrow 3 \end{array}$
 गुरु 12+3=15

$\begin{array}{r} 3 \\ \leftarrow 6 \overline{) 1} \\ \rightarrow \end{array}$
 ရှိလေ $6+1=7$

← 3/1 70.000 3

3	1 6 8 12
12, 8	1 3 6
12 8 6	1 3
1 3 6 8 12	மதுரை சிவசாமி பிரதீபகாந்த்

20.5.81

$\frac{1}{3}$

$1 \rightarrow$

$\frac{6}{12}$

$3 \rightarrow$

$\frac{1}{8}$

$1 \rightarrow$

$\frac{3}{1}$

2

3

4

$$3 + 1 = 4$$

$$12 + 3 = 15$$

$$8 + 1 = 9$$

3

1 3 6 8 12

1 6 8 12

1 3 8

1 3

31 mn.

(16 p)

32 mn.

(12 p)

34 m m $\nearrow$ (5 p)

www.pisethsok.wordpress.com

29, m m (20 p)



គូប ពិសិដ្ឋ - Sok Piseth Page
Facebook.com/TeacherSokPiseth



pisethsok.wordpress.com



plus.google.com/+PisethSok_SPS

2

ប្រធានសិស្សស្រីក្រសួងអប់រំ
ថ្ងៃទី ១៤ ធ្នូ ២០០២ (រយៈពេល ៣ម៉ោង)
វិញ្ញាសាទី១

មិត្ត ស៊ី អាន
អធិការ គណៈកម្មាធិការ
TEL: 011 953 029

១- ដោះស្រាយក្នុងសំនុំកុំផ្លិចសមីការ

ក- $z^5 - (1-i)z^3 - i = 0$

ខ- $2z^3 - (5+6i)z^2 + 9iz + 1 - 3i = 0$ ដោយដឹងថាសមីការមានរឹសមួយ ជាចំនួនពិត ។

២- ក្នុងប្លង់កុំផ្លិច ចូររកសំនុំចំនុចនៃ $M(z)$ ដែលរូបភាពនៃចំនុច i, z, iz រត់ត្រង់ជួរគ្នា ។

៣- ស្រាយបញ្ជាក់ថា $\frac{2\sin 2^\circ + 4\sin 4^\circ + 6\sin 6^\circ + \dots + 178\sin 178^\circ + 180\sin 180^\circ}{\sin 90^\circ} = \cot 1^\circ$

៤- គណនាផលបូកស្វ៊ីតខាងក្រោម .

a) $S_1 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2$ គេដឹង $(n+1)^3 = n^3 + 3n^2 + 3n + 1$ យកចំណុចខាងលើ គេបាន $n(n+1) = 3n^2 - n$ យកចំណុចខាងលើ

b) $S_2 = 1.2 + 2.5 + 3.8 + \dots + 668.2003$ គេដឹង $n(3n+1) = 3n^2 - n$ យកចំណុចខាងលើ

៥- គណនា $\frac{\sqrt[3]{8-3\sqrt{5}} + \sqrt[3]{64-12\sqrt{20}}}{\sqrt[3]{57}} \cdot \sqrt[3]{8+3\sqrt{5}} \left(\frac{\sqrt[3]{9-\sqrt{2}}}{\sqrt[3]{3+4\sqrt{2}}} + \frac{\sqrt[3]{2-9\sqrt{9}}}{\sqrt[3]{2-\sqrt{81}}} \right)$

៦- ស្រាយបញ្ជាក់ថា បើ n សេសនោះ $46^n + 296.13^n$ ចែកដាច់នឹង 1947 ។ $1947 = 3 \cdot 59$.


៧- គេអោយ $t > 1$ តាង $f(x) = \frac{t^x}{t^x + \sqrt{t}}$ ។ ចូរគណនាតំលៃនៃ $f(1) = \frac{t}{t + \sqrt{t}}$ យក $f(x) + f(1/x) = 1$

$f\left(\frac{1}{2003}\right) + f\left(\frac{2}{2003}\right) + f\left(\frac{3}{2003}\right) + \dots + f\left(\frac{2002}{2003}\right) = 1001$

៨- ក្នុងរូបខាងស្តាំនេះ ABCD ជាការជ្រុង 10cm

និង CDE ជាត្រីកោណសម័ង្ស ។

រករង្វាស់កាំរង្វង់ ។



៩- កំនត់តំលៃ m ដើម្បីអោយសមីការដឺក្រេទីពីរ $x^2 - mx + m^2 - m - 3 = 0$ (1) ($m \neq 0$)

មានរឹសពីរ x_1, x_2 ជាប្រវែងជ្រុង AB, AC នៃត្រីកោណ ABC មាន $\hat{A} = 90^\circ$ និង $BC = 2$ ។

$x_1^2 - x_2^2 = 2^2 \Rightarrow (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2 = 4$ គេដឹង (1)

ស្រាវជ្រាវ	១- ១០ពិន្ទុ	២- ១០ពិន្ទុ	៣- ១៥ពិន្ទុ	៤- ៨ពិន្ទុ	៥- ១២ពិន្ទុ
	៦- ១០ពិន្ទុ	៧- ១០ពិន្ទុ	៨- ១៥ពិន្ទុ	៩- ១០ពិន្ទុ	

១. ព្រង់នៃវិស័យសាមី

០ គេ: (ស្វ័យកម្ម) ដើម្បីសម្រាក:

$$n) z^6 - (1-i)z^3 - i = 0$$

$$\text{ក៏ } t = z^3 \text{ បាន: } t^2 - (1-i)t - i = 0$$

$$\text{ដើម្បីស } t_1 = 1; t_2 = -i$$

$$z^3 = 1 \text{ បាន: } 1 = \cos 0 + i \sin 0$$

$$z_1 = 1$$

$$z_2 = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3} = -\frac{1}{2} + i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$z_3 = \cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3} = -\frac{1}{2} - i\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$z^3 = -i \text{ បាន: } -i = \cos(-\frac{\pi}{2}) + i \sin(-\frac{\pi}{2})$$

$$z_4 = \cos(-\frac{\pi}{6}) + i \sin(-\frac{\pi}{6}) = \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2}$$

$$z_5 = \cos(\frac{\pi}{2}) + i \sin \frac{\pi}{2} = i$$

$$z_6 = \cos(\frac{7\pi}{6}) + i \sin(\frac{7\pi}{6}) = -\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{i}{2}$$

$$g) 2z^3 - (5+6i)z^2 + 9iz + 1-3i = 0$$

គេ: $a \in \mathbb{R}$ ដើម្បីស្វ័យកម្មសម្រាក: ក៏បាន

$$2a^3 - (5+6i)a^2 + 9ia + 1-3i = 0$$

$$(2a^3 - 5a^2 + 1) - (6a^2 - 9a + 3)i = 0$$

$$\text{ក៏បាន: } \begin{cases} 2a^3 - 5a^2 + 1 = 0 & (1) \\ 6a^2 - 9a + 3 = 0 & (2) \end{cases}$$

$$(2): \text{ ដើម្បីស } a = 1; a = \frac{1}{2}$$

$$a = 1 \text{ បាន: } (1) \quad 2 - 5 + 1 = 0 \text{ ត្រឹមត្រូវ}$$

$$a = \frac{1}{2} \text{ បាន: } (1) \quad 2 \cdot \frac{1}{8} - 5 \cdot \frac{1}{4} + 1 = 0 \text{ ត្រឹមត្រូវ}$$

ក៏បាន $a = \frac{1}{2}$ ដើម្បីស:

$$\text{ក៏ } 2z^3 - (5+6i)z^2 + 9iz + 1-3i = 0$$

$$2 \cdot \frac{1}{8} - (5+6i) \cdot \frac{1}{4} + 9i \cdot \frac{1}{2} + 1-3i = 0$$

$$\text{ក៏ } 2(z - \frac{1}{2}) - (5+6i)(z - \frac{1}{2}) + 9i(z - \frac{1}{2}) = 0$$

$$^{\dagger} (z - \frac{1}{2}) [z^2 - (2+3i)z - 1+3i] = 0$$

$$z_1 = \frac{1}{2}; z_2 = 1+2i; z_3 = 1+i$$

២. កាស៊ីនីត្រង់ $H(z)$

ក៏បាន $A(i); H(z); N(iz)$ ក៏បានដូច្នេះ

$$\text{ក៏បាន } \overrightarrow{HN} = K \overrightarrow{HA}; K \in \mathbb{R}$$

$$(iz - z) = K(i - z)$$

$$K = \frac{iz - z}{i - z} \quad z \neq i$$

$$\text{ក៏ } z = a + ib; a, b \in \mathbb{R}$$

$$\begin{aligned} \text{បាន: } K &= \frac{i(a+ib) - (a+ib)}{i - (a+ib)} = \frac{i(1-b) - a + i(a-b)}{i(1-b) - a + i(a-b)} \\ &= \frac{(i-1)(a+ib) [-a-i(1-b)]}{a^2 + (1-b)^2} \\ &= \frac{[(a-b)i - (a+b)] [-a-i(1-b)]}{a^2 + (1-b)^2} \\ &= \frac{(a^2+b^2+a-b) + [(a+b)(1-b) - a(a-b)]}{a^2 + (1-b)^2} \end{aligned}$$

$$K \in \mathbb{R} \text{ បាន: } \begin{cases} (a+b)(1-b) - a(a-b) = 0 \\ a^2 + (1-b)^2 \neq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a^2 + b^2 - a - b = 0 \\ a^2 + (b-1)^2 \neq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} (a-\frac{1}{2})^2 + (b-\frac{1}{2})^2 = \frac{1}{2} \\ (a-0)^2 + (b-1)^2 \neq 0 \end{cases}$$

ដូច្នេះ: ជំនុំចំនុច H ដោយស្របនឹង $(\frac{1}{2}; \frac{1}{2})$
នៃ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ ក៏បានចំនុច $(0; 1)$ ។

1-5

១) គ្រោលការណ៍

$$\frac{\sin 2^\circ + 4\sin 4^\circ + \dots + 178\sin 178^\circ + 180\sin 180^\circ}{90} = \text{cd}$$

ក្រុមប្រធាន: $\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$

$$\sin 178^\circ = \sin 2^\circ$$

$$\sin 176^\circ = \sin 4^\circ$$

$$\dots \dots \dots$$

ឆ្លុះបញ្ចាំង:

$$\frac{\sin 2^\circ + 4\sin 4^\circ + \dots + 88\sin 88^\circ + 90 + \dots + 178\sin 178^\circ}{90}$$

$$\frac{30\sin 2^\circ + 180\sin 4^\circ + \dots + 180\sin 88^\circ + 90}{90}$$

$$2\sin 2^\circ + 2\sin 4^\circ + \dots + 2\sin 88^\circ + 1$$

$$\frac{1}{\sin 1^\circ} (2\sin 1^\circ \sin 2^\circ + 2\sin 1^\circ \sin 4^\circ + \dots + 2\sin 1^\circ \sin 88^\circ) + 1$$

$$\text{ប្រើប្រាស់ } \sin a \sin b = \frac{1}{2} [\cos(a-b) - \cos(a+b)]$$

$$\frac{1}{\sin 1^\circ} (\cos 1^\circ - \cos 3^\circ + \cos 3^\circ - \cos 5^\circ + \dots + \cos 87^\circ - \cos 89^\circ) + 1$$

$$\frac{1}{\sin 1^\circ} (\cos 1^\circ - \cos 89^\circ) + 1, (\sin 1^\circ = \cos 89^\circ)$$

$$\frac{1}{\sin 1^\circ} (\cos 1^\circ - \sin 1^\circ) + 1 = \cot 1^\circ \text{ គឺ}$$

២) គណនាផលបូកស្របនាមីក្រូប:

$$1) S_1 = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + n^2$$

$$\text{កំណត់ } (x+1)^3 = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$$

កាលបរិច្ឆេទ $x = 1; 2, \dots, n$ គេបាន:

$$x=1 : 2^3 = 1 + 3 \cdot 1^2 + 3 \cdot 1 + 1$$

$$x=2 : 3^3 = 2^3 + 3 \cdot 2^2 + 3 \cdot 2 + 1$$

$$x=3 : 4^3 = 3^3 + 3 \cdot 3^2 + 3 \cdot 3 + 1$$

$$\dots \dots \dots$$

$$x=n : (n+1)^3 = n^3 + 3n^2 + 3n + 1$$

$$\text{បូក: } (n+1)^3 = 1 + 3(1^2 + 2^2 + \dots + n^2) + 3(1 + 2 + \dots + n) + n$$

$$(n+1)^3 = (n+1) + 3S_1 + 3S_2 + n$$

$$3S_1 = (n+1)(n^2 + 2n + 1 - 1 - \frac{3n}{2})$$

$$S_1 = \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1)$$

$$2) S_2 = 1 \cdot 2 + 2 \cdot 5 + 3 \cdot 8 + \dots + 668 \cdot 2003$$

$$\text{កំណត់/តួទូទៅ: } k(3k-1) = 3k^2 - k$$

កាលបរិច្ឆេទ $k = 1; 2, \dots, 668$ យើងបាន

$$k=1 \quad 1 \cdot 2 = 3 \cdot 1^2 - 1$$

$$k=2 \quad 2 \cdot 5 = 3 \cdot 2^2 - 2$$

$$k=3 \quad 3 \cdot 8 = 3 \cdot 3^2 - 3$$

$$\vdots$$

$$k=668 : 668 \cdot 2003 = 3 \cdot 668^2 - 668$$

$$\text{បូកគ្នា: } S_2 = 3(1^2 + 2^2 + \dots + 668^2) - (1 + 2 + \dots + 668)$$

$$S_2 = 3 \cdot \frac{1}{6} \cdot 668 \cdot 669 \cdot 1377 - \frac{668}{2} \cdot 669$$

$$S_2 = 298523856$$

៥) គណនា:

$$\frac{(\sqrt[3]{8-3\sqrt{5}} + \sqrt[3]{8+3\sqrt{5}})(\sqrt[3]{8+3\sqrt{5}})}{\sqrt[3]{57}}$$

$$= \frac{\sqrt[3]{64-45} + 2\sqrt[3]{64-45}}{\sqrt[3]{3} \cdot \sqrt[3]{19}} = \sqrt[3]{9} \quad (1)$$

$$\frac{\sqrt[3]{9} - \sqrt{2}}{\sqrt[3]{3} + \sqrt{2}} + \frac{\sqrt{2} - 9\sqrt[3]{9}}{\sqrt[3]{2} - \sqrt[3]{81}} = \frac{(\sqrt[3]{3})^2 - (\sqrt[3]{2})^2}{(\sqrt[3]{3} + \sqrt[3]{2})(\sqrt[3]{2} - 3\sqrt[3]{3})} + \frac{(\sqrt[3]{2})^2 - (3\sqrt[3]{3})^2}{(\sqrt[3]{2} - 3\sqrt[3]{3})}$$

$$= \sqrt[3]{3} - \sqrt[3]{2} + \sqrt[3]{2} + 3\sqrt[3]{3} = 4\sqrt[3]{3} \quad (2)$$

$$\text{ដូចគ្នា: } (1) \text{ និង } (2) \quad \sqrt[3]{9} \times 4\sqrt[3]{3} = 12$$

⑤ (ਸ਼ਬਦਾਨੁਸਾਰ) ੧ ਨਵੰਬਰ
 $46^n + 296 \cdot 13^n$ ਚਕਤੀ 1947

46ⁿ + 296.13ⁿ 10/10/1947

उदाहरण: $1947 = 33 \times 59, (33, 59) = 1$

ಗಾಢ A = $46^n + 296 \cdot 13^n$ ರೂಗಮಾರ್ತತತನುತು

$$\begin{aligned} A &= 46^n - 13^n + 297 \cdot 13^n \\ &= (46-13)[S(n)] + (33 \times 9) \cdot 13^n \\ &= 33 [S(n) + 9 \cdot 13^n] \text{ சிதைவாக 33 (1)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ထိပ် A} &= 46^n + 13^n + 295 \cdot 13^n, \text{ ဂဏန်း} \\ &= 59[0(n)] + (59 \times 5) \cdot 13^n \\ &= 59[0(n) + 5 \cdot 13^n] \text{ ဖြစ်သော 59 ခု} \end{aligned}$$

૧) ક્રી. (૨) ૧ ઓગસ્ટ ૧૯૪૭, ગાંધી

$$(2) \text{ 求 } \int_0^1 \left(\frac{1}{2003} \right) + \int_1^2 \left(\frac{2}{2003} \right) + \dots + \int_{2002}^{2003} \left(\frac{2002}{2003} \right)$$

$$t > 1 \quad f(x) = \frac{t^x}{t^x + \sqrt{t}}$$

ඒකේෂ් $x + y = 1$ සඳහා $f(x) + f(y)$

$$\begin{aligned} f(x) + f(y) &= \frac{t^x}{t^x + \sqrt{t}} + \frac{t^y}{t^y + \sqrt{t}} \\ &= \frac{t^x(t^y + \sqrt{t}) + t^y(t^x + \sqrt{t})}{(t^x + \sqrt{t})(t^y + \sqrt{t})} \\ x+y=1 \implies &= \frac{2t + \sqrt{t}(t^x + t^y)}{2t + \sqrt{t}(t^x + t^y)} = 1 \end{aligned}$$

75 :


$$\frac{1}{2003} + \frac{2002}{2003} = 1 \text{ என: } f\left(\frac{1}{2003}\right) + f\left(\frac{2002}{2003}\right) = 1$$

$$\frac{2}{2003} + \frac{2001}{2003} = 1 \Rightarrow \int \left(\frac{2}{2003} \right) + \int \left(\frac{2001}{2003} \right) = 1$$

$$\frac{\frac{1001}{2003}}{\frac{2003}{2003}} + \frac{1002}{2003} = 1 \Rightarrow \int \left(\frac{1001}{2003} \right) + \int \left(\frac{1002}{2003} \right) = 1$$

ឆ្នាំទី៖ $\frac{1}{2003} + \frac{1}{2003} + \dots + \frac{1}{2003} = 1001$

⑧ କରାଣା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ .



၇၈၀ နိဗ္ဗာန် အား ၀ သာလျှော့ချက်
 ၇၈၁ [AB] ၇ [DC] နိဗ္ဗာန်လျှော့ချက်
 ၇၈၂ [DC] ၇၈၁ [AB] နိဗ္ဗာန် F

$$\text{ord } EF = EI + IF = \frac{10\sqrt{3}}{2} + 10$$

ഞങ്ങൾ $OA = OE = x$, ഉൾപ്പെടെ AOE

$$\begin{aligned} x^2 &= AF^2 + OF^2 \\ &= 5^2 + (EF - x)^2 \\ x^2 &= 25 + EF^2 - 2x EF + x^2 \\ 2x EF &= 25 + (5\sqrt{3} + 10)^2 \\ 2x EF &= 25 + 75 + 100\sqrt{3} + 100 \\ 2x EF &= 20(5\sqrt{3} + 10) \\ 2x EF &= 20 EF \end{aligned}$$

$$x = 10 \text{ cm}$$

ប្រឡងសិស្សត្រីមាសទី២ឆ្នាំ២០០២

ថ្ងៃទី ១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០០២ (រយៈពេល៣ម៉ោង)

វិញ្ញាណក្ខន្ធ ទី២

១-ប្រៀបធៀបចំនួន $\sqrt{2001} + \sqrt{2003}$ និង $2\sqrt{2002}$ គេបាន $2002^2 - 1 < 2002^2 / (2001 \cdot 2003)$

២-គណនាផលបូក $S = \frac{1}{1+\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{2002}+\sqrt{2003}}$ គេបាន $\frac{(1-\sqrt{2})(1+\sqrt{2})}{-(1-\sqrt{2})} = \frac{-1}{1-\sqrt{2}}$

៣-គេអោយអនុគមន៍ $f_1(x); f_2(x); f_3(x); \dots$ ផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌ

$$f_1(x) = x \text{ និង } f_{n+1}(x) = \frac{1}{1-f_n(x)} \quad \forall \text{ គណនា } f_{2002}(2002)$$

៤- រកគ្រប់គូរនៃចំនួនគតិវិជ្ជមាន (x, y) ដែល $\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{1980}$

៥- ចំពោះចំនួនគតិវិជ្ជមាន n ដែល $A(n) = 2903^n - 803^n - 464^n + 261^n$ ។

បង្ហាញថា $A(n)$ ចែកដាច់នឹង 1897

៦-គេអោយត្រីកោណ ABC មាន $\hat{A} = 45^\circ$ ។ បន្ទាយជ្រុង [BC] ទៅខាង B បាន $BB' = BC$

បន្ទាយជ្រុង [BC] ទៅខាង C បាន $CC' = BC$ ។ តាង $B'\hat{A}B = \alpha$, $C'\hat{A}C = \beta$

ស្រាយបញ្ជាក់ថា $(1 + \cot \alpha)(1 + \cot \beta) = 8$

៧- រកអនុគមន៍ f ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌ

$$f(x+y) \geq f(x) \cdot f(y) \geq 2003^{x+y} \quad \text{គ្រប់ } x, y \in \mathbb{R} \quad \forall$$

៨- គេអោយ $0 < x_1 < x_2 < \dots < x_{12}$


$$\text{ស្រាយបញ្ជាក់ថា } \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_9}{x_3 + x_6 + x_9} + \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_{12}}{x_4 + x_8 + x_{12}} < 7$$

៩- យក k ជាចំនួនគតិវិជ្ជមាន និង M_k សំនុំនៃចំនួនគតិវិជ្ជមានដែល នៅចន្លោះ $2k^2 + k$ និង $2k^2 + 3k$

រួមទាំងចំនួនទាំងពីរ ។ តើគេអាចប្រែក M_k ជាពីរសំនុំរង A និង B ដែល

$$\sum_{x \in A} x^2 = \sum_{x \in B} x^2 ?$$

អត្រាពិន្ទុ	១- ៧ពិន្ទុ	២- ៨ពិន្ទុ	៣- ១០ពិន្ទុ	៤- ១៥ពិន្ទុ	៥- ១០ពិន្ទុ	៦- ២០ពិន្ទុ
	៧- ៧ពិន្ទុ	៨- ៨ពិន្ទុ	៩- ១៥ពិន្ទុ			



⑨ កំណត់តំលៃ m ; $m \neq 0$
 តើ x_1, x_2 ជាច្រើនគ្រប់គ្រង AB និង AC
 ក្នុង Δ កែង ABC លុះត្រាតែ :

x_1, x_2 គឺជាច្រើន, លក្ខណៈចាំបាច់

គ្រប់គ្រង ត្រូវបំពេញ :

(1) $p > 0$

(2) $\Delta \geq 0$

(3) $x_1^2 + x_2^2 = BC^2$ ឬ $(S^2 - 2P) = 4$

ឬ $\begin{cases} m^2 - m - 3 > 0 & (1) \end{cases}$

$\begin{cases} m^2 - 4(m^2 - m - 3) \geq 0 & (2) \end{cases}$

$\begin{cases} m^2 - 2(m^2 - m - 3) = 4 & (3) \end{cases}$

(3) : $m^2 - 2m - 2 = 0$ មានច្រើន


$m_1 = 1 - \sqrt{3}$; $m_2 = 1 + \sqrt{3}$

(2) $-3m^2 + 4m + 12 \geq 0$ មានច្រើន :

$m = \frac{2 - 2\sqrt{10}}{3}$; $m = \frac{2 + 2\sqrt{10}}{3}$

(1) $m^2 - m - 3 > 0$ មានច្រើន :

$\frac{1 - \sqrt{13}}{2}$, $\frac{1 + \sqrt{13}}{2}$



ដូចនេះ : $m = 1 + \sqrt{3}$

វិធីសាស្ត្រកំណត់តំលៃ

① ប្រើប្រាស់ : $\sqrt{2001} + \sqrt{2003}$ និង $2\sqrt{2002}$

ចាត់ : $2002^2 - 1 < 2002^2$

$\sqrt{2001 \times 2003} < 2002$

$2\sqrt{2001 \times 2003} < 2 \times 2002$

$2 \times 2002 + 2\sqrt{2001} \cdot \sqrt{2003} < 4 \cdot 2002$

$\sqrt{2001}^2 + 2\sqrt{2001} \cdot \sqrt{2003} + \sqrt{2003}^2 < 4 \cdot 2002$

$(\sqrt{2001} + \sqrt{2003})^2 < 4 \cdot 2002$

$\sqrt{2001} + \sqrt{2003} < 2\sqrt{2002}$

② គណនាផលបូក :

$$S = \frac{1}{1+\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{2002} \cdot \sqrt{2003}}$$

មាន $(\sqrt{2}-1)(\sqrt{2}+1) = (\sqrt{3}-\sqrt{2})(\sqrt{3}+\sqrt{2}) = \dots$

$= (\sqrt{2003}-\sqrt{2002})(\sqrt{2003}+\sqrt{2002}) = 1$

គេបាន : $\frac{1}{\sqrt{2}+1} = \sqrt{2}-1$

$\frac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} = \sqrt{3}-\sqrt{2}$

$\vdots$

$\frac{1}{\sqrt{2003}+\sqrt{2002}} = \sqrt{2003}-\sqrt{2002}$

បូករួម : $S = \sqrt{2003} - 1$

3) සඳහා $f_{2002}(2002)$

තවද $f_1(x) = x$

එවිට $f_1(2002) = 2002$

$$f_2(2002) = \frac{1}{1 - f_1(2002)} = -\frac{1}{2001}$$

$$f_3(2002) = \frac{1}{1 - f_2(2002)} = \frac{2001}{2002}$$

$$f_4(2002) = \frac{1}{1 - f_3(2002)} = 2002$$

එබැවින් $f_4(2002) = f_1(2002) = 2002$

$$f_5(2002) = f_2(2002) = -\frac{1}{2001}$$

$$f_6(2002) = f_3(2002) = \frac{2001}{2002}$$

⋮

$$f_{3n}(2002) = \frac{2001}{2002}$$

$$f_{3n+1}(2002) = 2002$$

$$f_{3n+2}(2002) = -\frac{1}{2001}$$

එබැවින් 2002 හි 3n+1

$$f_{2002}(2002) = 2002$$

4) ඇත්ත වන්නේ (x, y) යනු

$$\sqrt{x} + \sqrt{y} = \sqrt{1980} \quad (1 < x, y < 1980)$$

$$x + y + 2\sqrt{xy} = 1980$$

$$2\sqrt{xy} = 1980 - (x+y)$$

එවිට $\sqrt{xy} \in \mathbb{Z}_+$ සිදු x, y හි

සඳහා x, y යනු

සමීකරණයට

$$xy = k^2; \quad (k \in \mathbb{Z}_+) \quad (1)$$

$$\text{එවිට } 2k = 1980 - (x+y)$$

$$\text{ඉ} \quad (x+y) = 1980 - 2k = 2(990 - k)$$

(1), (2) x, y සමීකරණය:

$$t^2 - 2(990 - k)t + k^2 = 0 \quad (*)$$

$$\Delta' = (990 - k)^2 - k^2 = 990(990 - 2k) \\ = 1980(495 - k)$$

එබැවින් $\Delta' \geq 0$ යනු $k \leq 495$

Δ' සමීකරණයට

$$\text{එවිට } 1980(495 - k) = X^2, \quad X \in \mathbb{N}$$

$$\text{ඉ} \quad 6^2 \times 55(495 - k) = X^2$$

$$\text{එබැවින් } 495 - k = 55 \text{ ඉ} \quad k = 440$$

$$495 - k = 220 \text{ ඉ} \quad k = 275$$

$$495 - k = 0 \text{ ඉ} \quad k = 495$$

එවිට $k = 440$ සඳහා (x, y) යනු: 880, 220

$k = 275$ සඳහා (x, y) යනු: 1375, 55

$k = 495$ සඳහා (x, y) යනු: 495, 495

එබැවින් (x, y) යනු:

$$(220, 880); (880, 220)$$

$$(1375, 55); (55, 1375)$$

$$(495, 495)$$

ඉටුපිළි : 30හි $x > y$

$$1980 = 4 \times 495 = 9 \times 220 \\ = 36 \times 55$$

ඵ්ශාභ: $\sqrt{1980} = 2\sqrt{495} = 3\sqrt{220} = 6\sqrt{55}$

a) $\sqrt{1980} = 2\sqrt{495} = \sqrt{495} + \sqrt{495}$

භා: $x = y = 495$

b) $\sqrt{1980} = 3\sqrt{220} = \sqrt{4 \times 220} + \sqrt{220}$

භා: $x = 880; y = 220$

c) $\sqrt{1980} = 6\sqrt{55} = \sqrt{25 \times 55} + \sqrt{55}$

භා: $x = 1375; y = 55$

ඵ්ශාභ: $6\sqrt{55} = \sqrt{16 \times 55} + \sqrt{4 \times 55}$ (ඵ්ශාභ)

$6\sqrt{55} = \sqrt{9 \times 55} + \sqrt{9 \times 55}$ (ඵ්ශාභ)

ඵ්ශාභ: $(x=y=495)$ ඵ්ශාභ $x < y$
 $(x=880; y=220)$ $(220, 880)$
 $(x=1375; y=55)$ $(55, 1375)$

⑤ පඵ්ශාභ $A(n)$ ඵ්ශාභ 1897

$$A(n) = 2903^n - 803^n - 464^n + 261^n$$

ඵ්ශාභ 1897 = 4×271

$$a^n - b^n = (a-b)(a^{n-1} + a^{n-2}b + \dots + b^{n-1})$$

ඵ්ශාභ: $n > 1$:

$$A(n) = (2903^n - 803^n) - (464^n - 261^n)$$

$$= 2100 P(n) - 203 Q(n)$$

$$= 4 [30 P(n) - 29 Q(n)]$$

භා: $A(n)$ ඵ්ශාභ 7 (1)

$$A(n) = (2903^n - 464^n) - (803^n - 261^n)$$

$$= 2439 S(n) - 542 T(n)$$

$$= 271 [9 S(n) - 2 T(n)]$$


භා: $A(n)$ ඵ්ශාභ 7 (2)

(1) ඵ්ශාභ (2) ඵ්ශාභ 7

ඵ්ශාභ $(7, 271) = 1$ භා:

$A(n)$ ඵ්ශාභ 1897

⑥ (ඵ්ශාභ) $(1 + \cot \alpha)(1 + \cot \beta)$



ඵ්ශාභ $AB = c; BC = a; AC = b$

$$S = S_{ABC} = \frac{1}{2} bc \sin 45^\circ = \frac{1}{2} ac \sin \hat{B} \\ = \frac{1}{2} ab \sin \hat{C} = \frac{bc\sqrt{2}}{4}$$

$$S_{ABB'} = \frac{1}{2} ac \sin (\pi - B) = S$$

$$S_{ACC'} = \frac{1}{2} ab \sin (\pi - C) = S$$

ඵ්ශාභ $(BI) \parallel (AC)$ භා: I

ඵ්ශාභ $[BB'] \parallel [AB']$

$$S_{ABI} = \frac{1}{2} AI \cdot AB = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} AB' \cdot AB \right) =$$

Q ABI ඵ්ශාභ $\cos$ ඵ්ශාභ $\sin$

$$\cos \hat{ABI} = \frac{AB^2 + BI^2 - AI^2}{2 AB \cdot BI}; \sin \hat{ABI} = \frac{2S}{AB \cdot BI}$$

$$\cot \hat{ABI} = \frac{AB^2 + BI^2 - AI^2}{4 \cdot S_{ABI}}$$

$$\cot 45^\circ = \frac{AB^2 + BI^2 - AI^2}{4 \cdot S_{ABI}} \quad (\hat{ABI} = 45^\circ)$$

$$\cos \alpha = \frac{AI^2 + AB^2 - BI^2}{2S}$$

$$\cot 45^\circ + \cot \alpha = \frac{2AB^2}{2S} = \frac{C^2}{S} \quad (1)$$

បន្ត គាត់ C ចូល $(C) \parallel (AB)$, $\widehat{AC} = 45^\circ$
 គេបាន: $\cot 45^\circ + \cot \beta = \frac{2AC^2}{2S} = \frac{b^2}{S} \quad (2)$

(1) ដើម (2):

$$(1 + \cot \alpha)(1 + \cot \beta) = \frac{b^2 C^2}{S^2}$$

$$\text{តែ } S = \frac{bc\sqrt{2}}{4} \quad \text{គេ: } \frac{b^2 C^2}{8} = S^2$$

$$\text{បញ្ជាក់: } (1 + \cot \alpha)(1 + \cot \beta) = 8.$$

① កាតព្វកម្ម f រើសយកចំនួនគត់.

$$f(x+y) \geq f(x) \cdot f(y) \geq 2003^{x+y} \quad x, y \in \mathbb{R}.$$

យក $x=y=0$ គេបាន:

$$f(0+0) \geq f(0) \cdot f(0) \geq 2003^{0+0}$$

$$f(0) \geq [f(0)]^2 \geq 1$$

$$\text{នាំគេ } f(0) = 1$$

យក $y = -x$ គេបាន:

$$f(0) \geq f(x) \cdot f(-x) \geq 2003^0$$

$$1 \geq f(x) \cdot f(-x) \geq 1$$

$$\text{នាំគេ } f(x) \cdot f(-x) = 1 \quad (1)$$

យក $y = 0$ គេបាន:

$$f(x) \geq f(x) \cdot f(0) \geq 2003^x$$

$$f(x) \geq f(x) \cdot 1 \geq 2003^x$$

$$f(x) \geq 2003^x \quad (2)$$

$$f(-x) \geq 2003^{-x}$$

$$\frac{1}{f(-x)} \leq \frac{1}{2003^{-x}} = 2003^x$$

$$\text{តាម (1): } f(x) = \frac{1}{f(-x)} \leq 2003^x \quad (3)$$

$$(2) \text{ ដើម (3) គេបាន } f(x) = 2003^x$$

⑧ (សាយ): $\frac{x_1+x_2+\dots+x_9}{x_3+x_6+x_9} + \frac{x_1+x_2+\dots+x_{12}}{x_4+x_8+x_{12}}$

$$\text{ចំពោះ: } x_1 < x_2 < x_3 \quad \text{គេ: } x_1+x_2+x_3 < 3x_3$$

$$x_4 < x_5 < x_6 \quad \text{គេ: } x_4+x_5+x_6 < 3x_6$$

$$x_7 < x_8 < x_9 \quad \text{គេ: } x_7+x_8+x_9 < 3x_9$$

$$\text{ហេតុនេះ: } x_1+x_2+\dots+x_9 < 3(x_3+x_6+x_9)$$

$$\frac{x_1+x_2+\dots+x_9}{x_3+x_6+x_9} < 3 \quad (1)$$

$$\text{ដូចគ្នា: } \frac{x_1+x_2+\dots+x_{12}}{x_4+x_8+x_{12}} < 4 \quad (2)$$

$$\text{ដូចគ្នា: } \frac{x_1+x_2+\dots+x_9}{x_3+x_6+x_9} + \frac{x_1+x_2+\dots+x_{12}}{x_4+x_8+x_{12}} < 7$$

⑨ កាបសមីការ $M_k = \{2k^2+k, \dots, 2k^2+3k\}$

$$\text{កាបសំនុំចំនួន } A = \{2k^2+k, 2k^2+k+1, \dots, 2k^2+2k\}$$

$$B = \{2k^2+2k+1, 2k^2+2k+2, \dots, 2k^2+3k\}$$

$$\text{គេបាន } f(n) = \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{1}{6} n(n+1)(2n+1)$$

$$\begin{aligned} \sum_{x \in A} x^2 &= f(2k^2+2k) - f(2k^2+k-1) \\ &= \frac{1}{6} k(k+1)(2k+1)(12k^2+12k+1) \quad (1) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sum_{x \in B} x^2 &= f(2k^2+3k) - f(2k^2+2k) \\ &= \frac{1}{6} k(k+1)(2k+1)(12k^2+12k+1) \quad (2) \end{aligned}$$

$$(1) \text{ ដើម (2) } \sum_{x \in A} x^2 = \sum_{x \in B} x^2$$

③

ប្រធានគ្រឹះស្ថាន សិស្សត្រីកែ ឧទ្ទិសប្រធាន
ផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ គណៈកម្មាធិការ និង ប្រតិភូ
ថ្នាក់ទី៩ និង ទី១២ ឆ្នាំសិក្សា២០០២-២០០៣

~~*~*~*~*~*

វិញ្ញាបនបត្រគណិតវិទ្យាទី ១២ (ថ្ងៃទី 28-05-03)

រយៈពេល 3 ម៉ោង ~ ពិន្ទុ 100


ហិត ស៊ីរោត
លេខទូរស័ព្ទ គណៈកម្មាធិការ
TEL: 011 953 029

1. (ពិន្ទុ 05) មាន $f(x) = 2x + 1$ និង $g[f(x)] = x^2 + 3x + 1$ ។ គណនា $g(3)$ ។

2. (ពិន្ទុ 05) គណនា $\sqrt{9+\sqrt{80}} - \sqrt{9-\sqrt{80}}$ ។

3. (ពិន្ទុ 10) m និង n ជាចំនួនគតិវិជ្ជមានដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ $\frac{1}{m} + \frac{1}{n} = \frac{4}{7}$ ។ គណនា $m^2 + n^2$ ។

4. (ពិន្ទុ 10) ក្នុងរូបខាងក្រោម $ABCD$ ជាចតុកោណកែង ហើយ $PB = 1, BQ = 2$ ។ ដោយដឹងថា ផ្ទៃក្រលាខ្មៅ ត្រីកោណ APD ស្មើ 55 និងផ្ទៃក្រលាខ្មៅត្រីកោណ CQD ស្មើ 48 ចូររកផ្ទៃក្រលាខ្មៅត្រីកោណ PDQ ។



5. (ពិន្ទុ 10) ស្រាយបំភ្លឺថា គ្រប់ចំនួនគតិវិជ្ជមាន n , ចំនួន $\frac{n}{3} + \frac{n^2}{2} + \frac{n^3}{6}$ ក៏ជាចំនួនគតិវិជ្ជមានដែរ ។

6. (ពិន្ទុ 20) គេអោយ $U_0 = 1, U_1 = 2$ និង $U_{n+1} = \frac{U_n^2 + 1}{U_{n-1}}$ ចំពោះ $n \geq 1$ ។

ក/. គណនា U_2

ខ/. បង្ហាញថា $U_{n+1} = 3U_n - U_{n-1}$ ចំពោះ $n \geq 1$ ។

7. (ពិន្ទុ 20) គេឧបមាថា $x^2 + x + 1 = 0$ ។ គណនា $x^{2003} + \frac{1}{x^{2003}}$ ។

8. (ពិន្ទុ 20) ត្រីកោណ ABC មានមុំទាំង 3 ជាមុំស្រួច ហើយ $\angle B = 60^\circ$ ។ ស្រាយបំភ្លឺថាបន្ទាត់ពុះមុំមួយ ដែលផ្គុំដោយកំពស់គូសពី A និង C កាត់តាមជុំវិញចំណុចក្រៅត្រីកោណ ABC ។

កម្រិតវិទ្យាល័យប្រឡងសិស្សត្រីវិភាគ

ទំព័រទី១៧ កំពុង 28/5/03

វិភាគលំហូរ

① គណនា $g(3)$

$$f(x) = 2x + 1 = 3 \text{ ដោយ } x = 1$$

$$g(3) = 1 + 3 + 1 = 5$$

② គណនា $\sqrt{9+\sqrt{80}} - \sqrt{9-\sqrt{80}}$

$$\text{តាង } x = \sqrt{9+\sqrt{80}} - \sqrt{9-\sqrt{80}}$$

$$x > 0 \text{ ព្រោះ } \sqrt{9+\sqrt{80}} > \sqrt{9-\sqrt{80}}$$

$$x^2 = 16 \text{ ដោយ } x = 4$$

$$\sqrt{9+\sqrt{80}} = 2 + \sqrt{5}$$

$$\sqrt{9-\sqrt{80}} = -2 + \sqrt{5} \quad (2-\sqrt{5} < 0)$$

$$\text{ដោយ } \sqrt{9+\sqrt{80}} - \sqrt{9-\sqrt{80}} = 4$$

③ គណនា $m^2 + n^2$

$$\text{តាង } \frac{1}{m} + \frac{1}{n} = \frac{4}{7} \text{ ដោយ } \begin{cases} m > \frac{4}{4} \\ n > \frac{4}{4} \end{cases}$$

$$\text{ដោយ } m, n \text{ គឺជា } : m \geq 2; n \geq 2$$

$$\text{យើងបាន } \begin{cases} n = \frac{4m}{4m-4} = \frac{4}{4-\frac{4}{m}} \quad (1) \\ m = \frac{4n}{4n-4} = \frac{4}{4-\frac{4}{n}} \quad (2) \end{cases}$$

$$\text{ចំពោះ } m=2 ; (1) \text{ គឺជា } n=14$$


$$\text{ចំពោះ } m > 2 ; \frac{1}{n} = \frac{4}{7} - \frac{1}{m} > \frac{1}{14}$$

$$2 < n < 14$$

ចំពោះ $2 < n < 14$; តាម (2) : គឺជា

$$n=2 \text{ ដោយ } m=14 \text{ គឺជា } m=2 \text{ គឺជា}$$

$$\text{គឺជា } m^2 + n^2 = 2^2 + 14^2 = 200$$



$$\text{តាង } AB = x ; AD = y$$

$$\text{ក្រឡា } \triangle APD : \frac{1}{2} y (x-1) = 55$$

$$\text{ក្រឡា } \triangle CDQ : \frac{1}{2} x (y-2) = 48$$

$$\text{ចេញផ្ទះ } : x = 12 ; y = 10$$

$$\text{ក្រឡា } \triangle PDQ \text{ គឺ } : S = 12 \times 10 - 55 - 48 = 17$$

$$S = 17 \text{ គឺជា } S = 17 \text{ គឺជា}$$

⑤ ប្រយោគ $\frac{n}{3} + \frac{n^2}{2} + \frac{n^3}{6}$ គឺជា

$$\text{តាង } E = \frac{n}{3} + \frac{n^2}{2} + \frac{n^3}{6}$$

$$6E = n(n+1)(n+2)$$

• $n, n+1, n+2$ គឺជា បីលេខជាប់គ្នា ដោយ

យកក្នុងមួយ បីលេខជាប់គ្នា

$$\text{គឺជា } n(n+1)(n+2) : 2$$

$$\text{• } n(n+1)(n+2) : 3 \text{ គឺជា}$$

$$\text{ចំពោះ } n \equiv 0 \pmod{3} \text{ ដោយ } n(n+1)(n+2) : 3$$

$$\text{ចំពោះ } n \equiv 1 \pmod{3} \text{ ដោយ } (n+2) : 3$$

$$\text{ចំពោះ } n \equiv 2 \pmod{3} \text{ ដោយ } (n+1) : 3$$

$$\text{គឺជា } n(n+1)(n+2) : 6$$

$$\text{නම් } f(n) = \frac{n(n+1)(n+2)}{6}$$

$$\text{ඒ } n=1 \quad f(1) = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6} = 1 \in \mathbb{N} \text{ නිසා}$$

$$n=2 \quad f(2) = \frac{2 \cdot 3 \cdot 4}{6} = 4 \in \mathbb{N} \text{ නිසා}$$

ප්‍රභවනිතයක් k ඒ $k(k+1)(k+2) : 6$
($k \in \mathbb{N}$) සාධනය (ප්‍රායෝගිකව) බිඳවිස්සේ $(k+1)$

$$f(k+1) = \frac{(k+1)(k+2)(k+3)}{6}$$

$$= \frac{k(k+1)(k+2)}{6} + \frac{3(k+1)(k+2)}{6}$$

$$\text{නිසා } k(k+1)(k+2) : 6$$

$$\text{නිසා (ප්‍රායෝගිකව) } \frac{3(k+1)(k+2)}{6} \text{ බිඳවිස්සේ}$$

$$\text{ඒ } (k+1)(k+2) : 2$$

$$\text{ඒ } k \text{ ක් } (k+2) \text{ ක් } (k+1)(k+2) : 2$$

$$\text{ඒ } k \text{ සහ } (k+1) \text{ ක් } (k+1)(k+2) : 2$$

$$\text{පිටපත්: } f(k+1) \text{ නිසා}$$

$$\text{නිසා } f(n) = \frac{n(n+1)(n+2)}{6} \text{ බිඳවිස්සේ}$$

$$6) \text{ ක) } \text{ප්‍රධාන } u_2 : u_0 = 1, u_1 = 2$$

$$n=1 : u_2 = \frac{u_1^2 + 1}{u_0} = \frac{2^2 + 1}{1} = 5$$

$$2) \text{ ප්‍රධාන } u_{n+1} = 3u_n - u_{n-1} \text{ (නැත)}$$

$$u_{n+1} = \frac{u_n^2 + 1}{u_{n-1}} \text{ නිසා } u_n \cdot u_{n-1} = u_n^2 + 1$$

$$\text{ඒ } u_{n+1} \cdot u_{n-1} - u_n^2 = 1$$

$$u_n = u_{n-1} \cdot u_{n+1} - u_n^2 \text{ නිසා (ප්‍රායෝගිකව)}$$

$$n \geq 1 \text{ පිටපත්: } u_n \cdot u_{n+2} - u_{n+1}^2 = u_n \cdot u_{n+1} - u_n^2 = 1$$

$$\text{ඒ } \frac{u_n + u_{n+2}}{u_{n+1}} = \frac{u_{n-1} + u_{n+1}}{u_n} \text{ (ප්‍රායෝගිකව)}$$

$$- z_n = \frac{u_{n-1} + u_{n+1}}{u_n} \text{ නිසා (ප්‍රායෝගිකව)}$$

$$(z_1 = z_2 = \dots = z_n)$$

$$\text{පිටපත්: } n=1, z_1 = \frac{u_0 + u_2}{u_1} = \frac{1+5}{2}$$

$$\text{පිටපත්: } z_n = \frac{u_{n-1} + u_{n+1}}{u_n} = z_1 = 3$$

$$\text{ඒ } u_{n+1} = 3u_n - u_{n-1}$$

$$\text{ප්‍රධාන } u_{n+1} = 3u_n - u_{n-1} \text{ (ප්‍රායෝගිකව)}$$

$$u_{n+1} = 3u_n - u_{n-1} \text{ (ප්‍රායෝගිකව)}$$

$$\text{නිසා } u_2 = 5 = 3 \cdot 2 - 1 = 3u_1 - u_0$$

$$\text{ප්‍රභවනිතයක් } n=k \text{ නිසා } u_k = 3u_{k-1} - u_{k-2}$$

$$\text{සාධනය (ප්‍රායෝගිකව) බිඳවිස්සේ } n=k+1$$

$$\text{ඒ } u_{k+2} = 3u_{k+1} - u_k$$

$$\text{ප්‍රධාන } u_{k+1} = \frac{u_k^2 + 1}{u_{k-1}}$$

$$\text{නිසා } u_{k+1} \cdot u_{k-1} = u_k^2 + 1$$

$$\text{ප්‍රධාන } u_{k+1} \neq 0 \text{ නිසා } u_{k+1} = 3u_k - u_{k-1}$$

$$u_{k+1}^2 = 3u_k \cdot u_{k+1} - u_{k+1} \cdot u_{k-1}$$

$$= 3u_k \cdot u_{k+1} - u_k^2 - 1$$

$$u_{k+1}^2 + 1 = u_k (3u_{k+1} - u_k)$$

$$\frac{u_{k+1}^2 + 1}{u_k} = 3u_{k+1} - u_k = u_{k+2}$$

$$\text{පිටපත්: } u_{k+2} = 3u_{k+1} - u_k \text{ නිසා}$$

$$\text{නිසා } u_{n+1} = 3u_n - u_{n-1} \text{ (} n \geq 1 \text{)}$$

$$x^{2003} + \frac{1}{x^{2003}}$$

$$\text{ឆ្លើយ: } x^2 + x + 1 = 0 \text{ គេ: } x + \frac{1}{x} = -1$$

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)^2 = (-1)^2 = 1$$

$$x^2 + \frac{1}{x^2} = -1$$

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) = 1 \quad \forall \quad x^3 + \frac{1}{x^3} = 2 \quad (n=3)$$

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)\left(x^3 + \frac{1}{x^3}\right) = -2 \quad \forall \quad x^4 + \frac{1}{x^4} = -1$$

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)\left(x^4 + \frac{1}{x^4}\right) = 1 \quad \forall \quad x^5 + \frac{1}{x^5} = -1$$

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)\left(x^5 + \frac{1}{x^5}\right) = 1 \quad \forall \quad x^6 + \frac{1}{x^6} = +2 \quad (n=6)$$

$$\text{ដូច្នេះ } x^n + \frac{1}{x^n} = 2 \text{ កាលណា } n = 3k \quad (k \in \mathbb{N}^*)$$

$$x^n + \frac{1}{x^n} = -1 \text{ សំ } n = 3k-2 \quad \forall \quad n = 3k-1 \quad (k \in \mathbb{N}^*)$$

$$\text{គេ: } 2003 = 668 \times 3 - 1 \text{ ឬ } 3k-1$$

$$\text{ដូច្នេះ: } x^{2003} + \frac{1}{x^{2003}} = -1$$

$$\text{ឈប់ប្រើ: } x^2 + x + 1 = 0 \text{ មានឆ្លើយ:}$$

$$x_1 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i; \quad x_2 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$$


$$\text{ក៏ឆ្លើយ } x_1 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i = \cos \frac{4\pi}{3} + i \sin \frac{4\pi}{3}$$

$$\text{ប្រើ De Moivre: } x^{2003} + \frac{1}{x^{2003}} = -1$$

$$\text{ក៏ឆ្លើយ } x_2 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i = \cos \frac{2\pi}{3} + i \sin \frac{2\pi}{3}$$

$$\text{ប្រើ De Moivre: } x^{2003} + \frac{1}{x^{2003}} = -1$$

(8)



យក H ជាប្រសព្វកំពស់ [AE] និង [CF]
O ជាចំណុចកណ្តាល ចំនុចកណ្តាល ΔABC

$$\angle AOC = 2\angle ABC = 120^\circ \text{ (មុំជិតខាង)}$$

- ចំណុចកណ្តាល BEHP ចំនុចកណ្តាល

$$\angle EHF = 180^\circ - \angle B = 180^\circ - 60^\circ = 120^\circ$$

$$\angle AHC = \angle EHF = 120^\circ$$

$$\text{ដូច្នេះ: } \angle AHC = \angle AOC = 120^\circ$$

ចំណុច A; H; O; C គឺជាចំណុចកណ្តាល

$$\text{សម្មាសន៍: } \angle OHC = \angle OAC \text{ (ក្នុងចំណោមចំណុចកណ្តាល)}$$

$$\angle EHO = \angle ACO \text{ (មុំបរិសុទ្ធមុំ)}$$

ប្រើចំណុចកណ្តាល ΔOAC សម្មាសន៍ (មុំបរិសុទ្ធមុំ)

$$\text{គេ: } \angle OAC = \angle ACO$$

$$\text{ដូច្នេះ: } \angle EHO = \angle OHC \text{ បញ្ជាក់ថា}$$

$$(HO) \text{ ជាប្រសព្វកំពស់: } \angle EHC = 90^\circ$$

ហត្ថ ស៊ីកេត

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសិស្ស សិស្សប្រតិភូ គណៈកម្មាធិការ

ផ្នែកអភិបាលកិច្ច គណៈកម្មាធិការ និង ប្រតិភូ

ឆ្នាំទី៩ និង ទី១២ ឆ្នាំសិក្សា២០០២-២០០៣

~~*~*~*~*~*

វិញ្ញាបនបត្រគណិតវិទ្យា 12 (ថ្ងៃទី 30-05-03)

រយៈពេល 3 ម៉ោង ~ ពិន្ទុ 100

1. (ពិន្ទុ 05) x និង y ជាចំនួនពិតដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ $x^2 + 3xy + y^2 = 60$ ។ រកតំលៃធំបំផុតនៃផលគុណ xy ។
2. (ពិន្ទុ 20) គេអោយ n ចំនុចនៅក្នុងប្លង់តែមួយ និងគ្មាន 3 ចំនុចណាមួយនៅលើបន្ទាត់តែមួយ ។ N ជាចំនួនអង្កត់ដែលភ្ជាប់ពីរចំនុច ។
 ៧. តើមានរូបដែល $N = n, N = 2n$ ដែររឺទេ ? បើមានចូររកតំលៃនៃ n រួចគូររូបបង្ហាញក្នុងករណីនីមួយៗ ។
 ៨. ជាទូទៅ តើមានចំនុចប៉ុន្មានដែល $N = kn$? ។
3. (ពិន្ទុ 25) k ជាចំនួនគត់ដែល $k \geq 2$ ។ ស្វ៊ីត (x_n) កំនត់ដោយ $x_0 = x_1 = 1$ និង $x_{n+1} = \frac{x_n^k + 1}{x_{n-1}}$ ចំពោះ $n \geq 1$ ។
 បង្ហាញថាចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ $k \geq 2$ ស្វ៊ីត (x_n) ជាស្វ៊ីតនៃចំនួនគត់ ។
4. (ពិន្ទុ 25) ក្នុងឆ្នាំនេះ សុខបានប្រលងតែសគណិតវិទ្យា 4 លើក ។ ពិន្ទុអតិបរមានៃការប្រលងមួយលើកស្មើ 100 ។ ពិន្ទុដែលសុខបានទទួលសុទ្ធតែមានលេខ 2 ខ្ទង់ ដែលខ្ទង់នីមួយៗខុសពី 0 ហើយពិន្ទុទាំង 4 លើកមានលេខខុសគ្នាទាំង 8 ។ មធ្យមភាគនៃពិន្ទុទាំង 4 លើករបស់សុខ ស្មើនឹងមធ្យមភាគនៃពិន្ទុនីមួយៗត្រលប់លេខ (ឧទាហរណ៍ : ពិន្ទុ ១៤ ត្រលប់លេខទៅជា 49) ហើយមធ្យមភាគនេះជាចំនួនគត់ដែលលេខនៃខ្ទង់នីមួយៗខុសពីលេខទាំង 8 នៃពិន្ទុទាំង 4 លើក ។
 តើមធ្យមភាគនៃពិន្ទុរបស់សុខស្មើប៉ុន្មាន ? ចូរអោយឧទាហរណ៍មួយនៃពិន្ទុទាំង 4 របស់សុខ ។
5. (ពិន្ទុ 25) ABC ជាត្រីកោណដែលមានមុំ B ជាមុំស្រួច ។ កន្លះបន្ទាត់ក្នុងនៃមុំ A ជួបជ្រុង BC ត្រង់ D ។ P ជាចំនុចមួយនៅលើជ្រុង AC ចន្លោះ A និង C ។
 ស្រាយបំភ្លឺថា $\angle BPD < \angle DPC$ ។

ករណីទី២ វិធានសាមី ២

① កាត់លេខនៃបំណង ១៥ ខ្សែ :

$$x^2 + y^2 = 60$$

$$(x-y)^2 + 5xy = 60$$

$$5xy = 60 - (x-y)^2$$

$$xy = 12 - \frac{(x-y)^2}{5} \leq 12$$

ដូច្នេះ: $xy = 12$ កាលណា $x = y$ គេ: ខ្សែមានលេខបំណង 12

② ក) ចំនួនរំងាប់ $N = n$; $k = 2n$



- ចំនួនរំងាប់ ចំនួនរំងាប់

នឹងមានចំនួនរំងាប់ចំនួន $(n-1)$ រំងាប់

ដូច្នេះ: ចំនួនរំងាប់ $N = \frac{(n-1) \cdot n}{2}$


ឡា: រំងាប់នឹងមានចំនួនរំងាប់ $(n-1)$ រំងាប់

ចំនួនរំងាប់	ចំនួនរំងាប់	រំងាប់
2	1	$1 = \frac{2(2-1)}{2}$
3	3	$2+1 = \frac{3(3-1)}{2}$
4	6	$3+2+1 = \frac{4(4-1)}{2}$
5	10	$4+3+2+1 = \frac{5(5-1)}{2}$
...	...	...
n	$\frac{n(n-1)}{2}$	$(n-1)+(n-2)+\dots+1 = \frac{n(n-1)}{2}$

- កាល $N = n$ គេ: $\frac{(n-1)n}{2} = n$ គេ: $n = 3$



- កាល $N = 2n$ គេ: $\frac{(n-1)n}{2} = 2n$ គេ: $n = 5$



ឧ) ចំនួនចំនួនរំងាប់ $N = kn$

$$\frac{(n-1)n}{2} = kn \quad \text{គេ: } n = 2k+1$$

បញ្ជាក់ x_n ជាចំនួនគត់ ចំពោះ $(k \geq 2)$

ដោយ $x_0 = x_1 = 1$ និង $x_{n+1} = \frac{x_n^k + 1}{x_{n-1}} \quad (n \geq 1)$

ឆ្លើយ: $x_2 = \frac{1^k + 1}{1} = 2$ ជាចំនួនគត់

$x_3 = \frac{2^k + 1}{1} = 2^k + 1$ ក៏ជាចំនួនគត់ដែរ

ឧទាហរណ៍ $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$ ជាចំនួនគត់

(គោរពថា x_{n+1} ជាចំនួនគត់)

ឆ្លើយ: $x_{n+1} = \frac{x_n^k + 1}{x_{n-1}}$ និង $x_n = \frac{x_{n-1}^k + 1}{x_{n-2}}$

ដំណាល $x_{n+1} = \frac{(x_{n-1}^k + 1) + x_{n-2}^k}{x_{n-2}^k \cdot x_{n-1}}$

ឆ្លើយ $N = (x_{n-1}^k + 1) + x_{n-2}^k$

* $N : x_{n-2}^k$ ព្រោះ x_n គត់ $\Rightarrow \frac{x_{n-1}^k + 1}{x_{n-2}}$ គត់

$\nmid x_{n-1}^k + 1$ ចែកគ្នាបាននឹង x_{n-2}

$(x_{n-1}^k + 1)^k$ ចែកគ្នាបាននឹង x_{n-2}^k

$(x_{n-1}^k + 1) + x_{n-2}^k$ ចែកគ្នាបាននឹង x_{n-2}^k (1)

* $N : x_{n-1}$ ព្រោះ $x_{n-1}^k + 1 \equiv 1 \pmod{x_{n-1}}$

ដំណាល $(x_{n-1}^k + 1)^k \equiv 1 \pmod{x_{n-1}}$

$(x_{n-1}^k + 1)^k + x_{n-2}^k \equiv 1 + x_{n-2}^k \pmod{x_{n-1}}$

ចំពោះ $x_{n-1} = \frac{x_{n-2}^k + 1}{x_{n-3}}$ ដំណាល $x_{n-1} \cdot x_{n-3} = x_{n-2}^k + 1 \equiv 0 \pmod{x_{n-1}}$

ដូច្នេះ: $N \equiv 0 \pmod{x_{n-1}}$ (2)

(1) និង (2) x_{n+1} ជាចំនួនគត់

គណនា M :

កំណត់ចំនួន 4 គោល : $(10a+b), (10c+d), (10e+f), (10g+h)$

$$M = \frac{(10a+b) + (10c+d) + (10e+f) + (10g+h)}{4} = \frac{(10b+a)(10d+c) + (10f+e) + (10h+g)}{4}$$

$$M = \frac{11a + 11b + 11c + 11d + 12e + 11f + 11g + 11h}{4.2} \quad (\text{បូកចំនួនចំនួន 2 តែ 12})$$

$$M = \frac{11}{8} (a+b+c+d+e+f+g+h)$$

គោលលេខទាំង 8 ទុក្ខក្នុង បើយកលេខ 0 បើគ្មាន :

$$M = \frac{11}{8} (1+2+3+4+5+6+7+8+9-K) \quad \text{ដែល } 1 \leq K \leq 9, K \text{ គត់}$$

$$M = \frac{11}{8} (45-K) \quad \text{គោល } M \text{ ជាចំនួនគត់ គេ: } (45-K) : 8$$

$$1 \leq K \leq 9 \quad \forall \quad 36 \leq 45-K \leq 44$$

$$\text{ដូច្នេះ: } 45-K = 40 \quad \forall \quad K=5$$

$$\boxed{M = 55}$$

១) ឧទាហរណ៍: បើ $M = 55$ ផលបូកលេខទាំង 4 គឺ: $55 \times 4 = 220$

$$\begin{array}{r} 55 \\ \times 4 \\ \hline 220 \end{array}$$

ហេតុដោយដូច្នេះ: ផលបូកលេខទាំង 10 គឺ 220 ផលបូកលេខទាំង 10 គឺ 20 ដូចគ្នា


ដែល លេខទាំង 10 គឺ 10 1 គ្រប់គ្រាន់ផលបូកលេខ 10:

$$1+9 = 2+8 = 3+7 = 4+6 \quad (\text{គ្មានលេខ 5 គេ: ទុក្ខក្នុង គោល ច្បាប់គត់})$$

ដូច្នេះ: លេខទាំង 4 គឺ: $(12, 98, 26, 84)$

$\forall (13; 94; 74; 36); \dots$

⑤



2) (නියමයන්) $\hat{P}_1 < \hat{P}_2$

නැවත $\angle B$ වලට: $\hat{P}_1 < \hat{P}_2 < 90^\circ$

නිසා $\sin B_1 < \sin B$

Δ ABC හි: $\frac{DB}{DC} = \frac{AB}{AC}$ (AD උසය: $\hat{A}$)

$$\frac{AB}{AC} = \frac{\sin C}{\sin B} \quad (\text{සිනස් ප්‍රමේය})$$

නිසා $\frac{\sin C}{\sin B_1} = \frac{DB}{DC} \quad (1)$

සමානාකාරී: (PE) වල $\angle BPC$ වල Δ BPC

$$\frac{PB}{PC} = \frac{EB}{EC} \quad (\text{උසය:})$$

$$\frac{PB}{PC} = \frac{\sin C}{\sin B_1} \quad (\text{සිනස් ප්‍රමේය})$$

නිසා $\frac{\sin C}{\sin B_1} = \frac{EB}{EC} \quad (2)$

නිසා $\sin B_1 < \sin B$ ආ $\frac{\sin C}{\sin B_1} > \frac{\sin C}{\sin B}$

(1) සිට (2) $\frac{EB}{EC} > \frac{DB}{DC}$

Δ BPC හි [BC] උපරිතලයේ උසය, D වලින් E

ප්‍රතිඵල: E වලින්: D වල C

නිසා $\hat{P}_1 < \hat{P}_2$

නිසා $\sin \hat{P}_1 < \sin \hat{P}_2$ නිසා $\hat{P}_1 < \hat{P}_2$ (9) ස)

නිසා: ප්‍රතිඵල $\hat{P}_1, \hat{P}_2$ වලින් නිසා

④

ប្រធានក្រឹតិសក្សសិស្សក្នុងគណៈកម្មាធិការជាតិឆ្នាំទី១២ ចំនួន ០៨រយ សំរាប់

ចូលរួមប្រធានគណៈកម្មាធិការក្នុងឆ្នាំ លើកទី៣ (១៩-២៣ ឧសភា ២០០៣)


សម័យប្រលង : ០២-០១-០៣

រយៈពេល : ៣ម៉ោង (១០០ពិន្ទុ)

វិទ្យាស្ថាន
អធិការ គណៈកម្មាធិការ
TEL: 011 953 029

វិញ្ញាបនបត្រសំរាប់ថ្ងៃទី១ :

I. (១០ពិន្ទុ) រកផលបូករង្វាស់ (គិតជាដឺក្រេ) នៃមុំ A, B, C, D, E និង F នៅក្នុងរូបខាងក្រោមនេះ :



$$\angle 1 + \angle 2 = 180^\circ$$

II. (១៥ពិន្ទុ) បើ n ជាចំនួនគត់វិជ្ជមាន ចូរបង្ហាញថា មានតំលៃគត់ នៃ x និង y ជាគិត ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការ $x^2 - y^2 = n^2$ ។

III. (២០ពិន្ទុ) $ABCD$ ជាការ ហើយ E ជាចំនុចមួយនៅក្នុងការ ដែល $AE=1$, $BE=2$ និង $CE=3$ ។ រករង្វាស់នៃមុំ $\angle AEB$ (គិតជាដឺក្រេ) និងផ្ទៃក្រលាផ្ទៃការ។

IV. (២៥ពិន្ទុ) គណនា $f(n)$ ដោយដឹងថា :


$$f(0) = f(1) = 0$$

$$\text{និង } f(n+1) = 2f(n) - f(n-1) + n + 1, \quad n \in \mathbb{N}$$

V. (៣០ពិន្ទុ) a, b និង c ជាចំនួនគត់វិជ្ជមាន។ ស្រាយបំភ្លឺថា បើ $\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c}$ ជាចំនួនសនិទាន នោះ a, b និង c ជាការប្រាកដ។

4/១១ កញ្ញា ២០១៣
 (ប្រធានាធិការ) យកសាលា SEA-HO
 ២០២/០១/០៣

I. (M₂, 10)



- ចំពោះ DEQP: $D + E + P_1 + Q_1 = 360^\circ$ (1)
- ចំពោះ AQR: $A + F + Q_2 = 180^\circ$ (2)
- ចំពោះ CBP: $B + C + P_2 = 180^\circ$ (3)

$$P_1 + P_2 = 180^\circ$$

$$Q_1 + Q_2 = 180^\circ$$

យកសរុបនៃ (1), (2) និង (3):

$$A + B + C + D + E + F = 360^\circ$$

II. (M₂, 15)

- តាង $x = \frac{n(n+1)}{2}$ និង $y = \frac{n(n-1)}{2}$, $n \in \mathbb{N}$

ដើម្បី យកតម្លៃ n តាមរយៈ $n+1$ និង $n-1$ យកតម្លៃ n

ដើម្បី យកតម្លៃ n តាមរយៈ n យកតម្លៃ n

ដូច្នេះ x និង y គឺជាចំនួនគត់

- ដើម្បី បញ្ជាក់:

$$x^2 - y^2 = \frac{n^2}{4} [(n+1)^2 - (n-1)^2]$$

$$= \frac{n^2}{4} \cdot 2n \cdot 2$$


$$= n^3$$

$$\begin{aligned} y &= n^2 \\ x &= n \\ x - y &= n^2 - n \\ x + y &= n^2 + n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x - y &= n^2 - n = \frac{n(n-1)}{2} \\ x + y &= n^2 + n = \frac{n(n+1)}{2} \end{aligned}$$

10 + 5 = 15

១០. (៥ ឆ្នាំ ២០)



កំណត់: $\angle AEB$:

គេឲ្យ ១ គូសប្រូតូស៍ ២ គូសកាត់

ក្នុង ៣៖ $x^2 + y^2 = 1$ (1)

$(a-x)^2 + y^2 = 4$ (2)

$(a-x)^2 + (a-y)^2 = 9$ (3) — ៥ ឆ្នាំ

(1) និង (2): $(a-x)^2 + 1 - x^2 = 4$

$x = \frac{a^2 - 3}{2a}$

(2) និង (3): $4 - y^2 + (a-y)^2 = 9$

$y = \frac{a^2 - 5}{2a}$

(1): $\left(\frac{a^2 - 3}{2a}\right)^2 + \left(\frac{a^2 - 5}{2a}\right)^2 = 1$

$a^4 - 10a^2 + 17 = 0$

$a^2 = 5 - 2\sqrt{2}$ មិនយល់ (ព្រោះ $a^2 < 0, y < 0$)

$a^2 = 5 + 2\sqrt{2}$ យល់ — ១០ ឆ្នាំ

(ចំណុច ២០) គេឲ្យ ១ គូសប្រូតូស៍ ២ គូសកាត់ (កំណត់ $\angle AEB$):

$5 + 2\sqrt{2} = 1^2 + 2^2 - 2 \times 1 \times 2 \cos \angle AEB$

$\cos \angle AEB = \frac{-1}{\sqrt{2}}$ ដូច្នេះ $\angle AEB = 135^\circ$ ៥ ឆ្នាំ

ចំណុច (កំណត់): $5 + 2\sqrt{2}$ គេឲ្យ ១ គូសប្រូតូស៍

IV (HS 25)

សំណួរ ១៨:
$$f(n+1) = 2f(n) - f(n-1) + n + 1$$
$$f(n+1) - f(n) = f(n) - f(n-1) + n + 1$$
$$f(n) - f(n-1) = f(n-1) - f(n-2) + n$$

$$f(3) - f(2) = f(2) - f(1) + 3$$
$$f(2) - f(1) = f(1) - f(0) + 2$$

យូរ:
$$f(n+1) = f(n) + (n+1) + n + \dots + 3 + 2$$

$$f(n+1) - f(n) = \frac{1}{2}n[(n+1)+2]$$

$$f(n+1) - f(n) = \frac{1}{2}n(n+3) \quad (1) \quad \text{--- 7 pts}$$

ឆ្លើយ (១):
$$f(n+1) - f(n) = \frac{1}{2}n(n+3)$$
$$f(n) - f(n-1) = \frac{1}{2}(n-1)(n+2)$$

$$f(3) - f(2) = \frac{1}{2} \times 2 \times 5$$

$$f(2) - f(1) = \frac{1}{2} \times 1 \times 4$$

យូរ:
$$f(n+1) = \frac{1}{2} [n(n+3) + (n-1)(n+2) + \dots + 2 \times 5 + 1 \times 4]$$
 7 pts

$$= \frac{1}{2} \left(\sum_{p=1}^n p^2 + \sum_{p=1}^n 3p \right)$$

$$= \frac{1}{2} \left[\frac{1}{6}n(n+1)(2n+1) + 3 \times \frac{1}{2}n(n+1) \right] \quad \text{សំណួរ ២៧} \quad 3 \text{ pts}$$

$$f(n+1) = \frac{1}{6}n(n+1)(n+5) \quad \text{--- 7 pts}$$

សំណួរ ១៩ គឺជា ៣ ឆ្នាំ ១០ ឆ្នាំ ១០ ឆ្នាំ

$$f(n) = \frac{1}{6}(n-1)n(n+4) \quad \text{--- 4 pts}$$

សេចក្តី (គណនា) បន្តបន្ទាប់គ្នា :

- ថា $\sqrt{a} \in \mathbb{Q}$ នោះ a ជាការគ្រាន់
- ថា $\sqrt{a} + \sqrt{b} \in \mathbb{Q}$ នោះ a និង b ជាការគ្រាន់
- ថា $\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c} \in \mathbb{Q}$ នោះ a, b និង c ជាការគ្រាន់

1) ថា $\sqrt{a} \in \mathbb{Q}$

តាម $\sqrt{a} = \frac{p}{q}$, p និង q ជាចំនួនគត់ដែលគ្មានកត្តាស្របគ្នា, $q \neq 0$
 គេបាន: a ជាចំនួនគត់

គេយ p និង q ឱ្យគ្នាទៅជា $p^2 = a q^2$

ឱ្យបាន a ជាចំនួនគត់ដែលគ្មានកត្តាស្របគ្នា $q^2 = 1$

សេចក្តីនេះ $a = p^2$ ជាការគ្រាន់

2) ថា $\sqrt{a} + \sqrt{b} \in \mathbb{Q}$

តាម $\sqrt{a} + \sqrt{b} = r$, $r \in \mathbb{Q}$

ថា $r = 0$ នោះ $a = b = 0$ គេយគេ.

ឱ្យបាន $r \neq 0$

$$\sqrt{b} = r - \sqrt{a} \quad b = r^2 - 2r\sqrt{a} + a$$

$$\sqrt{b} = \frac{r^2 + a - b}{2r} \in \mathbb{Q}$$

តាមក) a ជាការគ្រាន់

$$\text{ឱ្យបាន } \sqrt{b} = \frac{r^2 + b - a}{2r} \in \mathbb{Q}$$

តាមក) b ជាការគ្រាន់

3) ថា $\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c} \in \mathbb{Q}$

តាម $\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c} = \frac{p}{q}$, $\frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$, a, b, c, p, q ជាចំនួនគត់

$$\text{សេចក្តីនេះ } q\sqrt{a} + q\sqrt{b} = p - q\sqrt{c}$$

$$\text{សេចក្តីគេបាន: } 2q^2\sqrt{ab} + 2pq\sqrt{c} = p^2 + q^2(c - a - b)$$

$$\sqrt{4q^4ab} + \sqrt{4p^2q^2c} = p^2 + q^2(c - a - b) \in \mathbb{Q}$$

តាម 2) សេចក្តីនេះ $4q^4ab$ និង $4p^2q^2c$ ជាការគ្រាន់

ឱ្យបាន a ជាការគ្រាន់

ឱ្យ ឱ្យបាន b ជាការគ្រាន់:

$$\sqrt{4q^4a} + \sqrt{4p^2q^2b} = p^2 + q^2(b - a - c) \in \mathbb{Q}$$

$$\sqrt{4q^4bc} + \sqrt{4p^2q^2a} = p^2 + q^2(a - b - c) \in \mathbb{Q}$$

តាម 3) b និង a ជាការគ្រាន់

12

ពិសេស

ប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិរៀនប្រកួតប្រជែងវិទ្យាសាស្ត្រ និង វិជ្ជាជីវៈ ចំណុច ០៨ រូប សំរាប់
ចូលរួមប្រឡងគណិតវិទ្យាអូឡាំព្យាដ លើកទី៣ (១៩-២៣ ឧសភា ២០០៣)

សម័យប្រឡង : ០២-០១-០៣

រយៈពេល : ៣ម៉ោង (១០០នីមួយៗ)

វិធានសំរាប់ថ្ងៃទី២ :

I. (៥ពិន្ទុ) រកចំនួនពិតវិជ្ជមាន x ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការ $x \cdot x^{\frac{1}{x}} = \frac{x^x}{x}$ ។

II. (១៥ពិន្ទុ)

១. f ជាអនុគមន៍កំណត់ដោយ $f(n) = 3^n + 7$ ដែល $n \in \mathbb{N}$ ។

បង្ហាញថា $f(n+1) - f(n)$ ចែកដាច់នឹង ៨ ។

២. បង្ហាញថា $E = \frac{n}{3} + \frac{n^2}{2} + \frac{n^3}{6}$ (ដែល $n \in \mathbb{N}$) ជាចំនួនគត់ធម្មជាតិ។

III. (២៥ពិន្ទុ) g ជាអនុគមន៍ ដែលបំពេញលក្ខណៈ ដូចខាងក្រោម :

(i) $g(n)$ កំណត់ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់វិជ្ជមាន n

(ii) $g(n)$ ជាចំនួនគត់

(iii) $g(2) = 2$

(iv) $g(mn) = g(m) \cdot g(n)$ ចំពោះគ្រប់ m និង n

(v) $g(m) > g(n)$ បើ $m > n$

បង្ហាញថា $g(n) = n$ ចំពោះ $n = 1, 2, 3, \dots$ ។

IV. (២៥ពិន្ទុ) ABC ជាត្រីកោណកែង ក្រវ៉ាត់ A ហើយមានកំពស់ $[AD]$ ។ រង្វង់ច្រើន O_1 និង O_2 ចារឹករៀងគ្នា ក្នុងត្រីកោណ ABD និង ACD ។ បន្ទាត់ (O_1O_2) ជួបជ្រុង $[AB]$ និង $[AC]$ រៀងគ្នា ត្រង់ K និង L ។ តាង S_1 និង S_2 ជាផ្ទៃក្រលារៀងគ្នា នៃត្រីកោណ ABC និង AKL ។

បង្ហាញថា $S_1 \geq 2S_2$ ។

V. (៣០ពិន្ទុ) គេបានជំនួសលេខនីមួយៗដោយអក្សរ នៅក្នុងផលបូក ដូចខាងក្រោម :

$$\begin{array}{r}
 \text{S E V E N} \\
 \text{S E V E N} \\
 + \quad \text{S I X} \\
 \hline
 \text{T W E N T Y}
 \end{array}$$

រកលេខដែលត្រូវជំនួសអក្សរនីមួយៗខាងលើ បើអក្សរនីមួយៗ តាងលេខខុសៗគ្នា ហើយ
ខុសពីលេខ ០ ។

I (ឆ្នាំ 5)

$$\frac{x^2 \cdot x^{\frac{3}{2}}}{x^x} = 1$$

$$x^{2+\frac{3}{2}-x} = 1$$

$$x^{\frac{-x^2+2x+3}{2}} = 1$$

$$x^{\frac{-x^2+2x+3}{2}} = 1$$

- បើ $x = 1$ នោះ: $1^4 = 1$ ផ្ទៀងផ្ទាត់

- បើ $x \neq 1$ នោះ: $-x^2+2x+3 = 0$

ឆ្នាំ ២៨៨

២៨០

$$x = -1; x = 3$$

ដូច្នេះ: សមីការមានចំណុច $x = 1; x = 3$

II (ឆ្នាំ 15)

1. (ឆ្នាំ 5)

$$f(n+1) - f(n) = \left(3^{\frac{2(n+1)}{2n+2}} + 7\right) - \left(3^{\frac{2n}{2n}} + 7\right)$$

$$= 3^{\frac{2n}{2n+2}} - 3^{\frac{2n}{2n}}$$

$$= 3^{\frac{2n}{2n+2}} (3^{\frac{2}{2n+2}} - 1)$$

$$= 8 \cdot 3^{\frac{2n}{2n+2}}$$

ដូច្នេះ: $f(n+1) - f(n)$ តែងតែជាចំនួនគត់

ឆ្នាំ ៥
២៨០

2. (ឆ្នាំ 10)

$$E = \frac{n}{3} + \frac{n^2}{2} + \frac{n^3}{6}$$

$$6E = 2n + 3n^2 + n^3$$

$$= n(n^2 + 3n + 2)$$

$$= n(n+1)(n+2)$$

ដូច្នេះ $n; n+1; n+2$ គឺជាចំនួនគត់បន្តបន្ទាប់គ្នា នោះគេបាន:

$$n(n+1)(n+2) \text{ តែងតែជាចំនួនគត់ } 2$$

$$n(n+1)(n+2) \text{ តែងតែជាចំនួនគត់ } 3$$

ដូច្នេះគេបាន:

$$\text{ដូច្នេះ: } n(n+1)(n+2) \text{ តែងតែជាចំនួនគត់ } 2 \times 3 \text{ គឺ } 6$$

ដូច្នេះ: $6E$ តែងតែជាចំនួនគត់ គឺ E តែងតែជាចំនួនគត់

III (ឆ្នាំ 25)

បញ្ជាក់ $g(n) = 12$ ចំពោះ $n = 1, 2, 3, \dots$

$$+ g(2) = g(1+2) = g(1) \cdot g(2)$$

$$2 = 2 \cdot g(1) \text{ ដូច្នេះ } g(1) = 1$$

ដូច្នេះ ជំហានដំបូង គឺ $n = 1$

+ ឧបលាប ជំហានដំបូង គឺ $n = k$

$$\text{គេបាន } g(k) = k$$

+ គេ ប្រើប្រាស់ ចំពោះ $n = k+1$

$$\bullet \text{ បើ } k+1 = 2l \text{ ដែល } 1 \leq l < k$$

$$g(k+1) = g(2l) = g(2) \cdot g(l) \text{ ព្រោះ } 1 \leq l < k$$

$$= 2l$$

$$g(k+1) = 2l = k+1$$

$$\bullet \text{ បើ } k+1 = 2l+1 \text{ ដែល } 1 \leq l < k$$

គេបាន:

$$2l = g(2l) < g(2l+1) \text{ ព្រោះ } 2l < 2l+1 \quad (1)$$

$$\text{ឯ } g(2l+1) < g(2l+2) \text{ ព្រោះ } 2l+1 < 2l+2 \quad (2)$$

$$\text{តាម (1) \& (2) : } 2l < g(2l+1) < g[2(l+1)]$$

$$2l < g(2l+1) < g(2) \cdot g(l+1)$$

$$2l < g(2l+1) < 2(l+1)$$

$$2l < g(2l+1) < 2l+2$$

ឯ $g(2l+1)$ ជាចំនួនគត់

$$\text{ទាញបាន } g(2l+1) = 2l+1$$


$$g(k+1) = k+1$$

ដូច្នេះ ជំហានដំបូង គឺ $n = k+1$

សរុបគេបាន:

$$g(n) = n \text{ ចំពោះ } n = 1; 2; 3; \dots$$

(ඉදිරිපස)



ආස් $AB = c$, $AC = b$, $BC = a$, $AD = h$

$R_1 = \text{භ්‍යන්තර}(O_1)$, $R_2 = \text{භ්‍යන්තර}(O_2)$

ආශ්‍රිත: $S_1 = \frac{1}{2} a h$ (1)

$S_2 = \frac{1}{2} AK \cdot AL$ (2)

පෙන්වන්න: $AK = AE + EK = AF + EK$ (3) නිසා: $AE = AF$

$AE = AF = AD - FD = h - R_1$ නිසා: $O_1 F D D'$ ස්පර්ශකයක් වන R_1

$O_1 I = O_1 J - IJ = O_1 J - O_2 H$ නිසා: $IJ = O_2 H = R_2$
 $= AE - O_2 H$ නිසා: $O_1 J = AE$

$O_1 I = h - R_1 - R_2$ (4)

$O_2 I = HJ = AH - AJ = AG - O_1 E$ නිසා: $AH = AG$, $AJ = O_1 E$

$O_2 I = AG - O_1 E$ (5)

පෙන්වන්න: $AG = AD - GD = h - R_2$ නිසා: $G O_2 D''$ ස්පර්ශකයක් වන R_2

(5) සමීකරණය $O_2 I = h - R_2 - R_1$ (6)

නමුත් (4) & (6) ආශ්‍රිත $O_1 I = O_2 I = h - R_1 - R_2$

මගින්: $\triangle I O_1 O_2$ ත්‍රිකෝණයේ $\angle I O_1 O_2 = 45^\circ$

ආශ්‍රිත $\angle E K O_1 = \angle I O_2 = 45^\circ$ (ඉදිරිපස)

නිසා $\triangle E K O_2$ සහ $\triangle A K L$ සමකෝණීය වේ

එහෙයින්: $EK = EO_1 = R_1$; $AK = AL$ #

(3): $AK = h - R_1 + R_1 = h$

(2): $S_2 = \frac{1}{2} h^2$

ආශ්‍රිත: $\frac{S_1}{S_2} = \frac{\frac{1}{2} a h}{\frac{1}{2} h^2} = \frac{a}{h} = \frac{a^2}{a h} = \frac{b^2 + c^2}{b c}$ නිසා: $a^2 = b^2 + c^2$; $a h = b c$

$= \frac{b}{c} + \frac{c}{b} \geq 2$ සමානතාව $S_1 \geq 2 S_2$ (5)

V (ឆ្នាំ 30)

- គេបានដឹងថា : $T = 1$ ឬ $T = 2$ (ចំពោះ $S + S = 10$ ឬ 11)
 បើ $T = 2$ គេបានដឹងថា $S = E = 9$ ដូច្នេះចម្លើយគឺ (ប.ក. 100 + 9)

ដូច្នេះ : $(T = 1)$ 3 ប្រការ

- បើ $T = 1$ គេបានដឹងថា $S \geq 5$

- បើ x ជាការប្រើប្រាស់ប្រាក់កម្ចីក្នុងប្រាក់បញ្ញើ គេបានដឹងថា :

$$2E + x = 100 + E \quad \text{ដែល } 0 \leq E < 9, 0 \leq x \leq 1, 0 \leq x \leq 2$$

$$E = 100 - x$$

• បើ $x = 0$ គេបានដឹងថា $E = 100$ ដូច្នេះចម្លើយគឺ $E = 0$ គេបានដឹងថា $E < 0$

• បើ $x = 1$ គេបានដឹងថា $E = 99$

+ បើ $x = 0$ គេបានដឹងថា $E = 100$ ដូច្នេះចម្លើយគឺ

+ បើ $x = 1$ គេបានដឹងថា $E = 99$ ដូច្នេះចម្លើយគឺ

+ បើ $x = 2$ គេបានដឹងថា $E = 98$ ដូច្នេះចម្លើយគឺ $E = 8$ ដូច្នេះចម្លើយគឺ (ប.ក. 100 + 8)

- បើ $E = 9$ គេបានដឹងថា $S = 1$ ដូច្នេះចម្លើយគឺ $S = 1$

បើ $S = 5$ គេបានដឹងថា $S \geq 5$ (គេបានដឹងថា $S = 8$ ដូច្នេះចម្លើយគឺ $S = 9$)

• បើ $S = 5$ គេបានដឹងថា $S + S + 1 = 5 + 5 + 1 = 11$

ដូច្នេះចម្លើយគឺ $W = 1$ ដូច្នេះចម្លើយគឺ $T = 1$ ដូច្នេះចម្លើយគឺ

• បើ $S = 7$ គេបានដឹងថា :

បើ $S = 7$

បើ $S = 7$ គេបានដឹងថា $S = 7$

គេបានដឹងថា $S = 7$

$$V \geq 6 \quad \text{ដែល } V \neq 7; V \neq 8; V \neq 9 \quad \text{ដូច្នេះ } V = 6$$

+ បើ $V = 6$ គេបានដឹងថា $N = 0$; $N = 1$ (1 ឬ 10)

ក្នុងករណី $N = 1$ គេបានដឹងថា $T = 1$ ដូច្នេះចម្លើយគឺ

ក្នុងករណី $N = 0$ គេបានដឹងថា $X = Y$ ដូច្នេះចម្លើយគឺ $X \neq Y$

ដូច្នេះចម្លើយគឺ $S = 7$ ដូច្នេះចម្លើយគឺ $S = 6$ 3 ប្រការ

- បើ $S = 6$ គេបានដឹងថា $V = 3$ ដូច្នេះចម្លើយគឺ $6 + 6 + 1 = 13$

- បើ $S = 6$ គេបានដឹងថា $N \neq 0$ ដូច្នេះចម្លើយគឺ $S = 6$ ដូច្នេះចម្លើយគឺ $S = 6$

5

ប្រធានប្រឹក្សាសិស្សស្រុកប្រចាំឆ្នាំ ២០០៣

ថ្ងៃទី ០១ ~ ៤ ~ ២០០៣

វិញ្ញាបនាធិបតី:

គណៈកម្មាធិការជាតិរៀនសូត្រ

ហត្ថលេខា
ស្នាក់ការ គណៈកម្មាធិការ
TEL: 011 953 029

20P I ក) គេអោយចំនួន $A = \underbrace{11 \dots 11}_{n+1 \text{ តួ } 1}$ $B = \underbrace{11 \dots 11}_{2n \text{ តួ } 1}$ $C = \underbrace{66 \dots 66}_{n \text{ តួ } 6}$

ស្រាយបញ្ជាក់ថា $A + B + C + 8$ ជាការប្រាកដ ។

ខ) គណនាផលបូក $S = \sqrt{1 + \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2}} + \sqrt{1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2}} + \dots + \sqrt{1 + \frac{1}{2002^2} + \frac{1}{2003^2}}$

20P II ក) គេអោយ a, b, c ផ្ទៀងផ្ទាត់ $\begin{cases} a+b+c=0 \\ ab+bc+ca=0 \end{cases}$

គណនាតំលៃនៃកន្សោម

$$A = (a-1)^{2001} + b^{2002} + c^{2003}$$

ខ) រក 11 ចំនួនមិនអវិជ្ជមាន ដែលចំនួននីមួយៗ ស្មើនឹងការេ នៃផលបូក 10 ចំនួនផ្សេងទៀត ។

10P III ស្រាយបញ្ជាក់ថា បើផលគុណរវាងមួយនៃសមីការ $x^2 + ax + 1 = 0$ ជាមួយវិសណមួយនៃសមីការ $x^2 + bx + 1 = 0$ ជាវិសនៃសមីការ $x^2 + abx + 1 = 0$ ទោះ $\frac{4}{a^2b^2} - \frac{1}{a^2} - \frac{1}{b^2} = 2$

10P IV យក a, b, c ជាប្រវែងជ្រុង និង A, B, C ជាមុំនៃត្រីកោណ ABC , S ជាក្រលាផ្ទៃត្រីកោណ ABC ។
ស្រាយបញ្ជាក់ថា $\cot A + \cot B + \cot C = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{4S}$

10P V ស្រាយបញ្ជាក់ថាកន្សោម $10^n + 18n - 1$ ចែកដាច់នឹង 27 ចំពោះ n ជាចំនួនគត់ធម្មជាតិ ។

30P VI ក) គេអោយជ្រុងនៃការេ $ABCD$ មានរង្វាស់ស្មើ 1 ។ នៅលើ ជ្រុង $[AB]$, $[AD]$ គេដាក់ចំនុច P និង Q ដែលបរិមាត្រ ត្រីកោណ APQ ស្មើ 2 ។ គណនា មុំ $\widehat{PCQ}$
ខ) គេអោយចតុកោណប៉ោង $ABCD$ មានក្រលាផ្ទៃ S និងកន្លះបរិមាត្រ ស្មើ 2 ។
ស្រាយបញ្ជាក់ថា $S \leq 1$ ។

១០) គណនាផលបូកនៃ

១. ក. គណនាផលបូកនៃ $A+B+C+8$

១០) គណនាផលបូកនៃ

$$A = \underbrace{111\dots1}_{(n+1) \text{ ខ្ទង់}} = \frac{99\dots9}{9} = \frac{10^{n+1}-1}{9}$$

$$B = \underbrace{11\dots11}_{2n \text{ ខ្ទង់}} = 10^{2n-1} + 10^{2n-2} + \dots + 10^1 + 1 = \frac{10^{2n}-1}{9}$$

$$C = \underbrace{66\dots66}_{n \text{ ខ្ទង់}} = 6 \cdot \frac{10^n-1}{9}$$

ដូច្នេះ: $A+B+C+8$

$$= \frac{10^{n+1}-1}{9} + \frac{10^{2n}-1}{9} + 6 \cdot \frac{10^n-1}{9} + 8$$

$$= \frac{10^{n+1} + 10^{2n} + 6 \cdot 10^n - 8 + 72}{9}$$

$$= \frac{1}{9} (10^{2n} + 16 \cdot 10^n + 64)$$

$$= \frac{1}{9} (10^n + 8)^2$$

$$= \left(\frac{10^n + 8}{3} \right)^2 = \underbrace{33\dots36}_{(n+1) \text{ ខ្ទង់}}$$

១១) គណនាផលបូកនៃ

$$S = \sqrt{1 + \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2}} + \sqrt{1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2}} + \dots + \sqrt{1 + \frac{1}{2002^2} + \frac{1}{2003^2}}$$

$$\text{ដូច្នេះ: } S = \sum_{n=1}^{2002} \sqrt{1 + \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2}}$$

$$S = \sum_{n=1}^{2002} \sqrt{\frac{n^4 + 2n^3 + n^2 + n^2 + 2n + 1 + n^2}{n^2(n+1)^2}}$$

$$= \sum_{n=1}^{2002} \sqrt{\frac{n^4 + 2n^3 + 3n^2 + 2n + 1}{n^2(n+1)^2}}$$

$$= \sum_{n=1}^{2002} \sqrt{\frac{(n^2+n+1)^2}{n^2(n+1)^2}}$$

$$= \sum_{n=1}^{2002} \frac{n^2+n+1}{n(n+1)}$$

$$= \sum_{n=1}^{2002} \left(1 + \frac{1}{n(n+1)} \right)$$

$$= 2002 + \sum_{n=1}^{2002} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$$

$$= 2002 + 1 - \frac{1}{2003}$$

$$S = 2003 + \frac{1}{2003} = \frac{2002 \times 2004 + 1}{2003}$$

២០) ក) គណនាផលបូកនៃ $A = (a-1) + b + c$

១០) គណនា $a+b+c=0$; $ab+bc+ca=$

$$\text{ដោយ: } (a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2(ab+bc+ca)$$

$$\text{ដូច្នេះ } a^2 + b^2 + c^2 = 0$$


$$\text{ដូច្នេះ } a = b = c = 0$$

$$\text{ដូច្នេះ: } A = (a-1) + b + c$$

$$A = -1$$

1) ប្រែប្រួលក្នុងក្រុង:

$$2) \cot A + \cot B + \cot C = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{4S}$$



ក្នុងក្រុង ក្នុងក្រុង ត្រីកោណ Sine:

$$a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

$$= b^2 + c^2 - 4 \cdot \frac{1}{2} bc \sin A \cdot \frac{\cos A}{\sin A}$$

$$a^2 = b^2 + c^2 - 4S \cot A$$

$$b^2 = a^2 + c^2 - 4S \cot B$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 4S \cot C$$

$$\text{បញ្ជាក់: } a^2 + b^2 + c^2 = 2(a^2 + b^2 + c^2) - 4S(\cot A + \cot B + \cot C)$$

$$\text{ដូច្នេះ: } 4S(\cot A + \cot B + \cot C) = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{2}$$

$$\cot A + \cot B + \cot C = \frac{a^2 + b^2 + c^2}{4S}$$

ប្រែប្រួល 10ⁿ + 18n - 1 វិចារណៈ ១២

1) គ្រប់ n ជាចំនួនគត់វិជារណៈ

វិជារណៈ: n > 1 : ឆ្លើយ:

$$10^n - 1 + 18n$$

$$(10-1)(10^{n-1} + 10^{n-2} + \dots + 10 + 1) + 18n$$

$$9(10^{n-1} + 10^{n-2} + \dots + 10 + 1 + 2n)$$


$$9(10^{n-1} + 10^{n-2} + \dots + 10 + 1 - n + 3n)$$

$$9[(10^{n-1}-1) + (10^{n-2}-1) + \dots + (10-1) + (1-1) + 3n]$$

ឆ្លើយ 10^k - 1 វិចារណៈ ៣
3n វិចារណៈ ៣:

ឆ្លើយ: 10ⁿ + 18n - 1 វិចារណៈ ១២

(VI) ក)
(10)



ក្នុងក្រុង P, C, G

$$\text{កាត់សរុបគ្នា: } AG + AP + PQ = 2 \quad (1)$$

$$\text{ក៏ } AG + GD = 1$$

$$AP + PB = 1$$

$$AG + GD + AP + PB = 2 \quad (2)$$

$$(1) \text{ ដក } (2): PG = PB + GD$$

ក៏ (PG) ជាចំនួនគត់វិជារណៈ

$$MP = PB; DG = GM$$

ក៏ក៏បង្ហាញ [DA] ជាចំនួនគត់វិជារណៈ

$$DE = PB$$

កាត់សរុប: Δ PBC ≅ Δ CDE

$$\text{នាំគ្នា } CP = CE$$

ឆ្លើយ: Δ CPG ≅ Δ CGE (ក្នុងក្រុង)

$$\text{វិជារណៈ } \widehat{CGD} = \widehat{CGE}$$

នាំគ្នា Δ CMG ក៏ក៏ក្នុងក្រុង M

$$\text{ឆ្លើយ } \Delta CDG \cong \Delta CMG,$$

$$\Delta CHP \cong \Delta CPB$$


$$\text{នាំគ្នា } \widehat{GCD} = \widehat{GCM}; \widehat{MCP} = \widehat{PCB}$$

$$\text{ឡ } \widehat{PCG} = \frac{\widehat{C}}{2} = 45^\circ$$

$$\boxed{\widehat{PCG} = 45^\circ}$$

១) (ប្រយោគកាស៊ី) $S \leq 1$

(២០)



កាស៊ី ABCD គឺជាការកាស៊ី ឬ ឆ្នាំ

ឬ $AB = a$; $BC = b$; $CD = d$
 $AD = d$ កាស៊ី

$$S_{ABCD} = S_{ABC} + S_{ACD}$$

$$S = \frac{1}{2} ab \sin \hat{B} + \frac{1}{2} cd \sin \hat{D}$$

$$2S \leq \frac{1}{2} ab + cd \quad (1)$$

ឬ $S_{ABCD} = S_{ABD} + S_{BCD}$

$$S = \frac{1}{2} ad \sin \hat{A} + \frac{1}{2} bc \sin \hat{C}$$

$$2S \leq ad + bc \quad (2)$$

$$(1) + (2) : 4S \leq (ab + cd) + (ad + bc)$$

$$\leq a(b + d) + c(b + d)$$

$$4S \leq (a + c)(b + d)$$

កាស៊ី Cauchy : $2\sqrt{(a + c)(b + d)}$

$$4S \leq (a + c)(b + d) \leq \left(\frac{a + c + b + d}{2} \right)^2$$

$$\leq 4$$

$$\boxed{S \leq 1} \quad (p=2)$$

ហ៊ុន សែក

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលស្ថាប័ន

ថ្ងៃទី ០១ ខែ ៤ ឆ្នាំ ២០០៣

វិញ្ញាបនបត្រ: គណិតវិទ្យាឆ្នាំទី១២ រយៈពេល ៣ឆ្នាំ

10P I រកគ្រប់បណ្តាវិស ជាចំនួនពិត នៃសមីការ $\sqrt{x+2002}\sqrt{x+2002}\sqrt{x+\dots+2002}\sqrt{x+2002}\sqrt{2003x} = x$
(n រ៉ាឌីកាល់)

10P II គេអោយ $S = 1.2.3 + 2.3.4 + 3.4.5 + \dots + n(n+1)(n+2)$
ស្រាយបញ្ជាក់ថា $4S + 1$ ជាការប្រាកដចំពោះគ្រប់ចំនួនគតិវិជ្ជមាន n ។

15P III គេអោយ n ជាចំនួនគតិវិជ្ជមាន និង $n \geq 3$ ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថាចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត $x \neq 0$
គេបានជាមធ្យម $(1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+\dots+\frac{x^n}{n!})(1-x+\frac{x^2}{2!}-\frac{x^3}{3!}+\dots-\frac{x^n}{n!}) < 1$

30P IV. ក) គេអោយចតុកោណប៉ោង ABCD ។ អង្កត់ទ្រូងទាំងពីរនៃចតុកោណកាត់គ្នាត្រង់ P ។ ចំងាយពីចំនុច A, B, P
ទៅបន្ទាត់ (CD) រៀងគ្នាស្មើ a, b, p ហើយ $CD = c$ ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថា $S_{ABCD} = \frac{1}{2p}abc$

ខ) តាមចំនុចមួយនៅក្នុងត្រីកោណ តូចបន្ទាត់ 3 ស្របជាមួយជ្រុងនៃត្រីកោណ ។ បន្ទាត់ទាំងនេះចែកត្រីកោណ
ជា 6 ចំនែក ក្នុងនោះ មាន 3 ចំនែកជាត្រីកោណ ដោយក្រលាផ្ទៃ S_1, S_2, S_3 ។ គណនាក្រលាផ្ទៃ
ត្រីកោណដែលអោយជាអនុគមន៍នៃ S_1, S_2, S_3 ។

15P V គេអោយស្វ៊ីត (U_n) ផ្សេងជាត់
$$\begin{cases} U_0 = \frac{\sqrt{2}}{2} \\ U_{n+1} = \frac{\sqrt{2}}{2} \sqrt{1 - \sqrt{1 - U_n^2}} \end{cases} ; n \geq 0$$

កំនត់កន្សោមនៃ U_n ជាអនុគមន៍នៃ n ។

10P VI. ដោះស្រាយសមីការខាងក្រោម

ក) $(\cos 72^\circ)^x + (\cos 36^\circ)^x = 3 \cdot 2^x$

ខ) $4^{x^2+x} + 2^{1-x^2} = 2^{(x+1)^2} + 1$

10P VII ស្រាយបញ្ជាក់ថា $\underbrace{\sqrt{6+\sqrt{6+\sqrt{6+\dots+\sqrt{6+\sqrt{6}}}}}}_{n \text{ រ៉ាឌីកាល់}} + \underbrace{\sqrt{30+\sqrt{30+\sqrt{30+\dots+\sqrt{30+\sqrt{30}}}}}}_{n \text{ រ៉ាឌីកាល់}} < 9$

កត្តាកំណត់និក្ខេបសាមីក្រ

កត្តាកំណត់និក្ខេបសាមីក្រ

ល.ន. $x > 0$

$$y_1^2 = 2\cos x = x + 2\cos 2x \quad (1)$$

$$y_2^2 = x + 2\cos 2y_1 \quad (2)$$

$$y_3^2 = x + 2\cos 2y_2 \quad (3)$$

...

$$y_n^2 = x + 2\cos 2y_{n-1} \quad (n)$$

ចំពោះ ចំពោះ គ្រប់ $y_k > 0 \quad (k=1, n)$

ដោយសារតែ $y_n = x$

ដោយសារតែ $y_1 = x$

ដោយសារតែ $x > y_1$

$$\text{យក (1) - (2): } 2\cos 2(x - y_1) > 0$$

នោះ $y_1 > y_2$ បញ្ចប់បញ្ហា

ដោយ (2) និង (3); ...

នោះ $y_2 > y_3 > \dots > y_n$

នោះ $x > y_1$ នោះ $x > y_n$

ដោយសារតែ $y_n = x$

ដោយសារតែ $x < y_1$ នោះ $x < y_n$

ដោយសារតែ $y_n = x$

$$y_1^2 = 2\cos 3x \quad \text{នោះ } 2\cos 3x = x$$

$$y_1 = x$$

$$x = 0 \quad \vee \quad x = 2\cos 3$$

(10)

$$S = 1.2.3 + 2.3.4 + \dots + n(n+1)(n+2)$$

$$\text{ពិចារណា: } k(k+1)(k+2)$$

$$= \frac{1}{4} k(k+1)(k+2) [(k+3) - (k-1)]$$

$$= \frac{1}{4} k(k+1)(k+2)(k+3) - \frac{1}{4} (k-1)k(k+1)(k+2)$$

$$\text{សម្រាប់ } k=1 : 1.2.3 = \frac{1}{4} 1.2.3.4 - 0$$

$$k=2 : 2.3.4 = \frac{1}{4} 2.3.4.5 - \frac{1}{4} 1.2.3$$

$$k=3 : 3.4.5 = \frac{1}{4} 3.4.5.6 - \frac{1}{4} 2.3.4$$

...

$$k=n : n(n+1)(n+2) = \frac{1}{4} n(n+1)(n+2)(n+3) - \frac{1}{4} (n-1)n(n+1)(n+2)$$

$$\text{បញ្ចប់: } S = \frac{1}{4} n(n+1)(n+2)(n+3)$$

$$\text{នោះ } 4S+1 = n(n+1)(n+2)(n+3)+1$$

$$= (n^2+3n)(n^2+3n+2)+1$$

$$= [(n^2+3n)^2 + 2(n^2+3n)+1]$$

$$4S+1 = [n^2+3n+1]^2$$

(11) គ្រោងបញ្ហា គ្រប់ចំណុច $x \neq 0$

(12) កត្តាកំណត់និក្ខេបសាមីក្រ $n \geq 3$

$$\text{នោះ } (1+x+\frac{x^2}{2!}+\dots+\frac{x^n}{n!})(1-x+\frac{x^2}{2!}-\dots-\frac{x^n}{n!})$$

$$\text{នោះ } F(x) = f(x) \cdot g(x)$$

ដោយសារតែ $F(x) < 1$ គ្រប់ $x \in \mathbb{R}$

$$\text{យក } f(x) = 1+x+\frac{x^2}{2!}+\dots+\frac{x^n}{n!}$$

$$f'(x) = 1+x+\dots+\frac{x^{n-1}}{(n-1)!}$$

$$f'(x) = f(x) - \frac{x^n}{n!}$$

$$g(x) = 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \dots - \frac{x^n}{n!}$$

$$g'(x) = -1 + x - \frac{x^2}{2!} + \dots - \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}$$

$$= -(1 - x + \frac{x^2}{2!} - \dots - \frac{x^n}{n!}) - \frac{x^n}{n!}$$

$$= -g(x) - \frac{x^n}{n!}$$

ឆ៖ $F(x) = f(x) \cdot g(x)$

$$F'(x) = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$$


$$= [f(x) - \frac{x^n}{n!}] g(x) + f(x) [-g(x) - \frac{x^n}{n!}]$$

$$= -\frac{x^n}{n!} g(x) - \frac{x^n}{n!} f(x)$$


$$= -\frac{x^n}{n!} [g(x) + f(x)]$$

$$= -\frac{x^n}{n!} (1 + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} + \dots + \frac{x^{n-1}}{(n-1)!})$$

(កត់សម្គាល់, $n > 3$)



ដូច្នេះ $F(x) < 1$ (គ្រប់ $x \neq 0$)



ឆ៖ $S_{APB} = S_1$, $S_{BPC} = S_2$, $S_{CPA} = S_3$

ឆ៖ $S_{APD} = S_4$ ចាត់តាំងដូចខាងលើ៖

$$\frac{S_{APD}}{S_{CDP}} = \frac{S_3 + S_4}{S_3} = \frac{a}{p}$$

$$S_{BCD} = S_2 + S_3 = \frac{1}{2} bc$$

ក្នុងករណីនេះ៖ $\frac{(S_3 + S_4)(S_2 + S_3)}{(1 + \frac{S_4}{S_3})(S_2 + S_3)} = \frac{1}{2p} abc$

$$S_2 + S_3 + S_4 + \frac{S_2 S_4}{S_3} = \frac{1}{2p} abc$$

យើងដឹង (តាមលក្ខណៈ) $\frac{S_2 S_4}{S_3} = S_1$

ឆ៖ (តាមលក្ខណៈ) $\frac{S_4}{S_3} = \frac{S_1}{S_2}$

ហេតុ $\frac{S_1}{S_2} = \frac{AP}{PC}$ (1)

$\frac{S_4}{S_3} = \frac{AP}{PC}$ (2)

(1) និង (2) គេបាន $\frac{S_1}{S_2} = \frac{S_4}{S_3}$


ឬ $S_1 = \frac{S_2 S_4}{S_3}$

(*) $S_2 + S_3 + S_4 + S_1 = \frac{1}{2p} abc$

ដូច្នេះ៖ $S = \frac{1}{2p} abc$

២)

(15)



F ជាចំណុចក្នុង $\triangle ABC$ ដែល
 $(DE) \parallel (BC)$, $(PG) \parallel (CA)$
 $(HN) \parallel (AB)$ ជាប់ $D, G \in [AB]$
 $H, E \in [AC]$; $N, P \in [BC]$ ។
 រួមគ្នា (ត្រីកោណ) : $\triangle ABC$, $\triangle FNP$
 $\triangle MEF$ និង $\triangle DQF$ ជា S, S_1, S_2, S_3
 តើយើងត្រូវការសាងសង់ 4 ជំនួញ

ជំនួញទី ១: $\frac{S_1}{S} = \left(\frac{NP}{BC}\right)^2$

$\therefore \frac{\sqrt{S_1}}{\sqrt{S}} = \frac{NP}{BC}$

ជំនួញទី ២: $\frac{\sqrt{S_2}}{\sqrt{S}} = \frac{EF}{BC} = \frac{PC}{BC}$

$\frac{\sqrt{S_3}}{\sqrt{S}} = \frac{DF}{BC} = \frac{BN}{BC}$

បញ្ជាក់: $\frac{\sqrt{S_1} + \sqrt{S_2} + \sqrt{S_3}}{\sqrt{S}} = \frac{NP + PC + BN}{BC}$
 $= \frac{BC}{BC} = 1$

ដូច្នេះ $\sqrt{S} = \sqrt{S_1} + \sqrt{S_2} + \sqrt{S_3}$
 $S = (\sqrt{S_1} + \sqrt{S_2} + \sqrt{S_3})^2$

ជំនួញ (U_n) ត្រូវបានកំណត់

$U_0 = \frac{\sqrt{2}}{2}$

$U_{n+1} = \frac{\sqrt{2}}{2} \sqrt{1 - \sqrt{1 - U_n^2}}; n \geq 0$

កំណត់តម្លៃ U_n ជាអនេក្សន៍នៃ n

$U_0 = \frac{\sqrt{2}}{2} = \sin \frac{\pi}{4}$

$U_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} \sqrt{1 - \sqrt{1 - U_0^2}}$

$U_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} \sqrt{1 - \sqrt{1 - \sin^2 \frac{\pi}{4}}}$
 $= \frac{\sqrt{2}}{2} \sqrt{1 - \sqrt{\cos^2 \frac{\pi}{4}}}$
 $= \frac{\sqrt{2}}{2} \sqrt{1 - \cos \frac{\pi}{4}}$
 $= \frac{\sqrt{2}}{2} \sqrt{2 \sin^2 \frac{\pi}{8}} = \sin \frac{\pi}{8}$

រួមគ្នា $U_k = \sin \frac{\pi}{2^{k+2}}$ (10)

សំណួរ $U_{k+1} = \frac{\sqrt{2}}{2} \sqrt{1 - \sqrt{1 - \sin^2 \frac{\pi}{2^{k+2}}}}$
 $= \frac{\sqrt{2}}{2} \sqrt{1 - \cos \frac{\pi}{2^{k+2}}}$
 $= \frac{\sqrt{2}}{2} \sqrt{2 \sin^2 \frac{\pi}{2^{k+3}}}$
 $= \sin \frac{\pi}{2^{k+3}}$ គឺ (5)

តាមនិយមន័យ: $U_n = \sin \frac{\pi}{2^{n+2}}$

VI តាមប្រែប្រួលនៃការ:

(5) ក) $(\cos 72^\circ)^x + (\cos 36^\circ)^x = 3 \cdot 2^{-x}$

គណនា: $(2 \cos 72^\circ)^x + (2 \cos 36^\circ)^x = 3 \quad (1)$

យើង: $2 \cos 72^\circ \cdot 2 \cos 36^\circ$
 $= \frac{2 \sin 36^\circ \cos 36^\circ \cdot 2 \cos 72^\circ}{\sin 36^\circ}$
 $= \frac{\sin 72^\circ \cdot 2 \cos 72^\circ}{\sin 36^\circ} = \frac{\sin 144^\circ}{\sin 36^\circ}$
 $= \frac{\sin (180^\circ - 36^\circ)}{\sin 36^\circ} = \frac{\sin 36^\circ}{\sin 36^\circ} = 1$

ហេតុនេះ: $(2 \cos 72^\circ)^x \cdot (2 \cos 36^\circ)^x = 1$

តាម (1) និង (2), ប្រើកំណត់តម្លៃ
 $(2 \cos 72^\circ)^x$ និង $(2 \cos 36^\circ)^x$ ជាអនេក្សន៍នៃ t
 $t^2 - 3t + 1 = 0 \quad (3)$

សមីការ (១) មានរឹស $t_1 = \frac{3-\sqrt{5}}{2}$
 $t_2 = \frac{3+\sqrt{5}}{2}$

កត់តម្លៃជំនាស់៖ $2\cos 72^\circ = 2\sin 18^\circ = \frac{\sqrt{5}-1}{2}$

ក៏ដូចជា $\left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)^2 = \frac{3-\sqrt{5}}{2} = \left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)^2$

$x = 2$

$\left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)^2 = \frac{3+\sqrt{5}}{2} = \left(\frac{\sqrt{5}-1}{2}\right)^{-2}$

$x = -2$

ដូច្នេះ សមីការមានរឹសពីរ៖

$x = 2$
 $x = -2$

១) $4 \frac{x^2+x}{2} + 2 \frac{1-x^2}{2} = 2 \frac{(x+1)^2}{2} + 1$
 $\frac{2(x^2+x)}{2} + \frac{1-x^2}{2} - 2 \frac{(x+1)^2}{2} - 1 = 0$
 $\frac{2(x^2+x)}{2} + \frac{1-x^2}{2} - 2 \frac{(x^2+x)}{2} - \frac{1-x^2}{2} - 1 = 0$
 $\frac{2(x^2+x)}{2} (1-2) - (1-2) \frac{1-x^2}{2} = 0$
 $(1-2) \frac{1-x^2}{2} (2 - 1) = 0$
 $1-2 \frac{1-x^2}{2} = 0$ ឬ $1-x^2 = 0$
 $x = \pm 1$

$\frac{2(x^2+x)}{2} - 1 = 0$

$2(x^2+x) = 0$ ឬ $x = 0$
 $x = -1$

ដូច្នេះ សមីការមានរឹសបីគឺ៖

$x = 0; x = -1; x = 1$

VII ស្វ័យបញ្ជាក់៖

10) $\sqrt{6+\sqrt{6+\dots\sqrt{6}}} + \sqrt{30+\sqrt{30+\dots\sqrt{30}}}$

ចម្លើយ

$\sqrt{6+\sqrt{6+\dots\sqrt{6}}} < \sqrt{6+\sqrt{6+\dots\sqrt{9}}} < 3$

$\sqrt{30+\sqrt{30+\dots\sqrt{30}}} < \sqrt{30+\sqrt{30+\dots\sqrt{36}}} < 6$

ដូច្នេះ៖

$\sqrt{6+\sqrt{6+\dots\sqrt{6}}} + \sqrt{30+\sqrt{30+\dots\sqrt{30}}} < 9$

6

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសិស្សក្រសួងអប់រំ
ផ្នែកគណនេយ្យវិទ្យា គណនេយ្យ ប្រចាំឆ្នាំ
ឆ្នាំគតិ ៩ ទី១៩ ១២ ឆ្នាំសិក្សា ២០០៣-២០០៤
សម័យប្រជុំ: ១១.៥.០៤

វិទ្យាស្ថាន
អធិការ គណនេយ្យវិទ្យា
TEL: 011 953 029

វិទ្យាសា គណនេយ្យវិទ្យា ឆ្នាំគតិ ១២ លើកទី១ ថ្ងៃទី ១១.៥.០៤ (សេចក្តី ៣ ទំព័រ ១)

១-(ពិន្ទុ១០) គេចែកការមួយដែលមានជ្រុងប្រវែង ៣ ឯកតា ជា ១ ក្រលាប៉ុន្មានគ្នា។

ចូរយកចំនួនគតិ 1 ដល់ 9 ទៅបំពេញក្នុងក្រលាទាំង ១ នោះដើម្បីអោយបានផលបូកចំនួនតាមជួរដេកនីមួយៗស្មើ 15 ផលបូកចំនួនតាមជួរឈរនីមួយៗស្មើ 15 ហើយផលបូកចំនួនតាមអង្កត់ទ្រូងនីមួយៗស្មើ 15 ដែលក្រលានីមួយៗមាន ចំនួនគតិមួយគត់ហើយខុសគ្នា។

២-(ពិន្ទុ១០) កំនត់វិសមភាពនៃសមីការ $x^{2004} + 3x^{2002} - 10x^{2000} = 4x^{2003} - 8x^{2001}$ នៅក្នុងសំនុំចំនួនពិត។

៣-(ពិន្ទុ១០) បង្ហាញថា $1^n + 8^n - 3^n - 6^n$ ចែកដាច់នឹង 10 ចំពោះគ្រប់ចំនួនគតិវិជ្ជមាន n ។

៤-(ពិន្ទុ១០) n ជាចំនួនគតិវិជ្ជមាន។ (u_n) ជាស្ថិតនព្វន្ត ហើយ (v_n) ជាស្ថិតចរណីមាត្រ ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ :

$$u_{m+1} = v_{m+1} = a$$

$$u_{n+1} = v_{n+1} = b$$

$$u_{p+1} = v_{p+1} = c \quad \text{ដែល } a > 0; b > 0; c > 0$$

$$\text{បង្ហាញថា } (a^{b-c})(b^{c-a})(c^{a-b}) = 1$$

៥-(ពិន្ទុ១៥) បង្ហាញថា គ្មានចំនួនគតិ x ; y ; z ណាដែលផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការ $x^2 + y^2 - 8z = 6$ ទេ។

$$៦-(ពិន្ទុ២០) \text{ អនុគមន៍ } f \text{ កំនត់ដោយ } y = f(x) = \sqrt[3]{\frac{x^3 - 3x + (x^2 - 1)\sqrt{x^2 - 4}}{2}} + \sqrt[3]{\frac{x^3 - 3x - (x^2 - 1)\sqrt{x^2 - 4}}{2}}$$

គណនាតំលៃនៃ $f(\sqrt[3]{2004})$ ។

៧-(ពិន្ទុ២៥) M ជាចំនុចមួយស្ថិតនៅលើជ្រុង [AC] នៃត្រីកោណ ABC មួយដែលមានផ្ទៃក្រលា a^2 ។

r_1 និង r_2 ជាកាំរៀងគ្នានៃរង្វង់ចារឹកក្នុងត្រីកោណ ABM និង BCM ។

$$\text{ក្នុងករណីដែល } r_1 = r_2 \text{ បង្ហាញថា } BM^2 = a^2 \cot\left(\frac{B}{2}\right)$$

(B ជារង្វាស់មុំក្នុងត្រីកោណ ABC ត្រង់កំពូល B)

គណិតវិទ្យា
វិទ្យាសាលា សំរាប់ថ្ងៃទី ១១-៤-០៤

១-(ពិន្ទុ១០)

4	9	2
3	5	7
8	1	6

2	7	6
9	5	1
4	3	8

២-(ពិន្ទុ១០) កំនត់រើសចំបំផុតនៃសមីការ :

គេបាន : $x^{2000}(x^4 - 4x^3 + 3x^2 + 8x - 10) = 0$

$x^{2000}(x^4 - 4 - 4x^3 + 8x + 3x^2 - 6) = 0$

$x^{2000}[(x^2 - 2)(x^2 + 2) - 4x(x^2 - 2) + 3(x^2 - 2)] = 0$

$x^{2000}(x^2 - 2)(x^2 - 4x + 5) = 0$

$x^{2000} = 0$ នោះ $x = 0$

$x^2 - 2 = 0$ នោះ $x = \pm\sqrt{2}$

$x^2 - 4x + 5 = 0$ មាន $\Delta' = -1$

សមីការមានរើសចំបំផុត $x = \sqrt{2}$

៣-(ពិន្ទុ១០) បង្ហាញថា $1^n + 8^n - 3^n - 6^n$ ចែកដាច់នឹង 10 :

តាង $S = 1^n + 8^n - 3^n - 6^n$

គេបាន $S = (1-3)(1+3+\dots+3^{n-1}) + (8-6)(8^{n-1} + 8^{n-2} \cdot 6 + \dots + 6^{n-1})$

$S = (-2)(1+3+\dots+3^{n-1}) + (2)(8^{n-1} + 8^{n-2} \cdot 6 + \dots + 6^{n-1})$

$S = 2p$; $p = -1-3-\dots-3^{n-1} + 8^{n-1} + 8^{n-2} \cdot 6 + \dots + 6^{n-1}$

ដូចនេះ S ចែកដាច់នឹង 2 (1)

ម្យ៉ាងទៀត :

$S = (1^n - 6^n) \div (8^n - 3^n)$

$S = (1-6)(1+6+\dots+6^{n-1}) + (8-3)(8^{n-1} + 8^{n-2} \cdot 3 + \dots + 3^{n-1})$

$S = (-5)(1+6+\dots+6^{n-1}) + (5)(8^{n-1} + 8^{n-2} \cdot 3 + \dots + 3^{n-1})$

$S = 5q$; $q = -1-6-\dots-6^{n-1} + 8^{n-1} + 8^{n-2} \cdot 3 + \dots + 3^{n-1}$

ដូចនេះ S ចែកដាច់នឹង 5 (2)

តាង (1) និង (2) គេបាន

$1^n + 8^n - 3^n - 6^n$ ចែកដាច់នឹង 10

៤-(ពិន្ទុ១០) បង្ហាញថា $(a^{b-c})(b^{c-a})(c^{a-b}) = 1$

គេមាន:

$$a = u_1 + md = v_1 q^m$$

$$b = u_1 + nd = v_1 q^n$$

$$c = u_1 + pd = v_1 + q^p$$

$$b - c = d(n - p); c - a = d(p - m); a - b = d(m - n)$$

$$\begin{aligned} \text{គេបាន: } (a^{b-c})(b^{c-a})(c^{a-b}) &= (v_1 q^m)^{d(n-p)} (v_1 q^n)^{d(p-m)} (v_1 q^p)^{d(m-n)} \\ &= (v_1^{d(n-p+p-m+m-n)})(q^{d(n(n-p)-mp-np-nm+mp-np)}) \\ &= (v_1^0)(q^0) = 1 \end{aligned}$$

ដូចនេះ: $(a^{b-c})(b^{c-a})(c^{a-b}) = 1$

៥-(ពិន្ទុ១៥) បង្ហាញថា គ្មានចំនួនគត់ x, y, z ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ $x^2 + y^2 - 8z = 6$ ទេ :

ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ n គេបាន :

$$n = 4a + r \text{ ដែល } a \text{ ជាចំនួនគត់ និង } r = 0; 1; 2; 3$$

$$n^2 = 8(2a^2 + r) + r^2 = 8b + r^2 \text{ ដែល } b = 2a^2 + r \text{ ជាចំនួនគត់ហើយ } r^2 = 0; 1; 4; 9$$

$$\text{នេះបញ្ជាក់ថា } n^2 = 8m + s \text{ ដែល } m \text{ ជាចំនួនគត់ និង } s = 0; 1; 4$$

ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ $x : y$ គេបាន :

$$x^2 = 8p + s \text{ ដែល } p \text{ ជាចំនួនគត់ និង } s = 0; 1; 4$$

$$y^2 = 8q + t \text{ ដែល } q \text{ ជាចំនួនគត់ និង } t = 0; 1; 4$$

$$x^2 + y^2 = 8(p + q) + (s + t) = 8z + v \text{ ដែល } z = p + q \text{ ជាចំនួនគត់ និង } v = 0; 1; 2; 4; 5$$

បានន័យថា ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ $x; y; z$ គេបាន :

$$x^2 + y^2 - 8z = 0$$

$$\text{ឬ } x^2 + y^2 - 8z = 1$$

$$\text{ឬ } x^2 + y^2 - 8z = 2$$

$$\text{ឬ } x^2 + y^2 - 8z = 4$$

$$\text{ឬ } x^2 + y^2 - 8z = 5$$

ដូចនេះ: គ្មានចំនួនគត់ x, y, z ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ $x^2 + y^2 - 8z = 6$ ទេ

៦-(ពិន្ទុ២០) គណនា $f(\sqrt{2004})$:

$$\text{តាង } A = \sqrt[3]{\frac{x^3 - 3x + (x^2 - 1)\sqrt{x^2 - 4}}{2}} \text{ និង } B = \sqrt[3]{\frac{x^3 - 3x - (x^2 - 1)\sqrt{x^2 - 4}}{2}}$$

$$\text{គេបាន: } A^3 + B^3 = x^3 - 3x$$

មាន

$$A + B = y$$

$$A \cdot B = \sqrt{\frac{(x^3 - 3x)^2 - (x^2 - 1)^2(x^2 - 4)}{4}} = \sqrt[3]{\frac{4}{4}} = 1$$

$$y^3 = (A + B)^3$$

$$= A^3 + B^3 + 3AB(A + B)$$

$$y^3 = x^3 - 3x + 3y$$

$$y^3 - x^3 + 3x - 3y = 0$$

$$(y - x)(y^2 + xy + x^2 - 3) = 0$$

$$y - x = 0 \text{ គេបាន } y = x$$

$$y^2 + xy + x^2 - 3 = 0 \text{ មាន } \Delta = -3x^2 + 12 < 0 \text{ ព្រោះ } x = \sqrt[3]{2004} \rightarrow \text{លីក្លាស និក្ខ 3}$$


$$\text{គេបាន } y = x = \sqrt[3]{2004}$$

$$\text{ដូចនេះ: } f(\sqrt[3]{2004}) = \sqrt[3]{2004}$$

ពិន្ទុ 107

ពិន្ទុ 3

៧-(ពិន្ទុ ២៥) បង្ហាញថា $BM^2 = a^2 \cot\left(\frac{B}{2}\right)$:



ពិន្ទុ 5

តាង : s_1 និង p_1 ជាផ្ទៃក្រលា និង កន្លះបរិមាត្រនៃត្រីកោណ ABM

s_2 និង p_2 ជាផ្ទៃក្រលា និង កន្លះបរិមាត្រនៃត្រីកោណ MBC

s និង p ជាផ្ទៃក្រលា និង កន្លះបរិមាត្រនៃត្រីកោណ ABC

r ជាកាំរង្វង់ចារឹកក្នុង $\triangle ABC$

I និង I' ជាចំនុចប៉ះរវាង $[AB]$ ជាមួយរង្វង់ចារឹកក្នុង $\triangle ABC$ និង $\triangle ABM$

J និង J' ជាចំនុចប៉ះរវាង $[BC]$ ជាមួយរង្វង់ចារឹកក្នុង $\triangle ABC$ និង $\triangle MBC$

គេបាន :

$$s = pr$$

$$s_1 = p_1 r_1$$

$$s_2 = p_2 r_2$$

$$s = s_1 + s_2 = p_1 r_1 + p_2 r_2$$

$$pr = p_1 r' + p_2 r' = (p_1 + p_2) r' \quad (1) \quad \text{ព្រោះ } r_1 = r_2 = r'$$

ម្យ៉ាងទៀត : $2p_1 + 2p_2 = 2p + 2BM$ រឺ $p_1 + p_2 = p + BM$

(1) អាសរសេរ : $pr = (p + BM) r'$ ហើយ $\frac{r'}{r} = \frac{p}{p + BM} \quad (2)$

$\triangle I'AO_1 \sim \triangle IAO : \frac{AI'}{AI} = \frac{r'}{r}$ ហើយ $\triangle J'CO_2 \sim \triangle JCO : \frac{CJ'}{CJ} = \frac{r'}{r} \quad (3)$

ក្នុងត្រីកោណ ABC គេមាន $p = AI + BJ + JC = AI + BC$

នោះ $AI = p - BC$

ក្នុងត្រីកោណ ABC គេមាន $p = CJ + AI + IB = CJ + AB$

នោះ $CJ = p - AB$

តាមរបៀបដូចគ្នា :

ក្នុងត្រីកោណ ABM គេមាន $AI' = p_1 - BM$

ក្នុងត្រីកោណ MBC គេមាន $CJ' = p_2 - BM$

(3) : $\frac{r'}{r} = \frac{p_1 - BM}{p - BC} = \frac{p_2 - BM}{p - AB} = \frac{p_1 + p_2 - 2BM}{2p - (BC + AB)}$

$\frac{r'}{r} = \frac{p + BM - 2BM}{AC}$ ព្រោះ $p_1 + p_2 = p + BM$ ហើយ $2p = AC + BC + AB$

$\frac{r'}{r} = \frac{p - BM}{AC} \quad (4)$

តាម (2) និង (4) :

$\frac{p}{p + BM} = \frac{p - BM}{AC}$ នាំអោយ $p \cdot AC = p^2 - BM^2$

នាំអោយ $BM^2 = p(p - AC) = p \cdot BI \quad (5) \quad \text{ព្រោះ } BI = p - AC$

ក្នុងត្រីកោណត្រង់ IBO : $BI = r \cot \hat{OBI} = r \cot \left(\frac{B}{2} \right)$

(5) : $MB^2 = (pr) \cot \left(\frac{B}{2} \right) = a^2 \cot \left(\frac{B}{2} \right) \quad \text{ព្រោះ } a^2 = pr$

ដូចនេះ :

$$BM^2 = a^2 \cot \left(\frac{B}{2} \right)$$

ឯកសារ

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលស្ថាប័នសិក្សាស្រាវជ្រាវ
ផ្នែកអប់រំស្រីស្រី គណៈកម្មាធិការ រូបវិទ្យា
ថ្នាក់ទី ៩ និងទី ១២ ឆ្នាំសិក្សា ២០០៣-២០០៤

សម័យប្បទាន: ១១.៥.០៤

ចិញ្ចឹម គណៈកម្មាធិការ ថ្នាក់ទី ១២ លើកទី២ ថ្ងៃទី ១៣.៥.០៤ (យោងតាម ៣ ដំណើរ)

១-(ពិន្ទុ១០) គាវី សុខ និង សៅ ជាបេក្ខជនសិស្សតូចក្នុងកម្មវិធីប្រជែងប្រណាំងប្រជុំ (គណិតវិទ្យា រូបវិទ្យា និង ភាសាខ្មែរ) ។

- (១) : បើគាវី ប្រឈមគណិតវិទ្យា នោះ សុខ ប្រឈមរូបវិទ្យា ។
- (២) : បើគាវី ប្រឈមភាសាខ្មែរ នោះ សៅ ប្រឈមរូបវិទ្យា ។
- (៣) : បើ សុខ មិនប្រឈមភាសាខ្មែរ នោះ សៅ ប្រឈមគណិតវិទ្យា ។

តើបេក្ខជនណាប្រឈមមុខវិជ្ជាណា ?

២-(ពិន្ទុ១៥) ចូរបំពេញលេខអោយបានសមស្របក្នុងសញ្ញា * ក្នុងតារាងតាមលំដាប់
រវាងពីរចំនួន ដែលនៅខាងស្តាំនេះដោយបកស្រាយពន្យល់ជូន។

	*	*	*
×	*	2	*
	*	*	*
	*	*	*
	*	*	*
	*	8	*
	*	*	*
	*	9	2

៣-(ពិន្ទុ១៥) (x_n) ជាស្វ៊ីតនៃចំនួនដែលកំណត់ដោយ: $x_1 = 2003, x_2 = 2004$ និង $x_{n+1} = x_n(x_n - 1) + 2$ ចំពោះ $n \geq 2$

បង្ហាញថា $(x_1^2 + 1)(x_2^2 + 1) \dots (x_{2004}^2 + 1) - 1 = (x_{2005} - 1)^2$ ។

៤-(ពិន្ទុ១៥) a, b, c, d ជាបួនចំនួនគត់ដែលចែកមិនដាច់នឹង 5 ។

m ជាចំនួនគត់មួយដែលធ្វើអោយ $am^3 + bm^2 + cm + d$ ចែកដាច់នឹង 5 ។

បង្ហាញថា មានចំនួនគត់ n ដែលធ្វើអោយ $dn^3 + cn^2 + bn + a$ ចែកដាច់នឹង 5 ដែរ ។

៥-(ពិន្ទុ២០) $a_1, a_2, \dots, a_n$ និង $b_1, b_2, \dots, b_n$ ជាចំនួនពិត ។

ក-បង្ហាញថា $(a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2)$

បញ្ជាក់ថា វិសមភាពខាងលើក្លាយជាសមភាពកាលណា $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \dots = \frac{a_n}{b_n}$ ។

ខ-ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការដែលមានអញ្ញត $x_1, x_2, \dots, x_{2004}$:

$$\begin{cases} \sqrt{1+x_1} + \sqrt{1+x_2} + \dots + \sqrt{1+x_{2004}} = 2004 \sqrt{\frac{2005}{2004}} & (1) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \sqrt{1-x_1} + \sqrt{1-x_2} + \dots + \sqrt{1-x_{2004}} = 2004 \sqrt{\frac{2003}{2004}} & (2) \end{cases}$$

៦-(ពិន្ទុ២៥) រង្វង់ពីរមានកាំ R និង r ($R > r$) មានផ្ចិតរួម O ហើយស្ថិតក្នុងប្លង់តែមួយ ។ M ជាចំនុចនឹងនៅលើរង្វង់តូច ហើយ

B ជាចំនុចចល័តលើរង្វង់ធំ ។ បន្ទាត់ (BM) ជួបរង្វង់ធំម្តងទៀតក្រៅចំនុច C ។ បន្ទាត់ (L) កែងនឹង (BM) ក្រាស់ M ។

បន្ទាត់ (L) ជួបរង្វង់តូច ម្តងទៀតក្រៅចំនុច A ។

ក-គណនា ផលបូក $S = BC^2 + CA^2 + AB^2$ ជាអនុគមន៍នៃ R និង r ។

ខ-យក I ជាចំនុចកណ្តាលនៃ $[AB]$ ។ កំនត់សំនុំនៃចំនុច I ។

វិញ្ញាបនបត្រ សំណង់ថ្ងៃទី ១៣-៤-០៤

១-(ពិន្ទុ១០) បើ នារី ប្រលង គណិតវិទ្យា នោះ សុខ ប្រលង រូបវិទ្យា (តាម(1))

តាម(3) គេបាន សៅ ប្រលង គណិតវិទ្យា ព្រោះសុខមិនប្រលងភាសាខ្មែរ។

គេបាន នារី និង សៅ ប្រលង គណិតវិទ្យាតែមួយ ដែលជាករណីមិនអាចមាន។

ដូចនេះ នារីមិនប្រលងគណិតវិទ្យាទេ។

$$\begin{cases} (1p) \\ (2p) \\ \hline = 3p \end{cases}$$

-បើនារីប្រលងភាសាខ្មែរ នោះ សៅប្រលងរូបវិទ្យា (តាម(2))។

ក្នុងករណីនេះ សុខត្រូវប្រលងគណិតវិទ្យា (គឺមិនប្រលងភាសាខ្មែរទេ) ហើយបណ្តាលអោយសៅប្រលង

គណិតវិទ្យាដែរ (តាម(3))។ គេបាន សុខ និង សៅ ប្រលង គណិតវិទ្យាតែមួយ ដែលជាករណីមិនអាចមាន។

ដូចនេះ នារីមិនប្រលងភាសាខ្មែរទេ គឺ នារីច្បាស់ជាប្រលង រូបវិទ្យា។

$$\begin{cases} 1p \\ 2p \\ \hline = 3p \end{cases}$$

-បើសុខមិនប្រលងភាសាខ្មែរ គឺសុខប្រលងគណិតវិទ្យា (ព្រោះសល់តែខ្មែរនិងគណិត)។

តែតាម(3)គេបាន សៅ ប្រលងគណិតវិទ្យាដែរ ជាករណីមិនអាចមាន ដូចនេះ សុខប្រលងភាសាខ្មែរ។

$$\begin{cases} 1p \\ 1p \\ \hline \end{cases}$$

សរុបមកគេបាន :

$$\boxed{\text{នារីប្រលង រូបវិទ្យា សុខប្រលងភាសាខ្មែរ ហើយ សៅប្រលង គណិតវិទ្យា}} \quad 2p = 4p$$

២-(ពិន្ទុ១៥)

-ដោយ $2 \times ***$ នៃតំនាងគុណ បានចំនួនដែលមានលេខបីខ្ទង់ ហើយ(*) នៅតួគុណ គុណនឹង * * *

នៅតំនាងគុណ បានចំនួនដែលមានលេខបីខ្ទង់ នោះ(*) = 1 ។ គេបានតួគុណ = 121 ។

$$\begin{cases} 2 \\ 1 \\ 2 \\ \hline \end{cases} = 5p$$

-ដោយ 1 នៅខ្ទង់រយនៃតួគុណ គុណនឹង(*) នៅខ្ទង់ដប់នៃតំនាងគុណ បានលទ្ធផល 8 នោះ (*) = 8 ។

ពិន្ទុ2

-ដោយផលគុណមានលេខខ្ទង់ដប់ស្មើ 2 នោះ(*) នៅខ្ទង់ឯកតា នៃតំនាងគុណត្រូវស្មើ 7 ។

ពិន្ទុ2

-ដោយ 2 គុណនឹង (*) នៅខ្ទង់រយនៃតំនាងគុណ បានចំនួនមានលេខពីរខ្ទង់ ហើយខ្ទង់ឯកតាត្រូវបូកនឹង 8 ផង បូក

នឹងលេខដែលត្រូវទុកផងដើម្បីអោយបាន 9 នោះ(*) = 9 (គេសាកចាប់ពី 5 ដល់ 9) ។

ពិន្ទុ២

ដូចនេះគេបាន :

		9	8	7	
		×	1	2	1
		9	8	7	
	1	9	7	4	
	9	8	7		
1	1	9	4	2	7

ពិន្ទុ4

៣-(ពិន្ទុ១៥) បង្ហាញថា $(x_1^2 + 1)(x_2^2 + 1) \cdots (x_{2004}^2 + 1) - 1 = (x_{2005} - 1)^2$

តាង $S_n = (x_1^2 + 1)(x_2^2 + 1) \cdots (x_n^2 + 1) - 1$

គេនឹងបង្ហាញថា $S_n = (x_{n+1} - 1)^2$

ពិន្ទុ 2

-ចំពោះ $n=1$ គេបាន $S_1 = (x_1^2 + 1) - 1 = (2003)^2 = (2004 - 1)^2 = (x_2 - 1)^2$: ពិត

-ឧបមាថាទំនាក់ទំនងពិតដល់ $n=p$: $S_p = (x_{p+1} - 1)^2$

ពិន្ទុ 3

-ពិនិត្យចំពោះ $n=p+1$:

$S_{p+1} = (x_1^2 + 1)(x_2^2 + 1) \cdots (x_{p+1}^2 + 1) - 1 = [(x_1^2 + 1)(x_2^2 + 1) \cdots (x_p^2 + 1) - 1 + 1](x_{p+1}^2 + 1) - 1$ ពិន្ទុ 2

$= [S_p + 1](x_{p+1}^2 + 1) - 1 = [(x_{p+1} - 1)^2 + 1](x_{p+1}^2 + 1) - 1$

$= [(x_{p+1}^2 + 1) - 2x_{p+1} + 1](x_{p+1}^2 + 1) - 1$

ពិន្ទុ 2

$= [(x_{p+1}^2 + 1)^2 - 2x_{p+1}(x_{p+1}^2 + 1) + (x_{p+1}^2 + 1)] - 1$

$= [(x_{p+1}^2 + 1) - x_{p+1}]^2 = [x_{p+1}(x_{p+1} - 1) + 2 - 1]^2 = (x_{p+2} - 1)^2$

$S_{p+1} = (x_{p+2} - 1)^2$: ទំនាក់ទំនងពិតចំពោះ $n=p+1$

ពិន្ទុ 4

ដូចនេះ $S_n = (x_{n+1} - 1)^2$ ចំពោះគ្រប់ n ; $n \geq 1$ ។

ដោយយក $n = 2004$ គេបាន $(x_1^2 + 1)(x_2^2 + 1) \cdots (x_{2004}^2 + 1) - 1 = (x_{2005} - 1)^2$

ពិន្ទុ 2

៤-(ពិន្ទុ១៥) បង្ហាញថាមានចំនួនគត់ n : $dn^3 + cn^2 + bn + a$ ចែកដាច់នឹង 5 :

តាង : $A = am^3 + bm^2 + cm + d$

$B = dn^3 + cn^2 + bn + a$

A ចែកដាច់នឹង 5 តែ d ចែកមិនដាច់នឹង 5 នោះ $am^3 + bm^2 + cm$ ចែកមិនដាច់នឹង 5

(2p)

ដោយ $am^3 + bm^2 + cm = m(am^2 + bm + c)$ ចែកមិនដាច់នឹង 5 នោះគេបាន m ចែកមិនដាច់នឹង 5 ។

គេបាន $m = 5q + r$ ដែល q ជាចំនួនគត់ ហើយ $r = 1; 2; 3; 4$ ។

(2p)

= ពិន្ទុ 4

គេសិក្សា $An^3 - B = am^3n^3 + bm^2n^3 + cmn^3 - cn^2 - bn - a$

(2p)

$= a(m^3n^3 - 1) + bn(m^2n^2 - 1) + cn^2(mn - 1)$

$= (mn - 1)(am^2n^2 + amn + a + bmn^2 + bn + cn^2)$

$B = An^3 - (mn - 1)(am^2n^2 + amn + a + bmn^2 + bn + cn^2)$

= ពិន្ទុ 4

ដើម្បីអោយ B ចែកដាច់នឹង 5 គេត្រូវតែប្រើសេចក្តីលក្ខណៈចំនួនគត់ n ដែលធ្វើអោយ $mn - 1$ ចែកដាច់នឹង 5 ។

បើ $m = 5q + r$; $n = 5p + s$ នោះគេបាន $mn - 1 = 5k + rs - 1$ ដែល $k = 5pq + qs + pr$

(2p)

ដើម្បីអោយ $mn - 1$ ចែកដាច់នឹង 5 លុះត្រាតែ $rs - 1$ ចែកដាច់នឹង 5 ។

(1p)

= ពិន្ទុ 3

ដោយ $1 \leq r \leq 4$ នោះគេអាចរក s បាន តាមប្រែប្រួលដូចខាងក្រោម :

បើ $r = 1$ នោះ $s = 1$; $n = 5p + 1$ ដែល p ជាចំនួនគត់

(1p)

បើ $r = 2$ នោះ $s = 3$; $n = 5p + 3$ ដែល p ជាចំនួនគត់

(1p)

បើ $r=3$ នោះ $s=2$; $n=5p+2$ ដែល p ជាចំនួនគត់ (1p)

បើ $r=4$ នោះ $s=4$; $n=5p+4$ ដែល p ជាចំនួនគត់ (1p)

ដូចនេះ គេអាចរកបាន n ដែលធ្វើអោយ B ចែកដាច់នឹង s

= ពិន្ទុ 4

៥. (ពិន្ទុ ២០) ត-បង្ហាញថា $(a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2)$

-បើ $a_1 = a_2 = \dots = a_n = 0$ នោះគេបាន $0 \leq 0$: ពិត (1p)

-បើមាន $a_i \neq 0$ នោះ $a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2 > 0$ ហើយគេមាន :

$$(a_1x + b_1)^2 = a_1^2x^2 + 2a_1b_1x + b_1^2 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$(a_2x + b_2)^2 = a_2^2x^2 + 2a_2b_2x + b_2^2 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$(a_nx + b_n)^2 = a_n^2x^2 + 2a_nb_nx + b_n^2 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \quad (2p)$$

= ពិន្ទុ 3

បូកអង្គនិងអង្គ :

$$(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)x^2 + 2(a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n)x + (b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \quad (2)$$

លុះត្រាតែ :

$$\Delta' = (a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n)^2 - (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2) \leq 0 \quad (3)$$

$$\text{ដូចនេះ } (a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2) \quad \text{ពិន្ទុ 5}$$

-កាលណា $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \dots = \frac{a_n}{b_n} = t$ គេបាន :

$$(a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n)^2 = t^2(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2)^2 \quad (i) \quad (1p)$$

$$(a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2) = t^2(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2)^2 \quad (ii) \quad (1p)$$

តាម (i) និង (ii) :

$$(a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n)^2 = (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2)(b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2) \quad \text{ពិន្ទុ 2}$$

ខ-ដោះស្រាយប្រព័ន្ធសមីការ :

ដែនកំណត់ : $-1 \leq x_i \leq 1, i=1, 2, \dots, 2004$

$$(1) \text{ សមមូល } (\sqrt{1+x_1} + \sqrt{1+x_2} + \dots + \sqrt{1+x_{2004}})^2 = (2004)(2005) \quad (1p)$$

$$(\sqrt{1+x_1} + \sqrt{1+x_2} + \dots + \sqrt{1+x_{2004}})^2 \leq (1+1+\dots+1)(1+x_1+1+x_2+\dots+1+x_{2004}) \quad (1p)$$

$$(\sqrt{1+x_1} + \sqrt{1+x_2} + \dots + \sqrt{1+x_{2004}})^2 \leq (2004)(2004+x_1+x_2+\dots+x_{2004})$$

$$(2004)(2005) \leq (2004)(2004+x_1+x_2+\dots+x_{2004})$$

$$1 \leq x_1 + x_2 + \dots + x_{2004} \quad (3) \quad (1p)$$

= ពិន្ទុ 3

$$(2) \text{ សមមូល } (\sqrt{1-x_1} + \sqrt{1-x_2} + \dots + \sqrt{1-x_{2004}})^2 = (2004)(2003)$$

(1p)

$$(\sqrt{1-x_1} + \sqrt{1-x_2} + \dots + \sqrt{1-x_{2004}})^2 \leq (2004)(2004-x_1-x_2-\dots-x_{2004})$$

ប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សប្រចាំឆ្នាំសិក្សា

ថ្ងៃទី ០១ ~ ៤ ~ ២០០៤

៧

វិញ្ញាបនាធិបត្យ: គណិតវិទ្យាឆ្នាំទី១២ រយៈពេល ៣ម៉ោង

ប៊ិត ស៊ីភេត
អធិការ គណិតវិទ្យា
TEL: 011 953 029

(១៥ពិន្ទុ)

១- ក) ចូរប្រៀបធៀបចំនួន $(2004!)^2$ និង 2004^{2004}

ខ) ស្រាយបញ្ជាក់ថា ចំពោះគ្រប់ $n \in \mathbb{N}$, $n! \leq \left(\frac{1+n}{2}\right)^n$

(២០ពិន្ទុ)

២- យក I ជាជួរក្នុងចំណោមត្រីកោណ ABC ។ R និង r គឺជាកាំរង្វង់ចារឹកក្រៅ និង រង្វង់ចារឹកក្នុងនៃត្រីកោណ ABC ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថា:

ក) $r = 4R \cdot \sin \frac{A}{2} \cdot \sin \frac{B}{2} \cdot \sin \frac{C}{2}$

ខ) $IA \cdot IB \cdot IC = 4R \cdot r^2$

(១០ពិន្ទុ)

៣- ស្រាយបញ្ជាក់ថា ចំនួន $A = 11 \dots 122 \dots 2$ មាន 2004 ខ្ទង់នៃលេខ 1 និង 2004 នៃលេខ 2 ជាផលគុណនៃ ពីរចំនួនគត់គ្នា ។

(១០ពិន្ទុ)

៤- ចូរប្រៀបធៀបពីរចំនួន $A = 4 \tan 5^\circ \cdot \tan 9^\circ$ និង $B = 3 \tan 6^\circ \cdot \tan 10^\circ$

(២០ពិន្ទុ)

៥- គេអោយពហុកោណនិយ័ត $A_1 A_2 A_3 \dots A_n$ ចារឹកក្នុងរង្វង់ (O) ។ ដោយដឹងថា ចំនួនចតុកោណដែលមានកំពូលទាំងបួនផ្គុំដោយកំពូលនៃពហុកោណនិយ័តមាន $\frac{65}{4}$ ដងផលគុណនៃចំនួនកាំរង្វង់ និង ចំនួនចតុកោណកែង

ដែលមានកំពូលផ្គុំដោយកំពូលនៃពហុកោណនិយ័ត ។ គណនា ផលបូក

$$S = C_{2004n}^0 + C_{2004n}^2 \cdot 3^2 + C_{2004n}^4 \cdot 3^4 + \dots + C_{2004n}^{2004n} \cdot 3^{2004n}$$

(១៥ពិន្ទុ)

៦- ក) រកអនុគមន៍ តំរូវដោយ $f\left(\frac{x+1}{x-2}\right) + 2f\left(\frac{x-2}{x+1}\right) = x$

ខ) រកសមីការបន្ទាត់ប៉ះនឹងខ្សែកោង (C) នៃអនុគមន៍ $f(x)$ ដែល $f(2x) = 4 \cos x \cdot f(x) - 2x$

ត្រង់ចំនុចមានអាប់ស៊ីសស្មើ 0 ។

(១០ពិន្ទុ)

៧- ស្រាយបញ្ជាក់ថា គ្រប់ចំនួនគត់ធម្មជាតិ n នោះចំនួន $\frac{n^5}{5} + \frac{n^3}{3} + \frac{7n}{15}$ ជាចំនួនគត់ ។



កំណត់ត្រាទូទៅ

១) ក) ប្រែប្រួលបំផុត $(2004!)^2$ និង 2004^{2004}

$$\text{តើ } (n!)^2 = [1 \cdot 2 \cdot 3 \dots (n-1) \cdot n]^2$$

$$= (1 \cdot n) [2(n-1)] \dots [(n-1) \cdot 2] \cdot (n \cdot 1)$$

$$\text{ដោយ } 1 \cdot n \geq n$$

$$2(n-1) \geq n$$

⋮

$$n \cdot 1 \geq n$$

$$\text{ដូច្នេះ } (n!)^2 \geq n^n$$

បើ $n=2004$ គេ: $(2004!)^2 \geq 2004^{2004}$

២) (ស្រាយបញ្ជាក់) $(\frac{1+n}{2})^n$

$$n! \leq \left(\frac{1+n}{2}\right)^n$$

កាច cauchy ២ ឆ្នាំ

$$1+n \geq 2\sqrt{1 \cdot n}$$

$$2+(n-1) \geq 2\sqrt{2(n-1)}$$

⋮

$$n+1 \geq 2\sqrt{n \cdot 1}$$

$$\text{ដូច្នេះ } (n!)^2 \geq 2^n \sqrt{(n!)^2}$$

$$n! \leq \left(\frac{1+n}{2}\right)^n$$

២) ក) (ស្រាយបញ្ជាក់)

$$r = 4R \cdot \sin \frac{A}{2} \cdot \sin \frac{B}{2} \cdot \sin \frac{C}{2}$$

$$\text{ផ្ទៃក្រឡា } S = pr = \frac{abc}{4R}$$

$$\therefore r = \frac{abc}{4R}$$

$$p = \frac{1}{2}(a+b+c)$$

$$\text{គេ: } r = \frac{abc}{2R(a+b+c)} \quad (1)$$

តាមទ្រឹស្តីបទ ឆែន : $a = 2R \sin A$

$$b = 2R \sin B$$

$$c = 2R \sin C$$

$$\text{ជំ(1): } r = \frac{2R \sin A \cdot 2R \sin B \cdot 2R \sin C}{2R \cdot 2R (\sin A + \sin B + \sin C)}$$

$$r = \frac{2R \sin A \cdot \sin B \cdot \sin C}{\sin A + \sin B + \sin C} \quad (2)$$

យក $\sin A + \sin B + \sin C$

$$= 2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2} + \sin(A+B)$$

$$= 2 \sin \frac{A+B}{2} \left[\cos \frac{A-B}{2} + \cos \frac{A+B}{2} \right]$$

$$= 2 \sin \left(\frac{\pi}{2} - \frac{C}{2} \right) \left[2 \cos \frac{A}{2} \cdot \cos \frac{B}{2} \right]$$

$$= 4 \cos \frac{C}{2} \cdot \cos \frac{A}{2} \cdot \cos \frac{B}{2}$$

តាម(2):

$$r = \frac{2R \cdot 2 \sin \frac{A}{2} \cos \frac{A}{2} \cdot 2 \sin \frac{B}{2} \cos \frac{B}{2} \cdot 2 \sin \frac{C}{2} \cos \frac{C}{2}}{4 \cos \frac{A}{2} \cdot \cos \frac{B}{2} \cdot \cos \frac{C}{2}}$$

$$r = 4R \sin \frac{A}{2} \cdot \sin \frac{B}{2} \cdot \sin \frac{C}{2}$$

២) (ស្រាយ) $IA \cdot IB \cdot IC = 4Rr^2$

តាមរូបខាងលើ:

$$\sin \frac{A}{2} = \frac{r}{IA}$$

$$\therefore r = IA \cdot \sin \frac{A}{2}$$


ដូចគ្នា:

$$r = IB \cdot \sin \frac{B}{2}$$

$$r = IC \cdot \sin \frac{C}{2}$$

$$\text{គេ: } r^3 = IA \cdot IB \cdot IC \cdot \sin \frac{A}{2} \sin \frac{B}{2} \sin \frac{C}{2}$$

$$\text{តាមរូបខាងលើ: } IA \cdot IB \cdot IC = 4Rr^2$$



កំណត់ 4 ទីតាំង 4 កំណត់
 ក្នុងការសរសេរ យើងបានបញ្ជាក់ការណែនាំ

$$C_{4n}^4 = \frac{(4n)!}{(4n-4)!4!}$$

$$C_{4n}^4 = \frac{(4n-3)(4n-2)(4n-1)4n}{4!}$$

$$= \frac{(4n-3) \cdot 2(2n-1)(4n-1)4n}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot 4}$$

$$= \frac{1}{3} (4n-3)(2n-1)(4n-1)n$$

ដោយបញ្ជាក់ការណែនាំក្នុងករណីនេះ
 យើងបាន: ដំណើរការនេះ មាន ២៥
 កំណត់ ២៥ កំណត់: យើង មាន (២៥) កំណត់
 បញ្ជាក់បញ្ជាក់ការណែនាំក្នុងប្រយោជន៍:
 ចំនួនបញ្ជាក់ការណែនាំក្នុង:

$$C_{2n}^2 = \frac{(2n)!}{(2n-2)!2!} = (2n-1)n$$

ដូចគ្នា យើងបានការណែនាំក្នុងករណីនេះ ក្នុង
 មានកំណត់ (២៥) កំណត់ ដោយកំណត់
 ប្រយោជន៍ ៥ កំណត់ ក្នុង ១/៤ កំណត់
 បញ្ជាក់បញ្ជាក់ការណែនាំក្នុងប្រយោជន៍.

ចំនួនកំណត់: $C_n^1 = n$

ក្រាបសមីការ: $C_{4n}^4 = \frac{65}{4} \cdot C_n^1 \cdot C_{2n}^2$

$$\frac{1}{3} (4n-3)(2n-1)(4n-1)n = \frac{65}{4} n^2 (2n-1)$$

$$4(4n-3)(4n-1) = 3n \cdot 65$$

$$64n^2 - 64n + 12 = 195n$$

$$64n^2 - 259n + 12 = 0$$

ដោយសារតែ: $n = 4$

$$2^{2004n} = (1+3)^{2004n}$$

$$= C_{2004n}^0 + C_{2004n}^1 \cdot 3 + C_{2004n}^2 \cdot 3^2 + \dots + C_{2004n}^{2004n} \cdot 3^{2004n}$$

$$2^{2004n} = (1-3)^{2004n}$$

$$= C_{2004n}^0 - C_{2004n}^1 \cdot 3 + C_{2004n}^2 \cdot 3^2 - \dots + C_{2004n}^{2004n} \cdot 3^{2004n}$$

$$2^{2004n} + 2^{2004n} = 2S$$

$$2^{2004n} (2^{2004n} + 1) = 2S$$

$$S = 2^{2004n-1} (2^{2004n} + 1)$$

ចំណាំ: $n = 4$ ក្នុងករណីនេះ:

$$S = 2^{8015} (2^{8016} + 1)$$

6) ការសម្រួល $f(x)$

$$\text{មាន } f\left(\frac{x+1}{x-2}\right) + 2f\left(\frac{x-2}{x+1}\right) = x$$

$$\text{ក្នុង } t = \frac{x-2}{x+1} \text{ ដោយ: } tx + t = x - 2$$

$$x = \frac{t+2}{1-t}$$

$$\text{ដំណាក់កាល } f\left(\frac{1}{t}\right) + 2f(t) = \frac{t+2}{1-t}$$

$$\text{ដោយ } t \text{ ដោយ } \frac{1}{t}$$

$$\text{ដោយ: } f(t) + 2f\left(\frac{1}{t}\right) = \frac{1+2t}{t-1}$$

យក (1) ក្នុងករណីនេះ 2

$$2f\left(\frac{1}{t}\right) + 4f(t) = \frac{2t+4}{1-t}$$

$$2f\left(\frac{1}{t}\right) + f(t) = \frac{1+2t}{t-1}$$

$$\text{ដំណាក់កាល: } 3f(t) = \frac{2t+4+1+2t}{1-t}$$

$$f(t) = \frac{4t+5}{3(1-t)}$$

$$\text{ដោយ: } f(x) = \frac{4x+5}{3(1-x)}$$

8

ប្រធានក្រុមការងារសិស្សត្រូវតែប្រចាំរាល់ឆ្នាំក្នុងការ

ថ្ងៃទី ០១ ~ ៤ ~ ២០០៥

វិទ្យាសាស្ត្រ:

គណិតវិទ្យាឆ្នាំទី១២ រយៈពេល ៣ម៉ោង

សិក្សាស្រាវជ្រាវ

អគ្គិការ គណិតវិទ្យា

TEL: 011 953 029

I-(ពិន្ទុ១០) ចំនួនមួយជាការប្រែកម្រិតមានរាង $\overline{abcd}$ ។ ដោយដឹងថា $\overline{ab} - \overline{cd} = 1$ ។ រកចំនួន $\overline{abcd}$

II-(ពិន្ទុ១០) រកគ្រប់ចំនួនគត់ធម្មជាតិ n ដែលចំពោះគ្រប់ m មានមួយចំនួនគត់ x ផ្ទៀងផ្ទាត់
 $999(1999^n + 1) = 2(x^2 + x)$ ។

III-(ពិន្ទុ១០) រកគ្រប់ចំនួនសនិទាន a ដែល $|4a-2| \leq 1$ និង $A = \frac{4a-1}{27a^4}$ ជាចំនួនគត់ ។

IV-(ពិន្ទុ២០) យក M ជាចំនុចមួយនៅលើជ្រុង $AB = 1$ នៃត្រីកោណសម័ង្ស ABC ។ បណ្តាចំនុច P, Q រៀងគ្នា
 ជាចំណោលកែងនៃ M លើជ្រុង AC និង BC ។ ចំណោល P_1, Q_1 រៀងគ្នាជាចំណោលកែងនៃ P និង Q
 លើជ្រុង AB ។

ក- គណនារង្វាស់ P_1Q_1

ខ- កំណត់ទីតាំងចំនុច M ដើម្បីអោយ PQ មានរង្វាស់ខ្លីបំផុត ។

V-(ពិន្ទុ១០) រកគ្រប់អនុគមន៍ $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌ:

$$\begin{cases} f(1) = 2005 \\ 4xy(x^2 - y^2) + (x+y)f(x-y) = (x-y)f(x+y) \end{cases}$$

VI-(ពិន្ទុ២០) គេអោយ $f(x) = x^2 + 6ax - a$ ដោយ a ជាប៉ារ៉ាម៉ែត្រ ។

ក) រកគ្រប់តំលៃនៃ a ដើម្បីអោយសមីការ $f(x) = 0$ មានរឹសយ៉ាងតិចមួយ ។

ខ) ឧបមាថា x_1, x_2 ជាវិសសមីការ $f(x) = 0$ (មិនបាច់ផ្ទៀងផ្ទាត់) រកតំលៃតូចបំផុតនៃកន្សោម

$$A = \frac{9a - 4a^2}{(1+x_1)(1+x_2)} - \frac{70a^3 + 1}{(1-6a-x_1)(1-6a-x_2)}$$

VII-(ពិន្ទុ២០) គេអោយត្រីកោណ ABC មាន $AB = 22$; $BC = 19$; $CA = 13$ ។

1) យក M ជាទីប្រជុំទំងន់នៃត្រីកោណ ABC ។ ស្រាយបញ្ជាក់ថា $AM^2 + CM^2 = BM^2$

2) រកសំនុំចំនុច P ក្នុងប្លង់នៃត្រីកោណ ABC ដែល $AP^2 + CP^2 = BP^2$

3) កំណត់តំលៃចំបំផុត និង តូចបំផុតនៃ BP ដោយដឹងថា $AP^2 + CP^2 = BP^2$

គណិតវិទ្យា



ព្រឹត្តិបត្រ : ប្រតិបត្តិការគណិតវិទ្យា

ថ្ងៃទី : ០១.០៤.០៥

ឆ្នាំទី ១

ចំណុច

(ឆ្នាំ ១០)

ឆ្នាំ ១០

$abcd = n^2 \quad (n \in \mathbb{N}^*)$

$$100ab + cd = n^2$$

ឆ្នាំ ១០ $ab = cd + 1$

$$101cd + 100 = n^2$$

$$(n-10)(n+10) = 101cd$$

ឆ្នាំ ១០ n^2 មាន ៤ ខ្ទង់ ឆ្នាំ ១០ $n < 100$

$$n+10 = 101$$

$$n = 91$$

$$abcd = 8281$$

(ឆ្នាំ ១០)

ក្រុមចំនួនគត់សរុបជាដំបូង

$$999(1999^2 + 1) = 2(x^2 + x)$$

ឆ្នាំ ១០ ក្រុមចំនួនគត់សរុបជាដំបូង

ឆ្នាំ ១០ ២

$$1998 \cdot 1999 + 1998 = 4x^2 + 4x$$

$$1998 \cdot 1999 + 1999 = (2x+1)^2$$

$$n=1 : (2x+1)^2 = 1999^2$$

$$2x+1 = \pm 1999$$

$$x = 999 \quad \text{ឬ} \quad x = -1000$$

$$n \geq 2 : (2x+1)^2 : 1999$$

ឆ្នាំ ១០ ១៩៩៩ ចំនួនបឋម

$$(2x+1)^2 : 1999^2$$

ឆ្នាំ ១០ ២០០០ ចំនួនបឋម

$$1998 \cdot 1999 + 1999 : 1999^2$$

ចំណុច : គ្រប់ $n \geq 2$

$$n = 1$$

ឆ្នាំ ១០

ក្រុមចំនួនគត់សរុបជាដំបូង

$$|4a-2| \leq 1 \quad \text{ឆ្នាំ ១០} \quad \frac{1}{4} \leq a \leq \frac{3}{4}$$

$$A = \frac{4a-1}{27a^4}$$

$$a \geq \frac{1}{4} \quad \text{ឆ្នាំ ១០} \quad A \geq 0$$

$$A = 0 \quad \text{ឆ្នាំ ១០} \quad a = \frac{1}{4}$$

ឆ្នាំ ១០ ក្រុមចំនួនគត់សរុបជាដំបូង

$$A = K$$

$$\frac{4a-1}{27a^4} = \frac{1}{h} \quad (k = \frac{1}{h})$$

$$27a^4 - 4ah + h = 0$$

$$81a^4 - 12ah + 3h = 0$$

$$a^4 - 18a^2 + 1 + 18a^2 - 12ah + 3h - 1 = 0$$

$$(a^2 - 1)^2 + 2(3a - 1)^2 - 12a(h - 1) + 3(h - 1) = 0$$

$$(a^2 - 1)^2 + 2(3a - 1)^2 + 3(h - 1)(1 - 4a) = 0$$

$$\text{ព្រោះ: } 3(h - 1)(1 - 4a) \leq 0$$

$$\text{ដោយ } a \geq \frac{1}{4} \text{ ។ } 1 - 4a \leq 0$$

$$\text{ដូច្នេះ: } h - 1 \geq 0$$


$$h \geq 1 \text{ ។ } k \leq 1$$

$$\text{បើ } k \text{ ជាចំនួនគតិវិសេស } k = 1$$

$$\text{ដូច្នេះ } a = \frac{1}{3}$$

$$\text{ដូច្នេះ: } a = \frac{1}{4}; a = \frac{1}{3}$$

(គឺ ២០)



ក. គណនាផ្ទៃក្រឡា P_1Q_1

$$\text{ចំពោះ } S_{ABC} = S_{ACM} + S_{MBC}$$

$$\frac{AB^2 \sqrt{3}}{4} = \frac{1}{2} (MP \cdot AC) + \frac{1}{2} (MQ \cdot BC)$$

$$= \frac{1}{2} AB \cdot (MP + MQ)$$

$$\text{។ } MP + MQ = \frac{AB \sqrt{3}}{2}$$

Δ MPP₁ និង Δ MQQ₁ ក្នុងស្ថានភាពស្របគ្នា

$$MP_1 = MP \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}; MQ_1 = MQ \cdot \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$MP_1 + MQ_1 = \frac{\sqrt{3}}{2} (MP + MQ)$$

$$P_1Q_1 = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot AB$$

ឬ

$$P_1Q_1 = \frac{3}{4} AB$$

ខ. កំណត់ចំណុច M លើជ្រុង BC

PG មានផ្ទៃក្រឡាធំបំផុត

ចំពោះ: P_1Q_1 ជាចំណុចកណ្តាលនៃ PG

ដូច្នេះ $PG \geq P_1Q_1$

ដូច្នេះ: PG មានផ្ទៃក្រឡាធំបំផុត

ចំពោះ $[PG] \parallel [AB]$

ដូច្នេះ $AP = BQ$

$$S_{AMP} = S_{BMQ}$$

ឬ

$$AM = BM$$

PG ធំបំផុតនៅលើ M កណ្តាល [AB]

(1) (10)

ឆ្លើយ: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(1) = 2005 \quad (1)$$

$$4xy(x^2 - y^2) + (x+y)f(x-y) = (x-y)f(x+y) \quad (2)$$

ឆ្លើយ:

ឆ្លើយ: $x = y = 1$

ឆ្លើយ: $f(0) = 0$

$a = x + y$; $b = x - y$

$(a^2 - b^2)ab + af(b) = bf(a)$

$$a^2 - b^2 = \frac{bf(a)}{ab} - \frac{af(b)}{ab}$$

$$\frac{f(b)}{b} - b^2 = \frac{f(a)}{a} - a^2$$

ឆ្លើយ: (គំរូ $x \neq 0$) $\frac{f(x)}{x} - x^2$

$$\frac{f(x)}{x} - x^2 = f(1) - 1 = 2004$$

$$f(x) = x^3 + 2004x$$

(គំរូ $x \neq 0$)

ឆ្លើយ: $f(0) = 0$ ឆ្លើយ:

$$f(x) = x^3 + 2004x \quad (\forall x \in \mathbb{R})$$

ឆ្លើយ: ឆ្លើយ (2)

ឆ្លើយ: $x = t+1$; $y = t$

$$4(t+1)t[(t+1)^2 - t^2] + f(t+1)f(t) = f(2t+1)$$

$$(4t^2 + 4t)(2t+1) + 2005(2t+1) = f(2t+1)$$

$$[(2t+1)^2 - 1](2t+1) + 2005(2t+1) = f(2t+1)$$

$$(2t+1)^3 + 2004(2t+1) = f(2t+1)$$

ឆ្លើយ: $2t+1$ ឆ្លើយ: x

$$f(x) = x^3 + 2004x \quad (\forall x \in \mathbb{R})$$

(VI) (10)

ឆ្លើយ: ឆ្លើយ: a ឆ្លើយ: $f(x) = 0$ ឆ្លើយ: a

ឆ្លើយ: $f(x) = x^2 + 6ax - a = 0$

$$\Delta' = 9a^2 + a \geq 0$$

$$a(9a+1) \geq 0$$

$$a \in]-\infty; -\frac{1}{9}] \cup [0; +\infty[$$

ឆ្លើយ: ឆ្លើយ: A

ឆ្លើយ: $f(x) = 0$

$$f(x) = (x-x_1)(x-x_2)$$

$$f(-1) = (-1-x_1)(-1-x_2)$$

$$= (1+x_1)(1+x_2)$$

$$f(-1) = 1 - 6a - a = 1 - 7a$$

$$(1+x_1)(1+x_2) = 1 - 7a \quad \checkmark$$

ឆ្លើយ:

កំណត់ត្រា ក្នុងប្លង់ ΔABC

$$AP^2 + CP^2 = BP^2$$

មាន E កណ្តាល $[AC]$ និង

D នៅលើ B ធៀបចំនុច E

កាតព្វកិច្ច: គេដឹង PE ក្នុង $\Delta PAC, PBD$

$$4PE^2 = 2PA^2 + 2PC^2 - AC^2$$

$$4PE^2 = 2PB^2 + 2PD^2 - BD^2$$

$$2PA^2 + 2PC^2 - AC^2 = 2PB^2 + 2PD^2 - BD^2$$

$$2(PA^2 + PC^2 - PB^2) = 2PD^2 - (BD^2 - AC^2)$$

$$\text{ដោយ } BD = 2m_b = 39$$

$$AC = 13$$

$$BD^2 - AC^2 = 2 \cdot 26^2$$

$$PA^2 + PC^2 - PB^2 = PD^2 - 26^2 = 0$$

$$\therefore PD^2 = 26^2 \text{ ឬ } PD = 26$$

កំណត់ត្រា P ជាចំនុច (C) ដូច D ក៏ $PD = 26$

3) កំណត់ត្រាលក្ខណៈបំបែកដ៏សំខាន់

$$\text{ក្នុង } BP \text{ គេ } AP^2 + CP^2 = BP^2$$

កាតព្វកិច្ច 2): រូបរាងក្នុង (C) គឺ

យុទ្ធវិធាន (BD) ត្រូវ 2 ចំនុច M និង N

BP ធ្វើបំបែកចំនួន $M \equiv P$

$$\text{ឆ៖ គេបាន } BP = BM = 13$$

(M ក្នុងប្លង់ចំនុច ΔABC)

BP ធ្វើបំបែកចំនួន P ក្នុងចំនុច N

$$\text{ដូច្នេះ } BN = BD + DN$$

$$= 39 + 26 = 65$$

$$\text{ឆ៖ } \boxed{BN = 65}$$

ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសិស្សព្រឹទ្ធសាល័យ

ថ្ងៃទី ០១ - ៤ - ២០០៥

វិញ្ញាបនាស័ក គណនាវិទ្យាឆ្នាំទី១២ ឈ្មោះ: ពេល ពេល

- I-(ពិន្ទុ២០) ក) ស្រាយបញ្ជាក់ថា $11^{10^{2005}} - 1$ ចែកដាច់នឹង 10^{2006}
 ខ) ស្រាយបញ្ជាក់ថា ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់សេស n នោះ $(n^8 - n^6 - n^4 + n^2)$ ចែកដាច់នឹង 1152
- II-(ពិន្ទុ២០) គេអោយអនុគមន៍ $f: N^* \rightarrow N^*$ ផ្សេងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌ :
- i) ចំពោះគ្រប់ចំនួន $a; b$ បឋមរវាងគ្នា គេមាន $f(ab) = f(a) \cdot f(b)$
 - ii) ចំពោះគ្រប់ចំនួនបឋម $p; q$ យើងមាន $f(p) + f(q) = f(p + q)$
- ក) ស្រាយបញ្ជាក់ថា $f(2) = 2; f(3) = 3$
 ខ) គណនា $f(1999)$ និង $f(2006)$
- III-(ពិន្ទុ២០) គេអោយត្រីកោណ ABC មានមុំ $\hat{BAC} = 45^\circ$ ហៅ BE ($E \in AC$) ; CF ($F \in AB$) ជាកំពស់ ។
 ឧបមា H ជាអត្តសង្ខេបនៃត្រីកោណ ABC ; M, K រៀងគ្នាជាចំនុចកណ្តាល [BC] និង [AH] ។
- ក) ស្រាយបញ្ជាក់ថា MEKF ជាការេ
 ខ) ស្រាយបញ្ជាក់ថាអង្កត់ទ្រូងនៃការេ MEKF ប្រសព្វគ្នាត្រង់ចំនុចកណ្តាលនៃ [OH]
 ដោយ O ជាផ្ចិតរួមចំណុចក្រៅត្រីកោណ ABC
 គ) គណនា ប្រវែង EF បើរួមចំណុចក្រៅត្រីកោណ ABC មានកាំស្មើ 2005
- IV-(ពិន្ទុ១៥) រកគ្រប់អនុគមន៍ $f: R \rightarrow R$ ផ្សេងផ្ទាត់
- $$f\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{f(y) - f(x)}{y-x} \quad \text{គ្រប់ } x; y \in R ; x \neq y$$
- V-(ពិន្ទុ១៥) គេអោយបណ្តាចំនួនពិត $a; b; c$ ផ្សេងផ្ទាត់ $3a + 4b + 2005c = 0$
 ស្រាយបញ្ជាក់ថា សមីការ $ax^2 + bx + c = 0$ មានរឹសជានិច្ច ។
- VI-(ពិន្ទុ១០) ស្រាយបញ្ជាក់ថា ស្ថិតដែលមានធាតុបីគឺ $1; \sqrt{3}; 3$ មិនមែនជាស្ថិតនព្វន្ត ។

សាខា ២៤៤

ឯកសារ: ប្រតិបត្តិការគណិត

ថ្ងៃទី១២ : ១៩ ០៤ ០៥

ប្រភេទ២ :

ចំណុច

១

I (២០២០) :

១០²⁰⁰⁵

១០²⁰⁰⁶

១០) ក) ស្រាយថា $11^{10^k} - 1 \div 10^{k+1}$

យើងនឹងស្រាយថា $(k \in \mathbb{N})$

$$\text{គា: } 11^{10^k} - 1 \div 10^{k+1}$$

$$\cdot \text{ បើ } k=0 : 11-1 \div 10 \text{ ពិត}$$

២) ឧបសគ្គ សំនង់ពិត គឺ $k=k+1$

$$\text{គឺ: } 11^{10^k} - 1 \div 10^{k+1}$$

យើងនឹងស្រាយថា :

$$11^{10^{k+1}} - 1 \div 10^{k+2}$$

$$\text{មាន } 11^{10^{k+1}} - 1$$

$$= (11^{10^k})^{10} - 1$$

$$= (11^{10^k} - 1) [(11^{10^k})^9 + \dots + 1] \quad (1)$$

$$\text{គេដឹង } 11 \equiv 1 \pmod{10}$$

$$\text{ដូច្នេះ } (11^{10^k})^9 \equiv 1 \pmod{10}$$

$$(11^{10^k})^8 \equiv 1 \pmod{10}$$

$$(11^{10^k}) \equiv 1 \pmod{10}$$

$$\text{គា: } [(11^{10^k})^9 + (11^{10^k})^8 + \dots + 1] \equiv 10 \pmod{10}$$

$$\text{១) } [(11^{10^k})^9 + (11^{10^k})^8 + \dots + (11^{10^k}) + 1] \div 10$$

$$\text{គេដឹង } (11^{10^k} - 1) \div 10^{k+1}$$

តាម (២) និង (៣)

$$\text{២) } 11^{10^{k+1}} - 1 \div 10^{k+1} \cdot 10 = 10^{k+2}$$

$$\text{២) បើ } k=2005$$

$$\text{គា: } 11^{10^{2005}} - 1 \div 10^{2006}$$

$$\text{៣) } (11^{10^8} - 1) - (11^{10^6} - 1) + (11^{10^4} - 1) \div 1152$$

១០) ចំណុច: ក) ប្រភេទ២

$$\text{តាម } A = 11^{10^8} - 11^{10^6} + 11^{10^4} - 1$$

$$= 11^2 (11^{10^6} - 11^{10^4} + 1)$$

$$= 11^2 (11^{10^4} - 1) (11^{10^2} - 1)$$

$$= 11^2 (11^{10^2} - 1)^2 (11^{10^2} + 1)$$

$$\text{២) } 1152 = 2^7 \times 3$$

$$\text{គេដឹង } 1152 = 2^7 \times 3$$

$$\text{ដូច្នេះ } 11 = 2k+1 \quad (k \in \mathbb{N})$$

$$\text{គា: } A = (2k+1)^2 (2k)^2 (2k+2)^2 [(2k+1)^2 + 1]$$

$$\text{២) } = 32(2k+1)^2 \cdot k^2 (k+1)^2 (2k+2)^2$$

$$\text{មាន } k(k+1) \div 2 \text{ ដូច្នេះ } k^2(k+1)^2 \div 4$$

$$\text{គា: } A \div 32 \times 4$$

$$\text{១) } A \div 2^7 \quad (1)$$

$$\text{២) } A \div 2^7 \quad (1)$$

$$\text{៣) } A \div 2^7 \quad (1)$$

$$\text{៤) } A \div 2^7 \quad (1)$$

$$\text{៥) } A \div 2^7 \quad (1)$$

ផ្គត់ផ្គង់ :

$$n(n-1)(n+1) : 3$$

$$9! n^2(n-1)(n+1) : 9$$

$$\text{ឆ័ណ្ឌ } A : 9 \quad (2)$$

$$(1) \text{ និង } (2) \quad A : 2^7 \times 9$$

$$\text{ឆ័ណ្ឌ } A : 1152$$

II (តើ 20)

$$\text{ក) } \underline{\text{ស្វ័យគ្នា } f(2)=2; f(3)=3}$$

$$\text{តាមល. 2. i) } f(ab) = f(a) \cdot f(b)$$

$$(a;b)=1 \quad \text{និង} \quad \text{តាមល. 2}$$

$$\text{ii) } f(p)+f(q)=f(p+q)$$

និង $p; q$ គ្រប់គ្នាបរិច្ចាគ :

$$\text{• ឆ័ណ្ឌ } a=2; b=3$$

$$\text{តាម i) : } f(6) = f(2) \cdot f(3)$$

$$\text{តាម ii) } 2f(3) = f(2) \cdot f(3)$$

$$\text{ឆ័ណ្ឌ } f(3) \neq 0 \quad \text{នោះ : } \boxed{f(2)=2}$$

$$\text{• ឆ័ណ្ឌ } p=q=2$$

$$\text{តាម ii) : } f(4) = f(2)+f(2)=4$$

$$\text{• ឆ័ណ្ឌ } p=2; q=3$$

$$\text{តាម ii) } f(5) = f(2)+f(3)=2+f(3)$$

$$\text{• ឆ័ណ្ឌ } p=5; q=2$$

$$f(7) = f(5)+2 = f(3)+4$$

$$\text{• ឆ័ណ្ឌ } p=5; q=7$$

$$f(12) = f(5)+f(7)$$

$$= f(3)+2 + f(3)+4$$

$$= 2f(3)+6 \quad (1)$$

$$\text{• ឆ័ណ្ឌ } a=4; b=3$$

$$\text{តាម i) : } f(12) = f(4) \cdot f(3)$$

$$= 4f(3) \quad (2)$$

$$(1) \text{ និង } (2) :$$

$$2f(3)+6 = 4f(3)$$

$$\text{ឆ័ណ្ឌ } \boxed{f(3)=3}$$

$$\text{តាមល. 2 } f(5)=5; f(7)=7$$

$$\text{ខ) ឆ័ណ្ឌ } f(1999) \text{ និង } f(2006)$$

$$\text{1999 គឺជា } 1999 \text{ គ្រប់គ្នាបរិច្ចាគ :}$$

$$\text{នោះ : } 1999+3 = 2002 = 2 \times 7 \times 11 \times 13$$

$$\text{• ឆ័ណ្ឌ } a=5; b=3 : f(15)=15$$

$$\text{• ឆ័ណ្ឌ } p=13; q=2 : f(15)=f(13)+f(2)$$

$$\text{នោះ : } f(13) = f(15)-f(2) = 13$$


$$\text{• ឆ័ណ្ឌ } p=11; q=2 \text{ នោះ : } f(11)=11$$

$$\text{នោះ : } f(2002) = f(2) \cdot f(4) \cdot f(11) \cdot f(13) \\ = 2 \times 4 \times 11 \times 13 = 2002$$

$$\boxed{f(1999) = f(2002) - f(3) = 1999}$$

$$\boxed{f(2006) = f(1999) + f(7) = 2006}$$

III (សិស្ស ២០)



ក) (ស្វាយបញ្ជាក់ MEKF ជាការ៉េ)

១) មាន EH និង FM ជាមធ្យមនៃ
 ២) កែវ BCE និង BCF.

ដោះ: $EM = FM = \frac{BC}{2}$ (1)

ដូចគ្នា: EK និង FK មធ្យមនៃ
 ២) កែវ AEH និង AFH

ដោះ: $EK = FK = \frac{1}{2} AH$ (2)

មាន $\widehat{BAC} = 45^\circ$

ដោះ: ២) ABE ; ACF កែវសមបាត

ដូចគ្នា: $AE = BF$, $\widehat{ECH} = 45^\circ$

ដោះ: ២) CEH កែវសមបាត

ដូចគ្នា: $CE = HE$.

ដូចគ្នា ២) កែវ AHE $\cong$ កែវ BCE

ដូចគ្នា $AH = BC$ (3)

(1) ; (2) ; (3) ចុះក្រោយ.

MEKF ជាការ៉េ (4)

បញ្ជាក់:

$\widehat{KAE} = \widehat{KEA}$ (២) AKE សមបាត

$\widehat{MBE} = \widehat{MEB}$ (២) BME សមបាត

ដូចគ្នា $\widehat{KAE} = \widehat{MBE}$ (២) AHE $\cong$ ២) BCE

ដូចគ្នា $\widehat{KEA} = \widehat{MEB}$

ដូចគ្នា $\widehat{KEA} + \widehat{KEH} = 90^\circ$

ដោះ: $\widehat{MEK} = \widehat{MEB} + \widehat{KEH} = 90^\circ$

(4) និង (5): MEKF ជាការ៉េ

២) (ស្វាយបញ្ជាក់ ប្រសព្វកែវនៃ កែវ MEK)

១) បង្កើតកំណាត់ OH (O ជាកណ្តាល)

O ជាកណ្តាលនៃកំណាត់ ២) ABC.

ដូចគ្នា ២) AFC និង AEB កែវសមបាត

ដោះ: E, O ជាចំណុចមធ្យមនៃ ២) AE

$EO \perp AB$

$CF \perp AF$

ដោះ: $EO \parallel CF$

$FO \parallel BE$

ដូចគ្នា:

ដូចគ្នា HEOF ជាការ៉េសមបាត

ដូចគ្នា I (ប្រសព្វ HK និង FE)

ដូចគ្នា: I កំណាត់ OH

ក) ដូចគ្នា EF ប្រសព្វកំណាត់ OH

ដូចគ្នា ២) ABC មាន $\widehat{BAC} = 45^\circ$

H ជាកណ្តាល ដោះ: $BC = AH$

ដូចគ្នា ២) AFE មាន $\widehat{FAE} = 45^\circ$

ដូចគ្នា O កំណាត់ ដោះ:

$FE = OA = 2005$

IV (ឆ្នាំ 15)

កំណត់អនុគមន៍ $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$f\left(\frac{x+y}{2}\right) = \frac{f(y) - f(x)}{y-x}$$

នោះ $x, y \in \mathbb{R}, x \neq y$

ជំនួស x នោះ $x-y$

y នោះ $x+y$

$$\text{គំរាម } f'(x) = \frac{f(x+y) - f(x-y)}{2y}$$

ដោយជំនួស x ក្នុងកំរាម

$$\begin{aligned} \text{ឬ } f'(x) &= \frac{f'(x+y) - f'(x-y)}{2y} \\ &= \frac{1}{2y} \left[\frac{f(x+2y) - f(x)}{2y} - \frac{f(x) - f(x-2y)}{2y} \right] \\ &= \frac{1}{2y} \left[\frac{f(x+2y) - f(x)}{2y} + \frac{f(x-2y) - f(x)}{(-2y)} \right] \\ &= \frac{f(x+2y) + f(x-2y) - 2f(x)}{4y^2} \end{aligned}$$

$$\text{ឬ } f''(x) = \frac{1}{4y^2} [f'(x+2y) + f'(x-2y) - 2f'(x)]$$

$$\text{នោះ } f'(x+2y) = \frac{f(x+4y) - f(x)}{4y}$$

$$f'(x-2y) = \frac{f(x-4y) - f(x)}{(-4y)}$$

$$2f'(x) = 2 \cdot \frac{f(x+y) - f(x-y)}{2y}$$

ជំនួស y នោះ $4y$:

$$2f'(x) = \frac{f(x+4y) - f(x-4y)}{4y}$$

$$\text{នោះ } f'''(x) = \frac{1}{4y^2} [f'(x+2y) + f'(x-2y) - 2f'(x)]$$

$$\text{ឬ } f'''(x) = 0$$

$$\text{គំរាម } f'(x) = a$$

$$f'(x) = ax + b$$

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

$$\text{ឬ } f(x) = ax^2 + bx + c \quad (a, b, c)$$

V (ឆ្នាំ 15)

កំណត់អនុគមន៍ $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad \text{មានស្រាប់}$$

$$\text{— បើ } a=0 \text{ នោះ } bx + c = 0$$

$$\text{ឬ តាមល. ១ } b = -\frac{2005c}{4}$$

$$\text{នោះ } -\frac{2005c}{4}x + c = 0$$

$$c\left(-\frac{2005x}{4} + 1\right) = 0$$

$$\text{— គំរាម: } c=0 \text{ សម្រាប់ } x \in \mathbb{R}$$

$$\text{— គំរាម: } c \neq 0 \text{ សម្រាប់ } x \in \mathbb{R}$$

$$\text{គឺ: } x = \frac{4}{2005}$$

$$\text{— បើ } a \neq 0 \text{ តាម}$$

$$\text{ឬ } f(x) = ax^2 + bx + c$$

$$\text{ក៏ } af\left(\frac{4}{2005}\right) = a\left(\frac{16}{2005^2}a + \frac{4}{2005}b + c\right)$$

$$= \frac{a}{2005^2} (16a + 4 \cdot 2005b + 2005^2c)$$

$$= \frac{a}{2005^2} [16a + 2005(4b + 2005c)]$$

$$= \frac{a}{2005^2} [16a + 2005(-3a)]$$

$$af\left(\frac{u}{2005}\right) = -\frac{5999a^2}{2005^2} < 0$$

ឆ្លើយ: សំនុំរាង មានសិបបីធាតុ

VI (លីក 10)

ស្រាយចំណុច ១) មានតាម ២ ឆ្លើយ: $1, \sqrt{3}, 3$

ចំណុច ២) ឆ្លើយតាម ១) :

ឆ្លើយតាម ២) ឆ្លើយតាម ១) មានតាម ២ ឆ្លើយ

$1, \sqrt{3}, 3$

ឆ្លើយ $u_m = 1, u_n = \sqrt{3}, u_p = 3$

4p គណនា:
$$\frac{u_p - u_n}{u_n - u_m} = \frac{3 - \sqrt{3}}{\sqrt{3} - 1} = \sqrt{3} \quad (1)$$

ឆ្លើយតាម ២) ឆ្លើយតាម ១) ឆ្លើយតាម ២) ឆ្លើយតាម ១)

ឆ្លើយតាម ១) :

$$\frac{u_p - u_n}{u_n - u_m} = \frac{u_1 + (p-1)d - u_1 - (n-1)d}{u_1 + (n-1)d - u_1 - (m-1)d}$$

4p
$$= \frac{p-n}{n-m} \quad (2)$$

(1) ដូច (2) ទាញបាន :

$$\frac{p-n}{n-m} = \sqrt{3}$$

(2) សមភាពនេះ មិនមែន គឺជា ករណី ២
ដូចគ្នា គឺជា ករណី ២ ដូចគ្នា
គឺជា ករណី ២ ដូចគ្នា $(m, n, p \in \mathbb{N})$

ឆ្លើយ: គណនាតាម ១) ឆ្លើយតាម ១) ឆ្លើយតាម ១) ឆ្លើយតាម ១)

៩

ប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សត្រីកុដ្ឋានប្រទេស
ផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ គណិតវិទ្យា ប្រវត្តិ
ឆ្នាំទី ៩ និងទី ១២ ឆ្នាំសិក្សា ២០០៤-២០០៥
សម័យប្រឡង : ០៥-០៥-០៥

ហិត ស៊ីភេត
អធិការ គណិតវិទ្យា
TEL: 011 953 029

វិញ្ញាសា គណិតវិទ្យា ឆ្នាំទី ១២ លើកទី១ ថ្ងៃទី ០៥-០៥-០៥
(រយៈពេល ៣ ម៉ោង ពិន្ទុ ១០០)

១-(៥ពិន្ទុ) ចំពោះគ្រប់ចំនួនគតិវិជ្ជមាន k គេកំណត់ $k! = 1 \times 2 \times \dots \times k$ ។

$$\text{គណនាផលបូក } S = \frac{1}{2!} + \frac{2}{3!} + \frac{3}{4!} + \dots + \frac{n}{(n+1)!} \quad ?$$

២-(១០ពិន្ទុ) បង្ហាញថា $n! > 3^n$ ចំពោះគ្រប់ចំនួនគតិវិជ្ជមាន n ដែល $n \geq 7$ ។

៣-(១៥ពិន្ទុ) $S_k = u_1 + u_2 + \dots + u_k$ ជាផលបូក k ក្នុងប្លង់នៃស្វីតនព្វន្ឋ (u_n) មួយដែលមាន $u_1 \neq 0$ ហើយផ្ទៀងផ្ទាត់

$$\frac{S_m}{S_n} = \left(\frac{m}{n}\right)^2 \quad \text{ចំពោះគ្រប់ } m \neq n \quad ?$$

គណនា $\frac{u_{m+2004}}{u_{n+2005}}$ ជាអនុគមន៍នៃ m និង n ។

៤-(១៥ពិន្ទុ) p ជាចំនួនគតិវិជ្ជមាន ហើយ $p \geq 2$ ដែល $(p-1)! + 1$ ចែកដាច់នឹង p ។

បង្ហាញថា p ជាចំនួនបឋម ។

៥-(១៥ពិន្ទុ) អនុគមន៍ f កំណត់ដោយ $f(x+a) = \frac{1}{2} + \sqrt{f(x) - f^2(x)}$ ចំពោះគ្រប់ $x \geq 0$ និង $a > 0$ ។

បង្ហាញថា f ជាអនុគមន៍ខួបនៅលើ $[0; +\infty[$ ។

៦-(២០ពិន្ទុ) សមីការ $x^4 + ax^3 + bx^2 + ax + 1 = 0$ មានរឹលជាចំនួនពិតមួយយ៉ាងតិច ចំពោះ a និង b ជាចំនួនពិត ។
កំណត់តំលៃអប្បបរមានៃ $a^2 + b^2$ ។

៧-(២០ពិន្ទុ) ចំនុច O មួយស្ថិតនៅលើជ្រុង $[AB]$ នៃចតុកោណប៉ោង $ABCD$ មួយ ។ រង្វង់ជួស O កាត់មួយប៉ះជ្រុង $[BC]$;
 $[CD]$ និង $[DA]$ នៃចតុកោណ ។ ចតុកោណ $ABCD$ ចារឹកក្នុងរង្វង់មួយផ្សេងទៀត ។

បង្ហាញថា $AD + BC = AB$ ។



គម្រោងវគ្គគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២

សំរាប់ថ្ងៃទី ០៥-០៥-០៥

១-(៥ពិន្ទុ) គណនា ផលបូក $S = \frac{1}{2!} + \frac{2}{3!} + \frac{3}{4!} + \dots + \frac{n}{(n+1)!}$:

$$S = \frac{1}{2!} + \frac{2}{3!} + \frac{3}{4!} + \dots + \frac{n}{(n+1)!} = \frac{1}{1!} - \frac{1}{2!} + \frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{3!} - \frac{1}{4!} + \dots + \frac{1}{n!} - \frac{1}{(n+1)!}$$

៣ពិន្ទុ

$$S = 1 - \frac{1}{(n+1)!} = \frac{(n+1)! - 1}{(n+1)!}$$

២ពិន្ទុ

២-(១០ពិន្ទុ) បង្ហាញថា $n! > 3^n$, $n \geq 7$:

-បើ $n = 7$: $7! = 5040 > 3^7 = 2187$: ពិត

២ពិន្ទុ

-ឧបមាថា ពិតដល់ $n = k$ គឺថា $k! > 3^k$

៣ពិន្ទុ

-សិក្សាចំពោះ $n = k+1$:

$$(k+1)! = k!(k+1) > 3^k(k+1) > 3^k \cdot 3 = 3^{k+1} \quad \text{ព្រោះ } k+1 > 7 > 3 \quad \text{គ) នឹង ១}$$

៣ពិន្ទុ

បានន័យថា $(k+1)! > 3^{k+1}$

ដូចនេះ: $n! > 3^n$, $n \geq 7$

២ពិន្ទុ

៣-(១៥ពិន្ទុ) គណនា $\frac{u_{m+2004}}{u_{n+2005}}$ ជាអនុគមន៍នៃ m & n :

គេមាន: $\frac{m^2}{n^2} = \frac{S_m}{S_n} = \frac{[2u_1 + (m-1)d]m}{[2u_1 + (n-1)d]n}$

៣ពិន្ទុ

$$\frac{m}{n} = \frac{2u_1 + (m-1)d}{2u_1 + (n-1)d}$$

២ពិន្ទុ

$$m[2u_1 + (n-1)d] = n[2u_1 + (m-1)d]$$

២ពិន្ទុ

$$2u_1(m-n) - (m-n)d = 0$$

២ពិន្ទុ

$$2u_1 - d = 0 ; d = 2u_1 \quad \text{ព្រោះ } m \neq n$$

ម្យ៉ាងទៀត:

$$\frac{u_{m+2004}}{u_{n+2005}} = \frac{u_1 + (m+2003)d}{u_1 + (n+2004)d} = \frac{u_1 + (m+2003)2u_1}{u_1 + (n+2004)2u_1}$$

៣ពិន្ទុ

ដូចនេះ: $\frac{u_{m+2004}}{u_{n+2005}} = \frac{2m+4007}{2n+4009}$

៣ពិន្ទុ

៤-(១៥ពិន្ទុ) បង្ហាញថា p ជាចំនួនបឋម:

ឧបមាថា p មិនមែនជាចំនួនបឋម នោះមាន d ជាភូមិចែកនៃ p (ដែល $1 < d < p$) នឹង ១

៣ពិន្ទុ

ដូចនេះ $d | (p-1)!$

២ពិន្ទុ

គេដឹងថា $p | ((p-1)!+1)$ គឺមានចំនួនគត់ k ដែល $(p-1)!+1 = pk$

២ពិន្ទុ

ដោយ $d | p$ នោះ $d | pk$ គឺ $d | ((p-1)!+1)$

២ពិន្ទុ

គេបាន: $d | ((p-1)!+1)$ និង $d | (p-1)!$

២ពិន្ទុ

នោះ $d | ((p-1)!+1 - (p-1)!) = 1$ គឺថា $d | 1$ ដែលផ្ទុយនឹង $1 < d < p$

២ពិន្ទុ

ដូចនេះ

p ជាចំនួនបឋម

៥-(១៥ពិន្ទុ) បង្ហាញថា f ជាអនុគមន៍ខួប :

f មានដែនកំនត់ $D = [0; +\infty[$

គ្រប់ $x \in D; x+2a \in D$ ព្រោះ $a > 0$ គ្នា មិន 2

$$f(x+2a) = f((x+a)+a) = \frac{1}{2} + \sqrt{f(x+a) - f^2(x+a)}$$

$$= \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{2} + \sqrt{f(x) - f^2(x)} - \left(\frac{1}{2} + \sqrt{f(x) - f^2(x)}\right)^2}$$

$$= \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{2} + \sqrt{f(x) - f^2(x)} - \left(\frac{1}{4} + \sqrt{f(x) - f^2(x)} + f(x) - f^2(x)\right)}$$

$$= \frac{1}{2} + \sqrt{\frac{1}{4} - f(x) + f^2(x)} = \frac{1}{2} + \sqrt{\left(f(x) - \frac{1}{2}\right)^2}$$

$$= \frac{1}{2} + f(x) - \frac{1}{2} \quad \text{ព្រោះ } f(x) \geq \frac{1}{2} \text{ ចំពោះគ្រប់ } x \geq 0$$

$$f(x+2a) = f(x) \text{ ចំពោះគ្រប់ } x \in [0; +\infty[$$

ដូចនេះ

f ជាអនុគមន៍ខួបនៅលើ $D = [0; +\infty[$

៦-(២០ពិន្ទុ) គណិតវិទ្យាសម្រាប់ប្រឡូក $a^2 + b^2$:

-បើ $x = 0$ សមីការអាចសរសេរ: $1 = 0$ មិនអាចមាន គឺ $x \neq 0$

-ចែកគ្រប់ភូមិ x^2 គេបាន $\left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right) + a\left(x + \frac{1}{x}\right) + b = 0$

$$\text{តាង } k = x + \frac{1}{x}; |k| = \left|\frac{x^2 + 1}{x}\right| = \frac{|x|^2 + 1}{|x|} = |x| + \frac{1}{|x|} \geq 2$$

$$\text{គេបាន } k^2 - 2 = x^2 + \frac{1}{x^2}$$

$$\text{សមីការអាចសរសេរ: } k^2 - 2 + ak + b = 0$$

$$2 - k^2 = ak + b \text{ ហើយ } |2 - k^2| = |ak + b| \leq \sqrt{a^2 + b^2} \sqrt{k^2 + 1}$$

$$(2 - k^2)^2 \leq (a^2 + b^2)(k^2 + 1)$$

$$a^2 + b^2 \geq \frac{(2 - k^2)^2}{k^2 + 1} \quad (1)$$

$$\text{តាង } t = k^2 + 1$$

$$\text{ដោយ } |k| \geq 2 \text{ ដូច្នេះ } t = k^2 + 1 \geq 5$$

$$(1) \text{ អាចសរសេរ: } a^2 + b^2 \geq \frac{(3-t)^2}{t} \quad (2)$$

$$\text{សិក្សាអំពីអនុគមន៍ } f(t) = \frac{(3-t)^2}{t}; t \geq 5$$

$$f'(t) = \frac{t^2 - 9}{t^2} > 0 \text{ ចំពោះ } t \geq 5$$


គេទាញបាន f កើនជាអនិច្ចលើ $[5; +\infty[$ គឺថា $f(t) \geq f(5) = \frac{(3-5)^2}{5} = \frac{4}{5}$

(2) : $a^2 + b^2 \geq \frac{(3-t)^2}{t} \geq \frac{4}{5}$ នោះ $a^2 + b^2 \geq \frac{4}{5}$

ដូចនេះ

$$\min(a^2 + b^2) = \frac{4}{5}$$

៧-(២០ពិន្ទុ) បង្ហាញថា $AD + BC = AB$:



$AD + BC = AE + ED + BF + FC$ (1)

$BF = r \cot B$ $FC = r \cot \frac{C}{2}$ $ED = r \cot \frac{D}{2}$ $AE = r \cot A$

$AB = AO + OB = \frac{r}{\sin A} + \frac{r}{\sin B}$

ដោយ ABCD ជាពហុកោណច្របូក នោះ $A + C = \pi$; $B + D = \pi$

គេបាន $\frac{C}{2} = \frac{\pi}{2} - \frac{A}{2}$; $\frac{D}{2} = \frac{\pi}{2} - \frac{B}{2}$

(1) អាចសរសេរ : $AD + BC = r(\cot A + \cot \frac{D}{2} + \cot B + \cot \frac{C}{2})$

$AD + BC = r(\cot A + \tan \frac{B}{2} + \cot B + \tan \frac{A}{2})$ (2)

តែ $\tan \frac{A}{2} = \frac{1 - \cos A}{\sin A}$; $\tan \frac{B}{2} = \frac{1 - \cos B}{\sin B}$

(2) អាចសរសេរ : $AD + BC = r\left(\frac{\cos A}{\sin A} + \frac{1 - \cos B}{\sin B} + \frac{\cos B}{\sin B} + \frac{1 - \cos A}{\sin A}\right)$

$AD + BC = r\left(\frac{1}{\sin A} + \frac{1}{\sin B}\right) = \frac{r}{\sin A} + \frac{r}{\sin B} = AB$

ដូចនេះ

$$AD + BC = AB$$

ថ្ងៃទី ០៥ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៥

ប្រធានក្រុមគំណែ គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី ១២

អ៊ី ស៊ីមលី

②

ហ៊ុន សែន

ប្រធានមន្ទីរសេសសិស្សត្រកូលនៃប្រទេស
 ផ្នែកអក្សរសិល្ប៍វិទ្យា គណិតវិទ្យា រូបវិទ្យា
 ថ្នាក់ទី ៩ និងទី ១២ ឆ្នាំសិក្សា ២០០៤-២០០៥
 សម័យប្រឡូកៈ ០៥-០៥-០៥

វិញ្ញាបនា គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី ១២ លើកទី២ ថ្ងៃទី ០៧-០៥-០៥
 (ឈរក្រោម ៣ ម៉ោង ពិន្ទុ ១០០)

- ១-(១០ពិន្ទុ) បង្ហាញថា $F = \frac{21n+4}{14n+3}$ ជាប្រភាគសំរួលមិនបានចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ធម្មជាតិ n ។
- ២-(១០ពិន្ទុ) រកចំនួនគត់ធម្មជាតិតូចបំផុតដែលមាន 6 ជាលេខខ្ទង់ចក្ខុ ហើយបើគេប្តូរលេខ 6 ទៅខាងមុខគេបំផុតវិញ នោះគេនឹងបានចំនួនថ្មីដែលស្មើ 4 ដងនៃចំនួនដើមនោះ ។
- ៣-(១៥ពិន្ទុ) កំណត់គ្រប់អនុគមន៍លេខ g ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ $(x-y)g(x+y) - (x+y)g(x-y) = 4xy(x^2-y^2)$ ។
- ៤-(១៥ពិន្ទុ) A និង B ជាចំនុចនឹងនៅក្នុងប្លង់ (P) មួយ ។ គេបន្លាយ $[AB]$ ខាងចំនុច B ឱ្យបាន $BC = \frac{AB}{k^2-1}$ ដែល $k > 1$ ។
 M ជាចំនុចលើក្នុងប្លង់ (P) ដោយ ផ្ទៀងផ្ទាត់ $\frac{MA}{MB} = k$ ។ កំណត់សំណុំនៃចំនុច M ។
- ៥-(២៥ពិន្ទុ) p ជាចំនួនបឋម ហើយ $C(p; x)$ ជាចំនួនបន្សុំនៃ p ធាតុខុសគ្នាដោយចាប់យក ម្តង x ធាតុ ($x \leq p$) ។
 ក- បង្ហាញថា $C(p; x)$ ជាពហុគុណនៃ p ចំពោះគ្រប់ x ដែល $0 < x < p$ ។
 ខ- បង្ហាញថា $(a+b)^p - a^p - b^p$ ជាពហុគុណនៃ p ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ធម្មជាតិ a និង b ។
 គ- បង្ហាញថា $a^p - a$ ចែកដាច់នឹង p ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ធម្មជាតិ a ។
- ៦-(២៥ពិន្ទុ) អនុគមន៍ f កំណត់លើសំនុំចំនួនគត់ធម្មជាតិមិនសូន្យ ហើយយកតំលៃលើសំនុំចំនួនគត់ធម្មជាតិ ។
 f ផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខណៈទាំងបួនខាងក្រោម ៖
 (1) : $f(2) = 0$
 (2) : $f(3) > 0$
 (3) : $f(9999) = 3333$
 (4) : ចំពោះគ្រប់ $m; n$ គេបាន : $\begin{cases} f(m+n) = f(m) + f(n) \\ \vee f(m+n) = f(m) + f(n) + 1 \end{cases}$
 ក- កំណត់ $f(1)$ និង $f(3)$ ។
 ខ- បង្ហាញថា $f(3n) \geq n$ ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ធម្មជាតិមិនសូន្យ n ។
 គ- កំណត់ $f(2005)$ ។

អត្រាកំណែ គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី ១២

សំរាប់ថ្ងៃទី ០៧-០៥-០៥

១-(១០ពិន្ទុ) បង្ហាញថា $F = \frac{21n+4}{14n+3}$ ជាប្រភាគស្រួលមិនបាន :

ឧបមាថាមាន d ជាចំនួនគត់បំប៉ននៃ $21n+4$ & $14n+3$ នោះគេបាន :

$$21n+4=da, a \in \mathbb{N}$$

$$14n+3=db, b \in \mathbb{N}$$

$$21n+4-(14n+3)=(a-b)d$$

$$7n+1=(a-b)d$$

$$21n+3=3(a-b)d$$

$$21n+4-(21n+3)=ad-3(a-b)d$$

$$1=(3b-2a)d$$

ដោយ $3b-2a$ ជាចំនួនគត់ នោះ $d|1$ គឺ $d=1$

ដូចនេះ

F ជាប្រភាគស្រួលមិនបាន

២ពិន្ទុ

២ពិន្ទុ

២ពិន្ទុ

២ពិន្ទុ

២ពិន្ទុ

២-(១០ពិន្ទុ)

តាង $x = x_1 x_2 \dots x_n$ នោះ $x_1 x_2 \dots x_n 6$ ជាចំនួនដែលស្រួលរក

$$\text{គេបាន } 6x_1 x_2 \dots x_n = 4(x_1 x_2 \dots x_n 6)$$

$$6 \times 10^n + x = 4(10x + 6)$$

$$2(10^n - 4) = 13x$$

$$\text{ដោយ } (2;13)=1 \text{ នោះ } 13|(10^n - 4)$$

$$\text{-បើ } n=1 \text{ នោះ } 10^1 - 4 = 10 - 4 = 6 \quad \text{ចែកមិនដាច់នឹង 13}$$

$$\text{-បើ } n=2 \text{ នោះ } 10^2 - 4 = 10^2 - 4 = 96 \quad \text{ចែកមិនដាច់នឹង 13}$$

$$\text{-បើ } n=3 \text{ នោះ } 10^3 - 4 = 10^3 - 4 = 996 \quad \text{ចែកមិនដាច់នឹង 13}$$

$$\text{-បើ } n=4 \text{ នោះ } 10^4 - 4 = 10^4 - 4 = 9996 \quad \text{ចែកមិនដាច់នឹង 13}$$

$$\text{-បើ } n=5 \text{ នោះ } 10^5 - 4 = 10^5 - 4 = 99996 \quad \text{ចែកដាច់នឹង 13}$$

$$\text{ករណីនេះគេបាន } x = \frac{2(99996)}{13} = 15384 \quad \text{ហើយ } x_1 x_2 \dots x_n 6 = 153846$$

២ពិន្ទុ

១ពិន្ទុ

១ពិន្ទុ

១ពិន្ទុ

១ពិន្ទុ

១ពិន្ទុ

១ពិន្ទុ

១ពិន្ទុ

១ពិន្ទុ

៣-(១៥ពិន្ទុ) គណិតគ្រប់គ្រងអនុគមន៍ g :

$$\text{ដោយចែកគ្រប់គ្នានឹង } x^2 - y^2: \quad \frac{g(x+y)}{x+y} - \frac{g(x-y)}{x-y} = 4xy$$

$$\text{តាង } f(x) = \frac{g(x)}{x} \text{ នោះ } g(x) = xf(x)$$

$$\text{គេបាន } f(x+y) - f(x-y) = 4xy \quad (1)$$

២ពិន្ទុ

២ពិន្ទុ

១ពិន្ទុ

$$\text{ឃើញ } x = x_0 + \frac{h}{2} ; y = \frac{h}{2}$$

$$(1) \text{ អាចសរសេរ } f(x_0 + h) - f(x_0) = 4(x_0 + \frac{h}{2})(\frac{h}{2})$$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2x_0 + h)$$

$$f'(x_0) = 2x_0$$


$$f'(x) = 2x$$

$$f(x) = x^2 + c \quad (c \in \mathbb{R})$$

$$g(x) = x(x^2 + c) = x^3 + cx \quad (c \in \mathbb{R})$$

$$g(x) = x^3 + cx \quad (c \in \mathbb{R})$$

៤-(១៥ពិន្ទុ)



កំណត់សំណុំចំនុច M :

$$\text{តាង } AB = a \text{ នោះ } AC = AB + BC = a + \frac{a}{k^2 - 1} = \frac{ak^2}{k^2 - 1}$$

$$\triangle CAM : MA^2 = CM^2 + CA^2 - 2CM \cdot CA \cdot \cos C$$

$$\triangle CBM : MB^2 = CM^2 + CB^2 - 2CM \cdot CB \cdot \cos C$$

$$\text{តែ } MA^2 = k^2 \cdot MB^2$$

$$CM^2 + CA^2 - 2CM \cdot CA \cdot \cos C = k^2 CM^2 + k^2 CB^2 - 2k^2 CM \cdot CB \cdot \cos C$$

$$(1 - k^2)CM^2 = -\left(\frac{k^2 a}{k^2 - 1}\right)^2 + \frac{2k^2 a}{k^2 - 1} CM \cdot \cos C + k^2 \frac{a^2}{(k^2 - 1)^2} - \frac{2k^2 a}{k^2 - 1} CM \cdot \cos C$$

$$CM^2 = \frac{(ka)^2}{(k^2 - 1)^2}$$

$$CM = \frac{ka}{k^2 - 1}$$

ដូចនេះ

$$\text{សំណុំចំនុច M គឺជារង្វង់ជួរ C កំរិត } \frac{ka}{k^2 - 1} \text{ ដែល } k > 1$$

៥-(២៥ពិន្ទុ) ក- បង្ហាញថា $C(p; x)$ ជាពហុគុណនៃ p ចំពោះគ្រប់ x ដែល $0 < x < p$:

$$C(p; x) = \frac{p!}{(p-x)!x!} = \frac{p(p-1)(p-2)\cdots(p-x+1)}{x!}$$

១ពិន្ទុ

គេទាញបាន $p \mid (x!C(p; x))$

២ពិន្ទុ

ដោយ $0 < x < p$ និង p ជាចំនួនបឋម ទោះ $(p, x!) = 1$

២ពិន្ទុ

ដោយ $p \mid x!C(p; x)$ និង $(p, x!) = 1$ ទោះ $p \mid C(p; x)$

ដូចនេះ $C(p; x)$ ជាពហុគុណនៃ p ចំពោះគ្រប់ x ដែល $0 < x < p$

២ពិន្ទុ

ខ-បង្ហាញថា $(a+b)^p - a^p - b^p$ ជាពហុគុណនៃ p ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ធម្មជាតិ a និង b :

$$(a+b)^p - a^p - b^p = C(p; 0)a^p + C(p; 1)a^{p-1}b + \cdots + C(p; p-1)ab^{p-1} + C(p; p)b^p - a^p - b^p$$

២ពិន្ទុ

$$= C(p; 1)a^{p-1}b + \cdots + C(p; p-1)ab^{p-1} = \sum_{x=1}^{p-1} C(p; x)a^{p-x}b^x$$

២ពិន្ទុ

តាមសំរាយបញ្ជាក់ខាងលើ : $p \mid C(p; x)$ ចំពោះ $0 < x < p$

គេបាន $p \mid C(p; x)a^{p-x}b^x$ ចំពោះ $0 < x < p$

២ពិន្ទុ

គេទាញបាន $p \mid \sum_{x=1}^{p-1} C(p; x)a^{p-x}b^x$ គឺ $p \mid ((a+b)^p - a^p - b^p)$

ដូចនេះ $(a+b)^p - a^p - b^p$ ជាពហុគុណនៃ p ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ធម្មជាតិ a និង b

២ពិន្ទុ

គ- បង្ហាញថា $a^p - a$ ចែកដាច់នឹង p ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ធម្មជាតិ a :

-ចំពោះ $a = 0$: $0^p - 0 \equiv 0 \pmod{p}$: ពិត

២ពិន្ទុ

-ឧបមាថាទំនាក់ទំនងពិតដល់ $a = k$ គឺថា $k^p - k \equiv 0 \pmod{p}$

២ពិន្ទុ

-សិក្សាចំពោះ $a = k+1$:

$$A = (k+1)^p - (k+1) = ((k+1)^p - k^p - 1^p) + (k^p - k)$$

២ពិន្ទុ

តាមសំនួរ (ខ) : $(k+1)^p - k^p - 1^p \equiv 0 \pmod{p}$

១ពិន្ទុ

តាមសម្មតិកម្មកំនើន : $k^p - k \equiv 0 \pmod{p}$

១ពិន្ទុ

ទាញបាន : $A \equiv 0 \pmod{p}$

ដូចនេះ $a^p - a$ ចែកដាច់នឹង p ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ធម្មជាតិ a

២ពិន្ទុ

៦-(២៥ពិន្ទុ)

ក- កំណត់ $f(1)$ និង $f(3)$:

$$f(2) = f(1+1) = f(1) + f(1) = 2f(1) = 0 \quad \text{គេបាន } f(1) = 0$$

១ពិន្ទុ

$$f(2) = f(1+1) = f(1) + f(1) + 1 = 2f(1) + 1 = 0 \quad \text{មិនអាចមាន ព្រោះ } f(1) \geq 0$$

១ពិន្ទុ

ដូចនេះ $f(1) = 0$

១ពិន្ទុ

$$f(3) = f(2+1) = f(2) + f(1) = 0 + 0 = 0$$

១ពិន្ទុ

$$f(3) = f(2+1) = f(2) + f(1) + 1 = 0 + 0 + 1 = 1$$

១ពិន្ទុ

ដោយ $f(3) > 0$ នោះ $f(3) = 1$

២ពិន្ទុ

ខ- បង្ហាញថា $f(3n) \geq n$ ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ធម្មជាតិមិនសូន្យ n :

-ចំពោះ $n = 1$ $f(3 \times 1) = f(3) = 1$: ពិត

២ពិន្ទុ

-ឧបមាជាពិតដល់ $n = k$ គឺថា $f(3k) \geq k$

២ពិន្ទុ

-សិក្សាចំពោះ $n = k + 1$:

$$f(3(k+1)) = f(3k) + f(3) + \left| \begin{smallmatrix} 0 \\ 1 \end{smallmatrix} \right| = f(3k) + 1 + \left| \begin{smallmatrix} 0 \\ 1 \end{smallmatrix} \right| \geq k + 1 : \text{ពិត}$$

២ពិន្ទុ

ដូចនេះ $f(3n) \geq n$ ចំពោះគ្រប់ $n \geq 1$

២ពិន្ទុ

គ- កំណត់ $f(2005)$:

បើ $f(3n) > n$ នោះ $f(3(n+1)) = f(3n) + f(3) + \left| \begin{smallmatrix} 0 \\ 1 \end{smallmatrix} \right| > \left| \begin{smallmatrix} n+1 \\ n+2 \end{smallmatrix} \right|$ គឺ $f(3(n+1)) > n+1$

គឺថា $f(3p) > p$ ចំពោះ $p > n$ ។

២ពិន្ទុ

តែ $f(3 \times 3333) = 3333$ & $f(3 \times 1) = 1$ នោះ $f(3n) = n$; $n \leq 3333$

២ពិន្ទុ

គេអាចសរសេរ :

$$f(2005) = f(3 \times 668 + 1) = f(3 \times 668) + f(1) + \left| \begin{smallmatrix} 0 \\ 1 \end{smallmatrix} \right| = 668 + \left| \begin{smallmatrix} 0 \\ 1 \end{smallmatrix} \right| \geq 668 \quad (1)$$

២ពិន្ទុ

ម្យ៉ាងទៀត : $2005 = f(3 \times 2005) = f((2005 + 2005) + 2005) =$

$$= f(2005 + 2005) + f(2005) + \left| \begin{smallmatrix} 0 \\ 1 \end{smallmatrix} \right| = f(2005) + f(2005) + \left| \begin{smallmatrix} 0 \\ 1 \end{smallmatrix} \right| + f(2005) + \left| \begin{smallmatrix} 0 \\ 1 \end{smallmatrix} \right| \geq 3f(2005)$$

$$\text{គឺ } f(2005) \leq \frac{2005}{3} = 668 + \frac{1}{3} \quad (2)$$

២ពិន្ទុ


តាម (1) និង (2) : $668 \leq f(2005) \leq 668 + \frac{1}{3}$

ដោយ $f(2005)$ ជាចំនួនគត់ធម្មជាតិ នោះ $f(2005) = 668$

២ពិន្ទុ

ថ្ងៃទី ០៧ ខែ ឧសភា ឆ្នាំ ២០០៥

ប្រធានក្រុមកំណែ គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី ១២



អ៊ូ ស៊ីមា

ប្រឡងច្រើនសិស្សស្រីក្នុងវិទ្យាល័យប្រទេស
ផ្នែកគណិតវិទ្យា រូបវិទ្យា
ថ្នាក់ទី ៩ និងទី ១២ ឆ្នាំសិក្សា ២០០៥-២០០៦
សម័យប្រឡង: ០៥-០៥-០៦

$$1 + \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2}$$

$$1 + \frac{(n+1)^2 + n^2}{(n(n+1))^2}$$

$$1 + \frac{(n+1-n)^2 + 1}{n^2(n+1)^2}$$

$$\left[\frac{1}{n(n+1)} \right]$$

វិទ្យាសាគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី ១២ លើកទី២ ថ្ងៃទី ០៧-០៥-០៦ (រយៈពេល ៣ ម៉ោង)

១-(១០ពិន្ទុ) គណនាផលបូក $S = \sqrt{1 + \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2}} + \sqrt{1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2}} + \dots + \sqrt{1 + \frac{1}{2005^2} + \frac{1}{2006^2}}$ ។

២-(១០ពិន្ទុ) ស្វ៊ីតនៃចំនួនពិត (a_n) កំណត់ដោយ $a_0 > 2$ និង $a_n = \frac{1}{2} \left(a_{n-1} + \frac{4}{a_{n-1}} \right)$ ចំពោះ $n=1, 2, 3, \dots$ ។
បង្ហាញថា $a_n > 2$ ចំពោះគ្រប់ n ។

៣-(១០ពិន្ទុ) គេឱ្យត្រីកោណ ABC មួយ និង p ជាចំនួនគតិវិជ្ជមាន។ គេបន្លាយជ្រុង [AB] ខាង B ឱ្យបាន $BD = \frac{1}{p} AB$ ។
គេបន្លាយជ្រុង [BC] ខាង C ឱ្យបាន $CE = \frac{1}{p} BC$ ហើយ បន្លាយជ្រុង [CA] ខាង A ឱ្យបាន $AF = \frac{1}{p} CA$ ។
គណនាផលធៀបផ្ទៃក្រលានៃត្រីកោណ DEF និង ផ្ទៃក្រលានៃត្រីកោណ ABC ។

៤-(២០ពិន្ទុ) គេយក E ជាសំណុំនៃចំនួនពិតដែលធំជាង (-1) ។
អនុគមន៍ $f: E \rightarrow E$ កំណត់ដោយ $f(x + f(y) + x f(y)) = y + f(x) + y f(x)$ ចំពោះគ្រប់ $x, y \in E$
ហើយ $\frac{f(x)}{x}$ កើនដាច់ខាត ចំពោះ $-1 < x < 0$ និង $x > 0$ ។ កំណត់អនុគមន៍ f នោះ ។

៥-(២៥ពិន្ទុ) គេមាន [BC] ជាអង្កត់ធ្នូនឹងមួយនៃរង្វង់ (Γ) មួយ។ A ជាចំណុចចល័តនៅលើធ្នូធំ BC នៃ (Γ) ។
I ជាផ្ចិតនៃរង្វង់ចារឹកក្នុង $\triangle ABC$ ហើយ J ជាផ្ចិតនៃរង្វង់ដែលនៅក្រៅ $\triangle ABC$ ហើយប៉ះនឹង [BC], [AB] និង [AC] ។
ក- កំណត់សំណុំនៃចំណុច I និង J កាលណា A ចល័តនៅលើធ្នូធំ BC ។
ខ- សង់ សំណុំនៃចំណុច I និង J ។

៦-(២៥ពិន្ទុ) គេមាន a និង b ជាចំនួនគតិវិជ្ជមាន។ d ជាតួបែករួមធំបំផុតរបស់ a និង b ។
ក- បង្ហាញថា មានចំនួនគត់សនិទាន u និង v ដែល $au + bv = d$
ខ- ដោះស្រាយសមីការ $19x - 33y = 1$ ដែលមានអញ្ញាត x, y ជាចំនួនគត់សនិទាន។

អង្គភាពនៃ គណិតវិទ្យា ឆ្នាំទី ១២

សំណួរទី ០៨.០៥.០៦

១-(១០ពិន្ទុ) គណនាផលបូក $S = \sqrt{1 + \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2}} + \sqrt{1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2}} + \dots + \sqrt{1 + \frac{1}{2005^2} + \frac{1}{2006^2}}$:

គេមាន : $1 + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{(x+1)^2} = \frac{x^4 + x^2 + 1 + 2x^3 + 2x^2 + 2x}{x^2(x+1)^2}$ ២ពិន្ទុ

$$= \frac{(x^2 + x + 1)^2}{x^2(x+1)^2}$$
 ២ពិន្ទុ

$$\sqrt{1 + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{(x+1)^2}} = \frac{x^2 + x + 1}{x(x+1)} = 1 + \frac{1}{x(x+1)}$$

$$= 1 + \frac{1}{x} - \frac{1}{x+1}$$
 ២ពិន្ទុ

$$S = \left(1 + \frac{1}{1} - \frac{1}{2}\right) + \left(1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \dots + \left(1 + \frac{1}{2005} - \frac{1}{2006}\right)$$
 ២ពិន្ទុ

$$S = 2005 + \frac{2005}{2006}$$
 ២ពិន្ទុ

២-(១០ពិន្ទុ) បង្ហាញថា $a_n > 2$ ចំពោះគ្រប់ n

តាមសម្មតិកម្មគេមាន $a_0 > 2$ ។

- ចំពោះ $n=1$, $a_1 - 2 = \frac{1}{2} \left(a_0 + \frac{4}{a_0} \right) - 2 = \frac{(a_0 - 2)^2}{2a_0} > 0$

ដូចនេះ $a_1 > 2$

- ឧបមាថា $a_k > 2$

- ពិនិត្យចំពោះ $n = k+1$

$$a_{k+1} = \frac{1}{2} \left(a_k + \frac{4}{a_k} \right)$$

ដោយ $a_k > 2$ នោះ $0 < \frac{4}{a_k} < 2 < a_k$ ពី $a_k \neq \frac{4}{a_k}$ (១ពិន្ទុ)

តាមវិសមភាពកូស៊ី គេមាន $a_{k+1} > \frac{1}{2} \left(2\sqrt{a_k \times \frac{4}{a_k}} \right)$

$$a_{k+1} > 2$$

ដូចនេះ

$$a_n > 2 \text{ ចំពោះគ្រប់ } n$$

$$a_1 = \frac{1}{2} \left(a_0 + \frac{4}{a_0} \right) \geq \frac{1}{2} \times 2 \sqrt{a_0 \times \frac{4}{a_0}} = 2$$

$$\forall a_1 = \frac{1}{2} \left(a_0 + \frac{4}{a_0} \right) \geq \frac{1}{2} \times 2 \sqrt{a_0 \times \frac{4}{a_0}} = 2$$

$$\left. \begin{array}{l} \text{ដោយ } a_0 > 2 \text{ ឬ } 0 < \frac{4}{a_0} < \frac{1}{2} \\ \frac{4}{a_0} < 2 \end{array} \right\} \Rightarrow \frac{4}{a_0} \neq a_0$$


ដូចនេះ $a_k > 2$ (១ពិន្ទុ)

២ពិន្ទុ

២ពិន្ទុ

២ពិន្ទុ

៣-(១០ពិន្ទុ) គណនាផលធៀបផ្ទៃក្រលាទៃត្រីកោណ DEF និង ផ្ទៃក្រលាទៃត្រីកោណ ABC :



តាង $\hat{BAC} = x$; $\hat{ABC} = y$; $\hat{BCA} = z$

គេមាន $S_{ABC} = \frac{1}{2} AB \cdot AC \sin x$

$$\begin{aligned} S_{AFD} &= \frac{1}{2} AF \cdot AD \sin(\pi - x) \\ &= \frac{1}{2} \times \frac{1}{p} AC \times \frac{p+1}{p} AB \sin x \\ &= \frac{p+1}{p^2} S_{ABC} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_{CEF} &= \frac{1}{2} CE \cdot CF \sin(\pi - z) \\ &= \frac{p+1}{p^2} S_{ABC} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} S_{BDE} &= \frac{1}{2} BD \cdot BE \sin(\pi - y) \\ &= \frac{p+1}{p^2} S_{ABC} \end{aligned}$$

គេបាន $S_{DEF} = \frac{3p+3}{p^2} S_{ABC} + S_{ABC} = \frac{p^2 + 3p + 3}{p^2} S_{ABC}$

ដូចនេះ

$$\boxed{\frac{S_{DEF}}{S_{ABC}} = \frac{p^2 + 3p + 3}{p^2}}$$

thinking if $x = y$ then $f(x) = x$

៤-(២០ពិន្ទុ) កំណត់អនុគមន៍ f :

ឧបមាថា $f(p) = p$ ចំពោះ $p > -1$

យក $x = y = p$ នោះគេបាន $f(2p + p^2) = 2p + p^2$ ()

តាង $q = 2p + p^2$ នោះ (1) អាចសរសេរ $f(q) = q$

- បើ $-1 < p < 0$ នោះគេបាន $-1 < q < p$

តែ $f(p) = p$ និង $f(q) = q$ នោះ $\frac{f(p)}{p} = \frac{f(q)}{q}$ ដែលផ្ទុយពីសម្មតិកម្ម

- បើ $p > 0$ នោះគេបាន $q > p$

តែ $\frac{f(p)}{p} = \frac{f(q)}{q}$ ដែលផ្ទុយពីសម្មតិកម្ម

ដូចនេះ គេត្រូវតែបាន $p = 0$ ហើយ $f(0) = 0$

ម្យ៉ាងទៀត យក $x = y$ ជំនួសក្នុងទំនាក់ទំនងដើម :


$f(x + f(x) + xf(x)) = x + f(x) + xf(x)$ ដែលមានរាង $f(p) = p$

ដូចនេះចំពោះគ្រប់ $x \in E$ គេបាន $x + f(x) + xf(x) = 0$

$$(1+x)f(x) = -x$$

$$f(x) = -\frac{x}{1+x}$$

៥-(២៥ពិន្ទុ) ក- កំណត់សំណុំនៃចំណុច I និង J គាលណា A ចល័តនៅលើប្លង់ BC :



ពិន្ទុ

គ្រូបង្រៀន
(គ្រូបង្រៀន)

សំណង់សំណុំចំណុច I :

- សង់ $[Bx]$ ដែល $\angle BC = 90^\circ + \alpha$ ហើយសង់ $[By] \perp [Bx]$
 - សង់មេដ្យាទ័រ (d) នៃ $[BC]$ ។ យក $\{N\} = (d) \cap [By]$
 - យក N ជាផ្ចិត សង់ច្នៃ BIC ។ យកផ្នែកនៃ ច្នៃ BIC ដែលគ្មានចំណុច $B \& C$ ។
- សំណង់សំណុំចំណុច J :

- សង់ B' ដែល $B' = S_M(B)$ - សង់ C' ដែល $C' = S_M(C)$
- សង់ N' ដែល $N' = S_M(N)$ - យក N' ជាផ្ចិត សង់ច្នៃ $B'JC'$
- យកផ្នែកនៃ ច្នៃ $B'JC'$ ដែលគ្មានចំណុច $B' \& C'$ ។

១ពិន្ទុ

១ពិន្ទុ

១ពិន្ទុ

១ពិន្ទុ

១ពិន្ទុ

១ពិន្ទុ

៦-(២៥ពិន្ទុ)ក- បង្ហាញថា មានចំនួនគត់សនិទាន u និង v ដែល $au + bv = d$:

តាម Euclidean Algorithm គេបាន :

$$a = bq_1 + r_1 \quad r_1 < b \quad (1)$$

$$b = r_1q_2 + r_2 \quad r_2 < r_1 \quad (2)$$

$$r_1 = r_2q_3 + r_3 \quad r_3 < r_2 \quad (3)$$

២ពិន្ទុ

$$r_{n-2} = r_{n-1}q_n + r_n \quad r_n < r_{n-1} \quad (n)$$

$$r_{n-1} = r_n q_{n+1} \quad (n+1)$$

គេបាន $r_n = d$

២ពិន្ទុ

២ពិន្ទុ

គេនឹងបង្ហាញថា ចំពោះគ្រប់ចំនួនគតិវិជ្ជមាន p ដែល $1 \leq p \leq n$, $r_p = x_p a + y_p b$
ដោយ $x_p, y_p \in \mathbb{Z}$

- តាម (1) : $r_1 = 1 \cdot a + (-q_1)b = x_1 a + y_1 b$: ពិតចំពោះ $p=1$

២ពិន្ទុ

- ឧបមាថាពិតដល់ $r_{p-1} = x_{p-1} a + y_{p-1} b$ ដែល $x_{p-1}, y_{p-1} \in \mathbb{Z}$

២ពិន្ទុ

- ពិនិត្យករណី r_p :

២ពិន្ទុ

តាម (n) គេអាចសរសេរ $r_{p-2} = r_{p-1}q_p + r_p$

$$r_p = r_{p-2} - q_p r_{p-1}$$

$$= (x_{p-2}a + y_{p-2}b) - q_p(x_{p-1}a + y_{p-1}b) \text{ ដែល } x_{p-2}, x_{p-1}, y_{p-2}, y_{p-1} \in \mathbb{Z}$$

២ពិន្ទុ

$$= (x_{p-2} - q_p x_{p-1})a + (y_{p-2} - q_p y_{p-1})b$$

$$r_p = x_p a + y_p b \text{ ដែល } x_p = x_{p-2} - q_p x_{p-1}; y_p = y_{p-2} - q_p y_{p-1} \in \mathbb{Z}$$

៣ពិន្ទុ

បានន័យថា ទំនាក់ទំនងពិតចំពោះគ្រប់ p ដែល $1 \leq p \leq n$

យក $p=n$ គេបាន $r_n = x_n a + y_n b$ ដែល $x_n, y_n \in \mathbb{Z}$

ដូចនេះ មាន $u = x_n, v = y_n \in \mathbb{Z}$ ដែល $d = au + bv$

២ពិន្ទុ


ប្រឡងរៀនសរសេរព្រឹត្តិការណ៍ប្រទេស

ផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ គណិតវិទ្យា រូបវិទ្យា

សម័យប្រឡង: ០១.០៤.២០០៩

វិញ្ញាបនា គណិតវិទ្យា ជំពូកទី ១២ លើកទី១ ថ្ងៃទី ០១.០៤.០៩ (អាយុ ១៨០ ឆ្នាំ តិច ១០០)

១. (១០ពិន្ទុ) ពង្សាវតារបស់យើងមានប្រាំបីជំនុំស្រស់ស្រាយ ។ សំរាប់ប្រើប្រាស់វិញ្ញាបនាជាចំណុច $E; D$ និង F ទៅលើប្រភេទត្រីកោណ ។



២. (១០ពិន្ទុ) បង្ហាញថា $1^{2009} + 2^{2009} + 3^{2009} + \dots + (n-1)^{2009} + n^{2009}$ ចែកមិនដាច់នឹង $n+2$ ចំពោះគ្រប់ចំនួនគតិវិជ្ជមាន n ។

៣. (១៥ពិន្ទុ) គេមាន $f(x) = x^3 - 3x + 3$ ។

ក. បង្ហាញថា បើ $f(x) = x$ នោះ $f(f(x)) = x$ ។

ខ. រកប្រសិទ្ធភាពនៃសមីការ $f(x) = x$ ។ ទាញ រកប្រសិទ្ធភាពនៃសមីការ $(x^3 - 3x + 3)^2 - 3(x^3 - 3x + 3) + 3 = x$ ។

៤. (១៥ពិន្ទុ) គេដឹង $n! = n(n-1)(n-2) \times \dots \times 2 \times 1$ ។ បង្ហាញថា ចំពោះគ្រប់ចំនួនគតិវិជ្ជមាន n គេបាន :

$$1 + \frac{2009}{1!} + \frac{(2009)(2010)}{2!} + \dots + \frac{(2009)(2010) \dots (2009+n-1)}{n!} = \frac{(2010)(2011) \dots (2009+n)}{n!}$$

៥. (១៥ពិន្ទុ) អនុគមន៍ g កំណត់ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត x ដោយ $g(x+1) + g(x-1) = \sqrt{2}g(x)$ ។

ក. គេដឹង $g(x) = p$ និង $g(x-1) = q$ ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត x ។

គណនា $g(x+1), g(x+2), g(x+3)$ និង $g(x+4)$ ជាអនុគមន៍នៃ p និង q ។

ខ. បង្ហាញថា g ជាអនុគមន៍ខូច ។

៦. (១៥ពិន្ទុ) គេមានស្ថិតនៃចំនួនពិត (u_n) ដែលកំណត់ដោយ $u_1 = \frac{1}{2}$ និង $u_n = \left(\frac{2n-3}{2n}\right)u_{n-1}$ ចំពោះ $n = 2, 3, \dots$ ។

បង្ហាញថា $u_1 + u_2 + \dots + u_n < 1$ ចំពោះគ្រប់ចំនួនគតិវិជ្ជមាន n ។

៧. (២០ពិន្ទុ) ត្រីកោណកែវ ABC មានប្រវែងជ្រុង $BC = a$ និងកម្ពស់ $AH = h$ ។ គេចែក $[BC]$ ជា n ចំណែកស្មើគ្នា


ដោយ n ជាចំនួនគតិវិជ្ជមាន ។ គេកាត់ $[PQ]$ ជាចំណែកដែលនៅកណ្តាលគេ ហើយដែលប្លង់សម្រាប់ $\angle PAQ = x$ ។

បង្ហាញថា $\tan x = \frac{4nh}{a(n^2-1)}$ ។

អគ្គនាយកដ្ឋានពិចារណា ឆ្នាំទី១២

សម្រាប់ឆ្នាំ ០១-០៤-២០០៩

១. (១០ពិន្ទុ) បង្ហាញថាចំណុច E; D និង F នៅលើបន្ទាត់តែមួយ :



គេបាន

$$\angle EDB = \angle MAB$$

២ពិន្ទុ

$$\angle MAB = \angle BCF$$

$$\text{គេបាន } \angle EDB = \angle BCF$$

២ពិន្ទុ

$$\text{តែ } \angle BCF + \angle BDF = 180^\circ \text{ នោះ } \angle EDB + \angle BDF = 180^\circ$$

៣ពិន្ទុ

ដូចនេះ ចំណុច E; D និង F នៅលើបន្ទាត់តែមួយ ។

២. (១០ពិន្ទុ) បង្ហាញថា $1^{2009} + 2^{2009} + 3^{2009} + \dots + (n-1)^{2009} + n^{2009}$ ចែកមិនដាច់នឹង $n+2$ ចំពោះគ្រប់ចំនួនគតិវិជ្ជមាន n :

គេមាន

$$S_n = 1^{2009} + 2^{2009} + 3^{2009} + \dots + (n-1)^{2009} + n^{2009}$$

$$2S_n = (1^{2009} + 2^{2009}) + ((n-1)^{2009} + 3^{2009}) + \dots + (2^{2009} + n^{2009}) + 1^{2009} + 1^{2009}$$

២ពិន្ទុ

$$= (n+2)k_1 + (n+2)k_2 + \dots + (n+2)k_{n-1} + 2$$

៣ពិន្ទុ

$$= (n+2)k + 2 \text{ ដែល } k = k_1 + k_2 + \dots + k_{n-1} \text{ ជាចំនួនគតិវិជ្ជមាន}$$

$$\text{គេទាញបាន } 2S_n \text{ ចែកមិនដាច់នឹង } n+2$$

៣ពិន្ទុ

$$\text{ដូចនេះ } S_n \text{ ចែកមិនដាច់នឹង } n+2 \text{ ចំពោះគ្រប់ចំនួនគតិវិជ្ជមាន } n$$

២ពិន្ទុ

៣. (១៥ពិន្ទុ) គេមាន $f(x) = x^2 - 3x + 3$ ។

ក. បង្ហាញថា បើ $f(x) = x$ នោះ $f(f(x)) = x$:

$$\text{បើ } f(x) = x \text{ នោះ } f(f(x)) = f(x)$$

$$\text{ដូចនេះ } f(f(x)) = x \text{ ព្រោះ } f(x) = x$$

៣ពិន្ទុ

ខ. រកបួសនៃសមីការ $f(x) = x$:

$$\text{សមីការ } f(x) = x \text{ អាចសរសេរជា } x^2 - 4x + 3 = 0 \text{ ដែលមានបួស } x_1 = 1; x_2 = 3$$

៣ពិន្ទុ

$$\text{ទាញ រកបួសនៃសមីការ } (x^2 - 3x + 3)^2 - 3(x^2 - 3x + 3) + 3 = x :$$

$$\text{សមីការ } (x^2 - 3x + 3)^2 - 3(x^2 - 3x + 3) + 3 = x \text{ អាចសរសេរជា}$$

$$f(f(x)) = x \text{ ដែលជាសមីការផលវិបាកនៃ } f(x) = x$$

៣ពិន្ទុ

$$\text{គេទាញបាន } x_1 = 1; x_2 = 3 \text{ ជាបួសនៃ } (x^2 - 3x + 3)^2 - 3(x^2 - 3x + 3) + 3 = x$$

$$\text{គឺ } x_1 = 1; x_2 = 3 \text{ ជាបួសនៃ } x^4 - 6x^3 + 12x^2 - 10x + 3 = 0$$

៣ពិន្ទុ

$$(x^2 - 4x + 3)(x - 1)^2 = 0$$

$$\text{សមីការមានបួស } x_1 = 1; x_2 = 3$$

៣ពិន្ទុ

១៥. (១៥ពិន្ទុ) បង្ហាញថា ចំពោះគ្រប់ចំនួនគតិវិជ្ជមាន n គេបាន :

$$1 + \frac{2009}{1!} + \frac{(2009)(2010)}{2!} + \dots + \frac{(2009)(2010)\dots(2009+n-1)}{n!} = \frac{(2010)(2011)\dots(2009+n)}{n!}$$

៣ពិន្ទុ

- ចំពោះ $n = 1$: $1 + \frac{2009}{1} = \frac{2010}{1}$ ជាសមភាពដែលពិត

- ឧបមាថា សមភាពពិតដល់ $n = k$ មានន័យថា :

$$1 + \frac{2009}{1!} + \frac{(2009)(2010)}{2!} + \dots + \frac{(2009)(2010)\dots(2009+k-1)}{k!} = \frac{(2010)(2011)\dots(2009+k)}{k!}$$

៣ពិន្ទុ

- ពិនិត្យចំពោះ $n = k+1$

$$1 + \frac{2009}{1!} + \frac{(2009)(2010)}{2!} + \dots + \frac{(2009)(2010)\dots(2009+k-1)}{k!} + \frac{(2009)(2010)\dots(2009+k)}{(k+1)!} =$$

៣ពិន្ទុ

$$= \frac{(2010)(2011)\dots(2009+k)}{k!} + \frac{(2009)(2010)\dots(2009+k)}{(k+1)!}$$

៣ពិន្ទុ

$$= \frac{(2010)(2011)\dots(2009+k)(k+1)}{(k+1)!} + \frac{(2009)(2010)\dots(2009+k)}{(k+1)!}$$

៣ពិន្ទុ

$$= \frac{(2010)(2011)\dots(2009+k)(2009+(k+1))}{(k+1)!} \quad \text{គឺពិតចំពោះ } n = k+1$$

៧. (១៥ពិន្ទុ) ក. គេបាន $g(x+1); g(x+2); g(x+3); g(x+4)$:

$$\text{គេមាន } g(x+1) = \sqrt{2}g(x) - g(x-1)$$

ដោយ $g(x-1) = q$; $g(x) = p$ ចំពោះគ្រប់ $x \in \mathbb{R}$ នោះគេបាន

១ពិន្ទុ

$$g(x+1) = \sqrt{2}p - q$$

២ពិន្ទុ

$$g(x+2) = \sqrt{2}g(x+1) - g(x) = \sqrt{2}(\sqrt{2}p - q) - p = p - \sqrt{2}q \quad \text{ចំពោះគ្រប់ } x \in \mathbb{R}$$

៣ពិន្ទុ

$$g(x+3) = \sqrt{2}g(x+2) - g(x+1) = \sqrt{2}(p - \sqrt{2}q) - (\sqrt{2}p - q) = -q \quad \text{ចំពោះគ្រប់ } x \in \mathbb{R}$$

៤ពិន្ទុ

$$g(x+4) = \sqrt{2}g(x+3) - g(x+2) = \sqrt{2}(-q) - (p - \sqrt{2}q) = -p = -g(x) \quad \text{ចំពោះគ្រប់ } x \in \mathbb{R}$$

ខ. បង្ហាញថា g ជាអនុគមន៍ខួប :

៥ពិន្ទុ

$$g(x+5) = \sqrt{2}g(x+4) - g(x+3) = -\sqrt{2}p + q \quad \text{ចំពោះគ្រប់ } x \in \mathbb{R}$$

៦ពិន្ទុ

$$g(x+6) = \sqrt{2}g(x+5) - g(x+4) = \sqrt{2}(-\sqrt{2}p + q) - (-p) = \sqrt{2}q - p \quad \text{ចំពោះគ្រប់ } x \in \mathbb{R}$$

៧ពិន្ទុ

$$g(x+7) = \sqrt{2}g(x+6) - g(x+5) = \sqrt{2}(\sqrt{2}q - p) - (-\sqrt{2}p + q) = q \quad \text{ចំពោះគ្រប់ } x \in \mathbb{R}$$

៨ពិន្ទុ

$$g(x+8) = \sqrt{2}g(x+7) - g(x+6) = \sqrt{2}q - (\sqrt{2}q - p) = p = g(x) \quad \text{ចំពោះគ្រប់ } x \in \mathbb{R}$$

ដូចនេះ g ជាអនុគមន៍ខួប ។

របៀបទី២ : តាមសំណួរខាងលើ $g(x+4) = -g(x)$ នោះគេអាចសរសេរ :

៩ពិន្ទុ

$$g(x+8) = g((x+4)+4) =$$

ចំពោះគ្រប់ $x \in \mathbb{R}$

$$g(x+8) = -g(x+4) = -(-g(x)) = g(x)$$

១០ពិន្ទុ

ដូចនេះ g ជាអនុគមន៍ខួប ។

៦. (១៥ពិន្ទុ) បង្ហាញថា $u_1 + u_2 + \dots + u_n < 1$ ចំពោះគ្រប់ចំនួនគតិវិជ្ជមាន n ។

១១ពិន្ទុ

- ចំពោះ $k \geq 2$ គេបាន $2ku_k = 2ku_{k-1} - 3u_{k-1}$ ហើយ $u_{k-1} = 2(k-1)u_{k-1} - 2ku_{k-1}$

ដោយប្រើតម្លៃ $k = 2, \dots, n-1$

$$u_1 = 2u_1 - 4u_2$$

$$u_2 = 4u_2 - 6u_3$$


$$u_{n-1} = 2(n-1)u_{n-1} - 2nu_n$$

$$u_n = 2nu_n - 2(n+1)u_{n+1}$$

$$\sum_{i=1}^n u_i = 2u_1 - (2n+2)u_{n+1} = 1 - (2n+2)u_{n+1}$$

ដោយ $u_n > 0$ គឺពោលគ្រប់ n នោះ $u_1 + u_2 + \dots + u_n < 1$ ចំពោះគ្រប់ចំនួនគតិវិជ្ជមាន n ។

៧. (២០ពិន្ទុ) បញ្ជាក់ថា $\tan x = \frac{4nh}{a(n^2-1)}$:



តាម M ជាចំណុចកណ្តាលនៃ [BC] ។

$$\text{where } x = \angle PAQ = \angle PAH - \angle QAH$$

$$\tan x = \tan(\angle PAH - \angle QAH)$$

$$= \frac{\tan \angle PAH - \tan \angle QAH}{1 + \tan \angle PAH \times \tan \angle QAH}$$

$$\text{តែ } \tan \angle PAH = \frac{HP}{HA} ; \tan \angle QAH = \frac{HQ}{HA}$$

$$\tan x = \frac{(HP - HQ) \times HA}{HA^2 + HP \times HQ} = \frac{PQ \times HA}{HA^2 + HP \times HQ} \quad (1)$$

$$\text{ដោយ } HP = HM + MP = HM + \frac{a}{2n} \text{ និង } HQ = HM - MQ = HM - \frac{a}{2n}$$

$$HM^2 = AM^2 - AH^2 = \frac{a^2 - 4h^2}{4}$$

$$HP \times HQ = HM^2 - \frac{a^2}{4n^2} = \frac{a^2 - 4h^2}{4} - \frac{a^2}{4n^2} = \frac{a^2 n^2 - 4n^2 h^2 - a^2}{4n^2}$$

$$\tan x = \frac{ah}{n} \times \frac{4n^2}{a^2 n^2 - 4n^2 h^2 - a^2} = \frac{4nh}{a(n^2 - 1)}$$

ថ្ងៃទី ០១ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០០៩

ប្រធានគ្រូបង្រៀន គណិតវិទ្យា ឆ្នាំក្រី ១២

គ្រូ ស៊ីសុវណ្ណ

ប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូជគុណវិទ្យាល័យប្រទេស


ផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ គណិតវិទ្យា រូបវិទ្យា

សម័យប្រឡង: ០១.០៤.២០០៩

វិញ្ញាសា គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី ១២ លើគតិ២ ថ្ងៃទី ០៣.០៤.០៩ (រយៈពេល ១៨០ នាទី ពិន្ទុ ១០០)

១. (១០ពិន្ទុ) គេឱ្យចំណុច M មួយនៅក្នុងរង្វង់ដែលមានអង្កត់ផ្ចិត $[AB]$ ។

កាត់សំណុំចំណុចនៃចំណុច M កាត់ណា A ចំលើត្រង់ $[Ox]$ និង B ចំលើត្រង់ $[Oy]$ ដែលត្រង់ xOy មួយដោយរក្សាប្រវែង AB ដោយ



២. (១០ពិន្ទុ) បង្ហាញថា $3^{2n} + 2^{n-5}$ ែកដាច់នឹង 11 ចំពោះគ្រប់ចំនួនគតិវិជ្ជមាន n ។

៣. (១៥ពិន្ទុ) គេឱ្យចំនួនគតិវិជ្ជមាន a និង b ដែល $2a^2 + a = 3b^2 + b$ ។

បង្ហាញថា $a = b$; $2a + 2b + 1$ និង $3a + 3b + 1$ សុទ្ធតែជាការប្រាកដ ។

៤. (១៥ពិន្ទុ) សំណុំ E_n មួយមាន n ធាតុដែល n ជាចំនួនគតិវិជ្ជមាន ។ ពោរ $P(E_n)$ ជាសំណុំនៃសំណុំរងរបស់ E_n ហើយ

$\text{Card}(P(E_n))$ ជាចំនួនធាតុនៃ $P(E_n)$ ។ តាមវិធានដោយកំណើន បង្ហាញថា $\text{Card}(P(E_n)) = 2^n$ ។

៥. (១៥ពិន្ទុ) ត្រីកោណ ABC មួយមានជ្រុង $BC = a$; $AC = b$ ដែល $a + b = (a \tan A + b \tan B) \tan \frac{C}{2}$ ។

បង្ហាញថា ABC ជាត្រីកោណសម័ង្ស ។

៦. (១៥ពិន្ទុ) គ្រឹះ (x_n) មួយកំណត់ដោយ $x_1 = 1$ និង $x_{n+1} = 1 + x_1 x_2 \cdots x_n$ ចំពោះ $n = 1, 2, \dots$ ។

គេតាងផលបូក $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{x_k}$ ។

គណនា $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ ។

៧. (២០ពិន្ទុ) អនុគមន៍ $f(x; y)$ មួយផ្សេងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌទាំងបីខាងក្រោមចំពោះគ្រប់ចំនួនគតិវិជ្ជមាន x និង y :

(i) $f(0; y) = 1 + y$


(ii) $f(x+1; 0) = f(x; 1)$

(iii) $f(x+1; y+1) = f(x; f(x+1; y))$ ។

ក. គណនា $f(1; n)$, $f(2; n)$ និង $f(3; n)$ ជារន្ធគមនៃ n ។

ខ. គណនា $f(4; 2009)$ ។

១. (១០ពិន្ទុ) រកសំណុំចំណុចនៃចំណុច M :



២ពិន្ទុ

ចតុកោណ AMBO ជាត្រកូងរង្វង់មួយ ។

គេដឹង $\widehat{MAB} = \alpha$ ដូច្នេះ $AB = 2R$ ដូច្នេះ

គេបាន $\widehat{MOB} = \widehat{MAB} = \alpha$ ដូច្នេះ

បានន័យថា M នៅលើ $[OM)$ ដែល $\widehat{MOy} = \alpha$

២ពិន្ទុ

២ពិន្ទុ

លើសពី: - បើ $A = O$ នោះ $B = B_1$ ដែល $OB_1 = 2R$ ហើយ $M = M_1$ ដែល $OM_1 = 2R \cos \alpha$

- បើ $B = O$ នោះ $A = A_1$ ដែល $OA_1 = 2R$ ហើយ $M = M_2$ ដែល $OM_2 = 2R \sin \alpha$

២ពិន្ទុ

សន្និដ្ឋាន :

សំណុំចំណុចនៃចំណុច M គឺជា $[M_1 M_2]$ នៃ $[OM)$ ដែល $\widehat{MOy} = \alpha$, $OM_1 = 2R \cos \alpha$ និង $OM_2 = 2R \sin \alpha$ ។

២ពិន្ទុ

២. (១០ពិន្ទុ) បញ្ជាក់ថា $3^{2n} + 2^{6n-5}$ ចែកដាច់នឹង 11 ចំពោះគ្រប់ចំនួនគតិវិជ្ជមាន n :

ចំពោះ $n = 1$ គេបាន $3^2 + 2^{6-5} = 11$ ចែកដាច់នឹង 11 : ពិត

២ពិន្ទុ

ឧបមាថាពិតដល់ $n = k$ គឺថា $3^{2k} + 2^{6k-5} = 11p$, $p \in \mathbb{Z}^+$

៣ពិន្ទុ

នាំឱ្យ $3^{2k} = 11p - 2^{6k-5}$, $p \in \mathbb{Z}^+$

ពិនិត្យចំពោះ $n = k + 1$ គេបាន $3^{2(k+1)} + 2^{6(k+1)-5} = 9 \times 3^{2k} + 2^6 \times 2^{6k-5}$

៤ពិន្ទុ

$= 9 \times 11p - 9 \times 2^{6k-5} + 2^6 \times 2^{6k-5} = 11(9p + 5 \times 2^{6k-5})$ ចែកដាច់នឹង 11 : ពិត

ដូចនេះ $3^{2n} + 2^{6n-5}$ ចែកដាច់នឹង 11 ចំពោះគ្រប់ចំនួនគតិវិជ្ជមាន n ។

៥ពិន្ទុ

៣. (១៥ពិន្ទុ) បញ្ជាក់ថា $a^2 - b^2 : 2a + 2b + 1$ និង $3a + 3b + 1$ សុទ្ធតែជាការបែកគ្នា :

ដោយ $2a^2 + a = 3b^2 + b$ នោះគេបាន :

$$a^2 = a - b + 3a^2 - 3b^2 = (a - b)(3a + 3b + 1)$$

៣ពិន្ទុ

$$b^2 = a - b + 2a^2 - 2b^2 = (a - b)(2a + 2b + 1)$$

បើ δ ជាចំនួនចែករួមធំបំផុតរវាង $3(a + b) + 1$ និង $2(a + b) + 1$ នោះ $\delta \mid (6a + 6b + 3 - 6a - 6b - 2)$ គឺ $\delta \mid 1$

៣ពិន្ទុ

ដូចនេះ $\text{PGCD}(3(a + b) + 1; 2(a + b) + 1) = 1$ ហើយ $\text{PGCD}(a^2; b^2) = a - b$

យ៉ាងនេះ គេដឹង $d = \text{PGCD}(a; b)$ នោះ $a = dp$; $b = dq$ ដែល $\text{PGCD}(p; q) = 1$

៤ពិន្ទុ

$$\text{គេបាន } a^2 = d^2 p^2; b^2 = d^2 q^2$$

៤ពិន្ទុ

ដោយ $\text{PGCD}(p^2; q^2) = 1$ នោះ $d^2 = \text{PGCD}(a^2; b^2)$

៤ពិន្ទុ

$$\text{គេទាញបាន } a - b = d^2; 3a + 3b + 1 = p^2; 2a + 2b + 1 = q^2$$

៤. (១៥ពិន្ទុ) បញ្ជាក់ថា $\text{Card}(P(E_n)) = 2^n$:

- ចំពោះ $n = 1$: $E_1 = \{a_1\}$ ហើយ $P(E_1) = \{\emptyset, \{a_1\}\}$ នោះគេបាន $\text{Card}(P(E_1)) = 2 = 2^1$

៣ពិន្ទុ

- ឧបមាថាពិតដល់ $n = k$: គេបាន $E_k = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_k\}$ ហើយ $\text{Card}(P(E_k)) = 2^k$

៣ពិន្ទុ

- ពិនិត្យចំពោះ $n = k + 1$: គេបាន $E_{k+1} = \{a_1, a_2, a_3, \dots, a_k, a_{k+1}\} = E_k \cup \{a_{k+1}\}$

៣ពិន្ទុ

$$\lim_{n \rightarrow \infty} 2^{n+1} = +\infty \text{ គេបាន } \lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - 1) = +\infty$$

$$\text{ដូច្នេះ } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{x_{n+1} - 1} = 0$$

$$\text{ដូច្នេះ } \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 2$$

៧-(២០ពិន្ទុ)

ក. គេបាន $f(1;n), f(2;n)$ និង $f(3;n)$ ជាអនុគមន៍នៃ n :

$$\text{គេបាន } f(1;n) = f(0; f(1;n-1)) = 1 + f(1;n-1) : n \geq 1$$

$$\text{ដោយ } p_n = f(1;n) \text{ គេបាន } p_0 = f(1;0) = f(0;1) = 1 + 1 = 2; p_n = p_{n-1} + 1 \text{ ចំពោះ } n \geq 1$$

$$\text{គេបាន } (p_n) \text{ ជាស្វ៊ីតនព្វន្ឋដែលមាន } p_0 = 2; d = 1$$

$$\text{ដូច្នេះ } f(1;n) = p_n = p_0 + nd = n + 2$$

$$\text{គេបាន } f(2;n) = f(1; f(2;n-1)) = f(2;n-1) + 2 : n \geq 1$$

$$\text{ដោយ } q_n = f(2;n) \text{ គេបាន } q_0 = f(2;0) = f(1;1) = p_1 = 1 + 2 = 3; q_n = q_{n-1} + 2 \text{ ចំពោះ } n \geq 1$$

$$\text{គេបាន } (q_n) \text{ ជាស្វ៊ីតនព្វន្ឋដែលមាន } q_0 = 3; d' = 2$$

$$\text{ដូច្នេះ } f(2;n) = q_n = q_0 + nd' = 2n + 3$$

$$\text{គេបាន } f(3;n) = f(2; f(3;n-1)) = 2f(3;n-1) + 3 \text{ ចំពោះ } n \geq 1$$

$$f(3;n) + 3 = 2(f(3;n-1) + 3)$$

$$\text{ដោយ } u_n = f(3;n) + 3 \text{ គេបាន } u_0 = f(3;0) + 3 = f(2;1) + 3 = (2 \times 1 + 3) + 3 = 8$$

$$\text{ហើយ } u_n = 2(f(3;n-1) + 3) = 2u_{n-1} \text{ ចំពោះ } n \geq 1$$

$$\text{គេបាន } (u_n) \text{ ជាស្វ៊ីតធរណីមាត្រដែលមាន } u_0 = 8 : q = 2$$

$$\text{ហើយ } u_n = u_0 q^n = 2^{n+3}$$

$$\text{ដូច្នេះ } f(3;n) = 2^{n+3} - 3$$

ខ. គេបាន $f(4;2009)$

$$\text{គេបាន } f(4;n) = f(3; f(4;n-1)) = 2^{f(4;n-1)+3} - 3 : n \geq 1$$


$$f(4;0) = f(3;1) = 2^1 - 3 = 2^{2^0} - 3 \quad \text{មាននិមស្សន្ត 2 ចំនួន } 0 + 2 \text{ ដង}$$

$$f(4;1) = 2^{f(4;0)+3} - 3 = 2^{2^1} - 3 = 2^{2^{0+2}} - 3 \quad \text{មាននិមស្សន្ត 2 ចំនួន } 1 + 2 \text{ ដង}$$

$$f(4;n) = 2^{2^{n+2}} - 3 \quad \text{មាននិមស្សន្ត 2 ចំនួន } n + 2 \text{ ដង}$$

$$\text{ដោយយក } n = 2009 \text{ គេបាន } f(4;2009) = 2^{2^{2011}} - 3 \quad \text{មាននិមស្សន្ត 2 ចំនួន } 2009 + 2 = 2011 \text{ ដង}$$

ថ្ងៃទី ០៣ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០០៩
ប្រធានគ្រូបកំណត់ គណិតវិទ្យា ឆ្នាក់ទី១២



គី សារ៉ាសី

ប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សក្រសួងកំពង់ចាម

ផ្នែកគណិតវិទ្យា ឧបករណ៍គណិតវិទ្យា ប្រភេទគណិតវិទ្យា ឆ្នាំកំណត់ ៩ និងឆ្នាំកំណត់ ១២

កាលបរិច្ឆេទ ០១/០៩/២០១០

ពេលវេលា ៣០នាទី ឆ្នាំកំណត់ ១២ លើកទី១ ថ្ងៃទី ០៩/០៩/២០១០

យោគាស ១៨០នាទី ពិន្ទុ ១០០

I. ១៥ពិន្ទុ ១. សរសេរ $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$ ជាផលគុណនៃកំរិតបញ្ជាក់វិញ្ញាបនបត្រទី១

២. បង្ហាញថា $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$ នៃផលគុណនៃកំរិតបញ្ជាក់វិញ្ញាបនបត្រទី១

II. ១៥ពិន្ទុ គេបានដឹង ដែលជាផលគុណនៃកំរិតបញ្ជាក់វិញ្ញាបនបត្រទី១ $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$ ដែល $a > b > 0$

III. ១៥ពិន្ទុ ត្រីកោណកែង XYZ មាន $X = 90^\circ$, $YZ = x$, $ZX = y$ ដោយ $XY = z$

បង្ហាញថា $x^2 + y^2 = z^2$ ដែលជាផលគុណនៃកំរិតបញ្ជាក់វិញ្ញាបនបត្រទី១

IV. ១៥ពិន្ទុ គេបានបង្ហាញថាផលគុណនៃកំរិតបញ្ជាក់វិញ្ញាបនបត្រទី១ ៦ ដែលជាផលគុណនៃកំរិតបញ្ជាក់វិញ្ញាបនបត្រទី១

តែបើគេយកផលគុណនៃកំរិតបញ្ជាក់វិញ្ញាបនបត្រទី១ ១៧ ដែលជាផលគុណនៃកំរិតបញ្ជាក់វិញ្ញាបនបត្រទី១

គេបានផលគុណនៃកំរិតបញ្ជាក់វិញ្ញាបនបត្រទី១

V. ២០ពិន្ទុ បញ្ជាក់ថាប្រសិនបើ ABCD មាន $AB = a$, $BC = b$, $CD = c$, $DA = d$ បង្ហាញថា $\angle ABC = x$ និង $\angle ADC = y$

គេបានបង្ហាញថាប្រសិនបើ ABCD មានផលគុណនៃកំរិតបញ្ជាក់វិញ្ញាបនបត្រទី១

VI. ២០ពិន្ទុ ស្ថិតិនៃចំនួន (a_n) ដែលជាផលគុណនៃកំរិតបញ្ជាក់វិញ្ញាបនបត្រទី១ $a_1 = 1$, $a_2 = 1$ និង $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$ ដែល $n = 3, 4, \dots$

តាង $a = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ និង $b = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$

១. បង្ហាញថា $a^n > a^{n-1}$ ដែលជាផលគុណនៃកំរិតបញ្ជាក់វិញ្ញាបនបត្រទី១

២. បង្ហាញថា $a_n = \frac{1}{\sqrt{5}} (a^n - b^n)$ ដែលជាផលគុណនៃកំរិតបញ្ជាក់វិញ្ញាបនបត្រទី១

ក) បញ្ជាក់ថា $x^4 + 4y^4$ មិនមែនជាចំនួនបឋមទេ ចំពោះគ្រប់ចំនួនគតិវិជ្ជាទីបី x, y ។

$$x^4 + 4y^4 = (x^4 + 4x^2y^2 + 4y^4) - 4x^2y^2 = (x^2 + 2y^2 + 2xy)(x^2 + 2y^2 - 2xy)$$

២. បង្ហាញថា $n^4 + 4^n$ មិនមែនជាចំនួនបឋមទេ ចំពោះគ្រប់ចំនួនគតិវិជ្ជាទីបី $n > 1$ ។

ចំពោះគ្រប់ចំនួនគតិវិជ្ជាទីបី $n > 1$ គេមានពីរករណី៖

- បើ $n = 2k$ ដែល $k = 1, 2, \dots$ គេបាន $n^4 + 4^n = 16(k^4 + 16^{k-1})$ ដែលមិនមែនជាចំនួនបឋមទេ ។

- បើ $n = 2k + 1$ ដែល $k = 1, 2, \dots$ គេបាន $n^4 + 4^n = n^4 + 4^{k+1} = n^4 + 4(2^k)^4$

$$= (n^4 - 2^{4k+4} - n2^{4k+4})(n^4 + 2^{4k+4} - n2^{4k+4})$$
 ដែលមិនមែនជាចំនួនបឋមទេ ។

II. ១៥ពិន្ទុ រកអនុគមន៍ g ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការ $g(x) + g\left(\frac{1}{1-x}\right) = x$ ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត x ដែល $x \neq 0, x \neq 1$ ។

$$\text{- ជំនួស } x \text{ ដោយ } \frac{1}{1-x} \text{ គេបាន } g\left(\frac{1}{1-x}\right) + g\left(1 - \frac{1}{x}\right) = \frac{1}{1-x}$$

$$\text{- ជំនួស } x \text{ ដោយ } 1 - \frac{1}{x} \text{ គេបាន } g\left(1 - \frac{1}{x}\right) + g(x) = 1 - \frac{1}{x}$$

$$\text{គេបាន } g(x) + g\left(\frac{1}{1-x}\right) = x \quad - g\left(\frac{1}{1-x}\right) - g\left(1 - \frac{1}{x}\right) = -\frac{1}{1-x} \quad g\left(1 - \frac{1}{x}\right) + g(x) = 1 - \frac{1}{x}$$

$$\text{ដោយបូកអង្គនិងអង្គ គេបាន } g(x) = \frac{1}{2} \left(x + 1 - \frac{1}{x} - \frac{1}{1-x} \right) \text{ ចំពោះ } x \neq 0, x \neq 1$$

III. ១៥ពិន្ទុ ត្រីកោណកែង XYZ មួយមាន $\angle X = 90^\circ, YZ = x, ZX = y$ និង $XY = z$ ។

បង្ហាញថា $x^n > y^n + z^n$ ចំពោះគ្រប់ចំនួនគតិវិជ្ជាទីបី n ដែល $n \geq 3$

- ចំពោះ $n = 3$

$$\text{គេមាន } x^3 = y^3 + z^3 \Rightarrow x^3 = xy^2 + xz^2$$

$$\text{តែ } x > y \Rightarrow xy^2 > y^3 \text{ ហើយ } x > z \Rightarrow xz^2 > z^3$$

$$\text{គេទាញបាន } x^3 = xy^2 + xz^2 > y^3 + z^3$$


- ឧបមាថា $x^k > y^k + z^k$ ចំពោះ $k \geq 3$

- ពិនិត្យចំពោះ $k+1$

$$x^k > y^k + z^k \Rightarrow x^{k+1} > xy^k + xz^k$$

$$\text{តែ } x > y \Rightarrow xy^k > y^{k+1} \text{ ហើយ } x > z \Rightarrow xz^k > z^{k+1}$$

$$\text{គេទាញបាន } x^{k+1} > xy^k + xz^k > y^{k+1} + z^{k+1}$$



IV. ១៥ពិន្ទុ រកចំនួនផ្ទៃស្វាយតិចបំផុតដែលគេបានបោះ :

តាងជា M ចំនួនផ្ទៃស្វាយតិចបំផុតដែលសោភាបានបោះ ។

- ដោយដឹងថា គេបានរក្សាចំនួនផ្ទៃស្វាយថា 11 គំនរស្ទើរតាម និងនៅសល់ផ្ទៃស្វាយចំនួន 6 ផ្ទៃ គេបាន :

$$M \equiv 6 \pmod{11} \Rightarrow M = 11k + 6, k > 1$$


-ដោយដឹងថា គេបានរៀបចំផ្ទៃស្វាយជា 17 គំរូរស្មើគ្នា និងគ្មានសំណុំផ្ទៃស្វាយ នោះគេបាន :

$$M \equiv 0 \pmod{17} \Rightarrow M = 11k + 6 \equiv 0 \pmod{17} \\ \Rightarrow 11k \equiv -6 \equiv 11 \pmod{17}$$

ដើម្បីបានចំនួនផ្ទៃស្វាយតិចបំផុតដែលគេបានបោះគេត្រូវដាក់ $m = 1$ ជាអនុសាសន៍ :

$$m = 1 \Rightarrow k = 18 \text{ ហើយ } M = 11 \cdot 18 + 6 = 204 \text{ ផ្ទៃ}$$

V. ឧទាហរណ៍ : រកអនុគមន៍ដេរីវេនៃផ្ទៃក្រឡា ABCD មានផ្ទៃក្រឡាអតិបរមា



- ក៏ផ្ទៃក្រឡានៃ ABCD ជាអនុគមន៍នៃ $a; b; c; d; x$ និង y

$$\text{ចតុកោណ ABCD មានផ្ទៃក្រឡា } S = \frac{1}{2} ab \sin x + \frac{1}{2} cd \sin y$$

$$\text{អង្កត់ទ្រូង [AC] មានប្រវែង } L = a^2 + b^2 - 2ab \cos x = c^2 + d^2 - 2cd \cos y$$

ដោយយកដេរីវេធៀបនឹង x គេបាន :

$$S'(x) = \frac{1}{2} ab \cos x + \frac{1}{2} cd \cos y \cdot y' \quad (1)$$

$$L'(x) = 2ab \sin x = 2cd \sin y \cdot y'$$

$$ab \sin x = cd \sin y \cdot y' \Rightarrow y' = \frac{ab \sin x}{cd \sin y}$$

$$(1) \Rightarrow S'(x) = \frac{1}{2} ab \times \frac{\sin x \cos y + \cos x \sin y}{\sin y} = \frac{1}{2} ab \times \frac{\sin(x+y)}{\sin y} \text{ មានសញ្ញាដូចសញ្ញា } \sin(x+y)$$

$$S(x) = 0 \Leftrightarrow \sin(x+y) = 0 \Leftrightarrow x+y = \pi$$

$$\text{បើ } 0 < x+y < \pi \Leftrightarrow S'(x) > 0$$

$$\text{បើ } \pi < x+y < 2\pi \Leftrightarrow S'(x) < 0$$

បានន័យថា $S(x)$ មានអតិបរមាពុំត្រូវតែ $x+y = \pi$

ដូចនេះ ចតុកោណ ABCD មានផ្ទៃក្រឡាអតិបរមាពុំត្រូវតែ ABCD ប៉ាក្នុងរង្វង់មួយ ។

VI. (២០ពិន្ទុ) តាង $a = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ និង $b = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ ។

១. បង្ហាញថា $u_n > a^{n-2}$ ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ $n \geq 3$

- ចំពោះ $n = 3$ គេបាន $u_3 = 2$ ហើយ $a^{3-2} = a = \frac{1+\sqrt{5}}{2} < 2$ បានន័យថា $u_3 > a^{3-2}$

- ឧបមាថា $u_p > a^{p-2}$ ចំពោះ $p \geq 3$

-សិក្សាចំពោះ $p+1$

តាមសម្មតិកម្មអនុមានរួម គេបាន $u_p > a^{p-1}, u_{p+1} > a^{p+1}$

ដូចនេះ $u_p > a^{p-1}, u_{p+1} > a^{p+1}$

តែគេដឹងថា $a = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$ ជាឫសនៃសមីការ $x^2 = x+1$ នោះគេបាន $a^2 = a+1$

ដោយគូរឆ្លើយ a^{p+1} គេបាន $a^{p+1} = a^{p+1} + a^{p-1}$ (1)

តាម (1) & (2) $\Rightarrow u_{p+1} > a^{p+1}$

ដូចនេះ $u_n > a^{n-1}$ ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ $n \geq 3$ ។

៦. ចង្អាញថា $u_n = \frac{1}{\sqrt{5}}(a^n - b^n)$ ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ វិញ្ញាបិប័ត្នមាន n :

-ចំពោះ $n=1$ គេបាន $1 = u_1 = \frac{1}{\sqrt{5}}(a - b) = \frac{1}{2\sqrt{5}}(1+\sqrt{5} - 1 - \sqrt{5}) = 1$

-ឧបមាថា $u_k = \frac{1}{\sqrt{5}}(a^k - b^k)$

-សិក្សាចំពោះ $k+1$

គេមាន $u_{k+1} = u_k + u_{k-1} = \frac{1}{\sqrt{5}}((a^k + a^{k-1}) - (b^k + b^{k-1}))$ (3)

ពី a & b ជាឫសនៃសមីការ $x^2 = x+1$ នោះ $a^2 = a+1$ និង $b^2 = b+1$


គេបាន $a^{k+1} = a^k + a^{k-1}$ និង $b^{k+1} = b^k + b^{k-1}$

តាម (3) $\Rightarrow u_{k+1} = \frac{1}{\sqrt{5}}(a^{k+1} - b^{k+1})$

ដូចនេះ $u_n = \frac{1}{\sqrt{5}}(a^n - b^n)$ ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ វិញ្ញាបិប័ត្នមាន n ។

ថ្ងៃទី ០១ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១០

ប្រធានក្រុមការងារវិទ្យាសាស្ត្រ គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី ១២



អ៊ុយ ស៊ីង ណី

ប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សក្នុងគណនាវិទ្យាប្រទេស

ផ្នែកគណិតវិទ្យា គណិតវិទ្យា ប្រវត្តិ ៩ និងថ្នាក់ ១២

សម័យប្រឡង: ០១.០៤ ២០១០

ទីកន្លែង: អគ.ស.វ. ថ្នាក់ ១២ គណិត ថ្ងៃទី ០៧.០៤.២០

រយៈពេល ១៨០ នាទី ពិន្ទុ ១០០

I. (១០ពិន្ទុ) សមីការ $ax^2 + 2010x + c = x$ មានចូលនៅក្នុងសំណុំចំនួនពិត។

បង្ហាញថា សមីការ $a(ax^2 - 2010x + c)^2 + 2010(ax^2 + 2010x + c) + c = x$ មានចូលនៅក្នុងសំណុំចំនួនពិតដែរ។

II. (១៥ពិន្ទុ) ពហុធា $P(x) = x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + \dots + a_{n-1}x + 1$ មានលេខមេគុណ $a_1, a_2, \dots, a_{n-1}$ ជាចំនួនមិនអវិជ្ជមាន។

តើដឹងថា ពហុធា $P(x)$ មាន n ឫសដែលផ្សេងគ្នាជាចំនួនពិត។

បង្ហាញថា $P(2010) \geq (2\sqrt{2010})^n$ ។

III. (១៥ពិន្ទុ) គេឱ្យចំណុចនឹង A មួយដែលស្ថិតនៅផ្នែកក្នុងនៃមុំស្រួច $\angle xOy$ មួយ។

រកចំណុច B និង C នៅលើជ្រុង $[Ox)$ និង $[Oy)$ រៀងគ្នា ដើម្បីឱ្យត្រីកោណ ABC មានបរិមាត្រអប្បបរមា។

IV. (២០ពិន្ទុ) គេមានចំនួនគតិវិជ្ជមាន r ដែលជាសំណល់ក្នុងវិធីចែកអវិជ្ជមាននៃចំនួនគតិវិជ្ជមាន a និង b ។

១. បង្ហាញថា $2^r - 1$ ជាសំណល់ក្នុងវិធីចែកអវិជ្ជមាននៃចំនួនគតិវិជ្ជមាន $2^a - 1$ និង $2^b - 1$ ។

២. គេដាក់ μ ជាតួចែករួមធំបំផុតនៃ a និង b ។ បង្ហាញថា $2^\mu - 1$ ជាតួចែករួមធំបំផុតនៃ $2^a - 1$ និង $2^b - 1$ ។

V. (២០ពិន្ទុ) ស្វ័យ (S) មួយមានកាំ R ហើយចារឹកក្នុងតេត្រាអែត $ABCD$ មួយ។ បង្កប្រផ្សេងគ្នាប៉ះនឹងស្វ័យ (S) ហើយស្របរៀងគ្នានឹងមុខ

ទាំងបួននៃតេត្រាអែត កាត់តេត្រាអែតនោះបានជាតេត្រាអែតតូចៗចំនួនបួន។ តេត្រាអែតតូចៗទាំងនោះចារឹកក្រៅស្វ័យតូចៗ ដែល

មានកាំរៀងគ្នា r_1, r_2, r_3 និង r_4 ។

បង្ហាញថា $r_1 + r_2 + r_3 + r_4 = 2R$ ។

VI. (២០ពិន្ទុ) អនុគមន៍ f មួយកំណត់ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិតវិជ្ជមាន x ហើយ ផ្សេងជាតំលៃពិតទាំងបីខាងក្រោម:

(i) f ជាអនុគមន៍កើនដាច់ខាតលើចន្លោះ $]0; +\infty[$

(ii) $f(x) > -\frac{1}{x}$ ចំពោះគ្រប់ $x > 0$

(iii) $f(x) \cdot f\left(f(x) + \frac{1}{x}\right) = 1$ ចំពោះគ្រប់ $x > 0$ ។

១. គណនា $f(1)$ ។

២. គណនា $f(x)$ ។

I. (១០ពិន្ទុ) បង្ហាញថា សមីការ $a(ax^2 + 2010x + c)^2 + 2010(ax^2 - 2010x + c) + c = x$ គ្មានឫសជាចំនួនពិតដែរ ។

ដោយសមីការ $u(x) = x$ គ្មានឫសជាចំនួនពិត នោះ ឬមួយ $u(x) < x$ ឬមួយ $u(x) > x$ ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត x ។

តែបង្ហាញបាន ឬមួយ $u(x) < x$ ឬមួយ $u(x) > x$ ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត x ។ បានន័យថា :

- ឬមួយ $a(ax^2 + 2010x + c)^2 + 2010(ax^2 + 2010x + c) + c < x$ ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត x

- ឬមួយ $a(ax^2 + 2010x + c)^2 + 2010(ax^2 + 2010x + c) + c > x$ ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត x ។

ដូចនេះ សមីការ $a(ax^2 + 2010x + c)^2 + 2010(ax^2 + 2010x + c) + c = x$ គ្មានឫសជាចំនួនពិតដែរ ។

II. (១៥ពិន្ទុ) បង្ហាញថា $P(2010) \geq (2\sqrt{2010})^n$:

ដោយលេខគេគុណ $a_1, a_2, \dots, a_n$ ជាចំនួនមិនអវិជ្ជមាន នោះ ឬស $x_1, x_2, \dots, x_n$ ជាចំនួនពិតមិនអវិជ្ជមាន ។

តាង $\alpha_i = -x_i, i = 1, 2, \dots, n$ នោះគេបាន $\alpha_i \geq 0$ ហើយ $P(x) = (x + \alpha_1)(x + \alpha_2) \dots (x + \alpha_n)$


$$P(2010) = (2010 + \alpha_1)(2010 + \alpha_2) \dots (2010 + \alpha_n)$$

$$\text{ម្យ៉ាងទៀត } 2010 + \alpha_i \geq 2\sqrt{2010 \cdot \alpha_i}, i = 1, 2, \dots, n$$

$$\text{គេបាន } P(2010) = (2010 + \alpha_1)(2010 + \alpha_2) \dots (2010 + \alpha_n) \geq 2^n \sqrt{2010^n \cdot \alpha_1 \cdot \alpha_2 \dots \alpha_n}$$

$$\text{ដូចនេះ } P(2010) \geq (2\sqrt{2010})^n \text{ ព្រោះ } \alpha_1 \cdot \alpha_2 \dots \alpha_n = 1$$

III. (១៥ពិន្ទុ) រកចំណុច B និង C នៅលើជ្រុង $[Ox]$ និង $[Oy]$ រៀងគ្នា ដើម្បីឱ្យត្រីកោណ ABC មានបរិមាត្រអប្បបរមា :



តាង M & N ជាចំណុចឆ្លុះនៃ A ចំពោះ $[Ox]$ និង $[Oy]$ រៀងគ្នា ។

តាង B_0 & C_0 ជាចំណុចប្រសព្វ រវាង $[MN]$ ជាមួយ $[Ox]$ និង $[Oy]$ រៀងគ្នា ។

យក $B_i \in [Ox], C_i \in [Oy], i = 1, 2, \dots$

- គេបានបរិមាត្រនៃ $\triangle AB_0C_0 : p_0 = AB_0 + B_0C_0 + C_0A = MB_0 + B_0C_0 + C_0N = MN$ ថេរ

- គេបានបរិមាត្រនៃ $\triangle AB_iC_i : p_i = AB_i + B_iC_i + C_iA = MB_i + B_iC_i + C_iN$

តែ $MB_i + B_iC_i > MC_i \Rightarrow MB_i + B_iC_i + C_iN > MC_i + C_iN > MN$ ចំពោះគ្រប់ $i = 1, 2, \dots$

គេបាន $p_i > p_0, \forall i = 1, 2, \dots$

ដូចនេះ ត្រីកោណ ABC មានបរិមាត្រអប្បបរមាកាលណា $B = B_0, C = C_0$ ។

13

សិទ្ធិ

សិទ្ធិ

សិទ្ធិ

សិទ្ធិ

សិទ្ធិ

សិទ្ធិ

សិទ្ធិ

២០០៩) ១. បង្ហាញថា $2^a - 1$ ជាសំណុំលក្ខណៈវិធីចែកអឺគ្លីតនៃចំនួនគតិជ្រុងមាន $2^a - 1$ និង $2^b - 1$:

តាមវិធីចែកអឺគ្លីត $a = bq + r, 0 < r < b$ គេបាន :

$$2^a - 1 = 2^{bq+r} - 2^r + 2^r - 1 = 2^r(2^b - 1)((2^b)^{q-1} + \dots + 2^b + 1) - (2^r - 1) \\ = (2^b - 1)(2^{b(q-1)+r} + \dots + 2^{b+2r} + 2^{b+r} - 1) + (2^r - 1) + 2^{b+r} - 1$$

ដូច្នេះ $2^b - 1$ ចែកអឺគ្លីតនឹង $2^a - 1$ និង $2^r - 1$:

២. បង្ហាញថា $2^a - 1$ ជាតួបែករួមធំបំផុតនៃ $(2^a - 1)$ និង $(2^b - 1)$:

តាង $r_1 = a, r_2 = b$ ។ តាមវិធីចែកអឺគ្លីតបន្តបន្ទាប់ :

$$r_1 = r_2 q_1 + r_3 \quad (0 < r_3 < r_2), r_2 = r_3 q_2 + r_4 \quad (0 \leq r_4 < r_3), \dots, r_{n-2} = r_{n-1} q_{n-2} + r_{n-1} \quad (0 \leq r_{n-1} < r_{n-2}), \\ r_{n-1} = r_{n-1} q_{n-1}$$

គេបាន $\gcd(a, b) = r_{n-1} = a$

តាង $R_1 = 2^a - 1, R_2 = 2^b - 1$ ។ តាមវិធីចែកអឺគ្លីតបន្តបន្ទាប់ និងយកផលបូកគ្នា :

$$R_1 = R_2 Q_1 + R_3, R_2 = 2^b - 1$$

$$R_2 = R_3 Q_2 + R_4, R_3 = 2^a - 1$$


$$\dots \dots \dots$$

$$R_{n-3} = R_{n-2} Q_{n-2} + R_{n-1}, R_{n-2} = 2^a - 1$$

$$R_{n-2} = R_{n-1} Q_{n-1}$$

$$\text{គេបាន } \gcd(R_1, R_2) = R_{n-1} = 2^a - 1$$

V. ២០០៩) បង្ហាញថា $r_1 + r_2 + r_3 + r_4 = 2R$:



តាង f_i & $h_i, i = 1, 2, 3, 4$ ជាផ្ទៃក្រឡានៃមុខ និងកម្ពស់ដែលត្រូវគ្នានៃតេត្រាអែត។

តាង $r_i, i = 1, 2, 3, 4$ ជាកាំស្មើចារឹកក្នុងតេត្រាអែតតូចៗទាំងបួន។

ដោយប្លង់មុខកាត់ស្របមុខនៃតេត្រាអែត នោះតេត្រាអែតតូចៗដែលបានទាំងបួន ដូចនឹងតេត្រាអែតដើម។

$$\text{គេបាន } R/r_i = (h_i - 2R)/h_i = 1 - (2R/h_i) \Rightarrow (2R/h_i) = 1 - (r_i/R) = (R - r_i)/R$$

$$\text{ហើយ } 2R/h_i = (R - r_i)/R \Rightarrow 1/h_i = (R - r_i)/2R^2, i = 1, 2, 3, 4$$

$$\text{ចំពោះ } i = 1, 2, 3, 4 \text{ គេបាន } 1/h_1 + 1/h_2 + 1/h_3 + 1/h_4 = (4R - r_1 - r_2 - r_3 - r_4)/2R^2 \quad (1)$$

$$\text{ម្យ៉ាងទៀតគេមេនមាតិកនៃតេត្រាអែត } V = (1/3)R(f_1 + f_2 + f_3 + f_4) \Rightarrow f_1 + f_2 + f_3 + f_4 = 3V/R$$

$$V = (1/3)f_1 h_1 = (1/3)f_2 h_2 = (1/3)f_3 h_3 = (1/3)f_4 h_4$$

$$1/h_1 = f_1/3V, 1/h_2 = f_2/3V, 1/h_3 = f_3/3V, 1/h_4 = f_4/3V$$

គេបាន $1/h_1 + 1/h_2 + 1/h_3 + 1/h_4 = (f_1 + f_2 + f_3 + f_4)/3V = (3V/R) : 3V = 1/R$ (2)

តាម (1) & (2) $\Rightarrow (4R - r_1 - r_2 - r_3 - r_4)/2R^2 = 1/R$ ហើយ $4R - r_1 - r_2 - r_3 - r_4 = 2R$

ដូចនេះ $r_1 + r_2 + r_3 + r_4 = 2R$ ។

២. ចូរពិនិត្យ កំណត់អនាមិក $f(x)$

តាង $t = f(1)$

- យក $x = 1 \Rightarrow f(1) \cdot f(f(1) + 1) = 1$ ហើយ $t \cdot f(t + 1) = 1 \Rightarrow f(t + 1) = 1/t$

- យក $x = t + 1 \Rightarrow f(t + 1) \cdot f(f(t + 1) + 1) = 1$ ហើយ $(1/t) \cdot f(1/t + 1) = 1$

គេបាន $f(1/t + 1) = t = f(1)$

ដោយ f ជាអនុគមន៍កើនដាច់ខាតលើចន្លោះ $]0; +\infty[$ នោះគេបាន $1/t + 1 < 1$ ឬ $1/t < 0$ សមមូល $t^2 - 1 < 0$

មានឫស $t = (1 \pm \sqrt{5})/2$

- ចំពោះ $t = (1 + \sqrt{5})/2$ គេបាន $1 < t = f(1) < 1 + 1 = 2$ ដូចនេះ $1/t < 1$ ជាអសមភាព

- ចំពោះ $t = (1 - \sqrt{5})/2$ គេបាន $t = f(1) > -1/1$ គឺពិតចំពោះ (iii)

ដូចនេះ $f(1) = (1 - \sqrt{5})/2$

៣. គណនា $f(x)$

តាង $a = f(x) \Rightarrow a \cdot f(a + 1/x) = 1 \Rightarrow f(a + 1/x) = 1/a$

- យក $x = a + 1/x \Rightarrow f(a + 1/x) \cdot f(f(a + 1/x) + 1/(a + 1/x)) = 1$

គេទាញបាន $f(f(a + 1/x) + x/(ax + 1)) = a = f(x)$

ដោយ f ជាអនុគមន៍កើនដាច់ខាតលើចន្លោះ $]0; +\infty[$ នោះគេបាន $f(a + 1/x) + x/(ax + 1) = x$

$1/a + x/(ax + 1) = x \Leftrightarrow x^2 a^2 - xa - 1 = 0$

$a = (1 \pm \sqrt{5})/2x$

- ចំពោះ $a = (1 + \sqrt{5})/2x \Rightarrow f'(x) = -(1 + \sqrt{5})/2x^2 < 0$

ដូចនេះ f ជាអនុគមន៍ចុះ ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខណៈ (i)

- ចំពោះ $a = (1 - \sqrt{5})/2x \Rightarrow f'(x) = -(1 - \sqrt{5})/2x^2 > 0$

ដូចនេះ f ជាអនុគមន៍កើន ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខណៈ (i)

ឡាងឡេត $(1 - \sqrt{5})/2 > -1 \Rightarrow f(x) = (1 - \sqrt{5})/2x > -1/x$ ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខណៈ (ii) ។


ដោយ $f(x) = t/x$ នោះគេបាន :

$f(x) \cdot f\left(f(x) + \frac{1}{x}\right) = (t/x) \cdot f\left((t/x) + (1/x)\right) = (t/x) \cdot (tx/t + 1) = t^2/(t + 1) = 1$

ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខណៈ (iii) ។

ដូចនេះ $f(x) = t/x$ ដែល $t = (1 - \sqrt{5})/2$ ។

ថ្ងៃទី ០៣ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០១០
ប្រធានក្រុមការងារវិភាគសាកលវិទ្យាល័យ ប៉ាន់ស្រី



អ៊ូ សាមនី

ប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូជស្រីក្នុងវិទ្យាល័យប្រទេស
ផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ គណិតវិទ្យា រូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី៩ និងថ្នាក់ទី១២
សម័យប្រឡង : ០១ មេសា ២០១១
ចំណាត់ថ្នាក់ : គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ លើកទី១ : ០១-៤-២០១១
រយៈពេល : ១៥០ នាទី ពិន្ទុ : ១០០

- I. (១០ពិន្ទុ) នៅដើមឆ្នាំ ២០១១ នេះ ចំនួនទេសចរដែលបានមកទស្សនាប្រាសាទអង្គរវត្តស្មើនឹង $pq(p^2 - q^2)$ ដែល p និង q ជាចំនួនគត់ធម្មជាតិ ហើយ $p > q$ ។ គេស្រង់ឈ្មោះទេសចរទាំងនោះដាក់ក្នុងបញ្ជីមួយដោយមានចុះលេខរៀងត្រឹមត្រូវ។ បង្ហាញថា លេខរៀងរបស់ទេសចរចុងក្រោយគេបង្អស់ជាពហុគុណនៃ ៣ ។
- II. (១០ពិន្ទុ) ចំណុច $M_1(x, y, z)$ មានកូអរដោនេជាចំនួនគត់វិជ្ជមានដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ $x^2 + y^2 + z^2 = x^3 + y^3 + z^3$ ។ បង្ហាញថា មានចំណុច $M_1(x, y, z)$ ច្រើនជាងមិនអស់នៅក្នុងលំហ។
- III. (២០ពិន្ទុ) ស្វ៊ីត (u_n) កំណត់ដោយ $u_1 = 1, u_2 = 1$ និង $u_{n+1} = u_n + u_{n-1}$ ចំពោះ $n \geq 2$ ។ បង្ហាញថា $u_{2011} u_{2012} - u_{2010} u_{2013} = 1$ ហើយ $u_{10+2012} u_{10+2013} - u_{10+2011} u_{10+2014} = -1$ ។
- IV. (២០ពិន្ទុ) ស្វ៊ីត (I_k) កំណត់ដោយ $I_k = \int_0^{\pi/2} \sin^k x dx$ ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ធម្មជាតិ k ។ អនុគមន៍ f កំណត់ដោយ $f(k) = (k+1)I_k I_{k+1}$ ។
 ១- កំណត់ទំនាក់ទំនងរវាង I_k និង I_{k+2} ។
 ២- ប្រៀបធៀប $f(k)$ និង $f(k+1)$ ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ធម្មជាតិ k ។ គណនាតម្លៃ $f(2011)$ ។
- V. (២០ពិន្ទុ) ចតុកោណប៉ោង $ABCD$ មួយមានជ្រុង $AB = a, BC = b, CD = c, DA = d$ និងបរិមាត្រ $2p$ ហើយថាវាក្នុងរង្វង់មួយ។ បង្ហាញថា ចតុកោណ $ABCD$ មានផ្ទៃក្រឡា $S = \sqrt{(p-a)(p-b)(p-c)(p-d)}$ ។
- VI. (២០ពិន្ទុ) $P_n(x)$ ជាពហុធានីក្រេ n ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ $P_n(x) = -2xP_{n-1}'(x) + P_{n-1}''(x)$ ។
 ១- បង្ហាញថាដេរីវេទី n នៃអនុគមន៍ $y = e^{-x^2}$ កំណត់ដោយ $y^{(n)} = e^{-x^2} P_n(x)$ ។
 ២- ទាញបញ្ជាក់ថា $P_{n+1}(x) + 2xP_n'(x) + 2nP_{n-1}(x) = 0$ ហើយ $P_n''(x) - 2xP_n'(x) + 2nP_n(x) = 0$ ។

ប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងប្រទេស

ផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ គណិតវិទ្យា ប្រវត្តិ ថ្នាក់ទី ៩ និងទី ១២

សម័យប្រឡង: ០១.០៤.២០១១

រក្សាកំណត់គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី ១២ លើកទី ១ ថ្ងៃទី ០១.០៤.២០១១

រយៈពេល ១៨០នាទី ពិន្ទុ ១០០

I-(១០ពិន្ទុ) បង្ហាញថា លេខរៀងនៃទេសចរចុងក្រោយគេបង្អស់ជាពហុគុណនៃ3 ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ធម្មជាតិ $p, q, p > q$:

តើបង្ហាញថា $A = pq(p^2 - q^2)$ ជាពហុគុណនៃ3 ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ធម្មជាតិ $p, q, p > q$ ។

គេមាន $A = pq(p^2 - q^2) = pq(p - q)(p + q)$

ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ធម្មជាតិ p, q គេអាចមានករណី :

$p = 3a$ ឬ $p = 3a + 1$ ឬ $p = 3a + 2$ ដែល a ចំនួនគត់ធម្មជាតិ

$q = 3b$ ឬ $q = 3b + 1$ ឬ $q = 3b + 2$ ដែល b ចំនួនគត់ធម្មជាតិ

គេសិក្សាករណីនីមួយៗដូចខាងក្រោម :

-បើ $p = 3a \Rightarrow A$ ជាពហុគុណនៃ3

1 P

-បើ $p = 3a + 1$

1 P

 .បើ $q = 3b \Rightarrow A$ ជាពហុគុណនៃ3

1 P

 .បើ $q = 3b + 1 \Rightarrow p - q = 3(a - b) \Rightarrow A$ ជាពហុគុណនៃ3

1 P

 .បើ $q = 3b + 2 \Rightarrow p + q = 3(a + b + 1) \Rightarrow A$ ជាពហុគុណនៃ3

1 P

-បើ $p = 3a + 2$

1 P

 .បើ $q = 3b \Rightarrow A$ ជាពហុគុណនៃ3

1 P

 .បើ $q = 3b + 1 \Rightarrow p + q = 3(a + b + 1) \Rightarrow A$ ជាពហុគុណនៃ3

1 P

 .បើ $q = 3b + 2 \Rightarrow p - q = 3(a - b) \Rightarrow A$ ជាពហុគុណនៃ3

1 P

ដូចនេះ លេខរៀងនៃទេសចរចុងក្រោយគេបង្អស់ជាពហុគុណនៃ3 ។

1 P

II-(១០ពិន្ទុ) បង្ហាញថាមានចំណុច $M(x, y, z)$ ច្រើនរាប់មិនអស់នៅក្នុងលំហ :

ដើម្បីបំបាត់ x^3 និង z^3 ពីអង្គទី២ គេអាចយក $z = -x$ ។

2 P

នោះគេបាន $2x^2 + y^2 = y^3 \Leftrightarrow 2x^2 = (y - 1)y^2$

1 P

$\Leftrightarrow x^2 = \frac{y-1}{2} \cdot y^2$

1 P

សមីការផ្ទៀងផ្ទាត់លុះត្រាតែ $\frac{y-1}{2}$ ជាការប្រាកដ គឺថា $\frac{y-1}{2} = k^2, k \in \mathbb{Z} \Rightarrow y = 2k^2 + 1$

2 P

គេបាន $2x^2 = (2k^2 + 1 - 1)(2k^2 + 1)^2$ ឬ $x^2 = k^2(2k^2 + 1)^2$

1 P

ហើយ $x = \pm k(2k^2 + 1), y = 2k^2 + 1, z = \mp k(2k^2 + 1)$ ដែល $k \in \mathbb{Z}$ ។

2 P

ដូចនេះ មានចំណុច $M(x, y, z)$ ច្រើនរាប់មិនអស់នៅក្នុងលំហ ។

1 P

III-(២០ពិន្ទុ) ស្វ៊ីត (u_n) កំណត់ដោយ $u_1 = 1, u_2 = 1$ និង $u_{n+1} = u_n + u_{n-1}, n \geq 2$ ។

បង្ហាញថា $u_{2011} u_{2012} - u_{2010} u_{2013} = 1$

បង្ហាញថា $u_{1042012} u_{1042013} - u_{1042011} u_{1042014} = -1$

ដូចនេះត្រូវបង្ហាញថា $u_{n+1} u_{n+2} - u_n u_{n+3} = (-1)^n$ ចំពោះគ្រប់ $n \in \mathbb{N}$

-ចំពោះ $n = 1$ គេបាន $u_2 u_3 - u_1 u_4 = 1 \cdot 2 - 1 \cdot 3 = (-1)^1$; សមភាពពិត

3p

-ឧបមាថាសមភាពពិតដល់ $n = p$ គឺថា $u_{p+1} u_{p+2} - u_p u_{p+3} = (-1)^p$

3p

-សិក្សា ចំពោះ $n = p + 1$

$$u_{p+1+1} u_{p+1+2} - u_{p+1} u_{p+1+3} = u_{p+2} u_{p+3} - u_{p+1} u_{p+4}$$

$$u_{p+2} u_{p+3} - u_{p+1} u_{p+4} = u_{p+2} (u_{p+2} + u_{p+1}) - u_{p+3} (u_{p+3} + u_{p+2})$$

2p

$$= (u_{p+2})^2 + u_{p+2} u_{p+1} - u_{p+3} (u_{p+2} + u_{p+1} + u_{p-2}) = (u_{p+2})^2 - (u_{p+1})^2 - (u_{p+1} u_{p+2})$$

2p

$$= (u_{p+2} - u_{p+1})(u_{p+2} + u_{p+1}) - (u_{p+1} u_{p+2})$$

2p

$$= (u_p + u_{p+1} - u_{p-1})(u_{p+2}) - (u_{p-1} u_{p+2}) = u_p u_{p+3} - u_{p+1} u_{p+2}$$

2p

$$= (-1)(u_{p+1} u_{p+2} - u_p u_{p+3}) = (-1)(-1)^p = (-1)^{p+1}$$

បញ្ជាក់ថាសមភាពពិតចំពោះ $n = p + 1$ ។

ដូចនេះ $u_{n+1} u_{n+2} - u_n u_{n+3} = (-1)^n$ ចំពោះគ្រប់ $n \in \mathbb{N}$ ។

2p

- បង្ហាញថា $u_{2011} u_{2012} - u_{2010} u_{2013} = 1$

ដោយយក $n = 2010$ នោះគេបាន $u_{2011} u_{2012} - u_{2010} u_{2013} = (-1)^{2010} = 1$

2p

- បង្ហាញថា $u_{1042012} u_{1042013} - u_{1042011} u_{1042014} = -1$

ដោយយក $n = 1042011$ នោះគេបាន $u_{1042012} u_{1042013} - u_{1042011} u_{1042014} = (-1)^{1042011} = -1$

2p

IV. (២០ពិន្ទុ) ១- កំណត់ទំនាក់ទំនងរវាង I_k និង I_{k+2} ឆ័ត្រ

គេមាន $I_k = \int_0^{\pi/2} \sin^{k-1} x \sin x dx = [-\cos x \sin^{k-1} x]_0^{\pi/2} + (k-1) \int_0^{\pi/2} \sin^{k-2} x \cos^2 x dx$ 2p

$$I_k = (k-1) \int_0^{\pi/2} \sin^{k-2} x (1 - \sin^2 x) dx = (k-1) I_{k-2} - (k-1) I_k$$
 2p

$$\Rightarrow k I_k = (k-1) I_{k-2}$$
 2p

$$\Rightarrow (k+2) I_{k+2} = (k+1) I_{k+2-2} \Rightarrow (k+2) I_{k+2} = (k+1) I_k$$
 2p

២- ប្រៀបធៀប $f(k)$ និង $f(k+1)$ ១២ ពិន្ទុ

គេមាន

$$f(k+1) = (k+1+1) I_{k+1} I_{k+1+1}$$

$$f(k+1) = (k+2) I_{k+1} I_{k+2} \quad (1)$$

2p

$$\text{តែ } (k+2) I_{k+2} = (k+1) I_k \Rightarrow I_{k+2} = \frac{k+1}{k+2} I_k$$

2p

$$\text{តាម (1) គេបាន } f(k+1) = (k+2) I_{k+1} \cdot \frac{k+1}{k+2} I_k$$

1p

$$f(k+1) = (k+1) I_{k+1} I_k$$

$$\text{ដោយ } f(k) = (k+1) I_k I_{k+1} \text{ ហើយ } f(k+1) = (k+1) I_k I_{k+1}$$

1p

នោះគេទាញបាន $f(k+1) = f(k), \forall k \in \mathbb{N}$

គណនាតម្លៃ $f(2011)$:

ដោយ $f(k+1) = f(k), \forall k \in \mathbb{N}$ នោះគេអាចសរសេរ :

$$f(k) = f(k-1) = f(k-2) = \dots = f(2) = f(1) = (1+1)I_1 I_2 = 2I_1 I_2 \quad (2)$$

2p

$$\text{តែ } I_1 = \int_0^{\pi/2} \sin x \, dx = [-\cos x]_0^{\pi/2} = 1$$

1p


$$I_2 = \int_0^{\pi/2} \sin^2 x \, dx = (1/2) \int_0^{\pi/2} (1 - \cos 2x) \, dx = (1/2) [x - (1/2) \sin 2x]_0^{\pi/2} = \pi/4$$

1p

$$\text{តាម(2) គេបាន } f(k) = \pi/2 \Rightarrow f(2011) = \pi/2$$

2p

V-(២០ពិន្ទុ) បង្ហាញថា ចតុកោណ ABCD មានផ្ទៃក្រឡា $S = \sqrt{(p-a)(p-b)(p-c)(p-d)}$



2p

តាមទ្រឹស្តីបទ កូស៊ីនុសក្នុង $\triangle ABC$ និង $\triangle ACD$:

$$AC^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos B = c^2 + d^2 - 2cd \cos D$$

2p

$$a^2 + b^2 - 2ab \cos B = c^2 + d^2 + 2cd \cos B$$

$$\text{ព្រោះ } B + D = \pi \Rightarrow \cos D = -\cos B$$

1p

$$\cos B = \frac{a^2 + b^2 - c^2 - d^2}{2(ab + cd)}$$

1p

ម្យ៉ាងទៀត

$$S(ABCD) = S(ABC) + S(ACD)$$

$$= (1/2)ab \sin B + (1/2)cd \sin D$$

2p

$$S(ABCD) = (1/2)ab \sin B + (1/2)cd \sin B \quad \text{ព្រោះ } B + D = \pi \Rightarrow \sin D = \sin B$$

1p

$$S(ABCD) = (1/2)(ab + cd) \sin B$$

1p

$$S(ABCD) = (1/2)(ab + cd) \sqrt{1 - \cos^2 B} \quad (1)$$

1p

តែគេមាន :

$$1 - \cos^2 B = \left(1 + \frac{a^2 + b^2 - c^2 - d^2}{2(ab + cd)}\right) \left(1 - \frac{a^2 + b^2 - c^2 - d^2}{2(ab + cd)}\right)$$

2p

$$= \left(\frac{2(ab + cd) + a^2 + b^2 - c^2 - d^2}{2(ab + cd)}\right) \left(\frac{2(ab + cd) - a^2 - b^2 + c^2 + d^2}{2(ab + cd)}\right)$$

1p

$$= \left(\frac{(a+b)^2 - (c-d)^2}{2(ab + cd)}\right) \left(\frac{(c+d)^2 - (a-b)^2}{2(ab + cd)}\right)$$

1p

$$= \left(\frac{1}{4(ab + cd)^2}\right) (a+b+c-d)(a+b-c+d)(c+d+a-b)(c+d-a+b)$$

1p

$$= \left(\frac{1}{4(ab + cd)^2}\right) (a+b+c+d-2d)(a+b+c+d-2c)(c+d+a+b-2b)(c+d-a+b) \quad 1p$$

ដោយតាង $2p = a + b + c + d$ នោះគេបាន :

ដោយតាង $2p = a + b + c + d$ នោះគេបាន :

$$1 - \cos^2 B = \left(\frac{1}{4(ab+cd)^2} \right) (2p-2d)(2p-2c)(2p-2b)(2p-2a)$$

$$1 - \cos^2 B = \left(\frac{4}{(ab+cd)^2} \right) (p-a)(p-b)(p-c)(p-d)$$

1P

តាម (1) គេបាន :

$$S(ABCD) = \frac{1}{2}(ab+cd) \sqrt{\left(\frac{4}{(ab+cd)^2} \right) (p-a)(p-b)(p-c)(p-d)}$$

2P

ដូចនេះ $S(ABCD) = \sqrt{(p-a)(p-b)(p-c)(p-d)}$ ដែល $p = (a+b+c+d)/2$ ។

VI- (២០ពិន្ទុ) $P_n(x)$ ជាពហុធានីក្រេ n ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ $P_n(x) = -2xP_{n-1} + P'_{n-1}$

១-បង្ហាញថា $y^{(n)} = e^{-x^2} P_n(x)$ ជំនួស

-ចំពោះ $n=1$ គេបាន $y' = (-2x)e^{-x^2} = e^{-x^2} P_1(x)$

2P

-ឧបមាថាសមភាពពិតដល់ $n=k$ គឺថា $y^{(k)} = e^{-x^2} P_k(x)$ (1)

2P

-សិក្សាចំពោះ $n=k+1$: ដោយរកដេរីវេអង្គទាំងពីររបស់ (1) :

$$y^{(k+1)} = e^{-x^2} (-2xP_k(x) + P'_k(x)) = e^{-x^2} P_{k+1}(x)$$

4P

២-ទាញបញ្ជាក់ថា $P_{n+1}(x) + 2xP_n(x) + 2nP_{n-1}(x) = 0$ ហើយ $P''_n(x) - 2xP'_n(x) + 2nP_n(x) = 0$ ជំនួស

$$\text{គេមាន } y' = (-2x)e^{-x^2} = -2xy \Rightarrow y' + 2xy = 0 \quad (2)$$

2P

ដោយរកដេរីវេអង្គទាំងពីររបស់ (2) ចំនួន n ដង នឹង ប្រើរូបមន្ត Leibniz :

$$(fg)^{(n)} = f^{(n)}g + C(n,1)f^{(n-1)}g' + \dots + C(n,p)f^{(n-p)}g^{(p)} + \dots + fg^{(n)} = \sum_{i=0}^n C(n,i)f^{(n-i)}g^{(i)}$$

$$\text{គេបាន } y^{(n+1)} + 2(xy)^{(n)} = y^{(n+1)} + 2xy^{(n)} + 2ny^{(n-1)} = 0$$

2P

$$\text{ឬ } e^{-x^2} (P_{n+1}(x) + 2xP_n(x) + 2nP_{n-1}(x)) = 0 \Rightarrow P_{n+1}(x) + 2xP_n(x) + 2nP_{n-1}(x) = 0 \quad (3)$$

2P

$$\text{តែគេមាន : } P_{n+1}(x) = -2xP_n(x) + P'_n(x)$$

$$\text{តាម(3) គេបាន } -2xP_n(x) + P'_n(x) + 2xP_n(x) + 2nP_{n-1}(x) = 0$$

$$P'_n(x) + 2nP_{n-1}(x) = 0 \Rightarrow P'_n(x) = -2nP_{n-1}(x)$$

2P

$$\Rightarrow P'_{n+1}(x) = -2(n+1)P_n(x) = -2nP_n(x) - 2P_n(x) \quad (4)$$

$$\text{ដោយ } P_{n+1}(x) = -2xP_n(x) + P'_n(x) \Rightarrow P'_{n+1}(x) = -2xP'_n(x) - 2P_n(x) + P''_n(x) \quad (5)$$

2P

$$\text{តាម (4) និង (5) គេបាន } P''_n(x) - 2xP'_n(x) + 2nP_n(x) = 0$$

2P

ថ្ងៃទី ០១ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១១

ប្រធានគ្រូបកំណែតម្លៃវិទ្យាស្ថាន ១២



អ៊ុំ សារ៉ាណី

ប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែគណិតវិទ្យាប្រទេស
ផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ គណិតវិទ្យា ប្រវត្តិសាស្ត្រ ភូមិសាស្ត្រ និងភូមិសាស្ត្រ
សម័យប្រឡង : ០១ មេសា ២០១១
វិញ្ញាបនា : គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី១២ លើគណិត : ០៣.៤.២០១១
រយៈពេល : ១៨០ នាទី ពិន្ទុ : ១០០

- I. (១០ពិន្ទុ) គេបានប្រើប្រាស់ទ្រង់ចំនួន ១១ គ្រឿងសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនកូនមាន់ចំនួន $7y38x5$ ក្បាល ទៅកាន់កសិដ្ឋានមួយ។ រាល់លេខ x និង y ក្នុងប្រព័ន្ធរបស់គោលដប់ដោយដឹងថាក្នុងទ្រង់នីមួយៗមានចំនួនកូនមាន់ស្មើគ្នា។
- II. (១០ពិន្ទុ) គេឱ្យចំនួនគតិវិជ្ជាទីបី α, β, λ និង μ ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់សមភាព $\alpha\mu = 1 + \beta\lambda$ ។ គេយក x_0 ជាតួចែករួមធំបំផុតនៃចំនួនគតិវិជ្ជាទីបី a និង b ហើយយក y_0 ជាតួចែករួមធំបំផុតនៃ $\alpha a + \beta b$ និង $\lambda a + \mu b$ ។ ចូរប្រៀបធៀបចម្ងាយពីចំណុច $M_0(x_0, y_0)$ ទៅអ័ក្សទាំងពីរនៃតម្រុយអវត្តមានរវាងមួយ។
- III. (២០ពិន្ទុ) គេឱ្យអនុគមន៍ពហុធា $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_1 x + a_0$ ដែលមានលេខមេគុណជាចំនួនគតិវិជ្ជាទីបី។ គេដឹងថាមានចំនួនគតិវិជ្ជាទីបី x_0 ដែល $f(x_0) = p$ ជាចំនួនបឋម។ បង្ហាញថា មានចំនួនគតិវិជ្ជាទីបី β ច្រើនរាប់មិនអស់ ដែល $f(\beta)$ មិនមែនជាចំនួនបឋម។
- IV. (២០ពិន្ទុ) ស្វ៊ីត (x_n) កំណត់ដោយ $x_1 = 1, x_2 = 1$ និង $x_{n+1} = x_n + x_{n-1}$ ចំពោះ $n \geq 2$ ។ ស្វ៊ីត (y_n) កំណត់ដោយ $y_n = |x_{n+4}x_{n-2} - x_{n+2}x_n|$ ចំពោះ $n \geq 3$ ។ ស្វ៊ីត (z_n) កំណត់ដោយ $z_n - 9 = 4x_{n-2}x_nx_{n-2}x_{n-4}$ ចំពោះ $n \geq 3$ ។
 ១-បង្ហាញថា (y_n) ជាស្វ៊ីតថេរចំពោះ $n \geq 3$ ។ ទាញរកតម្លៃនៃ $y_{3042011}$ ។
 ២-បង្ហាញថា តួនីមួយៗនៃស្វ៊ីត (z_n) ជាការប្រាកដ។
- V. (២០ពិន្ទុ) គេឱ្យ a និង X ជាចំនួនគតិវិជ្ជាទីបីដែល $a > 1, X > 0$ ។ k ជាចំនួនគតិវិជ្ជាទីបីមិនអវិជ្ជមាន និង c_j ជាចំនួនគតិវិជ្ជាទីបីដែល $0 \leq c_j < a$ ចំពោះ $j = 0, 1, \dots, k$ ។ បង្ហាញថា X អាចសរសេរបានមួយបែបគត់ជារាង $X = \sum_{j=0}^k c_j a^j$ ។
- VI. (២០ពិន្ទុ) រង្វង់មួយមានផ្ចិត O និងកាំ R ចារឹកក្រៅត្រីកោណ ABC មួយដែលមានបរិមាត្រ $2p$ ។ ត្រីកោណ ABC នេះចារឹកក្រៅរង្វង់មួយទៀតដែលមានផ្ចិត I និងកាំ r ។ បង្ហាញថា $4R + r = p \left(\tan \frac{A}{2} + \tan \frac{B}{2} + \tan \frac{C}{2} \right)$ ។

ប្រឡងរៀនសរសើរសិស្សក្នុងគណៈកម្មាធិការប្រទេស

ផ្នែកគណិតវិទ្យា គណិតវិទ្យា រូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី ៩ និងទី ១២

សម័យប្រឡង: ០១.០៤.២០១០

គ្រោងគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី ១២ លើកទី ២ ថ្ងៃទី ០៣.០៤.២០១១

រយៈពេល ១៥០នាទី ពិន្ទុ ១០០

1-1 ១០ពិន្ទុ រកលេខ x និង y ដោយដឹងថាក្នុងទ្រង់នីមួយៗមានចំនួនកូនមានស្មើគ្នា :

គេត្រូវរកលេខ x និង y ក្នុងប្រព័ន្ធរបស់គោលដប់ដើម្បីឱ្យចំនួន $7x+38x5$ ចែកដាច់នឹង 99 ។

គេមាន $\gcd(9,11) = 1$

ដើម្បីឱ្យ $7x+38x5$ ចែកដាច់នឹង $99 = 9 \times 11$ លុះត្រាតែ

$7 + y + 3 + 8 + x + 5 \equiv 0 \pmod{9}$ និង $5 + 8 + y - x - 3 - 7 \equiv 0 \pmod{11}$

២ ពិន្ទុ

$\Leftrightarrow (x + y \equiv 4 \pmod{9}) \wedge (-x + y \equiv -3 \pmod{11})$

២ ពិន្ទុ

$\Leftrightarrow (x + y = 9m + 4) \wedge (-x + y = 11n - 3)$

២ ពិន្ទុ

ដោយ $0 \leq x, y \leq 9 \Rightarrow 0 \leq x + y \leq 18, -9 \leq -x + y \leq 9$ នោះគេទាញបាន :

$(x + y = 4) \wedge (-x + y = -3), (x + y = 4) \wedge (-x + y = 8),$


២ ពិន្ទុ

$(x + y = 13) \wedge (-x + y = -3), (x + y = 13) \wedge (-x + y = 8)$

ដូចនេះ $x = 8, y = 5$

២ ពិន្ទុ

1-2 ១០ពិន្ទុ ប្រៀបធៀបមធ្យមពិតចំណុច $M_n(x_1, y_1)$ ទៅក្នុងកូអរដោនេត្រីកោណមាត្រដូចមានរូបភាពខាងក្រោម :



ដោយ x_1 ជាតួចែករួមធំបំផុតនៃ a & b ហើយ y_1 ជាតួចែករួមធំបំផុតនៃ $A = \alpha a + \beta b$ & $B = \lambda a + \mu b$

នេះគេបាន $(x_1 | a \wedge x_1 | b) \Rightarrow x_1 | (\alpha a + \beta b) = A$ និង $(x_1 | a \wedge x_1 | b) \Rightarrow x_1 | (\lambda a + \mu b) = B$

ដូចនេះ $x_1 | y_1$ (1)

២ ពិន្ទុ

ដូច្នេះយើងបាន $y_1 | A = \alpha a + \beta b \Rightarrow y_1 | (\alpha \mu a + \beta \mu b)$

$y_1 | B = \lambda a + \mu b \Rightarrow y_1 | (\beta \lambda a + \beta \mu b)$

គេបាន $y_1 | (\alpha \mu - \beta \lambda) a = a$ ព្រោះ $\alpha \mu - \beta \lambda = 1$

២ ពិន្ទុ

តាមរបៀបដូចគ្នា $y_1 | A = \alpha a + \beta b \Rightarrow y_1 | (\alpha \lambda a + \beta \lambda b)$

$y_1 | B = \lambda a + \mu b \Rightarrow y_1 | (\alpha \lambda a + \alpha \mu b)$

គេបាន $y_1 | (\alpha \mu - \beta \lambda) b = b$ ព្រោះ $\alpha \mu - \beta \lambda = 1$

ដោយ $(y_1 | a \wedge y_1 | b) \Rightarrow y_1 | x_1$ (2)

២ ពិន្ទុ

តាម (1) & (2) $\Rightarrow x_0 = y_0$

២ ពិន្ទុ

ដូចនេះ ចំណុច $M_0(x_0, y_0)$ មានចម្ងាយស្មើពីអ័ក្សទាំងពីរនៃតម្រុយអរតូណរម៉ាល់ ។

២ ពិន្ទុ

III-(២០ពិន្ទុ) បង្ហាញថា មានចំនួនគតិវិជ្ជាទីប β ច្រើនរាប់មិនអស់ ដែល $f(\beta)$ មិនមែន ជាចំនួនបឋម:

គេមាន $f(x_0) = a_n x_0^n + a_{n-1} x_0^{n-1} + \dots + a_1 x_0 + a_0 = p$

៣ ពិន្ទុ

គេពិនិត្យ $f(x_0 + kp), k \in \mathbb{Z}$

$f(x_0 + kp) = a_n (x_0 + kp)^n + a_{n-1} (x_0 + kp)^{n-1} + \dots + a_1 (x_0 + kp) + a_0$

៣ ពិន្ទុ

$= (a_n x_0^n + a_n \sum_{i=1}^n C(n, i) x_0^{n-i} (kp)^i) + (a_{n-1} x_0^{n-1} + a_{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} C(n-1, i) x_0^{n-1-i} (kp)^i) + \dots +$

៣ ពិន្ទុ

$+ (a_1 x_0 + a_1 kp) + a_0$

៣ ពិន្ទុ

$= (a_n x_0^n + a_{n-1} x_0^{n-1} + \dots + a_1 x_0 + a_0) + (a_n \sum_{i=1}^n C(n, i) x_0^{n-i} (kp)^i + \dots + a_1 kp)$

$= p + p(a_n \sum_{i=1}^n C(n, i) x_0^{n-i} k^i p^{i-1} + a_{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} C(n-1, i) x_0^{n-1-i} k^i p^{i-1} + \dots + a_1 k)$

៣ ពិន្ទុ

$f(x_0 + kp) = p(1 + a_n \sum_{i=1}^n C(n, i) x_0^{n-i} k^i p^{i-1} + a_{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} C(n-1, i) x_0^{n-1-i} k^i p^{i-1} + \dots + a_1 k)$

៣ ពិន្ទុ

គេទាញបាន $p | f(x_0 + kp), k \in \mathbb{Z}$

ដូចនេះ មានចំនួនគតិវិជ្ជាទីប $\beta = x_0 + kp, k \in \mathbb{Z}$ ច្រើនរាប់មិនអស់ ដែល $f(\beta)$ មិនមែន ជាចំនួនបឋម ។

២ ពិន្ទុ

IV-(២០ពិន្ទុ)

១-បង្ហាញថា (y_n) ជាស្វ៊ីតថេរចំពោះគ្រប់ $n \geq 3$

$y_n = |x_{n+3}x_{n-2} - x_{n+2}x_n|$

$= |(x_{n+3} + x_{n-2})x_{n-2} - x_{n+2}x_n| = |x_{n+3}x_{n-2} + x_{n+2}(x_{n-2} - x_n)|$

២ ពិន្ទុ

$= |x_{n+3}x_{n-2} + x_{n+2}(x_{n-2} - x_{n-1} - x_{n-2})| = |x_{n+3}x_{n-2} - x_{n+2}x_{n-1}|$

២ ពិន្ទុ

$= |x_{n+3}(x_{n-1} - x_{n-3}) - x_{n+2}x_{n-1}| = |-x_{n+3}x_{n-3} - x_{n-1}(x_{n+2} - x_{n+3})|$

២ ពិន្ទុ

(ព្រោះ $x_{n-1} = x_{n-2} + x_{n-3} \Rightarrow x_{n-2} = x_{n-1} - x_{n-3}$)

$= |-x_{n+3}x_{n-3} - x_{n-1}(x_{n+2} - x_{n+2} - x_{n-1})|$

២ ពិន្ទុ

$= |x_{n+3}x_{n-3} - x_{n+1}x_{n-1}|$

$y_n = |x_{(n-1)+4}x_{(n-1)-2} - x_{(n-1)+2}x_{(n-1)}| = y_{n-1}, \forall n \geq 3$

៣ ពិន្ទុ

ដូចនេះ (y_n) ជាស្វ៊ីតថេរចំពោះគ្រប់ $n \geq 3$ ។

- ទាញរកតម្លៃ $y_{3042011}$

$y_n = y_{n-1}, \forall n \geq 3 \Rightarrow y_{3042011} = y_{3042010} = \dots = y_4 = y_3 = |x_7x_1 - x_5x_3| = |13 \cdot 1 - 5 \cdot 2| = 3$

៣ ពិន្ទុ

២-បង្ហាញថា តួនីមួយៗនៃស្វ៊ីត (z_n) ជាការប្រាកដ :

គេមាន $y_n = y_{n-1} = \dots = y_{3042011} = 3$ ហើយគេបាន :

$y_n = |x_{n+4}x_{n-2} - x_{n+2}x_n| = 3 \Rightarrow x_{n+4}x_{n-2} - x_{n+2}x_n = \pm 3 \Rightarrow x_{n+4}x_{n-2} = x_{n+2}x_n \pm 3$

៣ ពិន្ទុ

ម្យ៉ាងទៀត $z_n - 9 = 4x_nx_{n+2}(x_nx_{n+2} \pm 3) \Rightarrow z_n = (\pm 3)^2 + 2(\pm 3)(2x_nx_{n+2}) + (2x_nx_{n+2})^2$

$z_n = (\pm 3 + 2x_nx_{n+2})^2$ ជាការប្រាកដ ចំពោះគ្រប់ $n \geq 3$ ។

៣ ពិន្ទុ

V-(២០ពិន្ទុ) បង្ហាញថា X អាចសរសេរបានមួយបែបគត់ជារាង $X = \sum_{j=1}^k c_j a_j$

-តាមវិធីបែកអង្គបន្តបន្ទាប់គេបាន : $X = aq_0 + c_0, 0 \leq c_0 < a$

$$q_0 = aq_1 + c_1, 0 \leq c_1 < a$$

២ ពិន្ទុ

$$q_1 = aq_2 + c_2, 0 \leq c_2 < a$$

.....

$$q_{k-1} = a \times 0 + c_k, 0 \leq c_k < a$$

២ ពិន្ទុ

គេបានស្រ្តីនៃវិធីបែក : $X > q_0 > q_1 > q_2 > \dots > q_{k-1} > q_k = 0$ ហើយគេបាន :

$$X = aq_0 + c_0$$

$$= a(aq_1 + c_1) + c_0 = a^2q_1 + ac_1 + c_0$$

២ ពិន្ទុ

$$= a^2q_2 + c_2a^2 + c_1a + c_0$$

.....

$$= a^j q_{k-j} + c_{k-j}a^{j-1} + \dots + c_1a + c_0$$

២ ពិន្ទុ

$$= c_k a^j + c_{k-1}a^{j-1} + \dots + c_1a + c_0, (q_{k-j} = c_k) \quad \text{ដែល } 0 \leq c_j < a, j = 0, 1, \dots, k$$

$$\text{ដូចនេះ } X = c_k a^k + c_{k-1}a^{k-1} + \dots + c_1a + c_0 = \sum_{j=0}^k c_j a^j$$

២ ពិន្ទុ

-បង្ហាញថា X អាចសរសេរបានមួយបែបគត់

ឧបមាថា X អាចសរសេរបានពីរបែប :

$$X = c_k a^k + c_{k-1}a^{k-1} + \dots + c_1a + c_0, 0 \leq c_j < a$$

២ ពិន្ទុ

$$X = c'_k a^k + c'_{k-1}a^{k-1} + \dots + c'_1a + c'_0, 0 \leq c'_j < a$$

២ ពិន្ទុ

$$\text{គេបាន } (c_k - c'_k)a^k + (c_{k-1} - c'_{k-1})a^{k-1} + \dots + (c_1 - c'_1)a + (c_0 - c'_0) = 0$$

បើ X អាចសរសេរបានពីរបែបនោះគេអាចរកបានចំនួនគត់ j ដែលគូបជាងគេ ហើយ $c_j \neq c'_j$ ហើយគេបាន :

$$(c_k - c'_k)a^k + (c_{k-1} - c'_{k-1})a^{k-1} + \dots + (c_{j+1} - c'_{j+1})a^{j+1} + (c_j - c'_j)a^j = 0$$

២ ពិន្ទុ

$$\Rightarrow a^j ((c_k - c'_k)a^{k-j} + (c_{k-1} - c'_{k-1})a^{k-1-j} + \dots + (c_{j+1} - c'_{j+1})a^1 + (c_j - c'_j)) = 0$$

$$\Rightarrow (c_k - c'_k)a^{k-j} + (c_{k-1} - c'_{k-1})a^{k-1-j} + \dots + (c_{j+1} - c'_{j+1})a = c'_j - c_j$$

$$\Rightarrow ((c_k - c'_k)a^{k-j-1} + (c_{k-1} - c'_{k-1})a^{k-1-j-1} + \dots + (c_{j+1} - c'_{j+1}))a = c'_j - c_j$$

$$\Rightarrow a|(c'_j - c_j)$$

២ ពិន្ទុ


$$\text{តែ } (0 \leq c_j < a) \wedge (0 \leq c'_j < a) \Rightarrow (-a < c'_j - c_j < a)$$

នេះបញ្ជាក់ថា $a|(c'_j - c_j)$ ជារូបវិធីមិនអាចមាន។

២ ពិន្ទុ

$$\text{ដូចនេះ គេអាចសរសេរ } X = \sum_{j=0}^k c_j a^j \text{ បានមួយបែបគត់។}$$

$$\text{VI- ២០ពិន្ទុ : បង្ហាញថា } 4R + r = p \left(\tan \frac{A}{2} + \tan \frac{B}{2} + \tan \frac{C}{2} \right)$$



២ ពិន្ទុ

តាមរូបមន្តកាំរង្វង់ចារឹកក្នុងត្រីកោណ ABC គេបាន :

$$r = (p-a) \tan(A/2) = (p-b) \tan(B/2) = (p-c) \tan(C/2)$$

២ ពិន្ទុ

$$\Rightarrow r/(p-a) = \tan(A/2), r/(p-b) = \tan(B/2), r/(p-c) = \tan(C/2)$$

$$\tan(A/2) + \tan(B/2) + \tan(C/2) = r/(p-a) + r/(p-b) + r/(p-c)$$

$$= \frac{r(3p^2 - 2(a+b+c)p + ab + bc + ca)}{(p-a)(p-b)(p-c)} = \frac{r(-p^2 + ab + bc + ca)}{(p-a)(p-b)(p-c)} \quad (i)$$

២ ពិន្ទុ

តាមរូបមន្តផ្ទៃក្រឡានៃត្រីកោណ ABC :

$$S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)} = pr$$

$$\Rightarrow p(p-a)(p-b)(p-c) = p^2 r^2$$

$$\text{គេបាន } (p-a)(p-b)(p-c) = pr^2 \quad (ii)$$

២ ពិន្ទុ

តាម (i) :

$$\tan(A/2) + \tan(B/2) + \tan(C/2) = \frac{r(-p^2 + ab + bc + ca)}{pr^2}$$

$$= \frac{-p^2 + ab + bc + ca}{pr} \quad (iii)$$

២ ពិន្ទុ

តាមរូបមន្តផ្ទៃក្រឡានៃផ្ទៃក្រឡាត្រីកោណ ABC :

$$S = (abc)/4R = pr$$

$$\Rightarrow 4Rpr = 4RS = abc$$

២ ពិន្ទុ

តាម (ii) :

$$abc + (p-a)(p-b)(p-c) = 4Rpr + pr^2$$

$$abc + (p^3 - (a+b+c)p^2 + (ab+bc+ca)p - abc) = pr(4R+r)$$

$$p(p^2 - (a+b+c)p + ab + bc + ca) = pr(4R+r)$$

$$p^3 - 2p^2 + ab + bc + ca = r(4R+r)$$

$$-p^2 + ab + bc + ca = r(4R+r)$$

២ ពិន្ទុ

២ ពិន្ទុ

តាម (iii) :

$$\tan(A/2) + \tan(B/2) + \tan(C/2) = \frac{r(4R+r)}{pr} = \frac{4R+r}{p}$$

២ ពិន្ទុ

$$\Rightarrow p \left(\tan \frac{A}{2} + \tan \frac{B}{2} + \tan \frac{C}{2} \right) = 4R+r$$

$$\text{ដូចនេះ } 4R+r = p \left(\tan \frac{A}{2} + \tan \frac{B}{2} + \tan \frac{C}{2} \right)$$

២ ពិន្ទុ

ថ្ងៃទី ០៣ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១១

ប្រធានក្រុមកំណត់គណិតវិទ្យាឆ្នាំទី ១២



ស៊ី សាវណី

លេខបញ្ជី: ០១
 លេខ: ១១

SM

១៤

ប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងប្រទេស
ផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ គណិតវិទ្យា រូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី៩ និងថ្នាក់ទី១២
សម័យប្រឡង: ០២ មេសា ២០១២

វិញ្ញាសាទី១: គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី ១២ សម្រាប់ថ្ងៃទី: ០២-៤-២០១២
រយៈពេល ១៩០ នាទី ពិន្ទុ ១០០

- I. (១០ពិន្ទុ) គណនាផលបូក $S_{2012} = \cos a + \cos 2a + \cos 3a + \dots + \cos 2012a$ ។
- II. (១០ពិន្ទុ) បង្ហាញថា $A = 6^{2012} + 13^{2012} - 2^{2012} - 17^{2012}$ ចែកដាច់នឹង ៤៤ ។
- III. (១០ពិន្ទុ) ដោះស្រាយសមីការ $\sin^2 x^2 + \sin^2 2x^2 = \sin^2 3x^2 + \sin^2 4x^2$ ។
- IV. (១៥ពិន្ទុ) ប្រអប់មួយមានបាតជាតុកោណកែងដែលមានអង្កត់ទ្រូងប្រវែង $D(a) = \frac{a^2 - \sqrt{a^4 + 4} + 2}{a}$ ដែល $a > 0$ ។
 រកប្រវែងអតិបរមានៃអង្កត់ទ្រូងរបស់បាតប្រអប់ ។
- V. (១៥ពិន្ទុ) ពហុធា $r(x) = x^5 - 5x^3 - 3x^2 + 2x + 1$ មានឫសប្រាំផ្សេងគ្នា a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 ហើយ
 $s(x) = -x^2 + 5$ ជាពហុធាមួយទៀត ។
 គណនាផលគុណ $p = s(a_1)s(a_2)s(a_3)s(a_4)s(a_5)$ ។
- VI. (២០ពិន្ទុ) អនុគមន៍ f កំណត់ដោយ $f(x) = \frac{a^x}{a^x + \sqrt{a}}$ ដែល a ជាចំនួនពិតវិជ្ជមានហើយខុសពី ១ ។
 គណនាផលបូក $S = f\left(\frac{1}{2012}\right) + f\left(\frac{2}{2012}\right) + \dots + f\left(\frac{2011}{2012}\right)$ ។
- VII. (២០ពិន្ទុ) រង្វង់ជួរ O កាត់ R មួយចារឹកក្រៅត្រីកោណ ABC មួយដែលមានមុំក្នុងទាំងបីជាមុំស្រួច ហើយ $\angle ACB, \angle ABC$
 ផ្ទៀងផ្ទាត់វិសមភាព $\angle ACB - \angle ABC \geq \frac{\pi}{6}$ ។ H ជាចំណោលកែងនៃកំពូល A ទៅលើជ្រុង BC របស់ត្រីកោណ ។
 បង្ហាញថា $\angle BAC + \angle COH < \frac{\pi}{2}$ ។

ប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងប្រទេស

ផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ គណិតវិទ្យា រូបវិទ្យា ថ្នាក់ទី ៩ និងទី ១២

សម័យប្រឡង: ០២.០៤.២០១២

អត្រាកំណត់គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី ១២ លើកទី ១ ថ្ងៃទី ០២.០៤.២០១២

រយៈពេល ១៨០នាទី ពិន្ទុ ១០០

I-(១០ពិន្ទុ) គណនា $S_{2012} = \cos a + \cos 2a + \cos 3a + \dots + \cos 2012a$

- បើ $a = k2\pi, k \in \mathbb{Z}$ នោះ $\cos a = \cos 2a = \dots = \cos 2012a = 1$

២ពិន្ទុ

ដូចនេះ $S_{2012} = 2012$

- បើ $a \neq k2\pi, k \in \mathbb{Z} \Rightarrow \sin \frac{a}{2} \neq 0$ គេអាចសរសេរ

២ពិន្ទុ

$$2 \sin \frac{a}{2} S_{2012} = 2 \sin \frac{a}{2} \cos a + 2 \sin \frac{a}{2} \cos 2a + 2 \sin \frac{a}{2} \cos 3a + \dots + 2 \sin \frac{a}{2} \cos 2012a$$

២ពិន្ទុ

$$= \left(-\sin \frac{a}{2} + \sin \frac{3a}{2}\right) + \left(-\sin \frac{3a}{2} + \sin \frac{5a}{2}\right) + \dots + \left(-\sin \frac{4023a}{2} + \sin \frac{4025a}{2}\right)$$

$$= \sin \frac{4025a}{2} - \sin \frac{a}{2} = 2 \sin \frac{2012a}{2} \cos \frac{2013a}{2}$$

២ពិន្ទុ

$$\Rightarrow S_{2012} = \frac{\sin \frac{2012a}{2} \cos \frac{2013a}{2}}{\sin \frac{a}{2}} = \frac{\sin 1006a \cos \frac{2013a}{2}}{\sin \frac{a}{2}}, a \neq k2\pi$$

២ពិន្ទុ

II-(១០ពិន្ទុ) បង្ហាញថា $A = 6^{2012} + 13^{2012} - 2^{2012} - 17^{2012}$ ចែកដាច់នឹង 44

គេមាន $x^n - y^n = (x - y)(x^{n-1} + x^{n-2}y + \dots + y^{n-1}) = (x - y)z$ ចែកដាច់នឹង $x - y$

២ពិន្ទុ

គេបាន $(6^{2012} - 2^{2012}) + (13^{2012} - 17^{2012}) = 4k - 4l$ ចែកដាច់នឹង 4

២ពិន្ទុ

តាមរបៀបដូចគ្នាដែរ $(6^{2012} - 17^{2012}) + (13^{2012} - 2^{2012}) = -11m + 11n$ ចែកដាច់នឹង 11

២ពិន្ទុ

ដោយ $A \equiv 0 \pmod{4}, A \equiv 0 \pmod{11}, \text{GCD}(4, 11) = 1$

២ពិន្ទុ

ដូចនេះ $6^{2012} + 13^{2012} - 2^{2012} - 17^{2012}$ ចែកដាច់នឹង 44 ។

២ពិន្ទុ

III-(១០ពិន្ទុ) ដោះស្រាយសមីការ $\sin^2 x^2 + \sin^2 2x^2 = \sin^2 3x^2 + \sin^2 4x^2$

សមីការអាចសរសេរ

$$\frac{1 - \cos 2x^2}{2} + \frac{1 - \cos 4x^2}{2} = \frac{1 - \cos 6x^2}{2} + \frac{1 - \cos 8x^2}{2}$$

២ពិន្ទុ

$$\Leftrightarrow \cos 2x^2 + \cos 4x^2 = \cos 6x^2 + \cos 8x^2$$

$$\Leftrightarrow \cos 3x^2 \cos x^2 = \cos 7x^2 \cos x^2$$

$$\Leftrightarrow \cos x^2 (\cos 7x^2 - \cos 3x^2) = 0$$

$$\Leftrightarrow \cos x^2 \sin 2x^2 \sin 5x^2 = 0 \quad (E)$$

២ពិន្ទុ

គេទាញបាន

$$\cos x^2 = 0 \Leftrightarrow x_1^2 = (2k+1)\frac{\pi}{2}, k = 0, 1, 2, \dots$$

២ពិន្ទុ

$$\sin 2x^2 = 0 \Leftrightarrow x_2^2 = l \frac{\pi}{2}, l = 0, 1, 2, \dots \quad \sin 5x^2 = 0 \Leftrightarrow x_3^2 = m \frac{\pi}{5}, m = 0, 1, 2, \dots$$

២ពិន្ទុ

$$\text{- បើ } l = 2n+1 \Rightarrow x_2^2 = (2n+1) \frac{\pi}{2} = x_1^2$$

$$\text{- បើ } l = 2n \Rightarrow x_2^2 = n\pi = x_3^2 \text{ នៅពេលដែល } m = 5p$$

$$(E) \Leftrightarrow x = \pm \sqrt{(2k+1) \frac{\pi}{2}}, x = \pm \sqrt{m \frac{\pi}{5}} \text{ ដែល } k = 0, 1, 2, \dots \text{ និង } m = 0, 1, 2, \dots$$

២ពិន្ទុ

IV-(១៥ពិន្ទុ) រកប្រវែងអតិបរមានៃអង្កត់ទ្រូងរបស់បាតប្រអប់ដែលអាចផលិតបាន

គេមាន

$$D(a) = \frac{a^2 - \sqrt{a^4 + 4} + 2}{a} = \frac{(a^2 + 2)^2 - (a^4 + 4)}{a(a^2 + 2 + \sqrt{a^4 + 4})}$$

៣ពិន្ទុ

$$= \frac{4a^2}{a(a^2 + 2 + \sqrt{a^4 + 4})} = \frac{4}{(a^2 + 2 + \sqrt{a^4 + 4})/a}$$

$$= \frac{4}{a + \frac{2}{a} + \sqrt{a^2 + \frac{4}{a^2}}}$$

៣ពិន្ទុ

តាមវិសមភាពកូស៊ី គេបាន

$$a + \frac{2}{a} \geq 2\sqrt{2}, \quad a^2 + \frac{4}{a^2} \geq 4 \Rightarrow \sqrt{a^2 + \frac{4}{a^2}} \geq 2$$

៣ពិន្ទុ

$$a + \frac{2}{a} + \sqrt{a^2 + \frac{4}{a^2}} \geq 2\sqrt{2} + 2 \Rightarrow D(a) = \frac{4}{a + \frac{2}{a} + \sqrt{a^2 + \frac{4}{a^2}}} \leq \frac{4}{2\sqrt{2} + 2} = 2\sqrt{2} - 2$$

៣ពិន្ទុ

ដូចនេះប្រវែងអតិបរមានៃអង្កត់ទ្រូងរបស់បាតប្រអប់ $Max(D(a)) = 2\sqrt{2} - 2$ ឯកតាប្រវែង។

៣ពិន្ទុ

V-(១៥ពិន្ទុ) គណនាផលគុណ $p = s(a_1)s(a_2)s(a_3)s(a_4)s(a_5)$

ដោយ a_1, a_2, a_3, a_4, a_5 ជាឫសពហុធា $r(x)$ នោះគេបាន

$$r(x) = x^5 - 5x^3 - 3x^2 + 2x + 1 = (x - a_1)(x - a_2)(x - a_3)(x - a_4)(x - a_5) = \prod_{i=1}^5 (x - a_i)$$

៣ពិន្ទុ

$$\text{ផលគុណ } p = s(a_1)s(a_2)s(a_3)s(a_4)s(a_5) = (5 - a_1^2)(5 - a_2^2)(5 - a_3^2)(5 - a_4^2)(5 - a_5^2)$$

៣ពិន្ទុ

$$p = \prod_{i=1}^5 (\sqrt{5} - a_i) \times \prod_{i=1}^5 (\sqrt{5} + a_i)$$

៣ពិន្ទុ

$$= \prod_{i=1}^5 (\sqrt{5} - a_i) \times (-1) \left(\prod_{i=1}^5 (-\sqrt{5} - a_i) \right) = -r(\sqrt{5})r(-\sqrt{5})$$

២ពិន្ទុ

$$= -((\sqrt{5})^5 - 5(\sqrt{5})^3 - 3(\sqrt{5})^2 + 2\sqrt{5} + 1)((-\sqrt{5})^5 - 5(-\sqrt{5})^3 - 3(-\sqrt{5})^2 - 2\sqrt{5} + 1)$$

២ពិន្ទុ

$$= -(-14 + 2\sqrt{5})(-14 - 2\sqrt{5}) = -176$$

២ពិន្ទុ

VI- (២០ពិន្ទុ) គណនាផលបូក $S = f(\frac{1}{2012}) + f(\frac{2}{2012}) + \dots + f(\frac{2011}{2012})$

គេមាន

$$f(x) + f(1-x) = \frac{a^x}{a^x + \sqrt{a}} + \frac{a^{1-x}}{a^{1-x} + \sqrt{a}}$$

$$f(x) + f(1-x) = \frac{a^x}{a^x + \sqrt{a}} + \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a} + a^x} = 1$$

គេអាចសរសេរ

$$f(\frac{1}{2012}) + f(\frac{2011}{2012}) = 1$$

$$f(\frac{2}{2012}) + f(\frac{2010}{2012}) = 1$$

$$f(\frac{3}{2012}) + f(\frac{2009}{2012}) = 1$$


$$f(\frac{1005}{2012}) + f(\frac{1007}{2012}) = 1$$

$$f(\frac{1006}{2012}) = f(1/2) = \frac{\sqrt{a}}{2\sqrt{a}} = 1/2$$

ដោយបូកអង្គ និង អង្គ គេបាន

$$S = f(\frac{1}{2012}) + f(\frac{2}{2012}) + \dots + f(\frac{2011}{2012}) = 1005 + (1/2) = 1005.5$$

VII- (២០ពិន្ទុ) បង្ហាញថា $\angle BAC + \angle COH < \frac{\pi}{2}$



គេគូសអង្កត់ធ្នូ $AA' \parallel BC$ ហើយគេបាន $\angle ACB = \angle A'BC$

$$\angle A'BC - \angle ABC \geq \frac{\pi}{6} \Rightarrow \angle A'BC \geq \angle ABC + \frac{\pi}{6}$$

$$\angle CBA + \angle ABA' \geq \angle ABC + \frac{\pi}{6} \Rightarrow \angle ABA' \geq \frac{\pi}{6}$$

$$\Rightarrow \angle AOA' \geq \frac{\pi}{3}$$

តាង J, J' ជាចំណុចកណ្តាលអង្កត់ធ្នូ AA', BC រៀបគ្នា។

$$\text{ត្រីកោណសមបាត } OAA' \text{ មាន } \angle AOA' \geq \frac{\pi}{3} \Rightarrow AA' \geq OA = R$$

គេបាន $AI \geq R/2$

$AIJH$ ជាចតុកោណកែង នោះគេបាន $AI = HJ \geq R/2$

២ពិន្ទុ

ត្រីកោណកែង JOH : $OH > JH \geq R/2 \Rightarrow OH > R/2$ (1)

២ពិន្ទុ

តែ $HC = JC - JH < R - JH \leq R/2 \Rightarrow HC < R/2$ (2)

២ពិន្ទុ

(1)&(2) $\Rightarrow HC < OH$

$\Rightarrow \angle COH < \angle OCH$

២ពិន្ទុ

គូសអង្កត់ធ្នឹត CC' ហើយគេបាន $\angle C'CB = \angle C'AB$ (ស្មាត់ផ្ទៃរួម $C'B$)

២ពិន្ទុ

$\angle COH < \angle OCH \Rightarrow \angle COH + \angle BAC < \angle OCH + \angle BAC$


$\angle COH + \angle BAC < \angle C'AB + \angle BAC = \angle C'AC = \pi/2$

ថ្ងៃទី ០២ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១២

ថ្ងៃទី ០២ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១២

អ្នកកត់ត្រា


បានឃើញ និង ឯកភាព


ហាង ស៊ីភាវ

ប្រធានក្រុមកំណែទម្រង់វិទ្យាស្ថាន ១២



អ៊ុំ សាវណី



១០

ស្រី អ៊ុយ ឌី

១៥

ប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងប្រទេស
ផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ គណិតវិទ្យា ប្រវត្តិសាស្ត្រ ភូមិសាស្ត្រ និងថ្នាក់ទី៩ និងថ្នាក់ទី១២
សម័យប្រឡង: ០២ មេសា ២០១២

វិញ្ញាសាទី២: គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី ១២ សម្រាប់ថ្ងៃទី: ០៤-៤-២០១២
រយៈពេល ១៨០ នាទី ពិន្ទុ ១០០

- I. (១០ពិន្ទុ) គេកាត់ $[x]$ ជាផ្នែកគត់នៃចំនួនពិត x ហើយដែលកំណត់ដោយ $[x] \leq x < [x] + 1$ ។
 បង្ហាញថា បើ b ជាចំនួនគត់វិជ្ជមាន នោះគេបាន $\left[\frac{x}{b}\right] = \left[\frac{[x]}{b}\right]$ ។
- II. (១០ពិន្ទុ) អនុគមន៍ f កំណត់ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត x ដោយ $f(x) = \cos x + \cos(\sqrt{p}x)$ ដែល p ជាចំនួនបឋម។
 បង្ហាញថា f មិនមែនជាអនុគមន៍ខួបលើសំណុំចំនួនពិតទេ។
- III. (២០ពិន្ទុ) គេឱ្យផលបូក $S(a, b) = (a+1)^b + (a+2)^b + (a+3)^b + (a+4)^b + (a+5)^b$ ដែល a និង b ជាពិចម័យចំនួនគត់វិជ្ជមាន។
 បង្ហាញថា $S(a, b)$ ចែកដាច់នឹង 5 បើ b មិនមែនជាពហុគុណនៃ 4 ។
- IV. (២០ពិន្ទុ) សមីការ $t^3 = 3t^2 + 4t - 5$ មានឫសបីផ្សេងគ្នា a, b និង c ។
 គណនាតម្លៃលេខនៃ $F_7(a, b, c) = \frac{a^7 - b^7}{a - b} + \frac{b^7 - c^7}{b - c} + \frac{c^7 - a^7}{c - a}$ ។
- V. (២០ពិន្ទុ) ត្រីកោណ ABC មួយមាន $\angle ABC = 2a$ និងផ្ទៃក្រឡា s ។ D ជាចំណុចមួយស្ថិតនៅលើជ្រុង AC ហើយដែលរង្វង់ចារឹកក្នុងត្រីកោណ ABD ប៉ុនគ្នានឹងរង្វង់ចារឹកក្នុងត្រីកោណ BCD ។
 បង្ហាញថា $BD = \sqrt{\frac{s}{\tan a}}$ ។
- VI. (២០ពិន្ទុ) ស្ថិត (x_n) កំណត់ដោយ $x_1 = 1, x_2 = 1$ និង $x_{n+1} = x_n + x_{n-1}$ ចំពោះ $n \geq 2$ ។
 ១- បង្ហាញថា $x_{k+1} \cdot x_{k+2} - x_k \cdot x_{k+3} = (-1)^k$ ចំពោះ $\forall k \in \mathbb{N}$ ។
 ២- គេកាត់ arccot ជាអនុគមន៍ប្រាសនៃអនុគមន៍ $\cot$ ។
 បង្ហាញថា $\operatorname{arccot} x_1 - \operatorname{arccot} x_3 - \operatorname{arccot} x_5 - \dots - \operatorname{arccot} x_{2011} = \operatorname{arccot} x_{2012}$ ។

ប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែឧត្តមប្រទេស

ផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ គណិតវិទ្យា ប្រវត្តិ ថ្នាក់ទី ៩ និងទី ១២

សម័យប្រឡង: ០២.០៤.២០១២

អត្រាកំណត់គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី ១២ លើកទី ២ ថ្ងៃទី ០៤.០៤.២០១២

រយៈពេល ១៨០នាទី ពិន្ទុ ១០០

I-(១០ពិន្ទុ) បង្ហាញថា បើ b ជាចំនួនគត់ វិទ្យុកិច្ចមាន នោះ $[x/b] = [[x]/b]$:

តាង $a = [x]$ ហើយតាមវិធីចែកអវិជ្ជមាន a & b គេបាន $a = bq + r, 0 \leq r < b$

២ពិន្ទុ

ដោយ $0 \leq r < b \Rightarrow bq \leq bq + r < b(q+1)$ ហើយ $bq \leq a < b(q+1) \Rightarrow q \leq \frac{a}{b} < q+1$

គេទាញបាន $[a/b] = q$ ហើយ $[a/b] = [[x]/b] = q$ (1)

២ពិន្ទុ

ម្យ៉ាងទៀត $[x] \leq x < [x]+1 \Rightarrow x = a + \varepsilon = bq + r + \varepsilon, 0 \leq \varepsilon < 1$

គេបាន $[x/b] = [(bq + r + \varepsilon)/b] = [q + (r + \varepsilon)/b]$

២ពិន្ទុ

តែ $0 \leq \varepsilon < 1$ & $0 \leq r \leq b-1 \Rightarrow 0 \leq r + \varepsilon < b$ ហើយ $0 \leq (r + \varepsilon)/b < 1$

២ពិន្ទុ

គេបាន $q \leq q + (r + \varepsilon)/b < q+1$ ហើយ $q \leq [x/b] < q+1 \Rightarrow [x/b] = q$ (2)

តាម(1) & (2) $\Rightarrow [x/b] = [[x]/b]$ ។

២ពិន្ទុ

II-(១០ពិន្ទុ) បង្ហាញថា f មិនមែនជាអនុគមន៍ខួបលើសំណុំចំនួនពិតទេ :

ឧបមាថា f មានខួប T នោះគេបាន $f(x+T) = f(x)$ ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត x ។

២ពិន្ទុ

បានន័យថា $\cos(x+T) + \cos(x\sqrt{p} + T\sqrt{p}) = \cos x + \cos(x\sqrt{p})$ ចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត x ។

២ពិន្ទុ

ពិនិត្យចំពោះ $x=0$ គេបាន : $\cos T + \cos T\sqrt{p} = 2 \Leftrightarrow \cos T = 1 \wedge \cos T\sqrt{p} = 1$

២ពិន្ទុ

$T = k2\pi \wedge T\sqrt{p} = m2\pi, k \in \mathbb{N}, m \in \mathbb{N}$ ហើយ $\sqrt{p} = \frac{m2\pi}{k2\pi} = \frac{m}{k}$

២ពិន្ទុ

ដោយ $\sqrt{p} \in \mathbb{Q}_+ \wedge \frac{m}{k} \in \mathbb{Q}_+$ នោះគេបាន $\sqrt{p} = \frac{m}{k}$ ជាករណីមិនអាចមាន។

២ពិន្ទុ

ដូចនេះ f មិនមែនជាអនុគមន៍ខួបលើសំណុំចំនួនពិតទេ។

III-(២០ពិន្ទុ) បង្ហាញថា $S(a,b)$ ចែកដាច់នឹង 5 បើ b មិនមែនជាពហុគុណនៃ 4

ចំពោះ $a \geq 0$ គេបាន $a+1, a+2, a+3, a+4, a+5$ ចែកនឹង 5 បានសំណល់ 0,1,2,3,4 ។

២ពិន្ទុ

គេបាន $S(a,b) \equiv 0^b + 1^b + 2^b + 3^b + 4^b \equiv 1^b + 2^b + 3^b + 4^b \pmod{5}$

២ពិន្ទុ

តាមការសង្កេតគេបាន : $2^{4m} \equiv 1, 2^{4m+1} \equiv 2, 2^{4m+2} \equiv 4, 2^{4m+3} \equiv 3 \pmod{5}$

២ពិន្ទុ

$3^{4m} \equiv 1, 3^{4m+1} \equiv 3, 3^{4m+2} \equiv 4, 3^{4m+3} \equiv 2 \pmod{5}$

២ពិន្ទុ

$4^{4m} \equiv 1, 4^{4m+1} \equiv 4, 4^{4m+2} \equiv 1, 4^{4m+3} \equiv 4 \pmod{5}$

២ពិន្ទុ

-បើ $b = 4m+1$ (មិនមែនជាពហុគុណនៃ 4) នោះគេបាន

$1^b + 2^b + 3^b + 4^b \equiv 1^{4m+1} + 2^{4m+1} + 3^{4m+1} + 4^{4m+1} \equiv 1 + 2 + 3 + 4 \equiv 10 \equiv 0 \pmod{5}$

២ពិន្ទុ

$\Rightarrow S(a,b) \equiv 0 \pmod{5}$

-បើ $b = 4m + 2$ (មិនមែនជាពហុគុណនៃ 4) នោះគេបាន

$$1^b + 2^b + 3^b + 4^b = 1^{4m+2} + 2^{4m+2} + 3^{4m+2} + 4^{4m+2} \equiv 1 + 4 + 4 + 1 = 10 \equiv 0 \pmod{5}$$

$$\Rightarrow S(a, b) \equiv 0 \pmod{5}$$

២ពិន្ទុ

-បើ $b = 4m + 3$ (មិនមែនជាពហុគុណនៃ 4) នោះគេបាន

$$1^b + 2^b + 3^b + 4^b = 1^{4m+3} + 2^{4m+3} + 3^{4m+3} + 4^{4m+3} \equiv 1 + 3 + 2 + 4 = 10 \equiv 0 \pmod{5}$$

$$\Rightarrow S(a, b) \equiv 0 \pmod{5}$$

២ពិន្ទុ

ដូចនេះ $S(a, b)$ ចែកដាច់នឹង 5 បើ b មិនមែនជាពហុគុណនៃ 4 ។

២ពិន្ទុ
២.៥

IV-(២០ពិន្ទុ) គណនាតម្លៃលេខនៃ $F_7(a, b, c) = \frac{a^7 - b^7}{a - b} + \frac{b^7 - c^7}{b - c} + \frac{c^7 - a^7}{c - a}$:

សមីការ $t^3 = 3t^2 + 4t - 5$ មិនផ្ទៀងផ្ទាត់ចំពោះ $t = 0$ គឺថា $t \neq 0$

$$\text{នោះគេបាន } t^3 = 3t^2 + 4t - 5 \Leftrightarrow t^{k+3} = 3t^{k+2} + 4t^{k+1} - 5t^k$$

២ពិន្ទុ

ដោយ a, b និង c ជាបួសបីផ្ទៀងផ្ទាត់នោះគេបាន $a^{k+3} = 3a^{k+2} + 4a^{k+1} - 5a^k$ (1),

$$b^{k+3} = 3b^{k+2} + 4b^{k+1} - 5b^k \quad (2), \quad c^{k+3} = 3c^{k+2} + 4c^{k+1} - 5c^k \quad (3)$$

២ពិន្ទុ

$$(1) - (2) \text{ រួចចែកនឹង } (a - b): \frac{a^{k+3} - b^{k+3}}{a - b} = 3 \frac{a^{k+2} - b^{k+2}}{a - b} + 4 \frac{a^{k+1} - b^{k+1}}{a - b} - 5 \frac{a^k - b^k}{a - b} \quad (4)$$

២ពិន្ទុ

$$(2) - (3) \text{ រួចចែកនឹង } (b - c): \frac{b^{k+3} - c^{k+3}}{b - c} = 3 \frac{b^{k+2} - c^{k+2}}{b - c} + 4 \frac{b^{k+1} - c^{k+1}}{b - c} - 5 \frac{b^k - c^k}{b - c} \quad (5)$$

២ពិន្ទុ

$$(3) - (1) \text{ រួចចែកនឹង } (c - a): \frac{c^{k+3} - a^{k+3}}{c - a} = 3 \frac{c^{k+2} - a^{k+2}}{c - a} + 4 \frac{c^{k+1} - a^{k+1}}{c - a} - 5 \frac{c^k - a^k}{c - a} \quad (6)$$

២ពិន្ទុ

ដោយបូក (4) + (5) + (6) អង្គ និងអង្គ

$$\frac{a^{k+3} - b^{k+3}}{a - b} + \frac{b^{k+3} - c^{k+3}}{b - c} + \frac{c^{k+3} - a^{k+3}}{c - a} = 3 \left(\frac{a^{k+2} - b^{k+2}}{a - b} + \frac{b^{k+2} - c^{k+2}}{b - c} + \frac{c^{k+2} - a^{k+2}}{c - a} \right) +$$

$$+ 4 \left(\frac{a^{k+1} - b^{k+1}}{a - b} + \frac{b^{k+1} - c^{k+1}}{b - c} + \frac{c^{k+1} - a^{k+1}}{c - a} \right) - 5 \left(\frac{a^k - b^k}{a - b} + \frac{b^k - c^k}{b - c} + \frac{c^k - a^k}{c - a} \right) \quad (7)$$

២ពិន្ទុ

$$\text{តាង } F_k = \frac{a^k - b^k}{a - b} + \frac{b^k - c^k}{b - c} + \frac{c^k - a^k}{c - a} \quad F_{k+1} = \frac{a^{k+1} - b^{k+1}}{a - b} + \frac{b^{k+1} - c^{k+1}}{b - c} + \frac{c^{k+1} - a^{k+1}}{c - a}$$

$$F_{k+2} = \frac{a^{k+2} - b^{k+2}}{a - b} + \frac{b^{k+2} - c^{k+2}}{b - c} + \frac{c^{k+2} - a^{k+2}}{c - a}, \quad F_{k+3} = \frac{a^{k+3} - b^{k+3}}{a - b} + \frac{b^{k+3} - c^{k+3}}{b - c} + \frac{c^{k+3} - a^{k+3}}{c - a}$$

$$\text{គេបាន } F_{k+3} = 3F_{k+2} + 4F_{k+1} - 5F_k \quad (8)$$

២ពិន្ទុ

$$\text{- បើ } k = 0 \text{ នោះគេបាន } F_0 = 0, F_1 = 1 + 1 + 1 = 3, F_2 = 2(a + b + c) = 2 \times 3 = 6$$

២ពិន្ទុ

$$\text{ហើយតាម(8) គេបាន } F_3 = 3F_2 + 4F_1 - 5F_0 = 3 \times 6 + 4 \times 3 - 5 \times 0 = 30$$

$$\text{- បើ } k = 1 \text{ នោះតាម(8) គេបាន } F_4 = 3F_3 + 4F_2 - 5F_1 = 90 + 24 - 15 = 99$$

$$\text{- បើ } k = 2 \text{ នោះតាម(8) គេបាន } F_5 = 3F_4 + 4F_3 - 5F_2 = 297 + 120 - 30 = 387$$

២ពិន្ទុ


$$\text{- បើ } k = 3 \text{ នោះតាម(8) គេបាន } F_6 = 3F_5 + 4F_4 - 5F_3 = 1161 + 396 - 150 = 1407$$

$$\text{- បើ } k = 4 \text{ នោះតាម(8) គេបាន } F_7 = 3F_6 + 4F_5 - 5F_4 = 4221 + 1548 - 495 = 5274$$

$$\text{ដូចនេះ } F_7(a, b, c) = \frac{a^7 - b^7}{a - b} + \frac{b^7 - c^7}{b - c} + \frac{c^7 - a^7}{c - a} = 5274$$

២ពិន្ទុ

V-(២០ពិន្ទុ) បង្ហាញថា $BD = \sqrt{\frac{s}{\tan \alpha}}$:



៤ពិន្ទុ

តាង : s_1 និង p_1 ជាផ្ទៃក្រឡា និង កន្លះបរិមាត្រនៃ $\triangle ABD$ s_2 និង p_2 ជាផ្ទៃក្រឡា និង កន្លះបរិមាត្រនៃ $\triangle BCD$
 p ជា កន្លះបរិមាត្រនៃ $\triangle ABC$ r ជាកាំរង្វង់ចារឹកក្នុង $\triangle ABC$ r' ជាកាំរង្វង់ចារឹកក្នុង $\triangle ABD$ និង $\triangle BCD$
 E និង E' ជាចំនុចប៉ះរវាង AB ជាមួយរង្វង់ចារឹកក្នុង $\triangle ABC$ និង $\triangle ABD$
 F និង F' ជាចំនុចប៉ះរវាង BC ជាមួយរង្វង់ចារឹកក្នុង $\triangle ABC$ និង $\triangle BCD$

គេបាន : $s = s_1 + s_2$, $pr = p_1r' + p_2r' = (p_1 + p_2)r'$ (1)

២ពិន្ទុ

ម្យ៉ាងទៀត : $2p_1 + 2p_2 = 2p + 2BD \Rightarrow p_1 + p_2 = p + BD$

២ពិន្ទុ

(1) អាសរសេរ : $pr = (p + BD)r'$ ហើយ $\frac{r'}{r} = \frac{p}{p + BD}$ (2)

២ពិន្ទុ

$\triangle E'AO_1 \sim \triangle EAO$: $\frac{AE'}{AE} = \frac{r'}{r}$ ហើយ $\triangle F'CO_2 \sim \triangle FCO$: $\frac{CF'}{CF} = \frac{r'}{r}$ (3)

ក្នុង $\triangle ABC$ គេមាន $p = AE + BF + FC = AE + BC \Rightarrow AE = p - BC$

ក្នុង $\triangle ABC$ គេមាន $p = CF + AE + EB = CF + AB \Rightarrow CF = p - AB$

២ពិន្ទុ

ក្នុង $\triangle ABD$ គេមាន $AE' = p_1 - BD$ ក្នុង $\triangle BCD$ គេមាន $CF' = p_2 - BD$

(3) : $\frac{r'}{r} = \frac{p_1 - BD}{p - BC} = \frac{p_2 - BD}{p - AB} = \frac{p_1 + p_2 - 2BD}{2p - (BC + AB)}$

$\frac{r'}{r} = \frac{p + BD - 2BD}{AC} = \frac{p - BD}{AC}$ (4)

២ពិន្ទុ

តាម (2) និង (4) : $\frac{p}{p + BD} = \frac{p - BD}{AC} \Rightarrow p \cdot AC = p^2 - BD^2$

២ពិន្ទុ

$\Rightarrow BD^2 = p(p - AC) = p \cdot BE$ (5) ព្រោះ $BI = p - AC$

២ពិន្ទុ

ក្នុង $\triangle EBO$: $BE = \frac{r}{\tan \alpha}$

២ពិន្ទុ

(5) : $BD^2 = \frac{pr}{\tan \alpha} = \frac{s}{\tan \alpha} \Rightarrow BD = \sqrt{\frac{s}{\tan \alpha}}$

VI-(២០ពិន្ទុ) ១- បង្ហាញថា $x_{k+1} \cdot x_{k+2} - x_k \cdot x_{k+3} = (-1)^k$ ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ធម្មជាតិ k

- ចំពោះ $k = 1$ គេបាន $x_2 \cdot x_3 - x_1 \cdot x_4 = 1 \times 2 - 1 \times 3 = -1 = (-1)^1$

- ឧបមាពិត ដល់ $k = p$ គឺថា $x_{p+1} \cdot x_{p+2} - x_p \cdot x_{p+3} = (-1)^p$

២ពិន្ទុ

- សិក្សាករណី $k = p + 1$

$$\begin{aligned}x_{p+2} \cdot x_{p+3} - x_{p+1} \cdot x_{p+4} &= x_{p+2}(x_{p+1} + x_{p+2}) - x_{p+1}(x_{p+2} + x_{p+3}) \\&= (x_{p+2})^2 - x_{p+1}(x_{p+1} + x_{p+2}) = (x_{p+2})^2 - (x_{p+1})^2 - x_{p+1}x_{p+2} \\&= (x_{p+2} - x_{p+1})(x_{p+2} + x_{p+1}) - x_{p+1}x_{p+2} \\&= (x_{p+1} + x_p - x_{p+1})(x_{p+3}) - x_{p+1}x_{p+2} \\&= x_p x_{p+3} - x_{p+1}x_{p+2} \\&= (-1)(x_{p+1}x_{p+2} - x_p x_{p+3}) = (-1)(-1)^p = (-1)^{p+1}\end{aligned}$$

២ពិន្ទុ

ដូច្នេះ $x_{k+1} \cdot x_{k+2} - x_k \cdot x_{k+3} = (-1)^k$ ចំពោះគ្រប់ចំនួនគត់ធម្មជាតិ k ។

២ពិន្ទុ

២- បង្ហាញថា $\arccot x_1 - \arccot x_3 - \arccot x_5 - \dots - \arccot x_{2011} = \arccot x_{2012}$

គេដឹងថា $a = \cot \alpha, b = \cot \beta \Leftrightarrow \alpha = \arccot a, \beta = \arccot b$

២ពិន្ទុ

$$\cot(\alpha - \beta) = \frac{\cot \alpha \cot \beta + 1}{\cot \beta - \cot \alpha} \Leftrightarrow \alpha - \beta = \arccot \left(\frac{\cot \alpha \cot \beta + 1}{\cot \beta - \cot \alpha} \right)$$

២ពិន្ទុ

$$\Leftrightarrow \arccot a - \arccot b = \arccot \left(\frac{ab + 1}{b - a} \right)$$

គេអាចសរសេរ

$$\arccot x_{2i} - \arccot x_{2i+1} = \arccot \left(\frac{x_{2i}x_{2i+1} + 1}{x_{2i+1} - x_{2i}} \right) = \arccot \left(\frac{x_{2i}x_{2i+1} + 1}{x_{2i} + x_{2i-1} - x_{2i}} \right)$$

២ពិន្ទុ

$$\arccot x_{2i} - \arccot x_{2i+1} = \arccot \left(\frac{x_{2i}x_{2i+1} + 1}{x_{2i-1}} \right) \quad (1)$$

តាមសំណួរទី១ ខាងលើ និងយក $k = 2i - 1$ នោះគេបាន

$$x_{2i} \cdot x_{2i+1} - x_{2i-1} \cdot x_{2i+2} = -1 \Rightarrow x_{2i} \cdot x_{2i+1} + 1 = x_{2i-1} \cdot x_{2i+2}$$

តាម(1) គេបាន $\arccot x_{2i} - \arccot x_{2i+1} = \arccot x_{2i+2}$

ដោយដូចតម្លៃ $i = 1, 2, 3, \dots, 1005$ នោះគេបាន

$$\arccot x_1 - \arccot x_3 = \arccot x_4 \quad (\text{ព្រោះ } x_2 = x_1)$$

២ពិន្ទុ

$$\arccot x_4 - \arccot x_5 = \arccot x_6$$

$$\dots \dots \dots \arccot x_{2010} - \arccot x_{2011} = \arccot x_{2012}$$

២ពិន្ទុ

បូកអង្គ និងអង្គ គេបាន

$$\arccot x_1 - \arccot x_3 - \arccot x_5 - \dots - \arccot x_{2011} = \arccot x_{2012} \quad \square$$

២ពិន្ទុ

ថ្ងៃទី ០៤ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១២

ថ្ងៃទី ០៤ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១២

បានឃើញ និង ឯកភាព

អ្នកកត់ត្រា

ប្រធានគ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យាថ្នាក់ទី ១២



ហ៊ុន ស៊ីវិច



អ៊ុំ ស៊ីវិច

ក្រ

ប្រឡងប្រើសរសេរសិស្សព្រឹត្តិការណ៍កីឡាជាតិ

ផ្នែកគណិតវិទ្យា គណិតវិទ្យា ប្រឡង ថ្នាក់ទី ៩ ឆ្នាំទី ១២

សម័យប្រឡង : ០១-០៤-២០១៣

ចំណាត់ថ្នាក់ គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី ១២ ឆ្នាំទី ១ ថ្ងៃទី ០១-០៤-២០១៣

រយៈពេល ១៨០នាទី ពិន្ទុ ១០០

I. (១០ពិន្ទុ) បង្ហាញថា គ្រប់ចំនួនគត់វិជ្ជមាន k អាចសរសេរជា $a^2 + b^2 - 5c^2$ ដែល a, b, c ជាចំនួនគត់វិជ្ជមាន ។

II. (១៥ពិន្ទុ) កំណត់ចំនួនបួសគត់វិជ្ជមានទាំងអស់នៃសមីការ $x + y + z = n$ ដែល n ជាចំនួនគត់វិជ្ជមាន ។

III. (១៥ពិន្ទុ) ស្វ៊ីតចំនួនពិត $x_1, x_2, \dots, x_n$ កំណត់ដោយ $x_1 = 0$ និង $|x_i| = |x_{i-1} + c|$ ដែល $2 \leq i \leq n$ និង c ជា

ចំនួនពិតវិជ្ជមាន ។ កំណត់តម្លៃអប្បបរមារបស់ $A = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ ជាអនុគមន៍នៃចំនួនពិតវិជ្ជមាន c តែមួយគត់ ។

IV. (២០ពិន្ទុ) សិស្ស ៩ នាក់ ធ្វើដំណើរតាមកាតាណូតមួយ ដែលខ័ណ្ឌជា ៣ បន្ទប់ដាច់ពីគ្នា ។ សិស្សម្នាក់ៗត្រូវឡើងជិះនៅក្នុង បន្ទប់ណាមួយដោយចៃដន្យ ។ រកប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ :

A: សិស្ស ៣ នាក់ ជិះនៅក្នុងបន្ទប់ទីមួយ

B: សិស្ស ៣ នាក់ ជិះនៅក្នុងបន្ទប់ទីមួយៗ

C: សិស្ស ២ នាក់ជិះនៅក្នុងបន្ទប់មួយ ៣ នាក់ ជិះនៅក្នុងបន្ទប់មួយទៀត ហើយ ៤ នាក់ ជិះនៅក្នុងបន្ទប់ដែលនៅសល់ ។

V. (២០ពិន្ទុ) P ជា ចំណុចមួយនៅក្នុងត្រីកោណ ABC មួយ ។ បន្ទាត់ AP ជួប BC ត្រង់ I បន្ទាត់ BP ជួប CA ត្រង់ J ហើយ បន្ទាត់ CP ជួប AB ត្រង់ K ។

$$\text{បង្ហាញថា } \frac{PA}{PI} \times \frac{PB}{PJ} + \frac{PB}{PJ} \times \frac{PC}{PK} + \frac{PC}{PK} \times \frac{PA}{PI} \geq 12$$

VI. (២០ពិន្ទុ) រកគ្រប់អនុគមន៍ f ដែលកំណត់ និងមានដេរីវេចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត $x, y, xy \neq 1$ ហើយផ្ទៀងផ្ទាត់សមភាព

$$f(x) + f(y) = f\left(\frac{x+y}{1-xy}\right)$$

ប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូជគណិតប្រទេស

ផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ គណិតវិទ្យា ប្រវត្តិសាស្ត្រ ថ្នាក់ទី ៩ និមិត្ត ១២

សម័យប្រឡង: ០១.០៤.២០១៣

អត្រាកំណត់គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី ១២ លើកទី ១ ថ្ងៃទី ០១.០៤.២០១៣

រយៈពេល ១៨០នាទី ពិន្ទុ ១០០

I. (១០ពិន្ទុ) បង្ហាញថា គ្រប់ចំនួនគតិវិជ្ជមាន k អាចសរសេរជា $a^2 + b^2 - 5c^2$ ដែល a, b, c ជាចំនួនគតិវិជ្ជមាន

- ករណី $k = 2n+1, n \in \mathbb{Z}$ គេអាចសរសេរ $k = 2n+1 = n^2 + 4n^2 - 5n^2 + 2n+1$

២ពិន្ទុ

$$k = n^2 + 2n+1 + 4n^2 - 5n^2$$

២ពិន្ទុ

$$k = (n+1)^2 + (2n)^2 - 5n^2$$

- ករណី $k = 2n, n \in \mathbb{Z}$ គេអាចសរសេរ $k = 2n = n^2 + 4n^2 - 5n^2 - 8n + 10n$

២ពិន្ទុ

$$k = n^2 - 4n + 4 + 4n^2 - 4n + 1 - 5n^2 + 10n - 5$$

២ពិន្ទុ

$$k = (n-2)^2 + (2n-1)^2 - 5(n-1)^2$$

២ពិន្ទុ

II. (១៥ពិន្ទុ) កំណត់ចំនួនចម្លើយគតិវិជ្ជមានទាំងអស់នៃសមីការ $x + y + z = n$ ដែល n ជាចំនួនគតិវិជ្ជមាន

- ដំបូងគេពិនិត្យសមីការ $y + z = k$ ដែល k ជាចំនួនគតិវិជ្ជមាន

២ពិន្ទុ

y អាចយកតម្លៃ $1, 2, \dots, k-1$ ព្រោះបើ $y \geq k \Rightarrow z \leq 0$ ដែលមិនអាច

២ពិន្ទុ

z អាចយកតម្លៃ $k-y$ គឺ $z = k-1, k-2, \dots, 1$

២ពិន្ទុ

ដូចនេះ សមីការ $y + z = k$ មាន $(k-1)$ ចម្លើយគតិវិជ្ជមាន ។

- ចំពោះ សមីការ $x + y + z = n$

x អាចយកតម្លៃ $1, 2, \dots, n-2$ ព្រោះបើ $x \geq n-1 \Rightarrow x + y + z \geq n-1+1+1 = n+1$ ដែលមិនអាច

២ពិន្ទុ

ចំណែក y និង z ផ្សេងផ្ទាល់សមីការ $y + z = n-x$ ដែលមាន $((n-x)-1)$ ចម្លើយ (y, z)

២ពិន្ទុ

បានន័យថា ចំពោះ តម្លៃណាមួយរបស់ x គេអាចបាន $(n-x-1)$ ចម្លើយ (y, z) ។

ដោយ $x = 1, 2, \dots, n-2$ នោះគេបានចំនួន ចម្លើយគតិវិជ្ជមាន (x, y, z) ទាំងអស់នៃសមីការ $x + y + z = n$

២ពិន្ទុ

$$\sigma = (n-1-1) + (n-2-1) + \dots + (n-(n-2)-1)$$

$$= (n-2) + (n-3) + \dots + 1 = 0.5(n-1)(n-2)$$

៣ពិន្ទុ

ដូចនេះ ចំនួនចម្លើយគតិវិជ្ជមាន (x, y, z) ទាំងអស់នៃសមីការ: $\sigma = 0.5(n-1)(n-2)$ ។

III. (១៥ពិន្ទុ) កំណត់តម្លៃអប្បបរមារបស់ $A = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$ ជាអនុគមន៍ចំនួនពិតវិជ្ជមាន c តែមួយគត់

$$\text{គេមាន } \sum_{i=1}^{n+1} x_i^2 = \sum_{i=2}^{n+1} |x_i|^2 = \sum_{i=2}^{n+1} |x_{i-1} + c|^2$$

២ពិន្ទុ

$$= \sum_{i=2}^{n+1} (x_{i-1} + c)^2 = \sum_{i=2}^{n+1} x_{i-1}^2 + 2c \sum_{i=2}^{n+1} x_{i-1} + nc^2$$

២ពិន្ទុ

$$= \sum_{i=1}^n x_i^2 + 2c \sum_{i=1}^n x_i + nc^2$$

២ពិន្ទុ

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^{n+1} x_i^2 - \sum_{i=1}^n x_i^2 = 2c \sum_{i=1}^n x_i + nc^2$$

២ពិន្ទុ

$$0 = x_{n+1}^2 - 2 \sum_{i=1}^n x_i + nc^2$$

២ពិន្ទុ

$$\text{គេទាញបាន } 2c \sum_{i=1}^n x_i \geq -nc^2$$

២ពិន្ទុ

$$\frac{PA}{PI} = \frac{AI - PI}{PI} = \frac{AI}{PI} - 1 = \frac{S}{S_1} - 1 = \frac{S_2 + S_3}{S_1}$$

២ពិន្ទុ

តាមរបៀបដូចគ្នា

$$\frac{PB}{PJ} = \frac{S_3 + S_1}{S_2}$$

២ពិន្ទុ

$$\frac{PC}{PK} = \frac{S_1 + S_2}{S_3}$$

២ពិន្ទុ

តេអាទលរលេវ

$$\frac{PA}{PI} \times \frac{PB}{PJ} + \frac{PB}{PJ} \times \frac{PC}{PK} + \frac{PC}{PK} \times \frac{PA}{PI} = \frac{(S_2 + S_3)(S_3 + S_1)}{S_1 S_2} + \frac{(S_3 + S_1)(S_1 + S_2)}{S_2 S_3} +$$

២ពិន្ទុ

$$+ \frac{(S_1 + S_2)(S_2 + S_3)}{S_3 S_1}$$

$$= \left(\frac{S_3}{S_1} + \frac{S_1}{S_3} \right) + \left(\frac{S_3}{S_2} + \frac{S_2}{S_3} \right) + \left(\frac{S_1}{S_2} + \frac{S_2}{S_1} \right) + 3 + \frac{S_1^2}{S_2 S_3} + \frac{S_2^2}{S_3 S_1} + \frac{S_3^2}{S_1 S_2}$$

២ពិន្ទុ

$$= \left(\frac{S_3}{S_1} + \frac{S_1}{S_3} \right) + \left(\frac{S_3}{S_2} + \frac{S_2}{S_3} \right) + \left(\frac{S_1}{S_2} + \frac{S_2}{S_1} \right) + 3 + \frac{S_1^2 + S_2^2 + S_3^2}{S_1 S_2 S_3}$$

២ពិន្ទុ

$$\geq 2 + 2 + 2 + 3 + 3 = 12$$

$$\text{ដូចនេះ } \frac{PA}{PI} \times \frac{PB}{PJ} + \frac{PB}{PJ} \times \frac{PC}{PK} + \frac{PC}{PK} \times \frac{PA}{PI} \geq 12$$

២ពិន្ទុ

VI. (២០ពិន្ទុ) រកគ្រប់អនុគមន៍ f

$$\text{គេមាន } f'(x) = \frac{1+y^2}{(1-xy)^2} f'\left(\frac{x+y}{1-xy}\right) \quad (1)$$

៣ពិន្ទុ

$$f'(y) = \frac{1+x^2}{(1-xy)^2} f'\left(\frac{x+y}{1-xy}\right) \quad (2)$$

៣ពិន្ទុ

ដោយចែក (1) & (2) :

$$\frac{f'(x)}{f'(y)} = \frac{1+y^2}{1+x^2}$$

២ពិន្ទុ

$$\Rightarrow f'(x)(1+x^2) = f'(y)(1+y^2)$$

២ពិន្ទុ

$$\text{គេទាញបាន អង្គទាំងពីរត្រូវតែស្មើនឹងចំនួនថេរ } k \text{ ណាមួយ គឺថា } f'(x)(1+x^2) = k$$

២ពិន្ទុ

$$\Rightarrow f'(x) = k/(1+x^2)$$

$$\Rightarrow f(x) = \int (k/(1+x^2)) dx = k \arctan x + c$$

២ពិន្ទុ

$$\text{បើ } y = 0 \Rightarrow f(x) + f(0) = f\left(\frac{x+0}{1-0}\right) = f(x) \Rightarrow f(0) = 0$$

២ពិន្ទុ

$$\text{តែ } f(0) = k \arctan 0 + c = 0 \Rightarrow c = 0$$

២ពិន្ទុ

$$\text{ដូចនេះ } f(x) = k \arctan x \text{ ដែល } k \text{ ជាចំនួនថេរណាមួយ ។}$$

២ពិន្ទុ

ថ្ងៃទី ០១ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៣

គ្រោតត្រូវអំណោយដ៏តម្លាភាព ។


ស៊ី សាងសី

✓

ប្រឡងប្រើប្រាស់សិទ្ធិប្រឡងប្រឡង

ផ្នែកអក្សរស័ព្ទ គណិតវិទ្យា ប្រឡង ថ្នាក់ ៩ និង ១២

សម័យប្រឡង : ០១.០៤.២០១៣

ចំណាត់ថ្នាក់ គណិតវិទ្យា ថ្នាក់ ១២ លើក ២ ថ្ងៃ ០៣.០៤.២០១៣

សរុបពេល ១៨០នាទី ពិន្ទុ ១០០

I. (១០ពិន្ទុ) បង្ហាញថា $A = \frac{1}{n+1} C(2n, n)$ ជាចំនួនគត់ ចំពោះ $n = 1, 2, 3, \dots$ ។

II. (១៥ពិន្ទុ) ត្រីកោណមួយមានជ្រុងប្រវែង a, b និង c ។ គេស្វែងរកចំណុចនៅខាងក្រៅត្រីកោណ និងមានអង្កត់ធ្នឹម ជាជ្រុងនីមួយៗរបស់ត្រីកោណនោះ ។ អង្កត់ប៉ះពាល់នៃកន្លះរង្វង់ពីរ មានប្រវែង x, y និង z រៀងគ្នា ។ សរសេរផលបូក $\Sigma = \frac{yz}{x} + \frac{zx}{y} + \frac{xy}{z}$ ជាអនុគមន៍នៃ a, b និង c ។

III. (១៥ពិន្ទុ) M ជា ចំណុច មួយនៅលើ ឬនៅក្នុងរង្វង់កាំ R មួយ ។ តាម M គេគូសអង្កត់ធ្នឹមកែងគ្នា AC និង BD ។ រកតម្លៃធំបំផុត និងតម្លៃតូចបំផុតរបស់ផលបូក $S = AC + BD$ ។

IV. (២០ពិន្ទុ) គេឱ្យនូវនាក់ទំនង D មួយ ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌខាងក្រោម :

(i) $D(1, 0, 0, 1) = 1,$

(ii) $D(kw, x, ky, z) = k D(w, x, y, z),$

(iii) $D(w, x, y, z) = -D(x, w, z, y),$

(iv) $D(w+u, x, y+v, z) = D(w, x, y, z) - F(u, x, v, z)$ ដែល k, u, v, w, x, y និង z ជាចំនួនពិត ។

កំណត់ $D(a, b, c, d)$ ជាអនុគមន៍នៃចំនួនពិត a, b, c និង d ។

V. (២០ពិន្ទុ) គេតាង $s(n)$ ជាផលបូកលេខទាំងអស់របស់ចំនួន 2^n ដែល $n = 1, 2, 3, \dots$ ។

បង្ហាញថា គ្មាននូវនាក់ទំនង n ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ $s(n+1) = s(n)$ ។

VI. (២០ពិន្ទុ) គេឱ្យ ចំនួនពិត $a_1, a_2, \dots, a_m$ និង $u_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$ ដែល $n = 1, 2, \dots, m$ ។

បង្ហាញថា $\sum_{n=2}^m \left(\frac{u_n}{n} \right)^2 \leq 12 \sum_{n=1}^m a_n^2$ ។



ប្រឡងជ្រើសរើសសិស្សពូកែទូទាំងប្រទេស

ផ្នែកអក្សរសិល្ប៍ខ្មែរ គណិតវិទ្យា ប្រវត្តិសាស្ត្រ ថ្នាក់ទី ៩ និងទី ១២

សម័យប្រឡង: ០១.០៤.២០១៣

អគ្គនាយកដ្ឋានគណិតវិទ្យា ថ្នាក់ទី ១២ លេខ: ២ ថ្ងៃទី ០៣.០៤.២០១៣

យោងលេខ ១៨០នាទី ពិន្ទុ ១០០

I. (១០ពិន្ទុ) បង្ហាញថា $A = \frac{1}{n+1} C(2n, n)$ ជាចំនួនគត់ ចំពោះ $n = 1, 2, 3, \dots$

$$\text{គេមាន } A = \frac{1}{n+1} C(2n, n) = \frac{(2n)!}{n!(n+1)!}$$


$$A = \frac{(2n)!}{n!(n+1)!} ((n+1) - n) = \frac{(2n)!(n+1)}{n!(n+1)!} - \frac{(2n)!n}{n!(n+1)!}$$

$$= \frac{(2n)!}{(n!)^2} - \frac{(2n)!}{(n-1)!(n+1)!}$$

$$= C(2n, n) - C(2n, n-1)$$

ដោយ $C(2n, n) \& C(2n, n-1)$ ជាចំនួនគត់ នោះ $A = C(2n, n) - C(2n, n-1)$ ជាចំនួនគត់ ។

II. (១៥ពិន្ទុ) សរសេរផលបូក $\sum = \frac{yz}{x} + \frac{zx}{y} + \frac{xy}{z}$ ជាអនុគមន៍នៃ a, b និង c



គេយក $\triangle ABC$ ជាត្រីកោណដែលមាន $BC = a, CA = b$ និង $AB = c$ ។

តាង A', B', C' ជាចំណុចកណ្តាលរៀងរាល់ជ្រុង BC, CA, AB ។

តាង: MN ជាបន្ទាត់ប៉ះរួមនៃកន្លះរង្វង់ផ្ចិត C' និងផ្ចិត B' ហើយ $MN = x$

RS ជាបន្ទាត់ប៉ះរួមនៃកន្លះរង្វង់ផ្ចិត A' និងផ្ចិត C' ហើយ $RS = y$

PQ ជាបន្ទាត់ប៉ះរួមនៃកន្លះរង្វង់ផ្ចិត B' និងផ្ចិត A' ហើយ $PQ = z$ ។

គូស $C'T \perp B'N$ ត្រង់ T នោះគេបាន $MNTC'$ ជាតុកោណកែង ។

វិញ្ញាប $MC' = C'T = x$

គេបាន $B'C' = a/2, B'T = B'N - TN = [(b/2) - (c/2)]$

$$C'T = \sqrt{(B'C')^2 - (B'T)^2} = \sqrt{(a/2)^2 - ((b/2) - (c/2))^2}$$

$$x = (1/2) \sqrt{(a+b+c)(a-b+c)}$$

តាមរបៀបដូចគ្នា គេបាន :

$$y = (1/2) \sqrt{(a-b+c)(-a+b+c)}$$

$$z = (1/2) \sqrt{(-a+b+c)(a-b+c)}$$

$$\text{ដូច្នេះ } \frac{yz}{x} = \frac{1}{2} (a+b+c) \cdot \frac{1}{2} (a-b+c) \cdot \frac{1}{2} (a-b+c) = \frac{1}{2} (a+b+c)$$

$$\text{ដូចនេះ } \sum = \frac{yz}{x} + \frac{zx}{y} + \frac{xy}{z} = \frac{1}{2} (a+b+c) \quad \square$$

ហើយ $1 \leq a_m \leq 9, 0 \leq a_j \leq 9$ ចំពោះ $j = 0, 1, 2, \dots, m-1$

គេបាន $2^n \equiv a_m + a_{m-1} + \dots + a_1 + a_0 \pmod{3}$

$2^n \equiv s(n) \pmod{3}$

ម្យ៉ាងទៀត $2^{n+1} = b_p 10^p + b_{p-1} 10^{p-1} + \dots + b_1 10 + b_0$

គេទាញបាន $2^{n+1} \equiv s(n+1) \pmod{3}$

$s(n+1) \equiv 2^{n+1} \equiv 2 \times 2^n \equiv 2s(n) \pmod{3}$

ឧបមាថាមានចំនួនគតិវិជ្ជមាន n ដែល $s(n+1) = s(n)$ នោះគេបាន :

$s(n) \equiv 2s(n) \pmod{3} \Rightarrow s(n) \equiv 0 \pmod{3}$

$\Rightarrow 2^n \equiv 0 \pmod{3}$ ដែលជាការលើកមិនអាចមាន ។

ដូចនេះ គ្មានចំនួនគតិវិជ្ជមាន n ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់ $s(n+1) = s(n)$ ។

VI. (២០ពិន្ទុ) បង្ហាញថា $\sum_{n=2}^m \left(\frac{u_n}{n} \right)^2 \leq 12 \sum_{n=1}^m a_n^2$

គេមាន $\left(\frac{u_n}{n} \right)^2 = (a_n + (\frac{u_n}{n} - a_n))^2 \leq 2a_n^2 + 2(\frac{u_n}{n} - a_n)^2 = 4a_n^2 + 2(\frac{u_n}{n})^2 - 4a_n \frac{u_n}{n}$

គេអាចសរសេរ $\sum_{n=1}^m (\frac{u_n}{n})^2 \leq 4 \sum_{n=1}^m a_n^2 + 2 \sum_{n=1}^m (\frac{u_n}{n})^2 - 4 \sum_{n=1}^m a_n (\frac{u_n}{n})$ (1)

តែ $u_n^2 - u_{n-1}^2 = (u_n + u_{n-1})(u_n - u_{n-1}) = (2u_n - a_n)a_n = 2u_n a_n - a_n^2$

$\Rightarrow -2u_n a_n = -(u_n^2 - u_{n-1}^2) - a_n^2 \leq -(u_n^2 - u_{n-1}^2)$

គេបាន : $-2 \sum_{n=1}^m \frac{u_n a_n}{n} = -2u_1^2 - 2 \sum_{n=2}^m \frac{u_n a_n}{n} \leq -u_1^2 - \sum_{n=2}^m \frac{1}{n} (u_n^2 - u_{n-1}^2) = -\sum_{n=1}^{m-1} \frac{1}{n(n+1)} u_n^2 - \frac{u_m^2}{m}$

$\Rightarrow -2 \sum_{n=1}^m \frac{u_n a_n}{n} \leq -\sum_{n=1}^{m-1} \frac{1}{n(n+1)} u_n^2 - \frac{u_m^2}{m} \leq -\sum_{n=1}^{m-1} \frac{1}{n(n+1)} u_n^2 - \frac{u_m^2}{m(m+1)}$

$\Rightarrow -2 \sum_{n=1}^m \frac{u_n a_n}{n} \leq -\sum_{n=1}^m \frac{1}{n(n+1)} u_n^2$ (2)

តាម(1) និង(2) គេបាន

$\sum_{n=1}^m (\frac{u_n}{n})^2 \leq 4 \sum_{n=1}^m a_n^2 + 2 \sum_{n=1}^m \frac{u_n}{n^2(n+1)} \Rightarrow \sum_{n=1}^m (1 - \frac{2}{n+1}) (\frac{u_n}{n})^2 \leq 4 \sum_{n=1}^m a_n^2$

$\Rightarrow \sum_{n=1}^m (\frac{n-1}{n+1}) (\frac{u_n}{n})^2 \leq 4 \sum_{n=1}^m a_n^2 \Rightarrow 0 + \sum_{n=2}^m (\frac{n-1}{n+1}) (\frac{u_n}{n})^2 \leq 4 \sum_{n=1}^m a_n^2$ (3)

ដោយ $f(n) = \frac{n-1}{n+1}$ ជាអនុគមន៍កើនឡើង នេះ គេបាន $f(n) \geq f(2) = 1/3$ ចំពោះ $n \geq 2$

គេបាន $\frac{n-1}{n+1} \geq \frac{1}{3} \Rightarrow \sum_{n=2}^m \frac{n-1}{n+1} (\frac{u_n}{n})^2 \geq \frac{1}{3} \sum_{n=2}^m (\frac{u_n}{n})^2$ (4)

តាម(3) និង(4) គេបាន $\sum_{n=2}^m (\frac{u_n}{n})^2 \leq 12 \sum_{n=1}^m a_n^2$

ថ្ងៃទី ០៣ ខែ មេសា ឆ្នាំ ២០១៣

ប្រធានក្រុមកំណែតម្លៃវិទ្យាស្ថានទី ១២

ស៊ី សារ៉ាណី